





Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

74-7-73

74
2
14

74
2
3

12.14 f y



Collegij Rom. Luc. Lun. Cas. nitris.

VICTORIS
TRINCAVELLII
PHILOSOPHI,

AC MEDICI VENETI,
OMNIVM SVA TEMPESTATE
FACILE PRINCIPIS,

LIBRI TRES, ET QVARTI FRAGMENTVM:

*De ratione Componendorum Medicamentorum, eorundemq;
usu, Ipso dictante à suis Discipulis diligenter descripti; ac
à Laurensio Marucino Medico post alios recogniti.*

Cum locupletissimo Indice, tum capitulorum, tum rerum notabilium.

CVM PRIVILEGIIS.



VENETIIS,

Apud Camillum, & Rutilium Borgominerios Fr. ad signum S. Georgij

M D LXXI.

B. S.

TRINITY
HILL

JUL 19 1964

"MAY SWORN DEATH BE PART LEAST"

Dr. William C. Brown, Jr., President, 1990-1991

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵



E Q V I T I
CLARISSIMO, ET
PRAESTANTISSIMO

VENETAE REIP. SENATORI
MARINO DE CABALLIS
PRUDENTISSIMO PATAVINI
GYMNASII MODERATORI,

Io. Franciscus Trincauellius S. P. D.



ADDUCTVS maximis amico-
rum precibus, ac suasionibus
Senator Amplissime passus
sum, ut hac patris mei cum
uiueret tui studiosissimi moni-
menta de usu, & compositione
medicamentorum ab ipsius auditoribus eo legen-
te excepta in lucem prodirent. Sed quia ea ille
nec recognouit, nec emendauit, nec unquam cogi-
tauit, ut aliquando ederentur: tātum autem in di-
scipulorum gratiam explicauit: licet non defue-
rint pleriq; utriusq; lingua, ac artis medica peri-
tissimi uiri, à quibus diligenter recognita, atq;
emendata fuere: omnino tamen eo defensore ege-
bant, qui doctissimus esset, omni doctrinarum ge-
nere clarus, & maxima authoritatis uir, cuius

patrocínio quassitutiſſimo clypeo tecta. Zoilorum
calumnias nõ formidarent. Is certè es tu Senator
maxime, qui præter id quod in Veneta Republi
ca adminiſtranda, in ipſius commodis conſulen
do, in diſſidijs cum exteris principibus ſedandis,
in populis regendis, in legationibus ad omnes Eu
ropa principes egregie obeundis, in orando ab om
nibus merito princeps Senator haberiſ, & re
rum, locorumq̃, ac gentium uniuerſarum mo
rum, & conſuetudinum, & cæterorum etiam om
nium, quæ ad Imperium regendum faciunt: cogni
tione maximè præſtas. & ut alia, in quibus ex
cellis, prætermittam, in omnibus ſcientijs aquè
diuinis, atq; humanis, & in artibus liberalibus
plurimum inſudaſti, & profeciſti: Hyppocratis
q̃ue & Galeni, ac aliorum illius claſſis medico
rum dogmata optimè calles. Suscipe igitur or
natiffime uir (quæ tua eſt humanitas) horum li
brorum, quos tibi dico, deſenſionem, & me,
quod ſemper ſum̃mopere optauī, & opto, in cli
entelam tuam recipe. Faxitq̃ Deus, ut te diu in
columi in ijs præſertim difficillimis temporibus,
Veneta Reſpublica fruatur. Vale.

FRANCISCO TRINCAVELLIO

VICTORIS FILIO

IVRISCONSULTO

PERITISSIMO,

Laurentius Marucinus Medicus
salutem :



VE MADMODVM, Franciscæ Carissi-
me, temporum iniuriam demonstrant
euerſa palatia, turres, & ciuitates:
ſic inter cætera hominum præterito-
rum vires, ingenium, gloriamq; oſten-
dunt columnarum, ſtatuarum, libro-
rumq; fragmenta. Quapropter ani-
mo euoluens meo quanta ſemper fue-
rit patris tui iactura, & quod nullo
maiori deprehendi poſſet argumento, nec certiori teſtimonio
in poſterum declarari, quàm ſi ſcriptorum ſuorum reliquia
ſpectarentur, ideo non potui me ipſum amplius continere,
quin te ſæpe ſæpius recuſantem hortarer, moneremq;, vt in
communem omnium utilitatem, ſua, ſi qua ſint, vel etiam à
ſcolaribus ſcripta, tandem edenda permitteres. Sciunt enim
omnes, quod morte præuentus, vltimam ſuis monumentis ma-
num imponere non poterit. Eo autem magis hoc te factu-
rum exiſtimauī, ne aliena manu ſuis lectionibus adnotata,
quæ plura ſunt, diutius ſine recognitione in eius nominis iniu-
riam, inſtar Prothei, nulla forma conſtantia, vagarentur,
inuidorumq; latratibus, & morſibus indignè ſubiacerent, li-
cet ab optimis dogmatib. Excellentiffimi Patris tui longæua
ac diſtantia. Quod autem poſt aliorum admonitiones, &

I N D E X

*preces, meo nunc facile consilio acquieris, in studentium
commodum, his tecum gaudeo, qui operis huius beneficio,
magis quoq; tibi mea causa debent. Gratiasq; ago promu-
nere hoc in me collato, cum fuerit amoris erga me tui, ac exi-
stimationis non vulgare signum: & eo minus unquam mihi
obliuioni tradendum, quo post omnes alios doctissimos viros,
qui elaborarunt, tres libros, & quarti fragmentum de compo-
sitione, & usu medicamentorum, nuper modofidei, iudicioq;
liberè commiseris. Vale.*

INDEX CAPITVM

TOTIVS OPERIS TRINCAVELLII

DE VSV ET COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM.

CAPITA PRIMI LIBRI.

Cap.1.



Præmium in quo de occasione & genere scribendi agitur, & quæ partes medicinz ante doctrinam & usum medicamentorum prænoscendæ sint.

Cap.2.

Quòd medicamentum cibus & uenenum ad corpus referantur, & de necessitate compositionis medicamentorum communia præcepta.

Cap.3.

De communi medicamentorum enumeratione & differentiis, & quòd componendorum medicamentorum ratio præcipue ab indicationibus pendeat.

Cap.4.

De differentiis medicamentorum per os assumendorum.

Cap.5.

De purgantibus medicamentis.

Cap.6.

De usu medicamentorum leniter purgantium generalis methodus.

Cap.7.

Quòd rectus usus medicamentorum in qualitate, quantitate, modo utendi, & tempore consistit: ac primum de qualitate.

Cap.8.

A quibus petenda quantitas, seu modus medicamenti.

Cap.9.

Sub qua forma medicamentum sit exhibendum.

Cap.10.

De opportuno purgandi tempore.

Cap.11.

De ratione mixturæ horum facilium medicamentorum & usus eorum magis particulatim.

Cap.12.

Methodus miscendi leniter purgantia medicamenta, tum ipsorum: tum plenioris uacuationis, aut reuulsionis causa.

Cap.13.

De ratione usus, & compositionis medicamentorum, quæ potius soluentia, quàm lenientia dici possunt.

Cap.14.

De purgatoriorum medicamentorum dosi in uniuersum.

I N D E X.

- Cap. 15. De compositis medicamentis, quibus medici solent in purgandis corporibus uti.
- Cap. 16. De usu, & compositione medicamentorum, quæ bilem flauam uacuant, quæq; pituitam, & quæ plures humores.
- Cap. 17. De pillulis, uel catapotijs.
- Cap. 18. De trochiscis, in quibus uis purgatoria est insignis. Item & de pulueribus.
- Cap. 19. De ratione commiscendi mutuò medicamenta composita, atq; composita cum simplicibus, & de potionibus.
- Cap. 20. De clisteriis.
- Cap. 21. De glandibus.
- Cap. 22. De medicamentis, quibus cictur uomitus.

Capita secundi libri.

- Cap. 1. Quis sit huius libri scopus: ac de humorum concoctione, & præparatione in uniuersum.
- Cap. 2. Quòd medicamentorum alterantium natura distinde prænosceda est, de quæ indicationibus, à quibus rectus eorum usus pendet, uniuersalis receptio.
- Cap. 3. De artificialis concoctionis communi ratione, & cur tam simplicia, quàm composita medicamenta coqueantur, deque aqua, melle, & zuccharo nonnulla scitu digna.
- Cap. 4. De syrupis, qui in frequentiori usu sunt.
- Cap. 6. De ratione, & methodo recti syruporum usus.
- Cap. 5. De syrupis compositis, ac de ratione compositionis eorum.
- Cap. 7. De trochiscis.
- Cap. 8. De aliis medicamentis interius sumendis quæ uulgo eleuaria uel confectioes solent appellari, quibus ad alia munia quàm ad purgationem utimur.
- Cap. 9. De narcoticis dictis medicamentis, quæ & anodyna appellantur.
- Cap. 10. De clegmatibus, quæ Arabes loch uocare solent.

I N D E X

Capita libri tertij.

- Cap. 1. Proœmium.
- Cap. 2. De ratione compositionis & usus eorum medicamentorum quibus uti solent in curanda unitate soluta.
- Cap. 3. De medicamentis quorum usu curantur uulnera.
- Cap. 4. De compositis medicamentis, quibus con. mode uti possumus in conglutinandis uulneribus.
- Cap. 5. De cærais, uel emplastris, uel unguentis uulgo dictis quibus tum antiqui tum iuniores uti sunt in conglutinandis uulneribus, & de ratione usus eorum quæ hæcenus fuere exposita.
- Cap. 6. De differentiis ulcerum.
- Cap. 7. De ratione compositionis, & usus medicamentorum, quibus curandum est ulcus concauum.
- Cap. 8. De curatione, & simplicibus medicamentis, quæ tum ad ea ulcera pertinent à grecis *δυσήκτονα* proprie dicta, tum quæ ad maligna adhibentur, id est *καρκινώδη* appellata.
- Cap. 9. De compositione, & usu eorum prædicamentorum, quæ eisdem ulceribus contumacibus, & malignis curandis idonea sunt.
- Cap. 10. De compositione, & usu eorum medicamentorum, quibus sordida ulcera curanda sunt.
- Cap. 11. De medicamentis accomodatis putridis & gangrenosis.
- Cap. 12. De erodentium ulcerum, quæ ex edentia à latinis, phagedena à grecis dicuntur, & ipsa inter se maligna connumerata, medicamentis.
- Cap. 13. De sinu, & fistula, uel de medicamentis, quibus hæc curanda sunt.
- Cap. 14. De callosis sinibus fistulisq; ac aliis ulceribus, quæ ostracosa iuniores appellant.
- Cap. 15. De his quibus curanda sunt ulcera, quibus super ex creseit caro inutilis, quem affectum greci *ὀστέα πύρρον* appellant.
- Cap. 16. De compositione, & usu eorum medicamentorum, quæ caustica, quæq; septica hoc est urentia, & putrefaciencia dicuntur.
- Cap. 17. De medicamentorum ratione, quæ in curandis affectibus

I N D E X

bus neruorum ad solutam continuitatem attinentibus
in usum solent uenire.

- Cap. 18. Quibus medicamentis sistendus sit sanguis immodicè à
uulneribus, uel ulceribus profluens.
- Cap. 19. De curandis tumoribus, qui in corpore humano præter
eius naturam excitantur, per medicamenta, primumq;
de eorum natura in uniuersum.
- Cap. 20. De ratione medicamentorum, quibus curandæ sunt in-
flammationes.
- Cap. 21. De aptis medicamentis ad ignem sacrum curandis.
- Cap. 22. De Tuberculo, Furunculo, Phygethlo, & Carbunculo.
- Cap. 23. De curandis frigidis tumoribus, primumq; de tumore
molle, & laxo, qui oedema à Græcis dictus est.
- Cap. 24. De medicamentis aptis ad curandos tumores flatuosos.
- Cap. 25. De scirrhis exquisitis, & non exquisitis per medicamen-
ta curandis.
- Cap. 26. De ratione compositionis, & usus medicamentorum,
quibus curandus est cancer.
- Cap. 27. De ratione curandi reliquos tumores, & abscessus frigi-
diores, qui ex pituitosa materia ortum habent.
- Cap. 28. De ratione eorum medicamentorum, quibus apte cura
ri possunt cutanei affectus, nempe prurigine, scabie,
atq; huiusmodi.

Capita quarti libri.

- Cap. 1. Proæmium.
- Cap. 2. De topicis medicamentis accomodatis ad affectus cu-
tis capitis curandos.
- Cap. 3. De medicamentis aptis ad curandum manantia ulcera in
capite, quæ *ἑλκῆρες* & *ἡλπίς* & *ἰσχυρία* dicuntur.
- Cap. 4. De ratione compositionis, & usus medicamentorum
congruentium curandis affectibus internarum par-
tium capitis, primumq; de illis, quæ ad plagas capiti il-
latas pertinent.
- Cap. 5. De medicamentis componendis, quæ congruentia sunt
aliis affectibus internarum partium capitis curandis.
- Cap. 6. De affectibus capitis, qui à præsentē materia fouentur,
per

I N D E X

per topica medicamenta curandis.

- Cap. 7. De affectibus per medicamenta topica curandis, quibus exerceri solent particulæ quæ habent ortum, & facultates à cerebro, primumq; de illis, qui ad nervos, & nervosas partes referuntur, ut sunt resolutio, & convulsio.
- Cap. 8. De medicamentorum compositione, quæ apta sunt curandis morbis propriis sensuum instrumentis, primumq; de oculis, ac de eorum usu.
- Cap. 9. Ad ulcera oculorum.
- Cap. 10. De medicamentis, quibus maculæ in oculis exorta tolluntur, ac de eorum usu.
- Cap. 11. De ratione componendorum medicamentorum, quorum usu curandæ sunt affectiones partium circumstantium oculis, primumq; palpebrarum, & angulorum.
- Cap. 12. De ratione curandi alios faciei affectus per apta & localia medicamenta, & de eorum compositione, & usu.
- Cap. 13. De ratione compositionis eorum medicamentorum, quibus apte curari possunt narium affectus.
- Cap. 14. De medicamentis, quibus utuntur medici in aurium affectibus ex ratione curandis.
- Cap. 15. De ratione medicamentorum, quibus consulere medici solent auditui laboranti, quatenus ad propriam eius rationem pertinet.
- Cap. 16. De medicamentorum compositione, & usu, quæ apta possunt esse curandis affectibus oris.
- Cap. 17. De illis, quæ pertinent ad curandos male affectos dentes.

FINIS IN DICIS CAPITVM.

INDEX RERVM

OMNIVM MEMORABILIVM, QVAE

IN TOTO TRINCAVELLII

OPERE HOC CONTINENTVR.

A



- Antidotus quid sit ex Galeni sententia.* pag. 104. b
Antidotorum simplex differentia. pag. 104. b
Aromatum usus quomodo & quo tempore nocuus sit. pag. 112. a
Abstersio conglutinandis uulneribus omnino aduersatur. pag. 134. a
Astrictio addita pharnacis partium tenuium confert ad eorum penetrationem. pag. 137. a
Aloes uis in uulneribus remittitur mixtura thuris, & longè etiam magis si ex pilis leporis & oui candido fuerit administratum. pagina. 137. a
Astringentia solent exasperare ulcera. pag. 151. a
Alumen quia ualenter admodum astringit non est eius usus admodum frequens in curandis ulceribus, eius inquam solius & citra aliorum mixturam. pag. 152. a
Alumen zuccharinum quomodo conficiatur. pag. 176. b
Aloe magis astringit quàm thus. pag. 192. b
Attrahenti nihil prodest attractio nisi adsit redundantia. pag. 196. a
Adipit & medullæ differentia mulsæ ponuntur. pag. 217. a & infra
Adarce quid sit. pag. 236. b
Achores non sunt tñatum à pituita salsa ut uidetur dicere Galenus. pag. 244. b
Aceti proportio ad oleum rosaceum in oxirodino qualis esse debeat. pag. 255. a
Astringentia immoderata non laudantur in capitis affectibus interioris. pag. 262. b
Acrimonia sine aliquo calore esse requirit. pag. 263. a
 Amigdale

I N D E X

<i>Amigdale amara attenuandi, detergendi, & digerendi vires satis conspicuas habent.</i>	pag. 296. b
<i>Acetum magis siccatur quam uinum.</i>	pag. 302. b
<i>Assatio diffinitur.</i>	pag. 73. b
<i>Aqua cur à medicis coqui soleat.</i>	pag. 73. b
<i>Aqua ab Aegyptijs coquebatur ut magis refrigeraret.</i>	pag. 74. a
<i>Acetum, Aqua, & Mel, cur in oximellis compositione coquantur.</i>	pag. 75. a
<i>Aloes usus non solum hyeme suspectus est, ut dicit Mesues, uerum etiam aestate.</i>	pag. 21. a
<i>Aloe à proprietate non autem tantum per accidens, ut dicunt multi, ora uenarum sedis aperit. & quomodo liceat uitium hoc emendare.</i>	pag. 21. a & sequentibus.
<i>Aromatum odor cap. dolentibus infestus est.</i>	pag. 76. b
<i>Aceti odor ingratum medicamentorum, cum assumuntur, odorem superat.</i>	pag. 76. b
<i>Amaritudo in tenui substantia consistit.</i>	pag. 79. b
<i>Aciditas in tenui substantia fundatur.</i>	pag. 79. b
<i>Adstrictio sepe apertionem adiuvat, tantum abest ut eam impediat.</i>	pag. 80. a
<i>Artificiosa ratio quæ nam sit.</i>	pag. 80. b
<i>Aggregatarum pillularum ethymologia.</i>	pag. 47. b
<i>Aqua cruda nunquam est utendum ad diluenda medicamenta.</i>	pagina. 54. a
<i>Aque stillatitiæ retinent uim simplicium ex quibus stillantur.</i>	pagina. 54. a & b
<i>Aquarum stillatiarum odor malus quomodo euitari possit.</i>	pagina. 76. b
<i>Adstrictio et Apertio si contraria inter se sint, in eodem tamen esse possunt.</i>	pag. 79. b
<i>Adstringentia non admodum utiliter immiscentur medicamentis spirituum inuantibus.</i>	pag. 98. b
<i>Assatio siccitatem & adstrictionem adiuvat.</i>	pag. 102. b
<i>Anguria est melo Indus.</i>	pag. 103. b

B

<i>Byonia facultas ex Dioscoride ac Arabibus exponitur.</i>	pagina. 46. b
<i>Barbara</i>	

I N D E X

Barbara appellata medicamentum a primario à medicis excogitata sunt ad
agglutinanda recentia uulnera. pag. 139.b
Barbari usus non est omnino tutus in principio uulneris quando subest
timor futura inflammationis. pag. 142.b
Bubones in inguinibus solent excitari aliquando ex insueta & laborio
sa equitatione uel ex claudicante ambulatione aut dolore. pagi-
na. 206.a

C

Confectiones cum ex aridis pharmacis constant, omnes exiecat: un-
de in affectibus siccis non est admodum tutus earum usus.
pagina. 105.b
Continui solutio duplex est. pag. 128.b
Continuitatis solutio differentia à quibus petantur. pag. 129.a et infra.
Carnosæ partes quæ debiscunt ope natini caloris uniuntur. pag. 131.a
Carnis generatio est opus naturæ à medico tamen adiuuatur. pagi-
na. 145.a & b
Ceratum ex oleo & resina siccantius est quàm id quod fit ex oleo &
cera. pag. 161.b
Cucurbitula absq; scarificatione reuellunt ratione doloris concitati.
pag. 188.a
Cicoracea omnia tanta familiaritate erga iecur sunt prædita quod in ca-
lidis affectibus plurimum pro sunt in frigido tamen non nocent. pa-
gina. 89.b
Cuscuta potenter licnis obstructions aperire creditur. pag. 96.b
Carbones possunt dici ulcera & inflammationes. pag. 207.a
Canceri cur in mulierum mamillis potissimum oriri soleant. pag. 221.b
Cutis capitis quomodo differat à cute aliarum partium corporis. pa-
gina. 232.a
Capilli non sunt ueræ partes nostri corporis unde proprie nullus ijs com-
petit affectus præter naturam. pag. 233.a
Charta quomodo ab antiquis conficeretur. pag. 244.b
Contusio & concussio capitis quæ & quot incommoda possit asferre.
pag. 246.a
Cutis cur reliquis partibus nostri corporis imbecillior procreata sit.
pagi. 243.a
Contusum in ulceribus necesse est putrescere. pag. 249.a
Cerebrum

<i>Cerebrum aut nullum, aut admodum clisurum habet sensum.</i>	pagina. 260.a
<i>Calum oris unde dictum sit.</i>	pag. 315.b
<i>Concoctio & maturatio in medicina idem sunt.</i>	pag. 68.b
<i>Concoctio quid sit & à quo fiat.</i>	pag. 68.b
<i>Concoctionem adiuvat medicus dupliciter.</i>	pag. 69.b
<i>Concocta facilius inter se anuntur quam cruda.</i>	pag. 75.a
<i>Cibus, Medicina, venenum ex numero relatiuorum sunt.</i>	pag. 2.a
<i>Clysteriorum assiduus usus ex Galeno molestus est.</i>	pag. 17.b
<i>Cassia incommoda quomodo corrigantur.</i>	pag. 20.a
<i>Clysteres quales conueniant in ulceribus intestinorum.</i>	pagina. 63.b
<i>&</i>	64.a
<i>Clysteres ab uniuerso corpore euacuant & reuellant.</i>	pag. 63.b
<i>Clysteres molles & lenes quomodo acres reddantur.</i>	pag. 63.a
<i>Clysteres acres in quibus morbis potissimum conuenient.</i>	pag. 62.b
<i>Clysteres reuellentes in morbi principio conueniunt.</i>	pag. 60.b
<i>Clysteres euacuatiui dicti in quo differant à pharmacis euacuantibus per os assumptis, & in quo morbi & diei tempora commodius administrari possint.</i>	pag. 60.a & b
<i>Cassig pro clysterijs conficienda modus exponitur.</i>	pag. 62.a
<i>Crocus facile petit caput.</i>	pag. 45.b
<i>Costio quid boni efficiat in medicamentis.</i>	pag. 31.a
<i>Componendorum pharmacorum methodus rationi & experientie innititur.</i>	pag. 32.a
<i>Cheyron & Cariota quid sit.</i>	pag. 40.b
<i>Clysteris nomen unde deducendum sit.</i>	pag. 58.b
<i>Clysteriorum differentia quae & quot sint.</i>	pag. 58.a
<i>Clysteris figura ab indicatione desumpta est.</i>	pag. 58.b

D

D <i>Ecocta magis usualia quae sint & quomodo parentur.</i>	pag. 24.a
<i>Dulcia uentriculum resupinanti, iecur obstruunt, membrum uero respirationis sunt admodum familiaria.</i>	pag. 86.b
<i>Diapheniceis dosis praescribitur.</i>	pag. 40.b
<i>Diatribitum cum rhabarbato quomodo conficiatur secundum Bartholomei Montagnae inuentum, quodque sit medicamentum facile, ac tutum, ut pueris etiam dari possit.</i>	pag. 42.a & b
<i>Diapruni</i>	

I N D E X I

<i>Diapruni ethymologia.</i>	pag. 34. b
<i>Diaprun solutini dosis.</i>	pag. 36. b
<i>Diagridium quo tempore immiscendum sit in compositis medicamentis.</i>	pag. 36. b
<i>Diaphanicon quibus morbis conueniat.</i>	pag. 40. b
<i>Decoctum fructuum quomodo paratur.</i>	pag. 55. a
<i>Decoctum humori melancholico conueniens describitur.</i>	pag. 55. b
<i>Dulcia ingratum saporem medicamentorum tollunt.</i>	pag. 76. b
<i>Diagalanga uterinis affectibus admodum confert.</i>	pag. 3. a & b
<i>Diospolitico possumus tuto uti ante cibum, in cibo, & post cibum</i>	pag. 113. b
<i>Diachalamentum maxime conducit ad digestionem & penetrationem alimenti in omnes partes, & uniuersum corporis habitum.</i>	pag. 114. a
<i>Dolor quid sit, & quæ ad eum requirantur.</i>	pag. 115. b
<i>Doloris causa proxima est solutio continui.</i>	pag. 128. b
<i>Defensio a quid efficiant.</i>	pag. 150. a
<i>Deterfio seu abstersio consistit in tenuitate partium.</i>	pag. 158. b
<i>Detergentium aliqua sunt calida, alia autem frigida.</i>	pag. 158. b
<i>Dulcia detergunt quæ sunt substantiæ tenuis.</i>	pag. 159. a
<i>Detergentium ordines & enumeratio.</i>	pag. 159. a & b
<i>Deterfionem adiuuat astrictio in medicamentis interius assumendis, im-</i>	pag. 159. b
<i>pedit autem in ijs quæ exterius applicantur.</i>	pag. 217. b
<i>Digerentium & emollientium pharmacorum ordines penes quæ & quot sint immutandi.</i>	pag. 233. b
<i>Defluuium capillorum duabus causis euenire potest.</i>	pag. 233. b
<i>Destillatio ortum habet ex facultatis concoctricis cerebri errore sicuti</i>	pag. 274. b
<i>alui profluuium in uentriculo.</i>	pag. 319. a
<i>Dentium substantia sentit.</i>	

E

<i>Elixatio diffinitur.</i>	pag. 73. b
<i>Elaterij afferendi quantitas non eadem ab omnib. prescribitur.</i>	pag. 29. b
<i>Electuarium rosatum Mesue in purgando facilius est, quàm illud ex succo rosarum.</i>	pag. 38. b
<i>Electuarij ex Psilio duplex proponitur descriptio</i>	pag. 39. a
<i>Euphrasia</i>	

I N D E X

- Eupragia ad acuendum visum confert.* pag. 49.a
Excrementa concoctionem & ipsa recipiunt. pag. 69.a
Educenda materie difficultas unde oriatur. pag. 72.a
Eleſtuarij uox unde ſit deducta. pag. 104.a
Eleſtuarijs non utimur niſi expurgato aliquantiſper corpore. pagina. 104.b
Eleſtuaria potiſſimum conferunt in affectibus partium ſpiritualium. pag. 107.a
Excrementum in quolibet ulcere eſt duplex ichor & ſordes, quorum hoc quidem poſtulat deſerſionem, illud uero exiccationem. pagina. 145.b
Excrementa ulcerum cur adeo copioſa generentur. pagina 137.b et 138.a
Eſtiomeros quid ſignificet ſecundum grecos & arabes. pag. 163.b
Eraginis natura eſt ut cum cruda accipitur in medicamentis eauridia efficit, at ſi parum coquatur inde ſunt medicamenta lutei coloris, ulterius uero coſta gilua uel ſulua colore reddit medicamenta. pagina. 167.a
Euacuationes ac motiones contrarias quomodo ſimul moliri poſſit medicus. pag. 90.a

F

- Februm putridarū curatio nunquā inchoanda eſt à trochiſcorum exhibitione.* pag. 100.b
Faba innoxie exiccat, & carnem procreat. pag. 123.b
Fluxus ſanguinis moderatus uulneratis corporibus plurimam utilitatem offert. pag. 141.b
Fiſtula quomodo à ſinu differat. pag. 145.a
Fluxio humorum ad aliquam partem quibus ingenijs prohibeatur. pagina. 149.b
Fiſtule & maxime quæ ſunt in ano, non ſunt ita temere curanda. pagina. 170.a
Fiſtule & ſinus cum diuturni ſunt callum contrahunt. pag. 170.b
Friſtiones duplici nomine reuellunt. pag. 188.a
Febres diuturnæ raro per excretionem indicantur. pag. 90.a
Farina triticea magis ſuppurationem facit quā hordeacea: hæc autem aliquantulum inflammationem repellit. pag. 200.b
Fermentum quod uetustius fuerit, eo magis attrahit. pag. 201.a
b Fluxiones

I N D E X.

Fluxiones à capite & cerebro à qua materia foueantur. pag. 175. b
Faba egyptia pendet dr agnam unam. pag. 296. a

G

Gen ifle flores uomitum cient. pag. 66. b
Glutinantia magis exiccant, quàm ea, qua carnem generant. pagina. 133. b

H

Hyere magnæ qui nam fuerint inuentores. pag. 43. a
Hyera propinande dosis à Galeno diuerfimode proponitur, & cur. pagina. 29. a
Humores craffi & uifidi facilius euacuantur paulatim quàm fimul toti. pag. 90. a
Hordei farin in cataplasmatibus deficcet, aperit uero meatus, materiam digerit, & transpirare facit. pag. 198. b

I

Inteftina non sunt omnino expertia facultatis concoctricis ciborum. pagina. 59. b
Iuniores medici quomodo citra defim propinandi pharmaci gerere se debeant, & quo pacto eam possint addiscere. pag. 30. a
Indicationes in componendis pharmacis cum fit plures qua magis & qua minus praeipua sint. pag. 4. b
Iuue in medicina non sunt omnino inutiles. pag. 91. b
Indicatio sequitur naturam rei indicantis. pag. 127. b
Intemperies cum materia dupliciter potest affligere partes nostri corporis. pag. 127. b
Iudicium medici circa composita medicamenta in quo consistat. pagina. 129. b & 130. a
Indicationes componendi medicamenta defumuntur à rebus naturalibus & à rebus prae naturam.
Indicantium uis ut plurimum inaequalis est. pa. 130. b
Intemperies diuturna nequit esse sine uitiosa materia praesente à qua foueatur. pag. 168. a
Inflam. wa-

I N D E X

Inflammatio duplici calore prædicta est natio nimirum & aduentis
d. 110. pag. 194. b

Inflammationis tempora penes quæ sint distinguenda. *pag. 195. a*
na. 195. a

Inflammationes partium interiorum debet prohibere medicus ne sup-
purentur. *pag. 199. b*

Inflammationem arceya est inter primos scopos in ulceribus capitis
considerandos. *pag. 251. a*

Inflammatio membranarum cerebri proprie est phrenetis. *pagi-*
na. 251. a

L *Entis ius primum & secundum quomodo differant.* *pagi-*
na. 32. a

Lac asinum inter lactis genera est admodum serosum & ob id purgat.
pagina. 74. b

Lupuli prædominio refrigerant. *pag. 79. b*

Lignum aloes præter alias vires quæ habet est etiam gratum cordi.
pagina. 101. a

Lytargirus quod magis coquitur ad maiorem exiccandi vim habet. *pagi-*
na. 138. b

Lignorum caries & maxime ulmi sarcotica est. *pagi-*
na. 146. a

Linsbeyum detegens quomodo paretur. *pag. 159. b*

Laricea resina potest commodè in medicamenta in loco therebinthine
pagina. 160. b

Lumbrici terrestres adeo utiles sunt nervis vulneratis ut mirifice possint
eos incisos conglutinare & consolidare. *pagi-*
na. 185. a

Leucoma seu albugo quid sit. *pag. 283. a*

M

M *Acerationes medicamentorum quot quibusque de causis fiant.*
pagina. 55. b & 56. a

b 2 Mel

I N D E X.

- Mel crudum inferiorem aluum purgat, cœlium uero apinam magis mō*
uet. pag. 74. b
- Diagna inter artem & naturam intercedit similitudo in miscendis &*
concoquendis rebus. pag. 75. a
- Medicamenta uere purgantia quomodo conueniant cum uenenis & ab*
ijs differant qua incommoda afferant assumentibus, & quo pacto il-
lis obsistatur. pag. 76. & sequentibus.
- Medicamenta purgantia in quatuor ordines distribuuntur, & qua sin-*
gulorum sit dosis. pag. 78. b
- Medicamentorum purgantium facultas & dosis per experientiam in-*
uenta est. pag. 78. b
- Medicamentorum diuersitates circa facultates unde oriantur.* pagi-
na. 30. b
- Medicina benedictæ appellata non sunt omnino destituta purgatoria fa-*
cultate. pag. 7. a & 8. a
- Medicina benedicta quomodo conueniant & differant à choleribus.*
pag. 12. a
- Medicamenta an danda sint ante cibum an cum eo an post.* pagi-
na. 3. a
- Medicamenta euacuantia corpus per inferiora & per superiora quomodo*
differrant ab alijs aliter corpus euacuantibus. pag. 68. b
- Sturium stercus acre est & expultricem facultatem irritat.* pa-
gina. 64. b
- Medicamenta simplicia quò tenuius tritulantur eò magis in uenas an-*
do gnitiones perueniunt. pag. 112. b
- Medicamenta arida diuina etsi commoda sint ad conglutinanda minora*
ulnura que in altum non sint adducta, maioribus tamen agglutinan-
dis inepta sunt. pag. 136. b
- Metallica omnia medicamenta ex uisione suam mordacitatem aliquan-*
tisper remittunt subtiliter astringentem & exiccationem. pagi-
na. 135. a
- Medicamenta quo diutius coquuntur eo etiam magis siccantia eua-*
dunt. pag. 155. a
- Mel rosaceum magis mordet quàm mel simple x.* pagi-
na. 160. a
- Methodus ab indicationibus suum habet fundamentum.* pagi-
na. 186. b
- Mellientia*

I N D E X

<i>Mollientia phermaca ea proprie dicuntur quę mediocri quidem calore calefaciunt non tamen manifeste siccant aut humectant.</i>	pagina.	217.a
<i>Medicamenta purgantia in effectibus capitis ualide reuellunt.</i>	pagina.	249.b
<i>Metus animi & corporis humores commouent.</i>	pag.	251.b
<i>Magnitudo morbi cum uiricū robore non indicat uenę sectionem.</i>	pagina.	266.a

N

<i>Narcotica in quibus nam casibus in usum uenire debeant.</i>	pagina.	116.a
<i>Narcoticis ob multas & eas maximas utilitates calida immiscuntur.</i>	pagina.	116.b
<i>Narcotica composita conficientes ad tres scopos respicere debent.</i>	pagina.	116.b
<i>Narcoticis potissimum & ualidis egenus quando dolor est intolerabilis.</i>	pag.	116.b
<i>Natura & medicus circa humana corpora ita se habent ut aliquando etiam sola operetur, aliquando medicus tantum, quandoque autem uterque simul.</i>	pag.	130.b
<i>Natiuus calor aut ipsamet natura est, aut eius proximum instrumentum.</i>	pag.	131.a
<i>Neruorum uulnera cur sint periculosa, quęq; inter ea maius afferant periculum.</i>	pag.	181.a
<i>Nerui non requirunt medicamenta frigida nec tepida sed calida.</i>	pag.	184.a
<i>Nares triplicem afferunt utilitatem & usum.</i>	pag.	298.a
<i>Narium temperatura siccior est quàm oculorum & instrumentorum gustus, minus autem sicca quàm aurium.</i>	pag.	298.b

O

<i>Dor & sapor ingrata reddunt medicamenta.</i>	pag.	76.a
<i>Occisi comprehendorum pharmacorum à quot & quibus desumuntur.</i>	pag.	2.a & infra.

I N D E X.

<i>Olei quantitas in clysterijs ponenda quanam esse debeat.</i>	pag. 61. a
<i>Onorum lutea cur clysteribus injici soleant.</i>	pag. 63. a
<i>Oui album agglutinat, astringit, repellit, dolorem sedat, sanguinem ex vulnere fluentem sistit.</i>	pag. 133. b
<i>Oui luteum agglutinandi facultate proditum est & mitigandi dolores vim habet.</i>	pag. 134. b
<i>Oleum uetus magis fecat & magis calcfacit.</i>	pag. 148. a
<i>Osis ex plaga lęsi signa ponuntur.</i>	pag. 249. b
<i>Oleo rosaceo an utendum sit calido, aut tepido, uel frigido in capitis uulneribus.</i>	pag. 254. a
<i>Oxirodini mixtura semper debet constare ex maiori parte olei quā acetii.</i>	pag. 255. a
<i>Oxirodim quando debeat ingredi oleum rosaceum omphacinum & quando completum.</i>	pag. 255. b
<i>Oxirodino utendi modus, & multa circa illius usum aduertenda.</i>	pag. 263. a & b
<i>Oculorum affectus prater naturam sponte sua orti à capite & cerebro imprimis habent occasionem.</i>	pag. 275. a
<i>Oculi nomine quid proprie intelligendum sit.</i>	pag. 275. a
<i>Oculus facultate sentiendi & mouendi præditus est.</i>	pag. 275. a
<i>Oculorum affectus diuersam remediorum materiam ab alijs partibus requirunt.</i>	pag. 276. b
<i>Oleum rosaceum oculis maxime aduersarium est.</i>	pag. 276. b
<i>Oculorum affectus unde sanationis difficultatem nanciscantur.</i>	pag. 276. b
<i>Oculorum affectus cur emplasticis egeant.</i>	pag. 277. a
<i>Opiata damnat Gal. in doloribus capitis, at in doloribus aurium præsertim uero ex inflammatione eorum usum admittit.</i>	pag. 306. b

P

<i>Pillularum forma quot & quas commoditates assumencibus adferat in accipiendo & in operando.</i>	pag. 44. a
<i>Papienses medici taxantur circa pillulas cochias.</i>	pag. 44. b
<i>Pillularum sine quibus quis fuerit primus inuentor.</i>	pag. 46. a & b
<i>Palmulę in tollendo nentriculi fastidio plurimum ualent.</i>	pag. 40. b
<i>Puluis senę præparatus exponitur.</i>	pag. 51. a
<i>Puluis hernodætilatus.</i>	pag. 51. b
	Pillule

I N D E X

- Pillule magis euacuant quàm boli, & hi magis quàm liquida pharma-
ca.* pag. 53.b
- Putredinis succorum causa et aquosa humiditas in ijs contenta qua per
decoctionem alsumuntur.* pag. 74.a
- Pillula communes diela magis ualent ad praeseruandum à peste quàm
ad curandum.* pag. 23.a
- Pillula non sunt danda post cenam contra iuniores medicos.* pagi-
na. 15. & sequentibus.
- Portulaca afluanti uentriculi & alijs uisceribus plurimum prodest.*
pagina. 106.b
- capueris albi semina etsi somnum concilient, non tamen inter narcoti-
ca, medicamenta sunt connumeranda.* pag. 116.a
- Pulmo uulpinus affinitate & proprietate naturæ pulmonibus robur
addit.* pag. 122.a
- Particulis simplicibus nihil intimius est quàm suum naturale tempera-
mentum.* pag. 128.a
- Pus ad summum quarto die in uulneribus succrescere solet.* pagi-
na. 133.a
- Phagedena quomodo ab herpete differat.* pag. 144.b
- Plumbi uires tam ante alicnem quàm pesti actionem propinquunt.*
pagina. 148.b
- Putredinis in ulcere suberientis tres sunt petissima causa.* pagi-
na. 163.b
- Piper nigrum licet uideatur calidius, longè tamen ob substantia tenui-
tatem minus calefacit.* pag. 95.b
- Passula iocinoris obstructions possunt aperire.* pag. 96.b
- Panis quo magis est coctus eo magis secat quando male cocta ad suppu-
rationem facit.* pag. 200.b
- Porrigo & pedicularis morbus quomodo differant.* pag. 243.a
- Pedicularis herba nihil aliud est quàm flaphis agria.* pag. 243.b
- Plaga capitis quantuncunq; parua non est contemnenda.* pag. 248.a
- Procarctica causa mouent antecedentes si corpus sit plenum excre-
mentis.* pag. 264.b
- Pillula non principaliter purgant caput at totum caput.* pag. 266.b
- Pumex semper detergit.* pag. 289.b

Q

Quartanam febrem curantes dupliciter calefacere oportet. pag. 84.b

I N D E X

Quantitas remedium in arte medica difficillima est, & eam coniectu-
ralem reddit. pag. 27.b
Qualitates actiue per se quatenus ad agglutinationem pertinet nihil
faciunt. pag. 134.a

R

Rhabarbari & Rapontici differentia ponitur. pag. 30.b
Rosarum succi facultates in medium proponuntur. pag. 37.b
Rhabarbari dosis proponitur. pag. 22.b
Reuulsio in quo morbi tempore conueniat. pag. 12.a
Rhabarbarum ex Auer. sententia nulla eget correctione. pa-
gina. 17.a
Rhabarbarum in substantia magis adstringit quàm illius infusio. pa-
gina. 18.a
Rhabarbarum in substantia licet magis astringat quàm eius infusio,
non tamen minus aperit. pag. 21.a
Requies Nicolai adeo clemens est med. ut nutrices illam infantibus la-
ctentibus exhibeant quod tamen caute faciendum est. pa-
gina. 18.b
Reuulsio quando per purgantia medicamenta fieri debeat. pa-
gina. 188.a
Refrigerantia densant, incrassant, & impingunt. pag. 269.b
Resolutio quomodo à conuulsione differat, & à qua materia utraque
fiat. pag. 271.a & b
Resolutionis remedium præstans est aqua uitæ vulgo dicta. pa-
gina. 274.b
Reuulsio cum per multa instrumenta fieri possit quæ nam magis huic
aut illi affectui conueniat. pag. 276.a

S

Syruporum congruens usus & quot & quibus consiliat. pa-
gina. 80.b & sequentibus.
Syrupi aliquo liquore diluti citius è uentriculo descendunt & per ue-
nas totius corporis digeruntur quàm si absque liquore assumantur,
&

I N D E X

<i>Et ut dici solet in substantia hoc autem non magis uentriculum cor- roborant.</i>	pag. 88. a
<i>Stachadis laudes insignes proponuntur.</i>	pag. 44. b
<i>Scammonij preparandi modus explicatur.</i>	pag. 32. a
<i>Secreta profitentes medici taxantur.</i>	pag. 32. b
<i>Succi omnes præter uinum, mel, & oleum facillime putrescunt unde concoquuntur, ut diu imputres seruari possint.</i>	pag. 74. a
<i>Succi multas ob causas concoquuntur ad ignem.</i>	pag. 74. a
<i>Syrupi rosacei & uiolacei solutiuorum conuenientia, differentia & do- sis ponitur.</i>	pag. 23. b
<i>Scammonij exhibendi dosim diuersimode proponunt antiqui.</i>	pa- gina. 29. a
<i>Syruporum propinandorum tempus aptum quod nam sit.</i>	pagi- na. 88. a
<i>Syrupus de absinthio ad menstrua alba plurimum confert.</i>	pagi- na. 94. a
<i>Syrupus de mentha in febribus acutis cum stomachicis passionibus con- fert.</i>	pag. 94. b
<i>Sanguis multipliciter sili potest.</i>	pag. 102. b
<i>Sandali refrigerant, membra præcipua roborant.</i>	pag. 106. b
<i>Semina quatuor frigida maiora humores ad uias urinae deriuant.</i>	pagina. 106. b
<i>Solutio continui necessario trahit secum intemperiem.</i>	pag. 128. a
<i>Sanguis grumosus detergi potest spongiâ mada factâ uino nigro & præ- sertim astringente.</i>	pag. 41. b
<i>Sordes quomodo copiosæ in ulceribus generentur ratione medicamento- rum & etiam ratione causæ internæ.</i>	pag. 158. a
<i>Sordes in ulceribus deterfionem indicat.</i>	pag. 158. a
<i>Sanguis ex uulnere aut ulcere profuit duabus de causis.</i>	pagi- na. 187. b
<i>Sanguinis fluxus facilius & tutius supprimitur sanguinis detractiõne quàm purgatione.</i>	pag. 188. a
<i>Sextarius continet duas aquæ libras cum dimidia.</i>	pag. 107. b
<i>Sericum secundum Arabas cordi et spiritibus est admodum familiare, licet Græci illud inter medicinas non cennumerauerint.</i>	pa- gina. 96. a
<i>Serico utuntur obstetrices in prægnantibus quando timent abortum.</i>	96. a
	pagina.
	Sanguis

I N D E X

<i>Sanguis secundum naturam non continetur nisi in uenis, arterijs & cor de.</i>	pag. 186. a
<i>Sympt. quę & quot inflammationem concepitentur & cur.</i>	pagina. 194. a & b
<i>Scirrhus distinguitur in exquisitum & non exquisitum penes sensum.</i>	pagina. 216. a
<i>Scirrhus sapius oritur in solidis particulis quàm in mollibus.</i>	pagina. 216. a
<i>Scirrhus qui facile transeat in cancerum & quomodo.</i>	pag. 221. b
<i>Strumarum ethymologia inquiritur.</i>	pag. 225. a
<i>Strumis obnoxij sunt uoraces.</i>	pag. 225. a
<i>Senes à cutaneis affectibus difficillime possunt liberari.</i>	pag. 228. b
<i>Sternutatio quid sit, quis locus per eum purgetur, & quomodo differat à tussi & à uomitu.</i>	pag. 267. a
<i>Stupor est quasi uia quædam in resolutionem aut leuis & incipiens resolution.</i>	pag. 270. a
<i>Salina uim habet digerendi detergendi & attenuandi, quia false dinis est pariceps.</i>	pag. 284. a
<i>Sanguis cur sæpe in pueris ab oculorum angulis exeat.</i>	pag. 286. a
<i>Sapa musli in dolore sedando magnam uim habet.</i>	pag. 307. a

T

<i>Turbith quid sit cuius facultatis, quę afferat incommoda, & quomodo illis occurratur.</i>	pag. 40. a
<i>Trochiscorum de uiolis compositio explicatur.</i>	pag. 50. a & b
<i>Trochiscorum de agarico & albandal compositio cur excogitata fuerit.</i>	pagina. 50. b & 51. a
<i>Tenuitas & crassities materia euacuationi obstant.</i>	pag. 72. a
<i>Trochisci in præparando corpore & humoribus sunt ualidiores quàm medicamenta sub alijs formis exhibita.</i>	pag. 100. a
<i>Trochiscorum usus in febribus longis est admodum utilis.</i>	pag. 100. b
<i>Trochisci de alchechengi in ardore urine plurimùm conferunt.</i>	pag. 103. b
<i>Triphera ad proliciendas menstruas purgationes plurimum confert.</i>	pag. 119. a
<i>Tumores præter naturam principaliter sunt morbi in intemperie.</i>	pagina. 128. a
<i>Temperatum corpus est ueluti communis mensura ad quam primum referenda</i>	

I N D E X I

<i>ferenda sunt omnia communia theoremata ad medicum spectantia.</i>	pag. 132. b
<i>Tela aranea sanguinem sistit.</i>	pag. 191. a
<i>Thus magis astringit quam manna thuris, & est magis emplasticum quam aloë.</i>	pag. 192. b
<i>Tumores præter naturam quomodo ab uno tantum & simplici humore fieri dicantur.</i>	pag. 194. a
<i>Therma omnes exiccant, non tamen omnes calefaciunt.</i>	pag. 272. a
<i>Triticum masticatum magis maturat tubercula quam contusum.</i>	pag. 284. a
<i>Therebintina uim habet molliendi, concoquendi, & modeste digerendi.</i>	pag. 296. a
<i>Tribulus refrigerat & repellit.</i>	pag. 317. a

V

<i>Vermes quos cibos prosequantur & quos fugiant.</i>	pag. 61. a
<i>Vomitum cuncta quæ & qualia sint.</i>	pag. 65. b & 66. a
<i>Vomitus cur facilius & difficilius reddatur in diuersis corporibus.</i>	pag. 65. b
<i>Vomitus quas nam partes nostri corporis euacuet, & à quibus reuellet.</i>	pag. 65. b
<i>Vlcus quomodo à uulnere differat.</i>	pag. 129. b
<i>Vsus est finis compositionis medicamentorum.</i>	pag. 130. b
<i>Vulneris simplicis in carnosâ parte curatio in quo nam egeat opera medici è di troppo.</i>	pag. 131. a & b
<i>Vulneri in carnosâ parte illato quæ nam & quot soleant sympt. in principio superuenire quæ unionem impendant.</i>	pag. 131. b
<i>Vulnus simplex quod nam dici mereatur.</i>	pag. 131. b
<i>Vulnus quatenus vulnus indicat exiccationem, & astringentem, moderatam tamen.</i>	pag. 132. a
<i>Vulnera simplici egent ordine exiccantium medicamentorum pro diuersis scopis quos sibi medicus in eorum curatione proponit.</i>	pag. 132. b
<i>Vulnera aliqua ope solius naturæ agglutinantur.</i>	pag. 133. a
<i>Vinum agglutinandis vulnibus non est inutile medicamentum, nigrum tamen magis.</i>	pag. 133. b
<i>Vlcus omne exiccationem requirit & detersionem.</i>	pag. 143. b
<i>Vlcus omne quattuor habet uniuersalia tempora ut etiam alij morbi.</i>	pag. 143. b

I N D E X

- pagina.	145.a
<i>Ulcerebus malignis mollientia aduersantur.</i>	pag. 153.b
<i>Ulcus quo cordidius fuerit, eo acriora modicamenta facilius fert.</i>	pagina. 158.a
<i>Ulcera putrida curans medicus ad tria potissimum respicere debet.</i>	pagina. 164.b
<i>Ulcera depascentia in quo differant ab erodentibus.</i>	pag. 167.b
<i>Vena in partibus vulneratis, quando ab illis perfluit sanguis quomodo claudi possint.</i>	pag. 188.b
<i>Vigor quò ad sympthomata & quò ad concoctionem materiae aliquando distinguuntur.</i>	pag. 195.b
<i>Vernicularis herba est semperuiuum minus.</i>	pag. 256.a
<i>Vinum uetus magis desiccet quàm nouum.</i>	pag. 302.b
<i>Vermes quibus causis reperiuntur uini in auribus.</i>	pag. 313.a

Z

<i>Zuecharum & Mel quas commoditates praestant in compositis medicamentis.</i>	pag. 77.a
<i>Zuecharum Hypp. Diosc. & Gal. fuit quidem cognitum, parum tamen in usu.</i>	pag. 77.a
<i>Zuecharum est minus calidum, minus tenue, & minus acre, quàm Mel.</i>	pagina. 77.a

Indicis Rerum notabilium finis.

[illegible]

[illegible]

a. l. 1. relinquent. b. l. 11. ne possit dir. li. 17. facilitati ue. l. 37. 2. motoris. pag. 298. a. li. 13 hic pag.
 299. a. l. 1. olent. b. l. 10. congerator. pag. 300. a. l. 31. in illis. pag. 302. a. li. 9. quis. l. 27. tene-
 tens. l. 30. ad l. 31. Pollidz. f. l. 29. actius. pag. 303. a. l. 4. uiribus. l. 21. est dele. l. 33. iudicante. pag.
 304. a. l. 1. nimis. l. 5. depravate. l. 6. uitio. l. 12. odorabilem. b. l. 16. quidem. l. 30. sonum. pag. 307.
 a. l. 13. huc hoc l. 38. destitit. b. l. 12. nolimus. pag. 310. a. l. 5. ulcerum. l. 14. natura particulz. b.
 li. 32. uinum. pag. 312. a. l. 3. natuum. l. 38. autem. li. 31. imminutum. pag. 313. b. li. 12. scorumque.
 pag. 314. a. l. 17. raro. f. 32. elier. pag. 315. b. l. 9. est l. 33. nimis. p. g. 316. a. l. 26. curationis. l. 34. ca-
 renque. b. li. 11. acuris. pag. 317. a. l. 19. p. n. a. li. 28. n. n. a. l. 10. n. n. a. l. 10. n. n. a. l. 10. n. n. a. l. 10.
 310. a. l. 15. eum. l. 26. pituitz. l. 34. altero.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

L A V R E N T I I
M A R V C I N I
M E D I C I,
I N L I B R O S V I C T O R I S
T R I N C A V E L L I I D E R A T I O N E
C O M P O N E N D O R V M M E D I C A M E N T O R V M
E O R V N D E M Q V E V S V .

P R A E F A T I O,

Qua de Auctore, ac de operis utilitate agit.



In Maximus in re Medica Victor Trincavellius tanti semper ob res gestas, splendoris fuit, ut ab omnibus suspiceretur, colereturq;. Fuit is patria Venetus, familia inter ciues clara quam tamen studijs, doctrina, plurimisq; in re Medica eximijs periculis sceleriter actis clariorem reddidit, philosophiae ac Medicinae multa perbelle confrens. Primo enim ætatis flore, Themistio clarissimi viri Hermolai Barbari scolia, adnotationesq; adiunxit, ac quaestionem de Reactione, iuxta doctrinam Aristotelis, & Auerrois pertrastavit, Græcosq; edidit Themistium, Ioannem Grammaticum, Simplicium, & alios. Exaravit præterea complures medicas quaestiones, quarum duæ typis reperiuntur excusæ: altera utrum in morborum initijs solum cum materia turgeat, purgantibus
c medi-

medicamentis uti liceat: altera de uena in pleuritide, cæterisq; internorum inflammationibus secanda. Galeni etiam multa ex Græco in Latinum sermonem transtulit, eiusq; opera latinitati ab aliis donata, recognouit, ac in lucem purgatissima edidit. Denique uigiliis, laboribusq; suis eo peruenit, ut non solum in urbe, uerum in tota Italia maximus philosophus, ac Medicus haberetur: ad quem omnes tanquam ad Apollinem undiq; confluebant, consultiq; abibant. Cum uerò annum iam agens. 59. Senatus decreto prouinciam suscepisset practicum Medicinæ Patauij ex ordine in supremo loco profutendi, quo quidem munere annos. 13. ipse functus est: id sibi tantum proposuit, ut quo ad eius fieri posset, Medicinæ studiosis prodesset. Quare animum ad plura in ea arte scribenda appulit, ex quibus sine dubio maximam utilitatem studiosi ipsi cepissent: uerum cum uiueret in Medicina ægrotis facienda, tùm Venetiis, tùm Patauij, & alibi adeò fuit occupatus, ut neque posset muneri profutendi satisfacere, non enim ei tantum otij dabatur, quantum ad id munus egregiè obeundum posset esse satis. Innumera tamen negotiorum impedimenta, quibus quotidie obruebatur, superans, pleraq; ad Medicinæ cognitionem, & ad eam artem percipiendam maxime necessaria priuatim domi studiosis ijs præsertim diebus explicabat, quibus à publicis lectionibus uacabat: atque inter cætera illam partem secundi libri Prognosticorum Hippocratis, ubi agitur de urinis, & excrementis: quorum exactam cognitionem, quia medico apprime necessariam esse non ignoramus, Deo fauente in lucem dare conabor. Sed & cum obiter sæpè iisdem discessisset ita necessariam, utilemq; esse medico cognitionem usus, compositionisq; medicamentorum, tùm simplicium, tùm compositorum, ut qui eam adeptus non esset, ille nec dignus medici nomine esset, nec unquam foret,

ut ab eo alicuius ægroti leuissima etiam ægritudo curari posset, quinimo minimum quemlibet morbum maximum, & lætalem eius impericia esse euasurum; inde affecti studiosi assiduis, & uehementibus precibus ab ipso enixè petierunt, ut dilucidam & absolutam methodum exponeret usus, & compositionis medicamentorum, quibus uti solent medici, cum in ægrorum morbis depellendis, ac ipsædem pristinæ sanitati restituendis, tum in corporibus nostris ab imminetibus malis custodiendis, atque in eorum sanitate tuenda. Hoc quidem onus diu ipse suscipere detrectauit: non quidem, quod non cuperet discipulorum utilitati maximè consulere, sed quia argumentum hoc difficillimè esse tractationis sciebat, nec id, ut celeriter, aut facile absolui posset, quemadmodum studiosi cupiebant, ab eo præsertim, qui tot ægrorum curis distineretur, quibus semper uacare cogebatur. Huc accedebat, quod in eo antea plerique clarissimi, & maximi medici laborauerant, neque satis foeliciter: nam studiosi, & alii medicæ artis sectatores affirmabant, sibi à nullo hætenus fuisse satisfactum, ac eos omnes, qui de ea re scripssent, à scopo non parum abesse. Ipse itaque ægrè in eam palæstram descendebat, in qua antea tot præstantissimi uiri infelicitè pugnassent. Victus tandem discipulorum, quos maximè diligebat, precibus, & quotidianis efflagitationibus, illis morem gerere decreuerat, & Commentarios in quatuor libros diuisos conscribere: in quibus id argumentum uberrimè & diffusè tractaret, ac compositionis, & usus medicamentorum absolutissimam, atque dilucidam methodum traderet; nihilq; tandem prætermitteret, quod ad quamlibet eorum compositionis, & usus rationem facere posse existimaret: Opus istud iam inchoauerat, & maximam hanc provinciam aggressus fuerat, sed per ægritudines multorum, quibus quotidie incumberè cogebatur, in inchoa-

to opere multum progredi illi non licuit, & tantum post
magni temporis spatium opus absolui posse studiosi per
cipiebant. Tam diuturnam itaque moram non ferentes,
ab eosummis precibus contenderunt, vt interea com
pendium illorum commentariorum conscriberet, quos
præ manibus habebat, ac usus, & compositionis medica
mentorum rudimenta explicaret, & summam saltem
compositionis & usus illorum exponeret, quibus quoti
die, ut ita dicam, uti coguntur medici, & quæ in frequen
tiori sunt usu. Illis demum obtemperans, hoc iam inchoa
torum commentariorum compendium, seu rudimenta
auditoribus excipientibus prælegebat: sed per multas oc
cupationes uix tantum aliis diebus scribebat, quantum
feriatis studiosi eo dictante scriptum persequabantur, sæ
pè etiam nec illi rei satisfacere poterat. Tres igitur istius
compendii libri hac ratione ab ipsius discipulis descri
pti sunt, nec ab eo, id quod maximè cupiebat, recogniti,
aut emendati. Cum enim statim eos describendos pro
ponere cogeretur, penes se retinere non potuit, donec
aut recognoscerentur, aut emendarentur. Eodem modo
etiam excepta est ab auditoribus hæc quarti libri pars,
quam morte præuentus non absoluit, atque utinam ab
solutum, perfectumque hunc quartum librum habere
mus. dici enim non potest quanta utilitate inde affecti es
sent studiosi: nam ut perspici ex ea, quam edimus, parti
cula potest, hinc summam totius praxis artis medicæ, ac
morborum omnium dignoscendorum, & curandorum
peritiam medicinæ candidati adipiscerentur. Sed quic
quid ad manus meas peruenit, studiosis omnibus liben
ter offero illi ex hac particula norma quadam sumpta,
poterunt ea ueluti exemplo uti in cæteris ægritudinibus
curandis. Equidem ex horum librorum editione maxi
mam utilitatem allatum iri perspiciens, nulli laborum
studio, aut diligentia pepercit. Pluribus namque exem
plaribus

plaribus receptis (non enim perfectum auctoris manu scriptum exemplar extabat, sed tantum fragmenta quædam ita interlinearibus lituris oblitterata, ac deleta, ut plerisque in locis, nec legi possent, nec diuinari quid ibi scriptum esset) iisdemq; diligentissimè collatis, ut vnum integrum, ac nullibi mutilum exemplar describeretur, curavi. Qua quidem in re labor meus inter cætera fuit, euerfa multa restituere, manca reficere, diuersa conferre, multa corrigere, medicinarum dosim ad unguem consulere, ac loca antiquorum, quæ tantum secundum libros, ut in fragmentis Auctoris, sic etiam in scriptis scholæ adnotata erant, perquirere, ut capitibus propriis & particularibus signarentur. Hoc tamen adeò absolutum exemplar, ut verè auctoris istius esse cognoscas, primum à doctissimo & clarissimo medico Dominico Castellio, qui tamen acerrima illa morte à nequissimo fratri cida nobis præreptus, ad quarti libri emendationem, ac recognitionem peruenire non potuit, diligentissimè recognitum, emendatumq; est, & plerisque in locis perfectius, emendatiusq; redditum. Deinde verò Hieronymus Iularius, & Ludouicus Fumanellius Veronenses, medici præstantissimi, ac utriusque linguæ peritissimi, in eo corrigendo, emendando, ac recognoscendo summo studio, & incredibili diligentia vsi sunt: qui quidem non parum præstitere, cum discipuli studiosissimi auctoris fuerint, & tunc præsertim, cum hoc ipse libros dictabat, ac eius doctrinæ rationem, methodumq; satis perspectam habeant. Demum etiam Franciscus Manna Cremonensis medicus doctissimus, non parum diligentæ, ac studij horum librorum emendationi adhibuit. Inter cætera igitur Victoris Trincauellij monumenta, hæc quidem habemus, non iucunda tantum, sed apprimè utilia, ad depellendos malos empiricorum usus: qui adeò creuerunt, ut tempora nostra, quibus tantum receptis

fides

fides adhibebatur, aliquo egerent præceptore, qui doceret non omnibus fidem adhibendam esse medicamentis, sed his tantum, quæ ex usu, longaque experientia, ac recta componendi ratione, tum morbis, tum partibus ipsis adhiberentur. Et quemadmodum præcis illis temporibus Andromachus, & Heroignaros hominum usus profligarunt, ita etiam Galenus sua tempestate duobus libris materiã componendorum medicamentorum edocuit, tum secundum genera, tum etiam secundum loca. Nostra verò ætate Victor Trincauellius, vir doctissimus & expertissimus ad veterum imitationem, materiam eandem de compositione & usu medicamentorum aggressus est, ut eius discipuli malos empiricorum mores aliquando non declinarent tantum, sed statim optimis imbuerentur præceptionibus Andromachi & Heronis antiquissimorum medicorum, ac Galeni medicinæ cultoris optimi. Quapropter omni ingenio rationem istam ad recentiore præxim edocere nititur, in multisque ab antiquis diuersius, adeò tunc nobis medendi opus præbet, ut eo nihil vtilius unquam excogitatum sit ab alio. Cadunt ex hoc labore mala cuncta medicamenta: & bona ac tutissima fiunt omnia, sic ut ad morbos profligandos Trincauellij manus, diuina manus iudicanda sit, eiq; ut heroi, de hominum omnium salute optimè merito, marmorea, uel aurea potius monumenta dicanda sint. In prima & altera huius operis parte agit ad imitationem Andromachi & Heronis de his, quæ interiorius assumuntur: in tertia uero, & sequenti, de his quæ exteriorius applicantur: atque id totum primo & secundo libro absoluitur: in tertio uero & quarto, quæ est secunda pars particularium suarum lectionum, imitatur Galenum, qui duobus libris absoluit medicamentorum compositorum materiam secundum genera, & secundum loca, atque ita maximè dignoscitur, quomodo diuersis indicationibus ad exactum, perfectumque;

etumq; opus medicamenta quoque diversa paranda,
componendaq; sint. Habere itaque Victorem Trincauel
lium de compositione & usu medicamentorum sic edo-
centem, perinde est, ac si haberemus Hyppocratem &
Galenum ad hæc nostra tempora de auxiliis omnibus se
iplos moderantes, atque experta magis, ac tutiora edo-
centes: quæ quidem maxima est, me iudice, huius operis
utilitas. Fruamur igitur utilissimis his libris, qui aded
emendati, atque absoluti in lucem prodeunt, ut auctoris
hæredes, sine quorum assensu edere non licebat, nec ad-
duci aliquo modo poterant, ut assentirentur, quod nec
ab auctore emendatos, aut recognitos, nec ad hoc audito
ribus explicatos, ut unquam ederentur, dicerent, meis
tandem, & aliorum præstantissimorum in arte medica
uirorum suasionibus, qui hos libros emendatos, recogni-
tos, absolutos, ac auctore dignos affirmabant, tandem ut
ederentur permiserint, speramusq; fore, ut citò alia præ-
stantissimi, ac clarissimi huius medici opera edantur, in
quibus penitiora, & magis abdita medicæ artis arcana de-
clarabuntur. Ea ipse post reditum Clasis Venetæ, cui
modò sub sælicissimo Imperatore Hieronymo Zane-
medeor, si Deo placuerit, ut edantur conata facturum
recipio.

THE HISTORY OF THE
CITY OF LONDON
FROM THE FOUNDATION
TO THE PRESENT
BY JOHN STOW.
IN TWO VOLUMES.
THE FIRST.
LONDON, Printed by J. Stow, at the Sign of the Sun, in St. Dunstons Church-yard, 1660.

1660

VICTORIS
TRINCAVELLI

PHILOSOPHI ET MEDICI

VENETI

De compositione ac usu medicamentorum

LIBER PRIMVS.

Prohæmum in quò de occasiõne & genere scribendi agitur, & quæ partes medicina ante doctrinam & usum medicamentorum prænoscentia sint. Cap. I.



NON leuem, aut facilem sed arduam & maximam prouinciam uobis iuuenes studiosissimi flagitantibus, & assiduis precibus à me contententibus, aggredior, methodum expositurus, quæ apte & utiliter medicinis, omnibus cum simplicibus, tum etiam ex arte compositis in ægrotis curandis uti possitis id autem uel inde percipere potestis, quod argumentum hoc à multis celeberrimis medicis, & antiquioribus, & iunioribus tractatum est, nec tamen hactenus uobis esse satis factum affirmatis: vnde et factum est, ut summa huiusce negotij difficultate deterritus, ad hoc onus suscipiendum tardior fuerim; quam uos fortasse cuperetis: ne tamen putaretis onus me hoc reculare, quia laboris id multi esse cognoscerem (& si non ignorarem, me non sine nominis, & honoris mei periculo eiusmodi rem esse facturum) hanc prouinciam subire tædæ statuti spero si quidem uos, & animi mei alacritatem, & propensionem meamque erga uos studium ita esse spectaturos, ut mihi uitio daturi non sitis, si expectationi, opinionique, quam de me concepistis: hac in re non respondeo. Antequam autem ad institutum nostrum accedam; hoc uos monitos esse uelim, me non per diærodon (ut. Galen. uocabulis utar) rem hanc subiectam uobis

A uelle

Lib. 1. de
tract. cõl.

nelle explicare, nimis, n. ampla, & copiosa euaderet), atque si quæ-
cunque cognitu necessaria sunt, ut recte quis simplicia medica-
ta, & ex medicæ artis præscriptis componat, & eis apte utatur: in
præsentia exponerem, & singula præterea non omisis demonstra-
tionibus explanarem nimis profecto in immensum nostra hæc tra-
ctatio excresceret, sed certe breuius & apertius, fortasse etiam uti-
lius, quantum subiecta materia patitur agemus, atque ab ea docen-
di ratione non prorsus recedemus quam compendiam & isagoge
uidebitur postulare: cū igitur opus sit (ut Gal. sepe in libris de me-
dicamentorum compositione testatur est) ut si quis methodo sim-
plicia medicamenta est compositurus: exquisitè ille eorum simpli-
cium, quæ componenda, & commiscenda sunt naturam, & facultates,
omnesque numeros, & gradus calleat, simulque perspectas ha-
beat singularum affectionum, symptomatum, & causarum naturas
& differentias à quibus indicationes, & scopi sumuntur, (his enim
præcipue medicus in medicamenti componendis, & utendis,
innititur.) Nos quidem, cum hæc sint copiose tum ab aliis medicis
tum uel maxime à Gal. dilucide in suis libris exposita, qui passim
tam græci habentur formulis excusi, quam in latinum sermonem
conuersi; nec sperem præterea aut exactius, aut clarius me posse
ea explicare: ideo quæ de hac re in libr. de simpl. medica. facul. atq;
in libris de morborum, symptomatumque differentiis & causis ab
illo scripta, & probata sunt, tanquam principia & fundamenta ser-
monis nostri statuemus: Ad hæc etiam temperaturas naturales cor-
porum quibus adhibenda sunt medicamenta, nec corporum solum,
sed membrorum quoque omnium, & particularum, quorum saluti
consulentes medicinas paramus, & commiscemus, prænouisse ne-
cesse est, & de quibus omnibus à Gal. in lib. de temperamen-
tis, & in arte medicinali erudita & copiosa disputatio
instituta est. Ideo, & hæc tanquam constituta à
nobis accipienda sunt & theorematibus ibi
probatīs uti principiis eorum, quæ de
ratione componendorum me-
dicamentorum à nobis di-
cenda sunt, utemur:
Sed iam nego-
tium ag-
grediamur, nec in his amplius
tempus conteramus.

Quod medicamentum cibis & uenenum ad corpus referantur & de necessitate compositionis medicamentorum cōmunia pręcepta. Cap. 2.

VErum, ut ordinem aptum, & congruentem seruemus: & ne omnia confundamus, altius aliquanto rem exordiamur; & uniuersalia quædā pręcepta prius tractemus sic, n. recta uia & ratione procedemus methodus. n. ut 4. lib. meth. med. dicebat Gal. uniuersalis quædā uia est, quæ omniū particulatim cōis sit Ab hoc ergo capite sumamus initiū, quod medicamentū, aut cibis ea rōe, qua cibis aut medicamētū sunt; absolutas aliquas res per se nō significāt; Sed ea tantū, quæ ex relatione, & cōparatione ad aliud quidpiam (ut idē Gal. statim ab initio i. lib. de simpl. medic. fac. ait) hmoi dicūtor, medicamētū n. semper alicui medicamētū est; sicuti cibus alicui cibus, unde ibidē dīfīniēs medicamētū dixit id esse medicamētū, quod naturā nostrā alterare, uel mutare potest, sicut cibus, uel nutrimentū, id quod potest substantiā nostrā augere, quo fit, ut unū, & idem cū diuersis; & diuersa ratione collatū, possit, & medicamentū dici, & cibus; potest etiā nec cibus, nec medicamentū esse, comparatum enim simplex aliquod ad humanum corpus (de his nāque simplici bus quæ ad aliud referūt ac nūc nobis sermō institutus est) medicamentum, & alimentū dicitur & quatenus ad negotiū nostrū pertinet scire conuenit: idem, & uenenum: Nam cicuta exempli causa si comedatur à sturno cibus est, homini uero & medicamentum & uenenum erit dici posse: Quibus ita constitutis, tandem ad institutū redeamus; & dicamus, quæ cū medicinalis omnis methodus ex ipsis indicationibus pendeat; primæ uero indicationes duæ sint: altera quæ ab essentia affectionis uel tollendæ, uel custodiendæ, altera quæ à natura aut corporis, aut partis affectæ deponendæ, est & compositionis, medicinarū occasio ab aliquo istorū triū semper petendā est, aut à natura medicamēti administrandi, aut à natura corporis uel particulæ, cui illud administrandū est, aut à natura affectionis, propter quā illud administratur, hæc. n. tria maxime rationē cōponēdi medicamēta cōstituūt nepe res ipsa, quæ ad corpus humanū refertur & medicina dicitur; & natura corporis ad quod illa relata talis dicitur atque affectio, quæ in illo est; & propter quam maxime medicamentum esse necessarium censemus. Sed hæc omnia, ut clariora reddantur, exemplis declaremus: primum quæ, quomodo à natura affectionis occasio componendorū medicamētorum accipienda sit in uniuersū ostēdamus, id tanquā fundamētum huius rei

Cap. 4.

Cap. 11. &
cap. ult.

Victoris Trincauellij

Cap. 12.

accipientes; quod à Galen. 9. metho. medendi exponitur, quod unumquodque uim indicandi habens, aliquid unum pro ratione suæ naturæ indicat, quod quidem si simplex sit, simplicem etiam habebit indicationem; Si uero compositum, composita quoque erit indicationis ratio unde etiam compositam remedium, & medicamentorum rationem requireret. Exempli gratia, sit aliqua interperies, quæ corporis nostri alicuius particulæ operationes lædant statim indicatio insurget, qua illam esse tollendam, & remedijs quidem contrariis tollendam monebimur; At si illa simplex fuerit, nempe aut calida, aut frigida, aut humida, aut sicca; simplex item erit indicatio, & simplicem remedii rationem requireret. Si uero calida & humida, uel calida, & sicca, & composita indicatio exurget quæ compositam medicamentorum facultatem exiget. Quod si ea & cum materia fuerit: sicut si ex materia pituitosa frigida & humida crassa & lenta fuerit, iam multiplex erit indicationis ratio præter id enim quid calefaciendum, & siccandum sit, attenuandum etiam & incidendum, uacuandumque indicat raro autem, unico & simplici medicamento possumus hæc omnibus satisfacere: hæc igitur ratione inuenta est medicamenti compositio: ut ex multis diuersarum facultatum medicinis unum compositum constituamus quod possit unicuique indicationi suam contrariam facultatem adferre: qua affectus ex ea parte tolli possit. præterea uero, & plures etiam affectus interdum, uel in eodem membro, uel in diuersis reperiuntur, quorum cum singulatim propriam unusquisque remedium requirat rationem; nec unum medicamentum particulatim possit satisfacere: plura componimus. A natura autem affectus partis occasionem componendorum medicamentorum accipimus, uel propter membri dignitatem, & necessitatem actionis eius; cuius roboris semper est habenda ratio, ecce enim in affectibus uentriculi, & iocinoris, cum laxantibus, & discutientibus, uel digerentibus medicamentis opus est, nunquam eis puris, & simplicibus utimur, ne robur uisceris dissoluatur, sed semper ea, quæ astringunt (ut docet Galen. 13. metheo.) admiscenda sunt; Vel propter rationem situs membri, nam si in alto membrum, cui medicinam paramus, situm est, ut non sit facilis ad id transitus; aliquid commiscemus, quod tenuitate sua faciliorem transitum, & magis celerem faciat, antequam uis medicamenti à medijs partibus, per quas transeundum est: dissoluatur (ut secundo de composit. medicam. per loca in dolore, & inflammatione capitis Galen. expo-

§. 1. q. 2.
114. q. 2.

Cap. 15.
16.

exponit) acetum enim oleo rosaceo immiscemus, quamuis doloribus acetum sit, quantum ad naturam eius pertinet insissimum, & in ijs affectibus sola rosacei facultate egeremus, quia tamen cerebrum; aut membranz quæ profundæ sunt: laborant uis olei rosacei, eò non facile perueniret; ideo acetum addimus, ut olei, à tenuioribus aceti partibus perducti, facilius sit penetratio; unde si externæ capitis partes laborent, uel si internæ detectæ sint, acetum reijcimus; in capitis enim, & caluariæ vulneribus, à mixtura aceti abstinemus: Tertio uero loco medicamento componendi occasionem à ratione ipsius medicamenti, quod nobis usui futurum est: petimus: idque multis de causis: ut Galenus declarat statim in principio lib. primi de compos. medi. per gen. quod ut magis perspicue explanare possimus: non nulla antea statuisse non erit alienum diximus paulò ante medicamentum proprie dici, id quod facultatem habet corpus nostrum transmutandi, uel (ut dicunt) alterandi: ea uero facultas, qua corpus nostrum medicamenta transmutant, aut in elementa, ex quibus constituta sunt: qualitatesque elementorum refertur siue per primas qualitates agat sicut sunt calidum, frigidum, humidum, & siccum siue etiam per secundas, & tertias, uel quartas, (qui enim effectus has secundas, & tertias sequuntur; & si statim à primis non oriantur, tamen referuntur tandem omnes in primas, inde enim postremo omnis aliarum uis profluit) aut inquam ea facultas in ipsas elementorum qualitates referri potest, aut in totam substantiam, & formam ipsius specificam, sicut dicimus, quòd scammonium uin euacuandi bilem habet: item, & rhabarbarum; colochyntis uerò, pituitam: ueratrum autem cum humorem, qui ater est, non quia calida, aut frigida sint, sed quadà substantiæ suæ, & formæ proprietate, & ita deinde inter dū medicinas exposcimus ea rōne, qua qualitatib. corpus alterant aliquando aut, qua substantiæ suæ forma immutant & mouent expositis. Quibus ita cum necesse sit, ut contingat facultate medicamentorum, quibus corpus transmutandum est, aut eatenus esse per se ualentes aptas, transmutare, quatenus transmutatione opus est, aut etiam minus, aut magis: si per se effectum ualent. præstare quem requirimus, iam nihil est, quòd cum alijs misceantur, sin uero maiores sint medicamenti uires, quàm nobis ex usu sit, commiscemus aliqua, quibus de illius medicamenti uiribus detrahamus: q̃ si minores, sint, apponimus aliqua, quibus uires illi medicamento addamus sed ut apertior hæc

res reddatur in utroque medicamentorum genere exemplis agamus: Sit quispiam qui affectus sit intemperie aliqua frigida in uentriculo cum materia aliqua pituitosa uentriculo hærente, quæ in flatum uertatur, & dolorem excitet, quæ tamen neque uehementer cruda sit, neque intemperies illa etiam admodum sit insignis: & uelimus eam remanere intemperiem, statusque discutere, & materiã attenuare, statim nobis occurret piper, aut zingiber, aut garyophyllum appellatum, aut cinamomum, uideantur autem hæc plusquam uellemus calefacere, aut quia minor ea est intemperies, uel etiam quia iocinori timemus, tunc aliquid miscemus, quo nimius horum calor obundat, sicuti sunt rosæ, aut sandali, aut corali, aut quidpiam aliud simile, aut zucorum rosaceum, aut myrobalani illæ cõditæ; contra uero si esset opus absinthio in ea frigida intemperie remouenda, quæ cū humiditate uentriculi esset, substantiamque eius laxaret, ut ipsum calefaceret, & eius substantiam alstringeret: uerum in maiori quidem esset opus calfactione; & aliqua etiam detractione, absinthio adderemus marubium, quod aliquanto calidius est, & uim detergendi habet. ita etiam in purgantibus medicinis aliquando addendi roboris medicamento, aliquando detrahendi gratia, plura medicamenta miscemus, & simul componimus, sicuti si alicui expedire putarem, ut purgetur bilis; detrahaui: ad hanc autem purgationem ciendam elegerimus Aegyptiam siliquam, quam Arabes cassiam fistulam nuncupant, & id uel ratione ætatis, uel anni temporis, uel laborantis particulæ: ille tamen cui eum daturi essemus, esset alui astrictioris, quàm ut leuioribus medicamentis facile solui possit, cassiam cum portione alterius medicamenti, quod scamonium recipiat: quo cassia ualentior in uacuando fiat, commiscebimus, ita & Gal. ut ipse, 14. meth. ait, purgaturus mulierem, quam diu herpes detinuerat, cum omnia medicamenta renueret, sero lactis scamonium immiscuit; ita etiam interdum usu ri acri aliquo, & ualenti medicamento, eius uiolentiam timentes, aliquid leuius, & facilius commiscebimus, puta scamonio rhabarbarum addemus, aut myrobalanos, aut mânia, aut cassiam, aut aliud quidpiam simile. Prima ergo occasio componendorum medicamentorum à medicinarum natura accepta, atque primus scopus est hic: addendi nempe aliquid, uel de uiribus detrahendi gratia, ut additione ea, uel detractione ad eam æqualitatem, & temperamentum perducatur, quod negotio nostro congruens, & accommodatum esse uideatur: nec modo in his quæ nuper diximus, sco-

Cap. 17.

pus is locum habet: sed & in soporiferis, quæ narcotica medicamenta, uel anodina, hoc est, dolorem leuantia à græcis dicuntur. quod in prin. lib. 1. de componen. medic. per genera Gal. declarat: componunt enim medici frigidā cū calefacientibus, ut uis ea, quæ soporem, & torporem affert, ab illis obtundatur. hic ergo primus componendorum medicamentorum est usus, qui occasione accepta à natura ipsius medicamenti sumitur: Alter uero est propter saporem, aut odorem, aut aliam qualitatem alioquin ipsi naturæ ingratam, aut uentriculo molestant, unde natura id medicamentum renuens ad uomitum excitatur, & exagitur; atque ideo Gale. & Hyppo. docuere illi aliquid commiscendum, quod gratiam aliquā & suauitatem conciliet. hac enim de causa Hippocrat. secundo, de ratio. uict. in acut. mor. peplico, & nigro ueratro pleuriticis purgatus, semina odorata commiscet, nempe semen feniculi, anisi, amij, & similia, (ut ibidem declarat Gal.) ita interdum cum aliqua nobis medicina opus est, quæ suapte natura iusto plus morari in uentriculo, ac longiori mora illum nimis turbare soleat: aliquam ei alterius medicamenti acrioris portionem, leuem tamen addimus, quod eius descensum acceleret, & inde uentriculum ea molestia liberet, unde agarico zingiber addimus, & sal quod gemma uocant, interdum & oximel: nonnunquam autem, & si medicina aliqua eius qualitate utilis futura sit, quia tamen in ea alia etiam qualitas est, quæ plurimum potest uentriculum, & cætera præcipua uiscera lædere, sicuti omnes ferè medicinæ ledūt, quæ proprie soluentes sunt, ut scamonium, colochyntis, elateriū, ueratrū, & eius modi, aliæ quæ alicuius uenenosæ qualitatis & naturæ nostræ inimicę participes sunt, aliqua egebit mixtura qua, aut nocua ea qualitas tollatur, aut illi obstitatur, unde ratione, experientiaque innixi medicij aliqua quasi alexipharmaca (ut græci loquuntur) quibus incommotis harum medicinarum obstitatur, excogitarunt, quare scamonium in malo cotoneo decoquunt, ne uis eius uentriculi uires dissoluat, & ita omnia habent sua medicamenta, quibus corriguntur, & ut Arabes, & nostri iuniores loquuntur, cōsolantur. Tertius uero usus, unde interdum medicamenta commiscere cogimur, est, ut aliqua forma, & modus substantiæ medicamento detur, quæ forma, & qui modus nobis maxime ex usu futurus est, uerbi gratia (ut ibidem Gal. tradit) si aliquod medicamentum nobis conficere uelimus quod emplasticam formam constituat, plura medicamenta commiscere necesse est, quin nullum.

reperire possumus, quod solum nobis hoc præstare ualeat, neque enim cera sola, neque oleum solum, neque resina satisfaciet, nec item metallica medicamenta, quæ cocturaliqueſcunt, sicut spuma argenti, & alia similis naturæ. Vnde necessum est hæc, aut omnia, aut quædam simul mixta coquere, ut ad eam formam redigantur, quibus deinde & herbas confusas, & in puluerem deductas addimus, & arborum lachrimas, & alia pro ut indicationes uariæ ostendunt. postremus etiam compositorum medicamentorum usus (quem refert eodem loco Gale.) est, ut medicamenta, quæ à græcis *παρασκευα* dicuntur, hoc est uarij & multiplicis usus habeamus, sicuti, qui Theriacam & mitridatiam antidotum composuere, id sibi proposuerunt, ut medicamentum conficeret, quod omnibus uenenis aduersaretur, ac opem ferre posset. Hi ergo sunt omnes usus, uel saltem præcipui, quos medicamentorum commixtio præstare nobis potest, atque in hos tanquam in proprios scopos respicere oportet eum, qui recte, & ex arte medicamenta composuiturus est.

De communi medicamentorum enumeratione & differentiis & quod componendorum medicamentorum ratio præcipue ab indicationibus pendeat. Cap. 3.

PRæterea cum nihil magis ad doctrinæ perspicuitatem facere uideatur, quam distinctio, & ordo; in his rebus præsertim quæ multiplicem, & uarium usum habent, cumque maxime medicamentamulti non simplicem usum recipiant, ideo nisi priusquam particularim tractationem instituamus: usus hic multiplex distinguitur, & ad rectam partiendi rationem redigatur, confusio maxima in discentium, ac legentium animis faciliè suborietur; quæ eos non parum ab hoc instituto poterit deterrere diuisio siquidem inter omnes methodos, ad dearticulatam, & exquisitam disciplinam maxime (cōducit, ut ex sententia plat. 9. lib. de decretis Hippo & plat. docuit Gal. Hac itaque methodo usi, omnem modum, & rationem, qua uti solemus medicamentis partiendo exponamus; & dicamus quæ medicamenta, quæ nostro usui accommodari possunt, aut exterius adhibentur, aut interius assumuntur: quæ exterius adhibentur: diuersum habent usus, & compositionis modum diuersanque item formam; nam aut cerata sunt, aut emplastra, aut illitiones, siue linimenta dicas, aut fomenta, aut lotiones siue balnæ

balneæ, aut perfusiones, quas græci embrochas appellant, aut pulueres: Quæ uero intra corpus assumuntur, aut in nares iniiciuntur attrahuntur uel, aut in aures instillantur, aut ori induntur, aut inferius, in anum immittuntur, aut per genitalia membra atque in uiris atque in mulieribus administrantur, sicut in affectibus penis, uteri, & uellicæ fit. In nares autem aut succos, aut liquores, aut decocta uehementer inspirando; uel spiritum attrahendo ad superiores, & internas capitis partes adducimus, pulueres uero fistula, aut penna exceptos in suffiando immittimus. Quæ ore sumuntur, aut deuorantur, aut non deuorantur, sed diutius in ore continentur, quæ aut masticantur seu manduntur, aut ita quæta dum liquecant continetur, sicuti diacodion appellatum, & diatragachantum, & eclegmata (loch dicta à barbaris) quæ delinguntur: aut præterea gargarizantur. Quæ deuorantur sunt aut catapota, aut boli dicti, aut potiones, (in potibus autem omnia, quæ bibuntur comprehendendi possunt ut syrappi dicti à nostris, quod uocabulum apud Arabes potioem significat, nec eius quærenda est latina ethimologia ut quidam ex nostris fecere,) decocta item cæteraque medicamenta fluentia, quæ bibenda dantur. Quæ ano subiiciuntur, clysteres sunt, & glandes, uel ut nostri iuniores appellant, suppositoria. per clysteres etiam, quæ per æneam fistulam linimenta, aut lotiones ob interna ulcera intestinorum iniiciuntur, iniici dicimus. Quæ per membra, genitalia mulierum medicamenta recipiuntur. itidem sunt aut clysteres aut glandes, In uirile autem membrum liquida, & tantum fistula ænea, aut argentea, aut simili, propter meatus angustiam impelli possunt. Neminem esse puto, qui his omnibus non oscitanter lectis, non facile comprehendere animo possit, quam sit magna harum rerum congeries, & sylua, quas tamen omnes hoc nostro à nobis instituto sermone complecti sit opus, nisi imperfectum negotium uelimus relinquere, quod certè non leue onus uideri potest: Si uelim, quod uobis pollicitus sum præstare, & breui methodo ea omnia comprehendere. Agam tamen pro mea uirili parte, ut quo melius potero uobis satisficiam pergamus itaque ulterius, & ut tandem rem hanc magis particulatim tractare possimus, expediamus, si quid præterea sit, quod in uniuersum sit cognitu necessarium in quibus hoc potissimum est, quod medicamenta tam simplicia, quam composita sunt quædam medici instrumenta: quibus in curandis morbis utitur. quorum congruens usus, cum à recta uicinis ratione discerimus, præcipua

Victoris Trincauellij

cupua, & maxima uis medicæ artis uidetur esse, ipsius uero pars maxima in ipsorum compositione, & mixtione sita est; & sicut alia omnia apta, & congruentia catenus dicuntur, quatenus ex illis initiis pendent, à quibus uniuersa medendi methodus constituitur, uidelicet ex ipsis indicationibus, ita & horum non dissimilem esse rationem dicemus. Vnde, & in medicamentis componendis non minus indicationes illæ obseruandæ sunt, quam in aliis omnibus medicis instrumentis obseruantur, & operationibus: quarum primæ duæ illæ sunt, altera, & præcipua à tēperamento & natura, tum malè affecti corporis, tum etiā particulæ illius, cui, aut propter quam medicamenta componenda sunt, & administranda: dixi uerò naturam, quia non modo temperatura indicat, sed situs etiam figuraque, & connexio, atque cætera, in quibus natura membri consistit: Altera est natura, & essentia ipsius affectus, seu morbi ad ob quem tollendum componuntur. His succedunt & aliæ, quæ non ita præcipuæ sunt, quia nempe ad has referuntur, sed necessariæ & ipsæ sunt, non quidem propter se, at tantum quia ad primarum duarum exquisitam cognitionem faciunt, illæ uero sunt ætas, regio, tempus anni, eius constitutio, consuetudo, uitæ studia, & instituta, ut sunt artes & ciuiscemodi reliqua, de quibus omnibus, & in methodo morbos curandi, & in libris de medicamentorum comp. & aliis itidem locis amplissime Gal. disseruit.

De differentijs medicamentorum per os assumendorum. Cap. 4.

HOrum autem omnium tractationem ab his inchoabimus, quæ per os sumenda sunt, quæ cum diuersam admodum, (ut nuper exposuimus) differentemque rationem habeant, ut ordinarè habentes, lucidiorem, & faciliorem doctrinam instituamus, alium sequemur à præcedenti partiendi modum, ab effectu, & facultate harum medicinarum, uel potius à scopis desumptum, quos in exhibendis his medicamentis spectamus, & intuemur. Medicamēta igitur quæ ore sumenda damus, aut ideo damus, ut uiriosos, & superuacuos humores, uel in uniuerso corpore, uel in aliqua particula congestos, purgemus, uacueniusque: aut, ut per proprias medicamentorum vires uitia in uniuerso corpore contracta secundum qualitates, tam primas, quàm secundas, & reliquas emendemus: sicuti quando nitimur calidam partium, aut totius intemperiem contrahant, aut frigidam remouere, aut siccam, uel humidam, uel etiam mixtas

mixtas, & ut ita dixerim, coniugatas, uidelicet calidam & hūmidam, calidam & siccam, & parietiam ratione frigidam & hūmidam, frigidam & siccam: idem quod pariter ad alias qualitates pertinet dicamus sicuti si leuia exasperare uelimus, uel aspera lenire, leuigareue, præterea laxa, raraque astringere, & densare, densa & astricta laxare, & rarefacere, & reliqua his similia. Interdum uero non modo, ut corporis affectiones transmutemus utimur medicamentis, uerum quia sæpe non solum qualitate & affectione laeditur corpus, sed etiam uitiosæ materiæ præsentia, quæ affectionem particulæ fouet, & seruat: ideo propter uitium quoque istius modi humoris corrigendum, medicamentum bibendum, aut deuorandum ægrotanti offertur: præsertim, cum interna uiscera, aut uasa superuacaneis hūmores occupant, quod ob duplicem sanè scopum facimus: primus autem scopus est, ut si fieri possit, in bonam, & utilem naturam, & muniis corporis accomodatam eos reuocemus: tunc autem reuocantur quando uitium nondum sit insigne: Alter uero scopus est, ut quando id fieri nulla ratione potest, saltem aut euacuationi aptior reddatur, aut naturæ minus rebellis, & minus nocuus fiat, sicuti quando lentum, & crassum attenuare, & secare, item quæ detergere quærimus: cumque tales succi sæpius obstructiones efficere soleant: ideo hos præcipuè scopos in curandis obstructionibus spectamus. Quando autem nimis tenuis est, crassiorem reddere contendimus, si sit autem ita acer, mordaxque, ut ideo quasi pungens & abradens tum naturam turbet & stimulet, inquietūque & dolēre efficiat egrotantē, tum ulceret internas aut externas partes, procuramus, ut aptis medicamentis, & acrimoniam obtundamus, & mordacitatem deliniamus, & subinde his omnibus rationibus ad facilem uacuationem paremus. Sed de hac quidem medicamentorum ratione posterius suo loco agemus. Nunc prius sermonem de iis medicamentis instituemus, quæ ut corpus inaniatur, à medico frequentius dari solent. Eorumque duplex est differentia, aliis enim utimur, ut determinatam aliquam particulam purgemus: aliis uero ut uniuersum corpus inaniamus, certam particulam purgando inaniunt, quæ apophlegmatismi dicuntur, quæque uel manifesta, uel gargarizata caput & cerebrum detracta ab eo pituita uacuant, à iunioribus autem nostris tum masticatoria, tum gargarismata appellantur. Vniuersum corpus, atque etiam commune uias, & communia uiscera illa purgant, quæ sunt triplici distincta facultate, sicuti triplex est regio, & triplex uia sensibus manifesta, qua per medica-

eam, uel humorem melancholicum. attrahant, vnde omnes auctores, qui de illis habuere sermonem: unicuique eorum aliquam facultatem attribuunt, qua magis hunc, quam illum humorem respiciunt, sed ea facultas adeo leuis & imbecilis est, ut uix eius operatio euidens cōspici possit, nisi insigni copia exhibeantur, & propterea hæc medici in soluentibus medicamentis, quæ item verè cathartica uel purgatoria sunt: minime ponenda esse censuere, sed & alio modo hæc duæ medicamentorum differentiæ diuersam habent rationem, nempe quod prior eorum est, quæ facilia sunt ac tuta, & aut nullam, aut quam exiguam naturæ uim, aut molestiam afferunt & inter hæc minus etiam aliis ea molestant, quæ leniunt, ut sunt manna, casia, tamarindi, & quæ sebesten ab Arabibus mixta uero uel myxaria, à græcis præsertim posterioribus appellantur, item, & pruna uiolæque & rosæ, uel harum succi, prætereaserum lactis imo, & lac ipsum præcipue ac sinæ, nam huiuscemodi omnis fere medicamentosa qualitas expertia sunt: Vnde sæpe illis, simplicibus utimur, & sine alterius rei compositione & mixtura, quod si aliquando illis aliquid addimus, illud fit, ut eorum operationem acceleremus, & adiuuemus, quæ & debilis, & tarda nimis interdum esse solet, & ea ratione magis aliquam solent molestiam afferre, quam quòd ulla eis insit maligna, uel naturæ aduersaria qualitas, quæ mixtionem, unde corrigantur requirat: aliqua tamen ipsorum non nihil uisceribus incommodi afferunt, dum operantur, ita ut eam ob rem egeant aliqua (ut iuniores aiunt) consolatione uel correctione, præsertim uerò in illis, qui imbecillio rem aliquam particulam habent, & illi incommodo obnoxiam, cuius occasio id medicamentum esse solet, sicuti casia, quæ leuia, & imbecilia intestinalia habentes lædit, in illis enim torsiones flatus, & dolores concitat, Tamarindi quoque aciditate sua uentriculo debili, & frigido officunt, nec sene etiam admodum uentriculo commoda est: Ad tollendas itaque eiusmodi noxas, interdum has cum aliis, dum uti uolumus: componere soliti sumus, quamuis, & aliis de causis id fiat, de quibus magis particulatim postea agemus. Alterius uero differentiæ medicamenta, quæ & proprie purgantia, dicuntur, omnia & ultiosa sunt, & acris, & suapte ut qualitas naturæ nostræ aduersaria, & quasi penenosæ non expertia, quæ nisi reprimantur, & corrigantur, possunt magis lædere, quam iuuare: Vnde & insignem exigunt cautelam, moderationem, & temperamentum, quod sibi aliarum medicinarum mixtione, & compositione, & quasi condi-

mento

mento. comparare possunt pro indeque rarissime simplicibus, sapissime uero mixtis, & compositis, illis utuntur medici. De utrisque autem cuni sit habendus sermo, rationi magis consentaneum uidetur, ut à prioribus incipiamus, mox autem, & ad alia sermonem conuertamus, & quia non modo inter simplicia medicamenta hæc intercedit differentia, sed, & ex compositorum numero, alia sunt facilia & leuia, quæ aut nullā, aut modicā admodū agitationē & cōurbationē, dum aluum mouent: concitant: alia uero corpus non parum agitant, & turbant, ideo, ut exactior euadat doctrina de utraque medicamentorū cōpositorū ratione tractationē instituamus.

De usu medicamentorum, leniter purgantium generalis pau. 35
methodus: Cap. 6.

Non omnia simplicia medicamenta, quæ ad præsens institutum referri possunt in præsentia percurremus, nimis enim in longum nostra prouheretur oratio, & ultra huius nostri instituti fines cum nouitiis, procederemus non autem prouectioribus scribamus, & hunc isagogicam compendiariumque doctrinam sequi in hoc opusculo nobis proposuerimus nam, exactam istius methodi rationem cum maius otium nacti erimus, explanabimus: Vnde ea simplicia tantum medicamenta quæ ab arabum scola benedicta appellantur quibus solemus ad expurganda corpora, frequentius uti exponemus, atque nitemur, quo melius poterimus congruenter eorum usum rationemque explicare. Quæ ergo facilia sunt, & quibus soliti sunt medici sæpe, uel solis & simplicibus sine alterius rei mixta uti, & id propterea quod ex se quidē nullā habēt naturā, uel qualitatem corpori humano noxiā, quæ medicū cogat, ut illi quidpiā addat, quod eius malitiā reprimat, & emendet, sunt inter cætera siliqua illa ægyptia, quā Arabes, & iuniores, nostri castiā appellant. quæque antiquis medicinā scriptoribus quos me hætenus legisse meminere fuit ignota, præterea, & māna ab Arabibus dicta, siue mel aereū sit à græcis appellatū, siue aliud quod uis, & tamarindi, siue ad palmularū syluestriū genus attineāt, siue sint aliud, (à græcis posterioribus ut opinor uocātur oxiphēnices, quasi acetosas palmulas dicas, nā illos errare puto, qui eos esse dicūt, quos phenicobalanos Gal. lib. 6. de cōp. medicamento. secūdū locos. appellat), & serū lactis præsertim caprini, & in eodem ordine Hippo. & Gal. ut patet 4. de rat. uic. in morb. acut. coctū asinæ lac posuit. Rosa etiam uel eius succus, & pruna præterea myrobalanorū ab Arabibus appellatorū genera tria, ut sunt citrinæ, chebulæ, & inde, diximus aut

Cap. 6.

Com. 7.

ab Arabibus appellatorū, quia græci myrobalanon glandē unguen-
tariā nuncupant, quā Arabes been (nifallor) uocant, præterea uero
rhabarbarū appellatū, Aloe, absinthiū, fumaria, seu, ut uulgo di-
cunt fumus terræ, sēna, & Epithimum: Quod si aliquando non so-
lis his utimur, sed potius aliis additis cōponimus, nos ratio multi-
plex, ut hæc cū aliis cōponamus adducere potest, quia aut ipso-
rum medicamentorū causa aut purgātorū humorū, & morborū, qui eo-
rum usū curādi sunt, aut corporū, quorū curationē tractamus gratia,
eā cōponimus. Alia itaque interdū propter propriā eorū naturam
his leuibus medicamētis adiicimus, quod quidē dupliciter fieri po-
test: Nā aut propter uim, & facultatē, qua aluum cient, & soluunt.
aut propter aliquā aliā in eis qualitātē ad primas uel secundas per-
tinentem hac miscemus. Quatenus ad facultatē, qua aluus cietur,
attinet, additionē alterius rei requirunt leuia medicamēta, quia om-
nia in uniuersum, ut prius diximus, primū tarde admodū uentrem
soluunt, & suā sæpe post longū tēpus operationē tandē absoluunt,
deinde uero, & debile uim mouēdi, & trahēdi, uel educendi purgā-
dos humores habent: Vnde & hæc incōmoda non nunquā sequun-
tur: ex tarditate enim cōtingit quod mouent eo tēpore aliquando
quo agitari humorē purgandū, aut corpus turbari nō oporteret:
licuti in accessionū initiis, uel aliis incongruis huiuscemodi tem-
poribus, & interdū quo tēpore cibus acceptus esset in uentriculo
concoquendus, ut deinde turbatus ex medicamēti motione uentri-
culus cogatur simul & cibū, & medicamētum reiicere: Ac uero ob
imbecillitatē facultatis motricis mouēt quidē purgādos humores,
sed nō eā uim habēt, ut possint eos soluere, & educere: Vnde moti,
& nō educi molestia lōge maiore afferunt, & sæpe in causa sunt, ut
accessiones, doloresque & reliqua symptomata maiora fiāt: nōnū-
quā etiā præ sua imbecillitate paulatim mouēt, & frequenter ægro-
tos cogūt, ut ad deiiciendū assurgāt, quod nō parū laboris & incōmo-
di laborātibus esse interdū solet: dū parū deiiciūt, & sepius affur-
gunt. Quamobrem medici, ut his malis occurrant, aliquid addūt, quo
uel accelerari possit operatio, uel uis eorū augeri. Quatenus au-
tem ad alias eorum qualitates pertinet, quia quædam eorum uel ni-
mis calefaciunt, uel magis quā par sit: refrigerant: aut nimis astrin-
gunt, & exasperant, aut nimis laxant, & leuigant: ideo medici
sæpē ut hos excessus corrigant, & mediocritatem quandam ad-
ducant, aliquid addere consueuerunt, ut paulo post particulatim de
myrobalanis, tamarindis, rhabarbari, casia, manna, & aliis
quibusdam

Victoris Trincauellij.

quibusdam exponemus. Natura uero purgandorum humorum medicos admonet ut his medicamentis aliquid adiciant, tum ea ratione quia nonnunquam non unus tantum humor est uacuandus, sed plures, sicuti cum sunt crassi cum tenuibus humoribus mixti & leue medicamentum eam uim suapte natura habeat, ut tenuiores humores facile possit purgare, crassiores uero minus queat: ideo aliquid addemus, quod in crassioribus humoribus mouendis opem his ferre possit: ecce enim aloë per se biliosos humores, & pituitosos si tenues fuerint: potest educere, crassos uero minime: Vnde hie ra composita est, quæ simplex uel ex aloë dicitur, in qua additis aromatibus, quæ uim attenuandi habent, fit ut & crassos, & lentos humores possit uacuare. sunt & alia Simplicia quæ unum, & simplicem humorem possunt purgare, alium uero, aut nullo modo, aut adeo infirmiter, ut si aliquid purget, nihil tamen quod alicuius momenti sit, possit uacuare, quibus si aliqua alia immisceantur, quæ hæc ex ea parte iuuent, illum item humorem facile uacuabunt sicuti aloë addito epithimo, uel sena melancholicum & uisum humorem facile, & sine molestia uacuabit, Sed & morborum natura quandoque medicum cogit medicamenta hæc cum aliis componere, & miscere. Atque id multiplici occasione, primum quia non una erit, sed complex indicationis ratio quæ medico uacuandum esse suadet, sed quoquomodo composita, sicuti si quis diarrhæa in media ætate corripitur, quæ à copiosa in uniuerso corpore congesta ortum habeat, iuxta medicorum regulam, quæ sæpe fluxum curandum esse fluxu præcipit medicus indicet agendum esse, uelitque copiam illam leui, & facili medicamento uacuare, duos sibi scopos proponit: primum ut medicamentum illud ratione, tum temporis, tum naturæ uacuandi humoris, & intemperiei calidioris corporis ex qua multa illa bilis genita fuit: non plurimum calefaciat, & præterea ut post euacuationem aliqua astrictione fluxum & uiarum laxitatem propensionemque naturæ refrenet, ne uidelicet magis naturæ motus concitetur, quæ deinde præceps facile agi posset: Vnde aut cassiam eligemus, aut manna, aut tamarindos, & eis addelemus rhabbarbari quidpiam, uel citrinarum myrobalanorum, ut unci liquoris, uel (ut aiunt) floris cassiæ dragmam, uel semidragmā rhabbarbari in puluerem redacti, aut tantumdem myrobalanorum, uel parabimus infusionem (ut iuniores loquuntur, rhabbarbari ad scilicet dragmam ex decocto fructuum parato ex iuiubis tamarindis, prunis, & similibus, cui syrussi rosacei solutiu, aut mannæ ad

duas uncias, aut aliud his simile addemus, eodē modo in febribus calidioribus uentrē rhabarbaro purgaturi, quod illis alioquin calefaciendo aduersariū esse uidetur, commodus tamen eius usus est, tam aperiendo, si quæ sunt obstructiones, quàm biliosam materiam purgando, ipsum refrigerante decocto macerabimus, & alia addemus medicamenta, quæ eius quidē calorem temperent, neque uim purgatoriam impedian, sed potius iuuēt: possemus multa præterea eodē spectantia exempla exponere, cum nunc tamen nobis nou propofuerimus omnia explanare, quæ ad pharmaceuticē medicinæ partē pertineant, sed ea tantū per compendiu litteris mandare, quæ nouitios medicos in cōgruē tractandis medicamentis erudire possint: hæc censuimus fore satis: Ratio præterea corporū, quibus purgatoria medicamenta exhibenda sunt, medicamenti simplicibus aliquid addere suadet, quibus ea cōmixta faciliorem speramus operationē esse præstatura: quod quidē aliquādo necessum est, propterea quia, & si quoddam ad naturā medicamenti attinet, id maxime sit scopo, quem sibi medicus proposuit, aptū corpus tamen adeo astrictū est, & difficilis alui, ut his leuioribus solui nequeat, & ob id aliquid, quo uis medicamenti exacuatur, & augeatur, addimus: Aliquādo autē, quia in nonnullis aliquod uiscus est infirmū, quod facile ab aliqua medicamenti, quod alioquin esset opportunissimū, qualitate lædi posset, ideo, ne aliqua ex parte lædat, sed profit undequaque, aliquid illi immiscemus, quo imbeciliorē particulā ab iniuria medicamenti, quā timemus, defendat: Nā cū cassia intestina suapte natura laxa, & leuia habētibus nocua sit, tamarindi uero uētriculo infirmiori, & frigidiore, qñ (ut inferius dicemus) iis uti medici uolunt: sōne inueniēdi aliud medicamentum iniere, quod primam quidem purgandi facultatem non impediret: lēSIONem uero quam alioquin afferre possent, emendaret.

Quod rectus usus medicamentorum in qualitate, quantitate, modo utendi, & tempore consistit: ac primum de qualitate. Cap. 7.

Sed his in uniuersum expositis de istiusmodi medicamētis magis particulatim, ac de congruēti eorū usu agamus: quod ut rectius, & clarius faciamus, prius & hoc generale theorema inuestigemus, quod non parum ad hoc negotiū facere uidetur, nepe quot ea sint, in quibus omnis ferē cōgruētis horū medicamētōrū usus ratio cōsistit. Ea aut (ut ego quē arbitror) quatuor sūt, uidelicet qualitas, & medica-

B mēti

menti, quo uti uolumus, natura, deinde quātitās eius, tertio modus uel forma, qua exhiberi cōmodius potest: per modū aut, uel formā intelligimus, an potione magis dādū sit, an (ut aiunt) in forma boli uel cataportiorū, quæ pillulas nūc appellāt, uel in placētularū formā; & ut iuniores aiūt, in rotulis, uel cōfectionibus: quarto est tēpus ea administrandā. Qualitatē medicamēti, primū & per se indicat uacuādī humoris natura, & qualitas, quia id medicamētū ad uacuationē moliēdā eligendū est, qđ possit cōmodē; & tuto cū humorē educere, qui quidē aut noxius est, aut timēdū est, ne noccat: quia aut morbū facit, aut facturus est, uel ipsum fouet, uel forturus est ut 1. lib. aph. docuere tū Hippo. tū Gal. & quāuis hæc medicamentā, quæ leuia sunt, & quorū uis ad remotiores, & penitiores uenas non pertingit, plerūque eos uacuent humores; qui in uis cōmuni-bus sunt, aut in locis propē eas, & eos, quibus occurrūt: attamen, ut paulō ante diximus, unumquodque eorum omnino unum magis quā alium humorē naturæ suæ proprietate purgat, præsertim, si aliqua copia detur: unde facultates hæc sunt exacte à medico memoriter tenendæ, ut accōmodatū medicamētum possit eligere, neque hoc solum esse referendum putamus ad qualitatem eius medicamēti; quod primario tanquā nobis opportunum elegimus, sed etiā ad alia quæ cum his cōmiscenda sunt, nam sæpe medicamentū, quod alioquin ineptū & noxium esset, mixtura (ut 3. de temperamentis Gal. ait) fit aptū, & nostro scopo satisfacit. sed & 1. de compos. me- di: secundū genera inquit, quod idē medicamētū aliis immixtū effectus diuerfos facit: at horū indicatio ab illis accipitur, quæ nobis, uel corrigendū esse medicamētū demonstrant, uel eius uiribus aliquid ex eo esse addēdū, quod aut ibecillius sit, quā corpus, aut humor qui euacuāndus est; requirat, uel, ut aliū humorē etiā purga- ret: ut antea diximus, & hæc non modo in uniuersum, sed etiā particulatim cognoscenda sunt. nā aliqua sæpe inter nonnulla medica- menta familiaritas, & naturalis affinitas intercedit: unde felicissi- mē cōmisceri possunt, & sæpe, sicuti experientia docuit, duo sunt simplicia, quæ quāuis eiusdē sint, uel similis naturæ, alterū tamē alte- ro maiore cū tertio familiaritatē & conformitatē habet; ita ut id cū altero mixtum feliciorē in purgādo sortiatur effectū, quā si cū al- tero fuisset cōpositū. Sed de his particulatim paulo post sermonem habebimus. Hoc tantū in uniuersum exposito, quod semper ratio maior illius medicamentū habenda est, quod (sumpta indicatione præcipuē

Coment.
secunda.

Cap. 2. & 3

præcipuè à natura humoris) primariò nobis opportunum ad expurgandum corpus fore censemus. uidelicet, ne quæ illi addendâ sunt: eam illius uim detrahant, & operatione impediunt, uel retardent, cuius gratia maxime id eligimus. Huic autè priori capiti accedit, & tēperies purgandi corporis, & anni tēpus, & regio, nam in calida & sicca, ac in simili regione, itemque tempestatura, tempore æstiuo ab acrioribus, calidioribus, et ualide exiccantibus medicamentis temperandum est, contra uero à frigidioribus & humidioribus in contrariis temperamentis, regionibus, & temporibus.

A quibus petenda quantitas seu pondus medicamenti. Cap. 8.

Quantitatem uero commodam exhibendi medicamenti docere poterunt: partim magnitudo, & quantitas morbi, itemque copia & uacuandorum excrementorum, corporisque purgandi natura quibus etiam additi idē debet ætatis, & temporis, & regionis ratio: nā cū omnium natura constantium, siue per se considerentur siue ad alia referantur, sit certa quædā & determinata ratio, sint certi denique fines; hoc itē in medicamentis cū corporibus, quorū ratio ne habet, quod medicamēta dicantur; collatis, non minus obseruari potest, quia certa quadam mensura administrata modeste id efficiunt, infra quā uel nihil efficiunt, uel parū admodū, ita ut non modo iuuare non possint, sed potius ledere, dū mouent quidē succos, neque deinde eos superare possunt, uel digerere, aut educere, supra autē illā mēsurā inmodice mouent, & effrenis est eorum operatio: Ea uero mensura non omnino indiuidua est, aut eadē semper, sed latitudinē (ut loqui solent iuniores) habet, quia moderata, & certa hæc mēsurā uariari potest, quātū ad idē medicamentū pertinet, aut ratione corporis purgandi, ætatis uel, aut tēporis, & regionis, atque aliorū multorum: nā corpora quædā, nisi copiosiori exhibitō medicamēto, solui, & purgari nequeunt; alia uero, uel modico etiā accepto soluūtur multos enim noui, qui uel semūciæ castiæ deuorata, liberalissime fuere periti, tamen alii sesquiuncia parcissime inamiti sunt: sed & pueri nō possunt æque copiosum medicamētū, atque grādiōres, & adulti admittere: præterea ætate corpora facilius, & minori soluuntur medicamēto, quā hyeme, quare fines certæ mēsuræ medicamētorū aliquanto ampliōres sunt, sicut exēpli gratia, castiæ ægyptiæ à semūciā usq; ad sesquiūciā, uel ad summū ad duas uncias potest esse cōgrua mēsurā, & quia intra hos terminos semper

copiosior sequetur uacuatio, q uo copiosior acceptus erit liquor ex
siliquis extractus, quas canas vulgares uocant: ideo oportebit, ut medi-
cus, qui ea uti recte uoluerit, exacte corporis purgandi ratione ha-
beat, nepe an a medicamento facili negotio moueatur: nam si fa-
cile, & leui medicamento corpus illud uacuari soleat, minori copia
egebit, maiori uero, qui astrictioris alui sunt. Mox ad morbum, &
copiam hu morum uacuandorum respiciat, quia cum morbus leuis
est, & facilis, neque periculum aliquod in mora esse uidetur, quod
nos scmel, & confertim uacuare rogat, possumus minori copiamedi-
camenti uti, sapius, & minori ui illata naturæ partius uacuare.
At uero si sit morbus, qui uacuandum iam esse indicet, neque lon-
gam morā uideatur admittēre, id in medicamento erit addendum.
quo morbificis insigniter humoribus liberalius detractis, ægrotus
subleuetur, & fomentū morbo subtrahatur. Nec minus excremen-
torum, quæ uacuanda sunt, copia erit spectanda; nā si multa ea fue-
rint, & medicamentū modicū exhibuerimus; quod paucitatis ratio
ne imbecillius quoque sit, tunc maxime excrementa excitantur, &
mouentur, nec tamen ab imbecillo eo medicamento educi, aut ex-
pelli possunt: unde fit ut magis molesta imbecilla, huiusmodi me-
dicamenta fiant: semper enim causa morbosa, cum mouetur (ut
Gal. secundo de causis symptō testatur), nocentior est, quā cum
quiescit: unde ad hoc incommodum uitandum uel maior me-
dicamenti quantitas erit exhibenda, uel illi aliud ualentius erit im-
miscendum, quo illius uiribus aliquid addatur.

Cap. 5.

Sub qua forma medicamentum sit exhibendum. Cap. 9.

SED & formam, uel rationem, uel modum medicamenti exhiben-
di eligimus: partim illius, cui medicamentum dare institimus
naturā, & mores respicientes; partim morbi, uel affectus, quo ille la-
borat, ratione perpedētes, quibus & hoc casu addendū esse tēporis
statum, uel naturam putamus. Nam ut à primo incipiamus, aliqui
sunt, qui nunquā cataportica, uel pillulas, neque bolos (ut aiunt) de-
uorare potuerunt, nec syrupos admittere, sed primum hoc cōsiderā-
dū, q medicamentorū formæ, substantiæ seu cōsistētiæ modo plurimū
differūt, qā pillulæ substantia, qalius cōpactior, & solidior est, cōstāt,
potiones uero diluta, magis tenuiori, & magis fluida cōsistētia sūt:
inter has uero medio quodā modo se habēt, quæ uel boli à iuniorib.
dicuntur, uel cōfectiones, quæ ex zucharo decocto ad cōsumptionē
uniuersi ferē externi liquoris, quo fuerat dilutum, sunt, ut deinde
in orbes

In orbes, uel (ut loquuntur apothecariis,) in rotulas redacti & refrigerescentes in solidiorem compagem transeant. Sed hæc medicamenta quâuis solidiora etiam pillulis primû uideantur, tamen dū mâduntur: ab eo, qui in ore est, humore. dissoluta, teneriora fiunt. Modus uero assumptionis est, quod boli & pillulæ deuorandæ integræ dantur, quia facilius ita sumuntur, cum enim ingrati saporis, & odoris plerunque sint, non possunt sine multa molestia, & interdum fastidio, ore diutius teneri, sed deuoratz statim ad imum uentericulû delatz minus sumentem affligunt, potiones bibendæ dantur, cum enim fluidæ sint, cito desluunt, confectiones uero (ita enim nunc uulgo dulciaria appellant quæ sacharo condiuntur, uel parantur) cû aliis omnibus minus sint ingratz propterea quia sacharo dulcescunt, & gratiam sibi conciliant, mandî facile possunt. Sed unde diuertimus redeamus: nonnulli inquam nunquâ potuere, uel uolueratapotia deuorare, imò eorum aliqui dum medicorû suasu, aut assistentiû niterentur sumere, ferè strangulati sunt: alii uero bolos omnino detrectant, quòd si cogitur omnia euomunt, qui tamen potus facillime accipiunt; alii si liquidas biberint medicinas: statim uel paulo post, eas uomitu reiciunt, facile autem pillulas uel bolos admittunt, & continent, appellatz autem confectiones facilius nomine ferè, & dulci primo gustu decepti pueri accipiunt, & qui per inde, atque pueri delicati sunt: consulenda itaque primum naturæ ratio, & consuetudinis eorum, qui medicinas sunt assumpturi, raroque aliquid à medico repugnante natura agendum est, præterea uero cum medicinæ solidiores semper saltem actu, imò plerûque & potestate sicciores sint quàm liquidiores, & humidiores, ubi minus exicare uoluerimus, liquida, & fluida medicinæ consistentia opportunior erit, quàm solida, & magis sicca. Quod si humidior esset affectus, præsertim uero cum materia, non esset ineptum medicamentum id, quod non solum potestate exicaret, sed actu etiam siccum esset; Nam quod de ratione naturali corporis diximus, illud idè est ad affectus, morborumque rationè referendum; Vnde rarissime pillulis in febribus utimur, præcipue si magnæ, & acutz febres fuerint, & in aliis calidioribus morbis, rarò etiam æstate, & temporibus calidioribus; nam in potionibus facilius est calorem, & siccitatem medicinarum soluentium retundere refrigerantibus decoctis, uel aquis, uel syrupis, facilius etiam in bolis, & confectionibus, quàm in pillulis:

Victoris Trincauellij.

De opportuno purgandi tempore.

Cap. 10.

Postremo uero multam ad congruentem medicamentorū usum
tēpus uim habet. Vnde sicut multiplicis est sig nificationis, qua-
tenus ad præsens institutum pertinet, ita etiam multiplex est de eo
sermo instituēdus: nam cum de tempore usus alicuius medicamen-
ti loquimur, aut tempora morborum spectamus, id uero non est
unū sed in morbis principio enim uel incremento distat, illisq̃ue
consistentibus uel inclinantibus diuersum redditur, aut ad anni tem-
pora respicimus, uidelicet an hyeme, an æstate uel autumno,
uel uere cōgruens eius usus fiat aut particulatim ad horas, uel
partes diei, sicuti si quæramus an mane dandum sit medicamentū,
& homini ieiuno, uel magis uesperī, & post cœnam assumptā. Que-
madmodum enim diuersæ sunt eæ temporum acceptiones; ita
etiam respondendi rationes diuersas esse oportet, quia si de uere
purgatoriis, & fortioribus medicamenti sit instituenda inquisitio,
iam ab Hippo. & cæteris antiquioribus medicis diffinitum est pur-
gandi occasionem à ratione humorum esse petendam, in uniuersum
enim, si purgandum est, aut in initio morbi purgandum est,
aut post concoctam materiam, hoc est uel in fine uigoris seu sta-
tus, uel iam incipiente inclinatione: distinctionis autem, uel electio-
nis temporis opportunior occasio à motu, uel quiete humoris
est accipienda, nam si statim ab initio natura à multitudine, uel pra-
ua succorum qualitate concitata, eos exagitat, & uel ad uarias par-
tes importune moueat, uel ad expellendos nocuos humores in
membro aliquo principali hæc naturæ concitatio fieri uideatur,
quam primum fieri poterit, aut illa eadem die illa materia erit ua-
cuanda; quod si stabiles sint humores, neque præcipientes moueantur
uel si mouerētur quidem, sed ad unum certum locum moueren-
tur: Vbi, ne uel multitudinis, uel prauæ naturæ humorum, aut lo-
ci illius quo tendit nobilitatis ratione aliquod magnum malum ex-
citaretur: timendum non esset. morari tantis per, expediret donec
is humor à natuo calore esset & coctus, & paratus; & tum demum
obseruantes quid natura ageret, de purgatione esset decernendū,
quia si natura sponte sua ageret, & excrementitios coctosque hu-
mores quantum satis esset, excerneret, omne negotium naturæ es-
set relinquendum: Sin autem, uel ipsa non moueret. uel partius
quàm expediret; medicamenti & auxiliis nostris esset iuuanda, aut
excitandas

excitanda: præterea uero, & ex alio etiam capite potest hæc distinctio accipit: Videlicet à scopo, quæ sibi medicus in uacuando proposuit, nam cū aliquando purgantibus medicamentis ea tantū ratione utamur, ut copiā malorū humorū detrahamus, aliquando uero etiā ut alicuius materiæ in aliquē locū confluentis impetū reuellamus & auertamus: quæ quidem aliquod insigne malū illi loco sit allatura: quod in superiorū partiū, capitis nēpe, oculorū, & aliorū sensuum instrumētōrū, fauciumque affectibus fieri sæpe solet: in his enim purgatio per medicamenta reuellendi uim habet, ut Gal. 13. meth. docuit. Reuulsuri itaque non nisi in principio purgamus, reuulsio enim est remedium, quod eiusmodi morborū initiis propriū est, & accomodatū: (ut idē Gal. 4. & 5. meth. & in cōmētariis librorū epid. sæpe exposuit) alioquin uero expectandus est status, & concoctio, ut tamen & hoc sit cōsiderādum, quod diligēs hæc horū tēporū obseruatio præsertim adhibenda est in eorū medicamentorū usu: quæ certos, & determinatos humores attrahendi, & soluendi uim, & eā quidē ualidā habent: nā iis, quæ leniendo purgant ut cassia, manna, tamarindi, violæ, rosæ, pruna, lac, & eius serum, possumus cōmode, & tuto uti, si opportunitas indicet, & in initiis, & in aliis morborū tēporibus, nā eandē ferē rationē habent; quā & clysteres lenes, præterquā quod clysteres ad uentriculū, & superiora intestina non pertingunt, quod huiusmodi medicamenti non est denegatū: attamen nec ipsa ad penitiores uenas, & remotiora loca perueniunt; Sed tantū cōmunes uias purgant, uel si aliquas uenas attingunt, proximas, & primas attingunt, neque humoribus, qui uacuationi inepti sunt & concoctione egent: uim ullā afferunt, huius rei testis est Gal. una cū Hippo. 4. de rat. uict. in acut. mor. qui in febre ardenti, ubi amarum fuerit os; quod bilis in uentriculo contentæ est argumentum: ad eam expurgandam timens purgantia medicamenta, quæ calida, & acria sunt, propter febrē: lac asinæ coctum copiosum bibēdum dat, uel serum eius, qui si istiusmodi leues, & caloris omnisque acrimoniæ ex pertes medicinas nouissent; aut in usu habuissent, lactis mea quidem sententia in febre illa præuulissent: Quamuis autem cōsideratio hæc illis magis possit ac comodari, quæ posterius de illis medicamentis dicēda erunt, quæ uere soluētia, & purgantia dicuntur, rei tamē cōsequutione ducti ea hoc loco uoluimus exponere; cui & hoc addēdū existimamus, quod neque etiā medicamentis omnibus, quæ ad tractationē hæc pertinet,

Cap. 11.

Com. 7.

Victoris Trincauellij

Aph. 5.

& inter facilia, & benedicta (loquar, n. ut iuniores) collocata sunt, & ratione possumus inter initia morborum uti, præferim in febris à putredine humorum excitatis, quarum causa præcipua est obstructio, quia quæ uim insignem habent astringendi, in principio antequam attenuati, & incisi fuerint, & partim et uacuari humores, qui multitudine crassitie lætoreque sunt obstructionum causa: assumpta obstructiones, & sub inde febres augerent, eiusmodi autem sunt myrobalani, & rhabarbarum: Vnde rarissime, & ferè nunquam periti medici illis in initis febrium, & ante paratam materiam utuntur. Tempus deinde accipi potest, ut totius anni horas, & tēpestates respicit; uidelicet hyemem, uerem, æstatem, & autūnum, & quatenus ad hanc acceptionem pertinet absolute tempora usus medicamentorum maxime apta sunt, uerem, & autūnum, ut Gal. in cōmētariis in aphor. cōmētatio. 4. exposuit, explanās aph. illū, sub cane, & ante canem, præsertim uero id in fortium medicamentorum usu, quæ purgatoria proprie appellatur obseruandum est, ut à uehementibus caloribus, & frigidibus caueamus, tūc enim tutius uti possumus his facilioribus, & lenibus, attamen & in horum usu aliqua discretione opus est; nam quæ qualitibus moderata sunt, tam simplicia, quam cōposita in usum uenire facile tēstate quæ hyeme possunt, ut manna & cassia, quæ uero refrigerant hyeme magis cauenda sunt, ut tamariindi, myrobalani, uiolæ; & similia: Item quæ calcfaciūt, exiccantque, æstatem enō ita facile sunt admittenda, ut rhabarbarum, aloë, sene, epithimū, & id genus reliqua. Cū uero tēpus diuersas diei partes, respicit, & mane, uespere, & meridiē cōtinet, dupliciter potest cōsiderari, aut enim ad naturam differentiū diei partium refertur, aut ad aliquid, quod frequenter solet in illis cōtingere, matutino autē tēpore, si id quod frequentius contingere solet: spectemus, omnes penè concoctiones, uel saltē prima, & secūda sunt absolutæ, plerunque autē & excreta earum excrementa, in meridiē uel aliquanto antea cibus assumptus est; uespere autē nostris his tēporibus cenamus, noctu somno & spirituū uiriūque refectōri uacamus, sed & cōcoctioni tēpus id est maxime opportunū: in morbis uero, præsertim qui suas per periodos accessiones habent, inuadūt accessiones interdū matutinis horis, interdū meridianis, nōnunquam autē uespertinis, aut nocturnis: Quæ quidē oīa æque cibi atque medicamenti exhibēdi rationē possunt mutare: Vnde si de tēpore diurno, quod ad eius naturam pertinet, loquamur, tēpus, & hora ad medicinas accipiedas opportunior est matutina, tū propter rationes nuper expo-

sitās

fitas, tum vero quia tempus id in die magis temperatū est, & quod ex proportionē veri respōdet: sed si ea quę solēt in his horis cōtin gere cōsideremus, sæpe cōsideratione priori postposita alteri rei est incūbendū, & aliis horis egroto medicamentū exhibendū, & vt prius sermonē de ea indicatione habeamus, quā nobis symptomata .i. morbi accidētia ostendūt, semper illi, qui opportune hmōi exhibere medicamentū voluerit, tēpus accessions est declinandū, inter symptomata vero Gal. 1. aph. & accessiones collocat: ita aut accessions tempus esse declinandū censemus, vt nec eo tempore medicamentum exhibeatur: quod deinde accessions tempus ita consequatur, ne in initiis accessions medicamentū purgādo inoueat; Sed & id inouit Auicēna, vbi ait in die paroxysmi nō esse quicquā mouēdum, quod & Oribasius lib. 7. cōfirmat cuius inscriptio est. Quos, & quādo, & quibus medicamentis purgare oporteat. quod vniuersum tamen hinc inde ex verbis Gal. excerptum est, vbi ait p accessiones quoq; , quomodo sit vacuandum, docēt: nā dum accessio infestabit, à superioribus educes; vbi destiterit, quod intermissionem dicimus, ab inferioribus detrahes; q; si, aut quotidie fiāt accessiones, aut febres sint continētes, ita vt nequeat tandiu sine cibo esse ægrotus, nulla; sit intermissio; vel adeo brevis, vt medicamēto & cibo deinde exhibendo nō sufficiat, remissionis, vel inclinationis tēpus erit eligendū. Huic deinde cōsiderationi succedit & illa, an potius ante, vel post acceptū cibū, vel simul cum cibo medicamentū offerendū sit: nam his omnibus modis, si ea diligenter obseruare voluerimus, quę fieri à medicis quotidie solent: medicamenta purgātia dantur, potiones enim ieiunis, & ante cibum aut semper aut plerunq; solemus exhibere, post cibū uero, immo post cēnam sumptā, una uel altera hora in affectibus præsertim capitis cataporia deuoranda tradunt, aut omnes, aut plures hac nostra tēpe state medici, efficacius. n. ab eis posse caput expurgari putant, si medicamēti vapores cū illis, qui ex cibo euaporant simul mixti ad caput ferantur: simul autē cum cibo, vel in cibo interdum, idq; etiā in iocinoris effectibus, (ut ipse 13. meth. testatur) medicamentis purgantibus Gal. uti consueuerat. Epithimū nanq; vel nigrū veratrū ex pitissana coquebat, quā deinde sorbendā dabat; itē & polipodidū, vel enicū, quod cartamū Arabes appellāt; sed & parū scamoni ex pitissana datum dicit ipse 1. de faculta. alimen. parcissime purgat: At cū (vt cōsentaneū rōni esse videtur) à differētibus occasionibus accepta

Cap. 13.

Cap. 15.

accepta sit differens hæc exhibendi medicamenta ratio: (absurdum enim omnino uidetur esse, si quis se ijs medicamentis ex ratione, & arte uti existimauerit, qui illis promiscue & idistincte usus fuerit) non ab re erit huic etiam rei distinctiones aliquas adhibere: quibus iuuenes eruditi & moniti, occasiones, & opportunitates percipiât; quibus innixi quid quoquo tempore pro rei occasione cognoscât agendum sit, itaque nisi ab ijs uoluerimus recedere, quæ cum in antiquis, & probatis authoribus: tum etiam medicinam faciendo obseruauimus, nimirum priorem modum, ut tutiorem, atque ratio ni magis consentaneum amplectemur; nempe, ut uacuo uentriculo, & homini ieiuno purgantia medicamenta assumenda offeramus neque in hoc probando tempus esse conterendum putamus, cum res hæc ferè omnibus in cōfesso sit, nam quòd uel intermixta cibus, uel post cibum exhibeantur, id sit tantum particulatim, & certis dif finitisque ut paulo post dicemus occasionibus. Hoc tamen est animaduertendum, cuius etiam nos monuit Hippo. 2. de ratio. uict. in acu. mor. & ibidem etiã Gal. quòd ab accepto medicamento, aut sta tim cibus dandus est, aut si differendus est, tantisper est morandû; donec & purgatio, & motus medicamenti absolua tur: nam si dum purgatio fit, cibus sumatur, operatio purgantis medicamenti exolu itur. Quod si quæras quod nam horum magis præstet, uel quidẽ statim ab assumpto medicamento comedere, uel differre. donec me dicamentum suam absoluerit operationem, dicerem hanc quæstio nem commodè diffiniri non posse; nisi hæc duo prius consideraue rimus; nempe, & medicamenti uires, & causam propter quam post medicamentum cibum damus: nam ut à priori incipiamus, si leue fuerit medicamentum, qualia ea sunt, de quibus præsens sermo in stitutus est: cum id uires admodum ualidas non habeat, & tarde, ut diximus antea, moueat, possumus paulo post assumptum medica mentum cibum dare: nam leuia medicamenta à calore uentriculi fa cile superantur & facile eorum uis dissoluitur: immo sæpe etiam cõ coquuntur, ut & in alimentum antequam moliantur purgationem transeant: ut & Gal. testatus est tertio de fac. simpl. med. quod facilius in illis medicamentis sit, quæ omninò à ratione cibi non sunt aliena, ut sunt manna, & casia: unde cibo exhibito, non ita facile me dicamentum uiincitur, cum uenter uel rei illi magis familiari cibo concoquendo magis incumbat: præterea uero cum tarde & sol uant & moueant, iusto longior plerunque esset mora, si eousque morare-

Text. 13

Cap. 16.

moraremur, donec purgatio esset perfecta, unde post acceptum medicamentum quod statim comedant, præcipimus, ut anteaquam medicina ad actum deducta mouere aluum incipiat, iam propè confectus & concoctus sit cibus, quod si interdū ex ratione apparatus, quia promptior, & aptior & facilior ad deiciendum uenter sit, idē ante concoctionem mouere incipiat, cum in fundo, & sub aliis resideat, potest facile aperto pyloro sine magna cibi perturbatione descendere, At rursus quis forte iunior quæretur cum cassiam non dissolutam, & in potione, sed ut aiunt in bolo, deuorandā damus non præcipimus, ut Hipp. consulere uisus est, quod statim ægroti comedant, uerum horam interponi iubemus? dicam id non tantum ratione medicamenti fieri, sed magis illius qui medicamentum assumpsit: fieri enim fere æquit, quin dum medicamentum deuoratur aliquod fastidium, aut nausea concitetur; ut ergo interim motus & turbatio uentriculi sedetur, interuallum id interponitur: Sed & causa propter quam cibum post medicamentum damus confideranda nobis est, quia interdum non ideo præsertim cibum damus, ut alamus & vires reficiamus, qui tamen in alendo corpore primus & præcipuus scopus est, sed magis alterius alicuius commodi gratia, ratione uidelicet repertæ alicuius in eo cibo qualitatē, quando enim medicamentum ex eorum genere est, quæ uentriculum, si aut eius pars, uel impressa qualitas aliqua hærens ori eius in transitu sit relicta, plurimum possunt lædere & turbare: cibum aliquem offerimus, qui possit lenire, & obtundere medicamēti qualitatem atque relictas particulas de ore uentriculi detractas detergendo ad imum perducere unde non omnis cibus, sed piissima præsertim commendatur, quæ cum cibus sit uentriculo familiarior, gratior est, quam si quid offeratur, quod naturam medicamenti referret, Huc accedit quod non solum lenitate, acrem, & molestam illam medicamenti qualitatem demulcere & sedare humiditate potest, sed etiam deterfione si quid medicamenti in transitu gulæ uel ori uentriculi hæret: detrahit. Quod si medicamentum, aut huiusmodi esset, aut ita paratum, ut id incommode non timeremus, differendus cibus esset in usu quidē fortium medicamentorum quousque purgatio facta fuisset, in illis autem quæ aluum lenitate cient, per aliquod breue spaciū, id quod etiam Gal. 2. de alimentorum facultate docuit, cibus sumendus est: Hac nimirum ratione, ut si ante cibum medicamenta exhibita sint, humiditate, & lentore aluum afficiant,

afficiant, & leniant, atque si non statim post exhibitum medicamentum sumptus sit cibus, eam magis lubricam faciant, quàm facerēt, si statim post medicamentum cibus ingereretur, prius enim à calore ventriculi dissoluntur, & quasi (ut ita dicam) liquantur; unde & partes lenes reddunt, per quas transcunt: Nam si cum cibus essent commixta, ab illis horum ius confunderetur, & quasi obtunderetur. De his autem medicamentis, quæ vel simul cum cibo danda uel ex ptisana, aut ex alio cibo coquenda censuit Gal. ita statuendum esse existimo, quòd hæc sanè, aut leuia sunt, & ea quæ facili, & leuimotione uenterculum turbare, aut concoctionem impedire nequeant, quia præsertim, si quid habent acrimonie id à mulcebris eorum ciborum, quibus immiscentur: natura lenitur, & remittitur, & cibus adeo medicamentum superat, ut id, quod ex utroque commistum est: dici magis cibus debeat, qui medicinalis alicuius facultatis sit particeps, quàm ad ea, quæ propriè medicamenta dicuntur: referri. Quòd si ualentiora etiam medicamenta cibus incoquere Galenus solitus est, adeo modicam tamen eorum quantitatem coquendam immiscebat, ut tum ex eo quòd coquerentur, tum etiam multa cibi copia moderatiora & molliora facta aluum non nisi leuiter, & modice possent ciere, ita ut nulla uentriculi turbatio, aut noxa posset accidere: quæ alicuius momenti esset, quod inde patet: Nam & in iocinoris inflammatione curanda eorum meminit, cū tñ ualentiora medicamenta huiusmodi affectioni maxime aduersentur, aloem enim, & hyeram in id genus inflammationibus. 8. de comp. med. secundum loca damnavit, idque præsertim, si nondum concocta inflammatio fuerit; quod autem ad id attinet, quod proxime diximus, prætermittendū illud non est, huiusmodi nempe medicamenta cibus incocta iam propriè & absolute nec medicamenta esse dicenda, nec cibus, sed magis cibus, qui particeps medicamentosæ qualitatis sit factus, eiusmodi autem inter cibos multa reperiri liquido constat, quæ, & cibi quidem sunt, suapte tamen natura, & medicamenti officio funguntur. At nunquam neque Gal. neq; Hippo. neque peritus aliquis medicus aliquod medicamentū cibo immixtum, quod huiusmodi esset ea copia exhiberet, ut liberaliorem & copiosiore possent purgationem moliri: Tandem vero, & de ea consuetudine paucula quædam dicamus, quam iuniores nostri introducere, nempe ut medicamenta purgantia post cibum, præsertim uero post cenam deuoranda præbeant; quod in primis in catapoti

Cap. 3.

potiorum vel pillularum usu seruare soliti sunt; id autem non in omnibus, sed in capitis tantū affectibus curandis obseruant, ea quidem ratione ad id adducti, q̃ hoc modo & facilius, & valētius posse caput inaniri credunt, cum medicamenti vapores, vel saltē eius vis cum uaporibus, dum cibus in ventriculo cōfiscitur, ad caput delata, efficacius possit excrementa in capite congesta deerrahere: Sed neque horum sententia mihi probatur, neque ratio, quam ad eam probandam afferunt, ea esse videtur; ut id eo cogar magis corū sententiā, quā illā, quæ huic aduersatur: amplecti: vnde infirmo admodū fundamento videntur inniti: ne autem hoc temere dixisse videamur, rationes quæ nos ad id mouerint: exponamus: & à leuio ri incipiamus. Omnium ferè pillularū materia est aloë: (rarò enim pillulas inuenies, quas antiquiores descripserint, quæ aloem nō accipiant) Attamen Aetius lib. 3. vbi de aloë loquitur, & Paulus lib. 7. aiunt, q̃ & si commodè uespere à cœna dari possit, melius tamē est, ut mane accipiat, & ante cibum. Paulus uerò huius rei rationem addit, quam prætermisit Aetius, quia cibum ipsum, si post sumatur, distrahit, sed hoc prætermittamus: Nam hoc cuiuspiam fortasse satis anceps videbitur: nam Auicenna 2. can. contrarium videtur sensisse: cum dixit, neque enim cibum corrumpit, quamuis addiderit; si ex eo fiant pillulæ mixtæ cum his, quæ rectificant ipsam: (Ac primam quidem partē ex lib. 1. Oribasii synopsis ad Eustathium scriptæ accepit, sumi, ait, etiam commodè potest quotidie à cœna, pertransit enim, neque cibos corrumpit) in uniuersa igitur hac oratione, cum dicit Auicenna q̃ cibum nō corrumpit, si misceatur cū his, quæ illā rectificant; duo videtur insinuare, primum, q̃ sola sine aliorū mixtura cibum corrumpat; deinde hoc esse tanquā aloës priuilegium; vt ne à cibo etiam sumpta cibū corrumpat, quasi purgantia cætera medicamenta possint cibū corrumpere, quod alioquin neq; præter rationē esse uidetur; quia venenosa ferè natura oīa medicamenta cōstant, & uētriculo imprimis aduersantur (si de vere soluētib. & purgātib. medicamētis loquamur) & à cibi natura ratione q; oīno sunt aliena) unde si vitiosus aliquis humor, præsertim biliosus in uētriculo sit congestus, uel post cibū quidē in ipsum cōfluat, sepe, ut oēs medici attestāt, cibū corrūpit, acria etiā medicamēta nō minus virosam, & cibis aduersariā habēt naturā; quare nō minus poterunt cibū corrumpere, si cibo immisceātur, cū purgātia præsertim medicamenta eam cū humoribus, quos

Cap. 4.

Capit. de
aloe.

Cap. 18.

r 763

Cap. 14.

quos purgando suapte natura trahunt habeant familiaritatem, ut quemadmodum 3. de simpli. medi. facult. testatur Gal. si à calore ventriculi superata coquantur, in eum humorem vertuntur, quem attrahendi vim alioquin habent. Addamus autem, & his præterea quod qui à cibo esse medicamenta accipienda censent, secus ac Gal. & Hippo. medicinæ nostræ parentes, & optima quidem ratione, præceperint, agunt: Nam cum medicamentum aliquod purgatorium, quod vere medicamentum, non autem veluti cibus medicinalis dici possit: accipiendum est: imprimis illi studet, ne minima quidē eius vis vel particula in descēsu intercepta ori, & superioribus ventriculi partibus hæreat: quæ eas turbare, & irritare possit, sed uniuersum ad imum ventriculū descendat: & ideo, sicut paulo superius dicebamus, sorbendam esse hordeaceā prissanā consulere, quæ, si quid superioribus partibus hæserit, deorsum ad imū detrahatur. Hi uero recentiores in hæc incommoda incidunt, quæ antiquiores illi maximo studio declinabant, post cibum enim acceptū medicamentum ab eo suspenditur, & impeditur quod minus possit ad imum ventriculū delabi, imo cogit, ut proxime ad os ventriculi moretur, quod facili quidem constabit, si: quid nam ventriculus agat ab accepto cibo, considerauerimus, qui quidem, æque ex superiori, atque ex inferiori parte se se colligit, ut vndique cibum concoquendum complexetur, & ei coquendo hæreat: his uerò insuper & id accedit, quod medicamenta post cibum sumpta, si celeriter, & breui tempore purgare inceperint, quod tum ex medicamenti natura potest contingere, si nempe eis, quæ celerem habent operationem, constat: tum uero ex corporis, atque humorum uacuandorum natura, & præparatione; duo hæc incommoda facile sequi possunt, alterum quidem, quod cum medicamentum vitiosos humores ad se attrahat, quemadmodum & magnes ferrum; attracti humores, & cibo adhuc in ventriculo moranti commixti illum facili corrumpent, alterum autem, quod superiorem ventriculi partem commouens, & concitans medicamentum facile in causa esse poterit, ut uomitu simul cū cibo reiciatur: unde maior deinde conturbatio, quam purgatio subsequutura sit. Postremo autē & ex loco à simili, & ex uerbis Gal. 4. de sani. tuen. depromtam rationem addamus. ibi enim ait nullum medicamentum; quod ad distributionem alimenti in uniuersum corpus uim insignem habeat post cibum esse dandum; quia tunc cum coqui quā distribui

Cap. 7.

Tex. 44.

bui magis expedit. Quamobrem nos etiam eadem ratione concludemus, cum cibus ingestus est, utilius fore, ut ille coquatur, quam ut uenter purgetur: præsertim cum purgatio concoctioni maxime aduersetur; ut idem Gal. 4. de ratione uict. in acut. mor. attulmat. Sed & ratio, qua hi innituntur non modo modicam, aut nullam vim habet ad id probandum, quod ipsi asserunt, sed magis eorum uidetur sententiam improbare, & explodere; primum enim non ideo maiorem vim humores purgandi, vel attrahendi medicamentum habebit, quod cibi uaporibus immixti napore medicamenti sint, aut eius facultas illis sit impressa: quia, ut etiam probat Galenus, necesse non est, ut medicamentum, aut eius pars aliqua, uel aliquid aliud medicamentosa ea qualitate affectum humorem petat ut attrahatur, quia propria sua natura, uel tota substantia à medicamento fit attractio, sicuti & ferrum à magnete trahitur: unde sua pte natura ad eum locum fit attractio, in quo est res, quæ uim attrahendi habet, siue quidem eam insitam habeat, sine aliunde acquisierit, nam ad eum locum ferrum attrahitur in quo est magnes sed & ferrum, si magnete fricetur, aliud ferrum quod ipsi proximum sit, ad se attrahit. pari itaque ratione cum ex antiquiorum medicorum sententia attractio quæ à medicamento fit magnetis attractioni respondeat: medicamenti, uel ciborum uapores, qui iam affecti à medicamento sunt: caput petentes, si humores attrahent, ad caput magis, quam ad inferiorem uentrem attrahent, & ita non modo faciliorem non, facient purgationem, sed eam potius impedient: Verum enim uero & experientia docet, quod ubicunque fuerit id, quod uim attrahendi habet, eò attrahitur purgandus humor: Apophlegmatismi enim, qui à iunioribus masticatoria dicuntur, item & gargarismata, ad os trahunt, & per os caput purgant, erysina etiam, uel caput purgia dicta per nares. His autem & hoc addamus, ut huic considerationi finem deinde imponamus, quod humores, qui tum in partibus remotioribus continentur, ut in articulis, & in totius corporis habitu, sæpe liberaliter, & facile per accommodata medicamenta purgantur, neque tamen expectant, ut medicamenti, aut cibi uapores qualitate medicamenti affecti eò ferantur: sed hæc satis sint, si tamen & hoc addiderimus mea quidem sententia consideratione maxime dignum, quod si hanc consuetudinem sequi uoluerimus, quæ iam nostris iis temporibus plurimum inualuit; nempe, ut post cibum pillulas demus, cibus & cæna modo dica

dica esse debet, & ea sunt comedenda; quæ cito, & facile coquantur, facileque inferius descendant, ut deinde ante medicamenti motionem sint confecta, faciliusque ad medicamenti morum descensum habeant, ne illi resistendo, & difficilior, & magis turbulenta subsequatur purgatio: Multa certe hoc capite tractauimus quæ forsitan commodius, & aptius explicarentur inferius, ubi de acrioribus, & violentioribus medicamentis erit agendum: nam leniora hæc, de quibus in præsentia institutus est sermo, non tantam cautionem & diligentiam exigunt; sed ne istiusmodi doctrinam quæ coniuncta quodammodo esse videtur, separaremus, omnia hoc capite exposita una, & eadem oratione complecti uoluimus: Nunc vero quæ magis in uniuersum exposita sunt: particulatim ipsi simplicibus medicamentis, quæ leuia, vel lenia, uel benedicta appellauimus, aptemus: ac particulatim de singulis agamus: primum uidelicet, quibusnam ea misceri expediat; deinde quibus humoribus purgandis idonea sint: tertio qui eorum modus, aut mensura congrua sit: postremo quæ eorundem forma apta futura sit, dicemus: nam de tempore satis abunde in his actum esse putamus.

*De ratione mixturæ horum faciliū medicamentorum, & usus eorum
magis particulatim. Cap. 11.*

VT facilioribus istis medicamentis usuri, à quibus sæpe, si alia eis misceamus, faciliore, & feliciore operatione speramus, aliquam rationem, & methodum habeamus, quæ ea eligamus; quæ his aptius, & utilius misceri possunt; à quibusdam, quæ in uniuersum adhuc consideranda sunt, incipiemus, postea ad singula accedentes, hæc generaliter proposita, sigillatim in quocunque medicamentum, tanquam propriis exemplis explanabimus: primum ergo hoc dignum animaduersione mihi videtur, quod paucis quidem uerbis in 11. de simpl. medi. facult. cap. de ouo expositum est; re autem ipsa & effectu in libro secundo. de compos. medicam. secundum genera, & secundum locos amplissime fuit explanatum, id uero est, quod medicamenta uim validam non habentia duplici de causa cum aliis medicamentis mixta componuntur; interdum quia ipsa ideo illud postulant, quia ex illa mixtura & utiliora, & meliora fiunt, interdum uero quia ea, quæ cum illis miscentur, & componuntur, inde maximam utilitatem & commodum purgandi

Cap. 1.
Capite de
alopecia.

dis ægrotis adferunt: id autem præfertim (quod maximum quidē est) mitiora hæc medicamenta illis, quæ uim maiorem habent, impertuntur, quod, ut ibi docet Gal. eorum quasi materia sunt, illa enim cum his leuioribus mixta faciliorem, tutiorem, & minus no-
 cuam purgationem moliuntur, ex eo enim quod illis hæc mixta sunt, illorum acrimonia, & quasi furor mitescit, atque gratia, & familiaritas cum uentriculo, & reliquis uisceribus conciliatur; ne-
 que tamen principali eorum actioni, qua purgant: aduersantur, immo sæpe iuuant; quia uel leniunt, & leniendo facilior succedit purgatio: unde & qui de hac re scripsere, sicuti Io. Mes. plurimum laudant, ut, quæ uim leniendi habent, medicamenta, cum his misceantur, quæ soluant; ait enim (uerbis ipsius utar) quod eorum operationem scelerant: quapropter cum sermonem de materia habuisset, ait, quod beatificat operationes omnium aliorum exoluentium medicamentorum; atque hæc præstant benigna pharmaca; quæ uerò detergendi, & attenuandi uim habent, sicuti amara habent, si cum purgantibus medicamentis misceantur, humores uacuandos promptiores, & faciliores ad uacuationem reddunt: quæ uerò aliquam, & moderatam habent astringionem, qua uiscerum substantiam cogunt, & roborant; quæ à uiolenta fortiorum medietorum actione laxari, & dissolui solet, plurimum prodesse possunt, quo nomine aloem cum omnibus aliis purgantibus medicamentis mixtā non parum corporibus purgandis dixerunt conducere omnes aut hores, qui de ea re scripsere, præsertim Oribasius, Aetius, Paulus, imò & Dioscorides, nec non & Arabes omnes: sed & Auer. de rhabbarbo ait, quod ut ipsum nulla eget correctione: ita aliis medicinis additū emendat, quicquid in illis est malignitatis, & hoc, quod hætenus diximus, non modo ad simplicia medicamenta sed ad cōposita quoque est referendū; ut ea sunt, quæ nunc à iunioribus electuaria dicuntur, & pillulæ, & id genus alia. Nec modò in purgantibus medicamentis ita res hæc se habet; sed & in omnibus aliis, ut sunt ea, ex quibus uel emplastra cōficiuntur, uel cerata, uel linimenta, uel fomenta, uel perfusiones, id quod, si ea, quæ à Gal. de huiusmodi medicamentorum ratione literis tradita sunt, diligenter legerimus, facile percipiemus: sed de hac miscellæ, & cōpositionis ratione posterius agemus; magis. n. ad tractationem illā, quam de illis medicamentis instituemus; quæ uim maiorem habet, uidetur pertinere: particulatim aut, quo pacto leuioribus iis medicamentis

Cap. 1.

uti possimus, & ea cum aliis componere, & non quidem aliorum ratione, sed ipsorum; sermonem in presenti habeamus, & illis ea accommodemus, quæ in uniuersum hætenus exposita sunt, hoc primum explanato, quod ipsis interdum utimur, non ut redundantæ humorum copiam imminuamus, & corpus purgemus, sed tantum, ut aluum lubricum seruemus, & ex cõmunibus excretionum instrumentis ea deducamus, quæ, quando non sponte aluus deiecit, clysteres solent detrahare; quod in iis præsertim fieri solet, qui aut nolunt, aut non possunt clysteres admittere, assiduos enim clysteres molestos esse 13. meth. Gal. testatus est, quandoquæ uero aliquid amplius ex medicamento requirimus, uidelicet, ut liberalius educantur humores, qui tum in uentriculo, & in inferiori aluo quasi stagnant, tum uero in uenis, quæ à iecore, cauæque præsertim eius parte ortæ in eo pertingunt: uerûtamen, & pro diuersa horum scoporum ratione; diuersa etiam usus medicamentorum ratio nascitur: quod particulatim exponit Gal. 8. de composi. medic. secundo loco. aloem enim solum intestina, & uentriculum inaniri dicit, si modo dice tamen summat: nam si liberalius quis ea usus fuerit: operatio illius eiusdem sententia ad iecur usque attinget: quamobrem Aetius, Paulus, & Oribasius, quos & Arabes sequuntur, aiunt, ad hoc, ut clysteres officio fungatur, satis esse, si triobolum detur; moderatâ uerò eius assumptionem fore, si duæ accipiantur dragmæ, liberalis purgatio sequetur, addit Dioscorides, si tres dragmæ dentur, plurimis tamen, uel una tantum ex ea accepta pillula, quæ scrupulum pendat, satis est ad aluum commode excitandam. Quo duplex iis leuioribus medicamentis utendi ratio ex uariis eorum usu nascatur, hinc possimus colligere; quæ namque de aloë diximus, ea idem & aliis, quibus hoc modo uti solemus, possunt accommodari, cassia enim hoc modo usuri: satis erit, si illius liquoris, qui ex ipsa extrahitur, semunciam, uel minus etiam acceperimus tunc, cû prædium sumus sumpturi: at ideo minus semuncia satis esse dixi, quia sæpe si tantum siliquæ eius, uel canz, quantum palmum longitudine æquet, sumperimus, eumque nigrum liquorem comederimus, & quasi; ut ita dicam, delinxerimus: rei necessitati satisfaciemus, quod tum, si pendetur, ad trium dragmarum pondus non ascenderet, idem & de aliis dicendum est; ut exempli gratia de manna: attamen aliquibus & his longè leuiora satisfaciunt, ut si ante cibum lactis serum cum zucarho sumperint, antiqui uero (ut Gal.

restatus

estatus est, præsertim in libr. Aphorismo. commentatio. 3. & ali-
 bi sæpe) & cum sale utebantur, ut sæpe, & pruna exiccata in prima
 mensa coniecta, ita sola, & cruda profuerint; quatenus ad hunc sco-
 pum pertinet; & magis faciunt, quæ communia sunt, & dulciora,
 quam quæ damascena dicuntur, quæ quæ acerbioris, & austeri saporis
 non sunt expertia, ut ea sunt, quæ vulgares myrobalanos appellant,
 & ideo sæpius acerbioris, & austeri illius saporis causâ ex modico
 iure macro, uel aqua, addito copioso zucchero, decoctis illis uti-
 mur: ut verò minor horum medicamentorum, quando ad hunc
 usum accipiuntur, copia est assumenda, ita & minori cura egent,
 minusque studendum est, ut cum aliis misceantur: nam ex ea mo-
 dica quantitate nullum timemus incommodum, cuius quidē eui-
 tandi gratia talia sint illis addenda. His & illud addas, quod licet plura
 sint, quæ quantum ad ipsorum facultatem spectat, hoc nobis pos-
 sunt præstare: non ita tamen promiscuè, & sine ulla distinctione
 illis uti debemus; quandoque enim unum erit commodius, & aptius,
 nonnunquam aliud: nam ea quæ insignem habent astringentem,
 huic muneri non perinde sunt idonea, ut myrobalani ab Arabibus
 appellatur, atque rhabarbarum, maxime uerò, si totum, uel (ut aiunt)
 sua in substantia exhibeatur, quia eius dilutum, uel, ut nunc lo-
 quimur, infusio minus astringit, nam & si, cum accipiuntur, aluum
 deiciant, postea tamen eam magis astrictam, & ad deiectiones diffi-
 ciliorem reddunt, aloë autem, & si aliquam habeat astringentem, ma-
 iorem tamen deterfionem, & attenuationem habet, cum amaritu-
 do alia superet omnia, & inde uias magis expeditas relinquens ad
 faciliorem deiectionem conducit; lenientia uerò medicamenta
 omnia huic rei, de qua nunc agimus, idonea sunt: præterea uero in
 horum electione ad morbum, si quo laboret æger, respiciendum
 est, & ad naturam corporis, ætatem, tempus, consuetudinemque: ec-
 ce enim, si febris quidem adsit, quæ putrida sit, & longe etiam ma-
 gis hæctica, ab his, quæ insigniter calefaciunt, & exiccant, esset ab-
 stinendum; ut etiam frequentissimè consuluere Hippo. & Gal.
 unde censuere aloë lotam posse quidem admitti in febre, cum ea
 mitis, & non vehemens sit, cum tamen eam, quæ illota est, in hac
 etiam esse declinandam censuerint; quamuis enim aliqui febrici-
 tantes eam pertulisse videantur sine noxa; non desuere tamen, qui
 plurimum inde læsi sunt: at si aliquando nobis è re esse uisum fue-
 rit, ut illis utamur, corrigenda illa erunt, uel decoctis, uel aliis re-

Cap. 2.

bus additis; quæ nocuas eas qualitates temperent, sed si corpus, & viscera sint obstructionibus obnoxia, ab illis erit cauendum, quæ adstringendi uim manifestam habent; præsertim uerò in initio, antequam præparatio sit facta, & per attenuantia, incidentia, & detergentia humores fuerint concocti: unde inter initia, non modo à myrobalanis abstinere plerique medici, sed & à rhabarbaro: corporis etiam natura, & habitus respiciendus est: quia qui sicco sunt corporis habitu, præsertim uero sicco uentriculo, uel etiam calido, à frequēti usu eorum, quæ exiccant, uel calefaciunt, cauere debent, obseruauit enim Gal. ut ipse 8. de compositione medicamentorum secundum loca tradidit, aliquos ex assiduo usu aloes ad tabem fuisse perductos: ita eis, qui frigidiores habent uentriculum, ab illis abstinendum est, quæ refrigerant, ut sunt tamarindi, uiolæ, pruna, serum lactis, & huiusmodi, uel si eis uti uoluerint, illa saltem temperent, illis additis, quæ possint eorum frigus reprimere: humidum autem uentriculum, uel lenem nimis habentibus non admodum humida, & lenientia conducunt, sed magis sicciora: unde aloem, & hieram 8. de compositione medicamentorum secundum loca maxime conferre illis, qui sunt humidiori uentriculo, Gal. censuit, contra uero siccioribus temperaturis, præsertim cum citra materiam ea siccitas est, plurimum obesse ibidem tradit, & hæc eadem possunt ad anni tempora referri, & ad ætatem, similem enim hæc indicandi rationem habent cum corporis natura, uel temperatura, ut sæpius declarauit Gal. quantum autem ad hoc consuetudo faciat, nemo est, qui nesciat, quæ enim nobis familiaria sunt, ea minus nostram naturam, quàm illa, quibus uti non solemus, turbant.

Methodus miscendi leniter purgantia medicamenta, tum ipsorum: tum plenioris uacuationis, aut reuulsionis causa.

Cap. 12.

Sicut his medicamentis maiori copia utimur, cū liberaliter purgare uolumus: ita et maior tunc cura adhibenda est: nā plerūq; si aliquid, quod noxiū esse possit, eis insit: magis id nocere poterit cū copiosior medicina erit assumēda: hac igitur præsertim rōne cū

his facilioribus medicamentis utimur, aliis additis ea componimus, sed quæ mihi in eis miscendis, & componendis animaduertenda esse videmur: hæc sunt, nimirum quod præcipuè in eis, quæ cum his miscenda sunt, eligendis, ad eum scopum spectemus, qui nobis imprimis aliquid esse miscendum ostendit: nam alia admiscemus ut medicamentum adiuuemus, quod uel citius, & ualentius purget, uel unum magis, quam alterum humorem educat, quem alioquin non uacuaret, uel eius uis aliquam particulam pertingat, quam solum aut non attingeret, aut ægre saltem, & languidè, uel postremo, ut occuramus, quod minus aliqua in re lædat uentriculum, uel aliud quodpiam uiscus: unde pro diuersis his scopis uaria etiam eligemus, quæ sint his commiscenda. Sed ut incipiamus à cassia (ita enim nunc appellant) & ponamus nos operæpretium esse facturos, si ea usi fuerimus, primum illud erit perpendendum, quænam apta, & congrua futura sit (ut nunc dicere soleuius) eius dosis, hoc uerò quo pacto sit æstinandum, satis superque superius fuit expositum: postea considerandum, an tantum sit purgatura; quantum optaremus: nam si illa sola non uideatur esse satisfactura: tunc ulterius progrediētes examinabimus, unde futurum sit, ne illa, quæ tum opus sit: purgare queat: id autem accidit, aut quia enacuandus humor, & crassior, & magis lentus est, aut quia locus ille à uentriculo remotior est, quam ut eius uis eò possit peruenire. Ecce enim in pectoris affectibus ea utimur, pectori enim dulcedine, & lenitate illa sua, satis commoda, & utilis est: commodus item in renum affectibus est eius usus. Quamobrem si difficulter possit eò, quod cupimus, peruenire, alterius medicamenti immixtione, & adiumento necesse est, si ergo est immixtione adiuuanda propter humoris inepti crassitiæ, & lentorè; & affectus, quo tentatur egrotus, ad renes pertineat: accommodatissimū medicamentū hyscopus erit: attenuat enim, dissecat, flatus discutit, & detergit, unde in proterbio ferè est, quod syrupus ex hyscopo bonus absterfor est; qui quidem non tantum in renū, sed etiā pectoris affectibus, & pulmonum maxime conducit, & cum ipse etiam aliquid ad purgandam pituitam faciat, hac quoque ratione proderit: sed si non tanta caliditate, uel attenuatione esset opus, radix dulcis, uel (ut nostri aiunt) liquiritia utilis esset: atque si cuperemus eius uim ad renes usque, & uias urinæ peruenire, eas uidelicet ab eo crasso, uiscidoque excremento; quod acere non esset, purgaturi, quæ uerè diuretica

dicuntur, misceremus, nempe ea, quæ & calida sunt, & tenuiores habent partes, & subinde attenuant, utpotè quæ ad renes, & urinarias vias secum vium cassiæ facilius ducant, sicuti sunt, semina anisi, uel fœniculi, quæ flatum, qui à cassia sæpe solet excitari, discutendi vim etiam habent; sin autem nitrosus, & acris esset is humor; tunc liquiritia, uel recens capillus veneris, uel aliquid aliud istiusmodi commiscendum esset, sed si nullum horum particulatim quæreremus, uerùm aliquid tantum nobis esset exquirendum, quo magis, & facilius sumpta cassia purgaret, neq; tamen crassitiem crederemus obstare, aut multum lentorem, tunc, sicuti Arabes docent, serũ lactis, præsertim uerò in calidis, & acutis morbis, atq; calidioribus temporibus illi additum eius operationem mirum in modum iuuaret, quòd si maiori auxilio cassia uideretur ægere, quia aut longe liberaliorem uacuationem, aut ex remotioribus partibus cuperemus, uel etiam si expedire putaremus, ut ea alium præterea humorem educeret, quẽ educere sola nequiret, aliud fortius medicamentum esset illi addendum, illudq; minus, uel magis forte, ut & res ipsa, & scopi nobis propositi ratio, & humoris extrahendi natura uideretur exigere, nã si pituita esset detrahenda, agaricum adderemus, si melancholicus humor, ubi exustus esset, epithimum, uel fenam; si bilis, aliquid scamonii, uel alterius medicamenti, quod eiusdem esset facultatis. Interdum uero non simplicia addimus medicamenta, sed composita, seruata tamẽ semper prioris scopi ratione: sæpe. n. aliquid illius medicamenti addimus, quod diaphnicon, hoc est ex palmulis, & græci, & Arabes appellant, cum crassos humores purgare uolumus, aut id, quod confectionem Hamech appellauit Mesue, quando exustos, & melancholicos: aut ea quæ à rosarum succo nomẽ habuere, si bilis sit educenda. Sunt & præterea alia multa, quæ præterea recenseri possent, sed ea in præsentia omittenda putamus, nã & horum exempli tantum gratia meminimus: hoc tamen nequaquam prætereundum putamus, quòd cum cassiæ aliquid addendũ est (quod autem de cassia diximus, de aliis etiam id genus medicamentis intelligendum censemus) nempe cum primum, & præcipuum opus ex cassia, uel ex alio leui medicamento quærimus, cuius quidem natura fuit huic, quem nobis primum proposuimus, scopo maxime apta, & accommodata; hoc nobis imprimis seruandum est: ne alterius illius medicamenti, quod addendum est,

cām quantitatem adiciamus, quæ cassiam ipsam possit superare, tunc enim prima, & præcipua operatio addito medicamento attineret, non cassiæ, vel id genus aliis, unde cassia magis materiæ rationem seruariet, quàm eius quod præcipuum esset, ut superius diximus. Ea igitur quantitas est addenda, quæ cassiam sollicitare, & adiuuare possit; unde nunquam id addemus, quod iustæ, & integræ (ut nunc dicunt) dosi modum, & rationem possit habere, quare agarici, uel diaphæniconis, uel alterius dragmam ad summum unciam cassiæ addemus; ne videamur autem obliuioni tradidisse postremam illam causam, qua aliquid leuioribus medicamentis addimus, nonnulla etiam de ea dicemus; ea vero erat, quòd aliquando medicamenta componimus, ut alicui noxæ occurramus; quam posset medicamentum afferre; & quia hactenus de cassia habitus est sermo, ideo de ea persequemur. Hoc tantum itaque cassia habet incommodi, quòd tormina quandoquæ mouet: in his præcipuè qui lenia & humidiora intestina, &, ut Mesue dixit, qui viscera debilia habent, istiusmodi autem suspitio tollitur, si aliqua addantur, quæ uiscera modèstia aliqua astringitione roborent: unde inter simplicia, mastice, myrobalanorum, rhabbarbari, & spicæ Idem Mesue meminit; nos possumus & aloë, & citri semen addere. Inter composita uero hyera ex aloë optimum, & commodissimum est medicamentum; interdum uerò, & eo medicamento, quod diacatholicon Mesue appellat; utor; sed horum aliqua possunt duobus scopis satisfacere, nam & huic postremo, uidelicet, ut læsionem emendemus, quam ob tormina, & dolores timemus, maxime satisfaciunt; & præterea in purgando non parum conducunt: huiusmodi uero sunt, rhabbarbarum, myrobalani, aloë: mastix uero, & spica hanc duntaxat utilitatem præstant, quòd adstringendo, & roborando, & flatu discutiendo, ne uiscera lædantur, efficiunt: suspensionemque tollunt. Quantum uerò ad eorum delectum attinet, quando nobis uidetur cassiam solam posse purgationi satisfacere, utemur mastiche, uel spica; Sed si operæpretium esse putauerimus, ut præter id quoque, ea uis, quæ soluit, iuuetur, aut rhabbarbaro, aut myrobalanis utemur; myrobalanis quidem, ubi maiori astringitione, & refrigeratione, & præterea aliqua alterius humoris detractione sit opus, chebulis, si pituita: citrinis, si bilis; indis, si melancholicus humor sit educendus, rhabbarbaro, ubi magis

calefacere expediat, & præter astringentem etiã obstructions sine
aperiendæ; aloë etiam idem præstabit, siue lota, siue illota ea usi fue-
rimus, vt tamen & id cognoscamus, q̃ lota minus purgat, minusq;
calefacit, illota & calefacit magis, & magis purgat. De copia autem
exhibenda satis superq; superius diximus. Ex his quoq; facile quisq;
que poterit percipere, quomodo se medicus in usu manna gerat,
cum similem ferè duo hæc medicamenta naturam, & vires habeat;
aliquanto. n. imbecilior est manna; vnde & eius copia, uel (ut aiunt)
dosis maior esse debet, accedit. n. ad tertiam interdum unciam: ne-
que de tamarindis item longiorem sermonem nos habebimus; tã-
tum enim dicemus, q̃ sunt medicamentũ acutis febribus, tempori-
bus, & tẽperaturis calidis maximè commodum; nã & bilem tenuẽ,
calidamq; facillimè, & sine vlla agitatione, & turbatione educit; &
extinguit: præterea ardorem, & sitim reprimi, quæ earũ febrium
mollius, & morosus comes esse solet; vnde illis raro hyeme uti-
mur, & in his, qui frigidiorẽ habet ventriculum ab, eo abstinemus;
plurimum. n. frigidiores vetriculos lædit; & ideo è re esse uidetur,
vt huiusmodi incõmodo aliqua ratione occurramus, sicuti si ea mi-
scuerimus, quæ ventriculum roborant, & aliquantisper calefaciunt,
ut est maltix, spica, macer, absinthium, & id genus alia: sed & do-
cuit Mesab iis tamarindis hoc nocumentum tolli, si cum apio, feni-
culo, endiuia, & cicorio infundantur, uel coquantur: quia verò, &
tarde, & languide solunt, serum lactis, præsertim capræ, quod ma-
gnam habet cum eis familiaritatem, eos facillimè iuuare ad purgã-
dum poterit, sæpe autem eos cũ cassia, vel manna, vel rhabarbaro
scilicet miscere consueuimus; electio uerò horum potest facile
percipi ex iis, quæ paulò ante de cassia diximus; de sero autem la-
ctis satis abundè à Mesue, & reliquis tam Arabibus, quam Græcis
scriptum est, & aliqua etiã dicta superius sunt; vnde in his exponẽ-
dis tempus non teremus: solis etiam prunis, rosas, aut uiolis raro
ad purgandum utimur; atq; id idèd, quia vim leuissimam purgan-
di habent, si solis illis utamur: nam componimus syupos ex ro-
sis, & violis, quibus nostro hoc æuo omnes, ferè medici in Italia, &
aliis regionibus, quæ cum Italia consuetudinẽ habent: utuntur, sed
postea, cum de compositis agemus, de illis sumus sermonem habi-
turi. De aloë ferè quæcunq; ad nostrum institutũ facere uideban-
tur, iam exposita superius sunt: præterquàm quòd quamuis Me-
sue ab ea in hyeme idèd cauendum esse dixerit, quia orificia uena-
rum

rum aperiatur, non minus tamen ab ea cauendū est ætate, præsertim æstuosa, & sicca, cum ipsa sit satis calida, & magis etiam sicca, cū præsertim in calida, & sicca temperatura tutus non admodum sit eius frequens usus; quanquam si laetur, sicuti lauari solet, endiuiz, cicoræ, uel rosarum succo, aut aqua, minus obesse possit, non parum enim de calefaciendi facultate detrahitur, immo de ea, qua exiccatur, non ob id tantū quod herbæ hæ refrigerandi, & humectandi nim habeant, sed quia per loturam aufertur bona illius substantiæ pars, quæ magis medicamentosa est, & subinde, quæ maiorem uim calefaciendi & exiccandi habet. A iunioribus præterea quibusdam Mesue damnatur, quod hoc uitium inesse aloë dixerit, ut ora uenarum aperiatur, & ea ratione illis esse nocuā, qui sanguinis ab hæmorrhoidibus fluxui, & earum doloribus sunt obnoxii, in utroque uerò reprehenditur; primum quidem, quia antiquiores, præsertim uero Dioscorides, cui & alii adstipulantur, dixit aloem sanguinis sputum reprimere, hoc uerò rationi consonum esse non potest, quod ora uenarum aperiatur, & sanguinis sputum tollat, quod uerò hæmorrhoidas irriter, aiunt id quidem interdum fieri, neque id tamen in aloem esse referendum, sed in acriores humores, qui dū ex aloë educuntur, sedis uenas pungunt, & irritant, quæ hac de causa deinde aperiuntur. Mihi sanè uidetur Mesue, si recte intelligatur, & eius dicta, cum aliis auctoribus, à quibus ea descripsit, conferantur, & ad eorum præscriptum explanentur, posse à tanta calumnia defendi, neque enim id in uniuersum accipiendum est, quod orificia, uel ora uenarum aperiatur, sed id dūtaxat ad uenas sedis, uel ani referendum est; hoc enim ex Serapione depromptum est, ubi de aloë agit, citatō enim prius Paulo, addit, aperit orificia uenarum, quæ sunt in ano, & fortasse initio librariorum, uel eorum, à quo translatus est, prætermisssa ea uerba sunt, & hæc quidem quantum ad sententiam Mesues pertinet. Quamuis autem quod refert serapio, nunquam in Paulo me legisse meminerim, hoc tamen non admodum ad rem facere uidetur, modò uera istiusmodi sententia sit, ut tamen non sit prætermittendum id, quod ex his patet, nihil contra hanc sententiam facere rationem, qua Mesuem nituntur improbare iuniores, nimirum, quod si sanguinē sistit, cū expuitur, non potest ora uenarum aperire: nam fieri potest, ut sanguinem, qui expuitur, reprimat, & ora uenarū sedis aperiatur: quod ea ratione fit, quia partes astringentes, quæ frigida, & terrestri substantia

stantia constant, facilius ad spirituales (ut ita dicam) partes perueniūt, à tenuioribus, ex quibus pendet amaritudo, deducta, quæ fortassis nō ita facile usque ad uenas ani peruenire possunt; ad quas iis partibus, quæ amaritudinis in causa sunt, facilius est aditus; in tenui enim substantia amaritudo sita est, & ipsemet Mes: hanc difficultatem in cap: de centurio uidit, & eam dissoluere nixus est, sed quia est in hac re suspecta, immo nullius ferè momenti Mes: auctoritas; ideo ex Gal. decretis ratione à simili de prompta Mesuam tue bimur: Gal. enim 7. de simpli. medi. faculta. ubi de maioris centaurei radice sermonem habet, dicit, quod sanguinem spuentibus est utilis: cum tamen magnam in aperiendis uteri uenis uim habeat; ita ut possit, & abortum facere, & fætum mortuum eiicere, ubi Gal. ait, quod non est mirum effectus ferè oppositos ab his medicamentis prodire, quæ & diuersis partibus constant, & iis facultatibus, quæ sibi inuicem aduersantur; sed hæc omnia ommittamus, & neque autoritatibus adeò innitamur, sed rem ipsam diligentius consideremus, re uerā enim omnino negare non possumus, si quis rem exactius uelit examinare, & cum iis, quæ docet experientia, conferre, quin aloë priuato hoc uitio sit præditum, ut nempe præ aliis ferè medicamentis eos lædat, qui dolori, uel fluxui hæmorrhoidali sunt obnoxii, & id non tantum, ut peripatetici loquuntur per accidens, hoc est quia acres, & biliosos humores purgat, sed sua etiam naturali facultate, nam plurimis annis, quibus Venetiis ciuitate cuiusuis nationis hominum refertissima medicinam exercui re ipsa, & experientia obseruaui, quod illos curaturus, qui hoc incommodum tentari solent, dū uariis medicamentis, ut illos purgare, uterer, ab aliis nō adeò facile, aut propterea, quā ab aloë, hæmorrhoides irritabantur, quāuis illa, & acriora essent, atque, quā ab aloë, copiosiora excrementa biliosa educerent, neque enim sene, neque rhabarbarum, sed neque agaricum tantam molestiam afferrebant, non negauerim tamen, quin acres humores, & alia etiam medicamenta id præstare possint; sed & hoc addiderim, quod plus, minusue, pro ratione, aut acrimoniæ medicamenti, aut eorum humorum, qui excernuntur, naturæ, aut copię: nam & sine ullo medicamento in alui fluxionibus eas excitari uidi, uel quidem aptitudinis, & propensionis gratia, uel humorum acrimoniæ ratione: sed utcunque sese res habeat: priuata quadam proprietate hoc magis ab aloë fieri, quā ab aliis medicamentis dubitandum non est, quod si dicant, ut etiam

etiam sumopere contendunt hoc ab antiquioribus græcis imprimis nunquam fuisse litteris mandatum. Ego aduersus hanc eorum rationem propriis eorum armis, & clypeo instructus insurgam: nā & ipsi, dum de rhabarbaro loquuntur, fore credunt, ut hoc argumentum ista responsione effugiant, & euitent; nempe quòd primi illi auctores, & si plurima reperierint, & nouerint, non tamen omnes uires eorum simplicium medicamentorum, quæ ab illis fuisse repperita, cognouerunt; nam eorum nullus purgatoriam facultatem in rhabarbaro esse cognouit: licet enim aliis rationibus id in usu haberent; nunquā tamen eo uti purgatorio medicamento usi sunt, quæ uis postea percepta est, tam in eo, quod ex Ponto, ut Manardus dixit, uel ex India deferitur; (Quidam tamen mercator, qui diu in Persia uersatus fuerat, qui quidē erat aromatarius (ut dicunt) & horum omnium medicamentorum peritisimus, probus quidem uir ut eius uerbis maxima fides esset adhibenda: mihi retulit rhabarbarum in mōtuosis Persiæ locis nasci, colligi, siccarique, & in Aegiptū uel Syriam à Persiæ negotiatoribus importari, unde ad nos deinde afferri) sed hæc obiter de eius origine, illud ad rem propositam magis sit, quòd sicuti antiqui uires rhabbari soluentes ignorarūt ita pariter eisdem potuit esse ignotum aloem singulariter irritare hæmorrhoidas. Hoc autem incommodum (sicuti à posterioribus fuit obseruatum), bdellii, uel masticis admixtione faciliè potest mitigari, sed & de rhabarbaro pauca quædam dicamus: de eo enim superius nonnulla relata sunt, quæ si huc transferantur, & huic item loco poterunt accommodari, quibus hoc addamus, quòd nulum auctorem ante Mesuem me legisse memini, qui de duplici hac ratione, qua eo utimur, vnquam egerit; cum enim minorem ex eo astrictionem requirunt medici, id macerant per octo, uel decem horas, uel plus etiam, aliquo decocto, aut alio liquore occasione, & scopo, quem ipsi spectandum iudicant, accommodato: unde estate plerunque ex eo liquore macerant, quo illius caliditas, siccitasque, & asperitas remitti possit: hyeme uerò eo, qui humores attenuet, & illud in aperiendo iuuat: at cum maiorem astrictionem, ut in alui fluxionibus, & in sanguinis sputo, & profluuiis querunt, eo toto utuntur, & (ut iuniores aiunt), in substantia, sed illud est animaduertendum, quòd cum toto eo, uel in substantia (ut aiunt) utimur non minus aperit, quamuis magis astringat: Antiqui enim, ut ex eorum libris possumus obseruare, etiam cum obstructions erant aperiendæ

Victoris Trincauellij

aperiendę, toto illo utebantur; neque, ut docuit Gal. in libris de
 simpli: medi: facul. in his medicamentis, quę constant diuersis, &
 inter se aduersariis partibus, illę quę astringunt, obstant, quò mi-
 nus alię aperientes suo fungantur officio; immo quoquomodo
 potius iuuant, nā cum à natiuo calore ad actū deductę dissoluuntur
 quę aperiunt, ut potè quę tenuioris sint substantię, pręeunt, quas
 deinde astringentes sequuntur, & quasi exprimentes, eas ulterius
 impellunt, & adigunt, & inde fortasse etiam magis, & valentius
 purgat rhabarbarum, cum totum accipitur (id enim experientia
 sæpe perceptum est), quā quando solus liquor, in quo fuerit ma-
 ceratum, quamuis & hoc potest accidere, quòd totum magis re-
 sistit, ne à calore natiuo dissoluatur, & digeratur: & ideo diutius
 potest uim suam seruare, neque iis, quę de illo à Galeno, Dioscori
 de, & ab Arabibus dicta sunt habeo, quod addam, nisi quòd rarò
 in eo exhibendo uidi his temporibus medicos ultra tertiam drag-
 mam fuisse progressos; quòd si Mesue longè maiorem copiam ui-
 deatur permittere: non quidem ego crederem eam Mesues esse
 sententiam, sed magis in libris latinis esse mendum: qui multis aliis
 etiam erroribus scatent, præsertimquē in notis mensuras, & ponde-
 ra referentibus: vnde nunquam est his libris ita fidendum, quin &
 medicus semper consulta ratione, & experientia, & frequenti usu
 obseruata suum etiam ipse iudicium apponat: de myrobalanis au-
 tem & ipsis nihil, quod referam, habeo, præter ea quę ab Arabibus
 scribuntur, qui earum fuere, quod ego quidem nouerim, inuncto-
 res, & fortasse ea ratione, quia ab Indis, cum quibus in exercenda
 mercatura commercium habuere, & apud quos hæc nascuntur, fue-
 runt edocti: vnde ad composita medicamenta, quę cum his simpli-
 cibus in eodem ordine sunt, quod ad soluendi rationem pertinet,
 accedamus: sed nec de his omnibus etiam, ne prolixiores sumus, ser-
 monem habere uolumus; satis siquidem fore putamus, si ea, quę in
 communiori, & frequentiori usu sunt, fuerint à nobis exposita. In
 his itaque nostris proximis regionibus, ut putà Venetiis, Parauii,
 & in reliquis huiusmodi ciuitatibus passim, & frequentissime in
 usu est medicamentum id, quod uulgo electuarium lenitium ap-
 pellant, & illud, quod recentiores nostri medici, qui paulò ante hæc
 nostram ætatem claruere, diasebesten nuncuparunt, cuius auctor
 Bartholomæus Montagnana fuit, & duplici modo in usum uenire
 solet, interdum enim non addito scammonio eo utuntur, & tunc

aut incompletum, aut simplex appellant; interdum uero & scāmōnium addunt, & uel completum, uel compositum uocant; singulæ autem istius medicamenti uncia scāmōnii ex cotoneo, quod de inde diagridium nuncupant, parati grana nonnulla accipiunt, in copia enim, uel pondere scāmōnii indendi solent seplatiarii. uariare; cæterum longè facilius est medicamentum; & quod magis inter lenientia medicamenta sit recensendum: illud, quod simplex est, & citrà scāmōnium, quamuis & illud, quod scāmōnium admittit, possit in hunc ordinem referri: adeo enim exiguam scammonii accipit portionem, ut illud non sit id, quod primùm purgat, sed quod alia medicamenta iuuat, & excitat, sicuti superius in multis aliis explanauimus, unde sæpe, si solo hoc electuario utantur, integram unciam exhibent, quæ dosis (utar enim his uocibus) non uidetur ualentiora medicamenta spectare, sed potius lenientia, & facilia; uerumetiam, quantum ad rationem compositionis pertinet, idem de eo medicamento censendum est, quod Diaprunon ideo iuniores uocauere, quòd magna ex parte ex prunorum succo conficiatur, nam & sine scāmōnio conficiunt, atque Diaprunon non solum lucium dicunt; aliquando uero addito scammonio, & solutiuum, dicunt; uerùm quia longe maior est copia scammonii, quam accipit eiusmodi confectio; si componatur, ut à Nicolao describitur; ideo non inter lenientia, sed inter uere soluentia collocandum erit; præstans præterea est & id medicamentum, quod à Mes: describitur, & Diacatholicon, quasi omnes in uniuersum humores respiciat, ab eo appellatur, quod & ipsum est in hoc ordine. A quo neque procul abest Diasene à Mes: item descriptum. Sed de his omnibus id quoque dicendum est, quod superius de simplicibus diximus; nimirum, quod interdum illis tanquam materia aliorum fortium utimur, uidelicet, quando illis fortiora immiscemus, eo cōsilio, ut ipsorum ferè integra dosis accedat, interdum tanquam eo, quod præcipuum sit futurum in euacuando, ac si solis uteremur, uel si aliquid addimus, id tantum addimus, quod hæc & iuuare possit, & accelerare. Nunc de leuioribus iis electuariis hæc summatim, & breuiter dicta sufficiant. In quorum quidem compositionibus referendis, & describendis, ideo longiorem sermonem non habuimus, quia satis esse censuimus, si authores, qui exacte illa exposuerunt, significarem: hoc igitur tantum nobis in præsentia est explicandum, quòd eorum, alia quidem bi-

Victoris Trincauellij.

lem purgant, tenuem præsertim, ut sunt, quod Diasebesten, & Diaprunon citra scamonium diximus appellari: & eadem calidioribus temporibus esse accomodata: alia uero pluribus humoribus exustis purgandis utilia sunt, & hæc sunt ea, quæ diacatholicon, dialena, & lenitium electuarium appellari diximus: sed præterea, ne quis putet sola ea medicamenta, quæ uulgo electuaria uocant, ad hunc primum medicamentorum ordinem pertinere; huic etiam sermoni illud addendum est, quod & syrups reperiuntur, & pillulæ, uel catapotia, & pulueres, & decocta ad hunc eundem ordinem pertinentia, ex syrupis duæ præcipuæ eorum differentiæ, quæ quidem solunt, nobis in usu sunt, quarum alteram nos syrupum rosaceum solutium appellamus: quidam autem nucharum solutium, magis barbaro uocabulo: nuncupant, & hanc aromatariorum quidam ex nouem, alii uero ex duodecim rosarum infusionibus (barbaris uocabulis nobis nunc uti liceat) parant, syrupum autem rosaceum ideo appellamus, quia aqua ex multiplici maceratione expressa, & ex zucharo decocta, in formam, uel modum syrupi redigitur. Alteram autem syrupi differentiam, syrupum uiolaceum solutium nuncupant, quæ quidem ex uiolarum infusione eodem modo ante aliquot annos fieri cæpit, differt autem sic à priori, quod frigidior, & humidior est uiolaceus: & ideo maiorem calorem extinguendi, & somnum conciliandi uim habet, maiorem etiam leniendi: unde etiam accomodatior est in inflammationibus, & reliquis calidis, & siccis pectoris, & pulmonum affectibus: sitim etiam magis extinguit, rosaceus uero magis detergit, aperit, & roborat, & proinde est i iocinoris, uentriculi, & cerebri, calidis præsertim affectibus, præstantior; quatenus autem ad eorum dosim pertinet: hæc sunt consideranda, quod ut maiorem uim soluendi habet rosaceus uiolaceo, ita copiosiore mensura possumus uti uiolaceo sed & præterea scire licet, quod cum recentes sunt, magis solunt, dum ueterascunt, purgatoria eorum uis resoluitur, quapropter mensis Maio, & Iunio, Iulioque interdum tres uicæ satis sunt, Martio, & Aprili, uix quatuor, uel interdum quinque possunt liberaliter aluum ciere: possemus quidem hic & de syrupo de fumoterræ, qui compositus nuncupatur, agere, & de eo qui ex pomis compositus solent uocari, uerum illis utimur non soluendi: sed potius præparandi gratia, quamuis & ipsi aliqua accipiunt, quæ purgatoria facultate prædita sunt, leuissimam tamen uim habent, nisi ab alio medicamento adiuentur, sed, & quia decocta plurimum cum syrupis coniungunt,

de

de ipsis quoque paucula quædam dicemus. Duo autem sunt, quæ in frequentiori sunt usu. Alterum quidem, quod fructuum decoctum dicitur, quod si (ut describitur à Mef.) conficiatur, uim quidem mediocrem, facilem, & sine molestia purgandi habet, addit enim & cassiam, & mannam, & tamarindos, pruna, sebesten & zizipha, sed his temporibus uarius est eius usus, aliquando enim fit ex prunis, sebesten, & ziziphis, quibus addunt flores, quos cordiales appellant; uidelicet, boraginis, buglossæ, & uiolearum; interdum uero sine his conficiunt, his nonnunquam tamarindos quoque addunt, aliquando uero non addunt, adduntque, quando maiore caloris extinctione feruentis bilis opus est, & maiore item uacuatione, cum uero uenter debilior est, & frigidior, cui uideatur timendum esse, eos adimunt, & est istius modi decoctio ueluti materia, qua æstuosus, & calidis temporibus omnia ferè medicamenta purgantia dissoluntur; nam prætermissa cassia, quandoque etiam & manna, si macerandum est rhabarbarum, hoc decocto infusum hoc tempore macerant, sed & si aliud purgans medicamentum sit diluendum, hoc itidem decocto diluunt, nam leuiter, humectat, & refrigerat. Præter hoc autem, & id decoctum in usu est, quod ex epithymo dicitur, humori melancholico purgando aptissimum, cuius inter alias duplex in usu reperitur confectio: altera ex Rasi desumpta; altera uero ex Mef. quæ item apud nos in maiori usu est: at istud non huic medicamentorum ordini adscribendum est, cum & turbith accipiat, & agaricum, & nigrum ueratrum; idè postèrius de eo forsitan sermonem habebimus, id uero, quod à Rasi refertur, omnia facilia habet præter turbith, quod quidem cum non in multa copia iniiciatur, potest aliquo modo in hoc ordine censerì, tum sit facilis sanè medicina, quæ ad humorem melancholicum facile purgandum apta sit, siue aliquem syrupum ad hunc pertinentem illi addamus, siue eo tanquam materia, qua alia medicamenta sint diluenda, utamur: non solent autem seplasiarii eiusmodi decocta diutius parata seruari, sed ea, cum illis opus est, conficere, quia calidioribus temporibus facillè putrescunt. In decocto autem senæ, quod & ipsum in multo usu est, non multus error, cum uariè, & multipliciter conficiatur; nam tum ex ratione eorum, quæ senæ adduntur; tum uero ex illis, quæ de sena sunt paulò ante dicta, facile omnia, quæ ad ipsum pertinent, poterit quisque, uel leuiter instructus, assequi: syrupi autem, si probè cocti fuerint, integri diutissime seruantur, pillulæ uero uel catapotia, quæ in hunc ordinem referri possunt, ex his quibus

bus nunc utimur, sunt pillulæ ex hyera, scilicet, quamdiu aloes Gal. appellat, ite & pillulæ, quas 3. can. assaiareth: uocauit Auicena has uero, & priores addito agarico quandoque conficiunt, ut à remotioribus partibus, præsertim uero à capite, uim maiorem attrahendi habeant; quarum hæc est differentia, pillulæ, quæ ex hyera conficiuntur, calidiores sunt: unde frigidioribus affectibus multò opportuniores sunt, quàm calidis: at assaiareth non ita calefaciunt, mixtis enim myrobalanis aliorum medicamentorum calor temperatur. Alephanginæ uerò, quas statim à principio tractationis de pillulis Mesi: descripsit, insigniter calidæ & ipsæ sunt: immo & illis ex hyera confectis calidiores; & præter id, quòd non minorem putgandi uim habent, quàm hyera habeat, calefaciunt etiam, statusque dissoluunt, & discutiunt, crassamque, & lentam materiam attenuant, unde ad dolores ex materia pituitosa, flatulenta, in uentriculo præsertim; & intestinis concitatos admodum præstantes sunt. In hoc eodem ordine sunt mastichinæ, quæ etiam laboranti uentriculo, & crassiores humores, tum biliòsos, tum pituitòsos congerenti prodesse maxime possunt, & ratione agarici earum uis ad caput etiam pertingit, & ad oculos: unde earum usus affectibus oculorum, & capiti utilis est, tum illis, qui earum partium primarii sunt, tum uel maxime iis, qui ex uentriculi consensu oriuntur. In hoc eodem etiam ordine sunt pillulæ, quæ ex tribus cum rhabarbaro uulgo in nostra hac regione ideò appellantur, quia ex tribus simplicibus medicamentis confectæ sunt, uidelicet, aloë, agarico, & rhabarbaro, pari singulorum pondere; quæ mirum in modum obstructions aperiunt bilemque, notham præsertim, & pituitam educunt, unde in febribus diuturnis earum usus præcipue conducit, quæ à multis uiscerum obstructionibus fouetur: sed & doloribus, tam uentriculi, quàm ieciorum ab eisdem humoribus excitatis conferunt: dicuntur autem cum rhabarbaro, ut eas discernamus ab illis, quæ interdum pillulæ communes, interdum de tribus dicuntur, & ab Arabibus tanquàm medicamentum describuntur, quod in pestilentia maxime sit salutare, eas quæ in Ruffum auctorem referunt, quamuis, si græcos legerimus, alio modo medicamentum Ruffi se habeat, quàm Arabes retulerint: hi enim ex aloë, croco, & myrrha eas conficiunt: Ruffus uero croci non meminit, sed ammoniacum pro croco imponit, neque, pillulas conficit, sed puluerem componit, neque est idem horum pondus. Ruffo, & Arabibus, si Paulum legere uoluerimus. A Etium, & Oribasium

cap:

cap. de pestilentia, & Arabes, ubi idem argumentum tractant: sed siue hoc, siue illo modo composuerimus, mirum est medicamentum, & à posterioribus omnibus probatum, quod tamen mea quidem sententia magis accommodatum esset homini à pestilentia custodiendo, quam iam lapsò in pestilentia curando; exsiccat enim, quod insigniter præstat, & faciliè purgando sine agitatione, à pestilenti putredine potest defendere; tutior tamen est eius usus, quando nulla, aut modica febris accensa est, quia, cum febris est acuta, sicut sæpe pestilentes febres sunt, (nam & si exterius non uideantur ardentes, interius tamen vrunt) calefacientia, & exsiccantia, ut sæpe testantur Gal. & Hippo. maxime illi aduersantur: harum verò omnium, quatenus ad eius (ut aiunt) dosim pertinet, idem ferè modus est, communi enim consuetudine accedit usque ad sesquidragmam, vel ad summum ad dragmas duas. Pulveres autem, quibus non modò medici, sed interdum & mulieres ad purgationes utuntur, sunt, primum pulueres hyeræ, & scæne pulvis, quæ nunc vulgares seplasiarii apud nos scæne præparatum appellant, facile sanè medicamentum, & primum, quod ego quidem nouerim, à Bartholomæo Motognana descriptum, exiis præsertim humoribus; deinde & pituitosis, crassisque educendis aptum: conficitur autè accepta scæne ad sesquiunciam, additis deinde macere, & zingibere, utriusque dragmis tribus, & deinde scæcis vini albi, quam vulgares tartarum appellant, sesquidragma: hoc medicamento nostræ obstetrices in cienda aluo, si quando in puerperis supprimatur, utuntur, dant autem dragmam vnâ, aut alteram ex iure gallinaceo, quod sæpissime citra vllam noxam aluum mouet: aliqui tamen & salindum iniiciunt, & scammonium: sed hæc cum adduntur, iam in causa sunt, ne huiusmodi medicamentum huic primo medicamentorum ordini; de quibus nunc est institutus sermo, adscribi possit: scammonium siquidem, & sal illud aciora sunt medicamenta, etiâ si cum leuioribus aliqua copia commisceantur; quàm, ut possint ad hunc ordinem admitti. De pulueribus autem hyeræ, licet illi ita in usu antiquis fuerint; tamen, ob aloes amaritudinem, perpauci sunt; qui illos sine aliorum mixtura possintmittere; idco non multa præterea de iis dicemus; sed ad alium medicamentorum ordinem nostrum sermonem conuertemus.

b De ratione usus, & compositionis medicamentorum; quæ potius soluentia, quàm lenientia dici possunt. Cap. 13.

VT eundem in his ordinem seruemus, quem in aliis quoque seruauius, primùm de simplicioribus medicamentis, mox & de compositis agemus: quamuis, quantum ad institutum nostrum pertinet, in his res secus se habeat, ac in aliis, de quibus hæc genus sermonem habuimus, quia illis non modò interdum, sed frequentissimè (ut superius diximus) simplicibus utuntur medici, sæpe uerò paucissimis additis: his uerò rarissime solis, sæpius uerò compositis: ut autem cōpositorum vires cognoscamus & illis congrue, & fœliciter utamur, necesse est prius de simplicibus ad hoc genus pertinentibus agere, cum illa ab his vires suas sortiantur; non omnia autem, quorum auctores meminere, persequemur, sed ea tantum, quæ passim in frequentiori sunt usu, & quæ inter cōposita recipiuntur, quibus frequenter, & ad uniuersum ægrorum corpus purgandum, serè ubique medici utuntur; itaq; ualentissima quidem sunt, scāmōnium, colocynthis, elateriū, uera trū nigrū, albi namq; ueratri usus, postquā Arabū doctrina in has regiones, & in nostra studia irrepsit, intermissus est: Arabes n. ab illo tāta incommoda adferri testantur, atq; tot mālīs ab illo egros affici adfirmant, ut omnes medici, aut maxima eorū pars, illorū maledictis perterrefacti illud in usum reuocare timuerint: sed neque in præsentia de eo agendum est, cum enim de iis, quibus uomitus excitatur, agemus: de illo sermonem habebimus: polypodium uerò epithymum, turbith, agaricum, & cnicus, quem Arabes caritatum appellant, uim mitiorem aliquantò habent: de quibus illud in memoriam est reuocandum, quod superius diximus, nimirum nos sæpe his uti, ut illorum immixtione aliorum imbecillium medicamentorum vires adiuuemus, & excitemus, atque ea, quæ tardiora sunt, acceleremus; quo tamen casu eorum modicā portionem aliis addimus, non autem eā, quæ ad id pondus propè accedat, quod exhibere solemus, cum illis solis utimur, ut eis mediocriter purgemus: tunc enim imbecillium vires superarent, & ipsa non autem leuiora euacuarēt, purgarentq;: sed de hoc in prioribus capitibus abunde satis dictum est. De iis ergo, quod ad hunc locum attinet, quod soluunt, & in purgando præcipua sunt, nunc tractandum nobis est: & quamuis, ut paulò ante diximus, raro his solis medica-

mentis

mentis medici uti soleant: plerunque autem in compositionibus, ueluti in appellatis à me electuariis, aut catapotis, aut id genus aliis, in usum ueniant: quia tamen aliquando etiam eis solis utimur, & sepius etiam antiqui utebantur: & nos quoque primum de illis solis, simplicibusque, postea de iisdem compositis in usum deducendis exactius loquemur: neque tamen, cum illa in usum sola deduci dicimus, intelligi uolumus, ea omnino simplicia, & sola, atque sine ullo apparatu, & correctione, uel ulla materia exhiberi: nam si uel ex iure, uel ex multa, uel ex aliquo alio decocto accōdato accipiantur, nō ideo tolli credimus, quin dicere possimus, quod illis solis, & tanquā simplicibus utamur, sicuti cū mulierem illā nobilē, quæ herpete laborabat, & omnia medicamenta renebat, Galenus scāmonio lactis sero addito decepit; & quia, ut diximus, uel nunquā, uel quā rarissime, medici, qui ex ratione medentur, hæc absque ullo apparatu ægrotantibus offerunt: propterea quod nullū est horū medicamentorum, cui insignis aliqua malignitas, ac praua qualitas nō insit: quæ iecur, uenterculū, cor, & cætera viscera, reliquasque præcipuas, ac digniores corporis partes plurimū possint lædere: ideo primū de ratione, quæ ea paramus, deinde uerò quo pacto illis paratis, & correctis uti possimus, sermonē faciemus, & postremū de illis compositis, quibus hæc purgandi facultatē adferūt, agemus: primū autem quædā tractemus, quæ in uniuersum ad hoc negotium attinere arbitror: quæ quidē, si rectē percepta fuerint, nō parum lucis illis sunt allatura, quæ particulatim de unoquoque medicamento, tam simplici, quā composito sunt exponenda. Tria itaque sunt (nisi fallor) ea, quæ cōmuni quadam ratione in his medicamentis corrigēdis, ne quid noceant, medici diligentia, & eā quidē maximā, postulant: primū uerò est, quod omnia istius generis medicamenta qualitate quadā prædita sunt, quæ naturā ueneni sapit, & naturæ nostræ inimica sunt, neque ab his, quæ uere, & exquisitè uenena sunt, ut 6. libr. com. in 6. epid. Gal. docuit, alia ratione differunt, nisi quod uenena uerē, & propriē illa dicenda sunt: quæ suapte natura eam vim, & facultatem habent, ut eorum usu humano generi mors, & perniciēs paretur; quæ quidem licet, quādo in exigua admodum copia exhibentur, illum, cui oblata sunt, non interficiant: nunquā tamen in aliquod corporis humani commodū, aut utilitatem uerti possunt: nil mirum autem est, si exigua admodū copia exhibita non interficiant: etsi enim qualitate agant: & forma, certa

Com. 1.

2. 9. 8.

tamen quantitas exigitur: quod non iis solum, sed in cæteris omnibus rebus naturalibus locum habet: ecce enim, neque minima ignis fauilla comburet, cum tamen suapte natura cōburendi facultatem ignis habeat: medicamēta verò, quæ purgandi uim habent, & quæ propria sua natura uentrē soluant, de quibus institutus est præfens sermo, in multa quidem copia, perinde atq; uenenum, interficiunt, in certa tamen, & diffinita quantitate, quantū nempe natura possit eā rectē administrare, & regere, & opportune illi oblata plurimū conferre possunt, & vtilia sunt: ad purgandū enim corpus, & ea excrementa detrahenda, quæ illi molesta sunt, illis tanquā instrumentis natura utitur: nam facultatem eam habent, qua certos ad ventriculū, & intestina, dum in illis nempe horum uis manet, humores attrahunt: quos deinde expultrix facultas ad exteriores partes expellit: quod si maiori copia hæc medicamenta exhibeantur, perinde ac venena, necāt: unde Theriaca, quæ vim habet reprimendi, & venenorum omnium perniciosam facultatem abolendi, si homini exhibeatur, qui pharmacum purgatorium acceperit, quamuis iam purgatio inceperit, alium sistit, uel medicamenti repressa, & superata, sicut alia uenena ab ipsa superantur: immo hoc maxime argumento, an recte parata sit Theriaca, cognoscimus. Alterum uerò, cuius in horum medicamentorum usu maximam rationem habere oportet, est: quod propria sua natura ventriculo, præcipuè vero ori eius aduersantur, ut eodem 2. lib. de ratione vict. in acut. mor. & 8. de comp. med. secundum lo. monet Gal. cum enim alicuius acrimoniæ non sint expertia, & hac ratione lædunt: & ob eximium istius particulæ sensum: quæ plurimum ex eorum usu molestiam percipit: unde postea contingit non solum ventriculi, (quod nobis ob oculos debet versari) sed plurimum etiam aliorum viscerum robur, & substantiam exolui, laxioremq; reddi, nisi illis aliquo pacto consulamus. Tertium potestremò illud est, quod adeò illa ingrati, & molesti saporis, atque odoris sunt, dum deuorantur; ut cum primū à gustu percipiuntur, stomachum subuertant; & fastidium moueant; sed non modò, dum summuntur, molesta sunt; sed postea etiam molestas & ingratissimas eructationes excitant; quæ, ut idem Gal. 1. de comp. med. per loc. ait, totum hominem turbant, & cogunt, ut medicamentum euomat, atque deinde ita sollicitum reddunt, ut quiescere deinde nequeat: sæpe enim humores mouent, nequā ta-

men

Cap. 3.

.7. m.

Cap. 3.

men possunt educere. Sicuti autem tria hæc incommoda cōmōni quadam ratione ad hæc omnia medicamēta attinent, ita etiam, quomodo illis possimus occurrere, in uniuersum, & communi oratione agemus: & quod quidem ad primum pertinet, quia, ut superius diximus ex sententia Gal. lib. 3. de temperamentis, & 6. lib. com. in sextū Epidem. nocent, si sint ea quantitate exhibita, qua uires naturæ uincunt; & ab ea superari, aut recte moderari nequeunt: si uerò modice oblata fuerint, & quantum à natura regi possunt, quasi eius accomodata, & utilia instrumenta sunt: ideo in hoc maxime ea ratio consistit, qua huic primo incommodo possimus occurrere, ut uniuscuiusque medicamenti eam mensuram inueniamus, quam natura facile, & citra insignem molestiam ferre, & regere possit; & hoc est, quod & Arabes, & Latini, & multi ex Græcis medicamentorum dosim appellant: neque tamen ire inficias volumus, quin etiam multum quandoque expediat aliqua his commiscere, quæ uenenosam eorum naturam reprimēdi uim habeant, sed de hoc postea magis particulatim agemus: alteri uerò in cōmōdo mixtura succurrimus: aliquid enim cum eis immiscemus: quod tum acrimoniam horum medicamentorum obrundet, & leniat: tum uero substantiam ventriculi, & aliorum viscerū colligendo illis robur addat, & obsistat, quod minus à medicamentosa pharmaci qualitate dissolui, aut laxari possint: unde medici ferè omnes, præsertim Mesue, eos summopere laudant, qui cum purgatoriis medicamentis leniētia commiscant; ait enim, quod illarum operationem beatificent: sed & alia ratione præterea occurrimus; si post assumptum pharmacum aliquid sorbendum demus, quod detergendi uim habeat: ut si quid aut substantiæ, aut qualitatis medicamentosæ sit relictū, quod ori ventriculi hæreat, ad fundū id detrahatur: quæadmodū esset mulsæ: sed & syrupus rosaceus ex rosarū succo, uel infusione (ut aiunt) factus posset huic rei satisfacere. Hippo. uero eodē com. 2. de ratio: uict. utroque nomine puissanā, uel hordei cremorē laudat, si post acceptū pharmacū sorbeatur, quia & leniendi, & detergendi uim habent, quidā uero ad substantiā, & partes oris uentriculi corrigēdas, & roborādas, malū cotoneū, uel aliud, quod sit astrictionis particeps, mādūt; uel pirū, ac succū deuorant: tertio autē in cōmōdo occurrēdū esse docuere Hippo. & Gal. rebus, quæ bene oleant, ut grato, & aromatico odore insuauitātē, & abominationem (ut ita dicam) quam secum

affert medicamentum, mitigent, aut reprimant, & uentriculo gratiam concilient, ut enim fastida, & quæ tetrum spirant odorem, & quæ horribili sapore gustum afficiunt, fastidium, & tandem uomitum cient, ita quæ bene olent, & quæ grato sapore prædita sunt, ut grata sunt uentriculo, immò & cæteris visceribus ita facile detinentur, & ab eo recte administrantur: unde postea excogitatum est, ut Gal. in sæpius citatis locis testatus est, ut ex melle conficiantur medicamenta, uel zucharo, illisque aut aromata, aut semina bene odorata addantur, qualia sunt semina fænicali, anisi, cimini, ameos & id genus alia; quæ quidem præterea attenuando, & aperiendo faciliorem operationem pharmaci reddunt; ita ut minori molestia ægrum efficiat. Et hæc sunt præcepta, quæ communi quadam ratione exposita, particulatim deinde omnibus his simplicibus medicamentis, quæ nim purgatoriam habent, sunt accomodanda. Sed antequàm rem hanc particulatim tractemus, de dosi dicta adhuc quædam in uniuersum, quæ cognitu necessaria sunt, exponamus.

De purgatoriorum medicamentorum dosi in uniuersum .Cap. 14.

Cap. 12.

C6m. 37.

Nihil profectò aut magis necessarium est, aut saltem magis utile, quàm illud, in quo agunt medici de inuenienda mensura, uel quantitate medicamenti: quæ ita cõgrue exhiberi possit, ut iuuet plurimùm, ebesse uerò uel minimum nequeat, nec modò in his purgantibus medicamētis hoc medicum sollicitum reddit, uerùm etiam in omnibus aliis serè medicinæ instrumentis: nam (ut in libello de curandi ratione per secl: uenam Gal. exponit) sæpissime medicis accidit, nec medicis modò, uerùm & popularibus hominibus, ut pro compertissimo habeant, quid intrando morbo sit agendum; nam cum natura morbi fuerit cognita; inde euidentissima, certissimaque ratione perspicitur; an sanguinem de trahere expediat, uel magis calefaciendum, refrigerandum ue sit; quæ uerò sanguinis copia sit detrahenda, aut quantum calefacere, uel refrigerare oporteat, non certa, aut præfinita aliqua ratione, sed quadam tantum coniectura possumus cognoscere: quod Gal. in commentariis in secundum de rat. uic. in acut. mor. testatur: ubi ait singulorum præsidiorum quantitatem artificiosa coniectura egere: unde postea eodem de curandi ratione per secl: uenam libro addit, nihil esse, quod in agendo medicinam artem coniecturalem

Naturalē æquē faciat, ac cuiusq; remedii quātitas; quā autē artifi-
 ciosa hæc cōiectura difficilis sit: idē illo eodem secūdo de ratione
 uict: cū hæc protulit, ostendit: artificiosē coniciere uiri est, qui ui-
 res omniū, quæ ad eam artē pertinent, didicerit, memorizæque man-
 dauerit, & in artis operibus diligentia adhibita se exercuerit: vn-
 de etiam in huiusmodi dosi, uel discernenda purgatorii medica-
 menti purgatione, qua assequamur, quo pacto, uel qua ratione ita
 purgandus ille sit, qui purgatione eget, ut ea purgatio ipsi insigni-
 ter prorsit, nullo autem pacto noceat, uel saltem leuiter noceat: sæ-
 pe medici in diuersas abeunt sententias, præsertim uerò, cum par-
 ticulatim res hæc tractatur: nam rarior sententiarum diuersitas
 oritur, cum generatim, & in uniuersum huiusce rei consideratio
 proponitur, nimitum quando in uniuersum quærimus, quæ ho-
 mini laboranti alicuius medicamenti quantitas dari tuto possit, ut
 natura facile deinde uacuationem illam serat, nulla tamen particu-
 latim relatione facta ad hunc, uel illum: quo quidem casu, ex tem-
 peratura, ætate, uiribus, tempore, regione, artibus, maxime diuersi
 tatis ratio aliqua potest oriri: nam generalis illa consideratio am-
 plior est, & latioribus finibus comprehenditur: longe uerò angu-
 stiores termini proponuntur, cum generales rationes contrahere,
 & eas particulatim huic, uel illi ægrotanti accomodare necesse est:
 cum autem utrunque sit medico, qui hanc artē uoluerit exerce-
 re, necessarium; ideo de utraque ratione agemus; primū uide-
 licet, in uniuersum hoc negotium tractantes, mox uerò, quod ma-
 gis per artē fieri potest, uniuersalia præcepta ad rationem usus,
 & operationis particularis contrahemus: itaque ab hoc capite exor-
 diamur. Quicumque recte rationē eam tenere, & addiscere uolue-
 rit, qua medicamenta, siue illa simplicia fuerint, siue composita,
 per suas congruas doses metiri ex arte possit: oportet, ut hoc
 primū tanquam fundamentum iaciat, nempe ut omnia medica-
 menta simplicia primū perspecta, & cognita habeat, quantum ui-
 delicet ad facultates, & uires eorum pertinet: simplicibus enim ex-
 quisite cognitis facile deinde erit illis, ex quibus compositum me-
 dicamentum confectum est, mutuocollaris, & compositorum ui-
 res, facultatesque perdiscere: nec solum (ut Gal. sæpe testatus est)
 satis erit: si communes eorum rationes tenuerit, sed eas etiam in
 suos ordines, uel (ut aiunt iuniores) in suos gradus digerere ne-
 cesse est; neque de illis ordinibus nūc loquimur, qui primas qua-

lirates respiciunt, quanuis & illi necessarii sint: sed de illis agimus in præsentia, qui naturâ eâ respiciunt, qua medicamenta vim purgatoriâ habent, q̃ non omnia eandē, & æqualē vim habent: imo alia aliis ualentiora, aut imbeciliora sunt, & sicut differentes sunt uires, & robur; ita & differentē habent mensuræ quantitatis, uel copię, ad purgationē offerendæ rationē: neque minus in his medicinis necessaria est hæc in ordines, & gradus distinctio: quàm in illis, in quibus, ut calefaciamus, vel refrigeremus, uel id genus alia agamus: utimur. Sed quātuis res hæc satis oībus, qui hæc animaduertūt, possit esse aperta, eâ tamē exēplis manifestiorē faciamus: in his ergo medicinis, quę nūc in maiori vsu sunt, supremū ferē ordinē: & ut Gal. loqui solet, quartū ordinē tenent, scāmoniū, elateriū, colocynthis, & euphorbiū: horū. n. rari sunt, qui dum purgare uolūt, nostris præsertim his tēporibus, audeāt ad pōdus semidragmæ accedere, plerique uerō, neque ad scrupulū: tertii autē ordinis sunt; turbit, agaricū, sarcocolla, serapinū, opoponacū, & id genus reliqua, in quorum vsu non timemus etiā dragmā excedere, ut tamē in his etiā sint alia aliis uehementiora; vltra tamē pondus sexquidragmę rarō trāscendimus: secūdū ordinē occuparunt polypodiū, cnici semina (cartamū Arabes appellāt) centurea, hermodactilus, eianus lapis, quem lazulū Arabes vocant, iridis radix, uel succus, eius, in quibus vltra dragmā alterā, & semissem interdū progredimur; postremus autē ordo, quiq; primus cēsendus est, si a leuiorib. & faciliorib. ut cōsueuit Gal. incipiamus, quē & nos sequuti sumus, & sequemur, est corū medicamētōrū, quorū tractationē in prioribus capitibus expediuimus; sed hoc imprimis in horū medicamētōrū rōne cōsiderandū est, q̃ purgantiū medicamentorū facultates, atque eorundē robur, & efficacīā sola experiētia medicos edocuit: ita ut vel parū, vel fortassē nihil ratio cōtulerit, de simplicib. loquor; vnde quicquid de facultatibus, uel de dosi horum medicamētōrū dicēdū est, id totū ab obseruatione, & experientia petēdū erit: & proinde qui in vsu horū simplicīū medicamētōrū fieri peritior voluerit, illum oportet ea, quę de illis à probatis auctoribus literis tradita sunt, diligēter legere, & ipsum præterea, vel artē hāc exercendo diligēter, effectibus, & operationibus, quę post exhibitū medicamentū sequi solent, diligenter attendere, uel longe antea optimos sequutū præceptores obseruasse, quid, & quomodò res il

li suc-

si succedat: nā si diligenter quis animaduertat, perspiciet eos, qui uolūt esse, ut de natura pronunciauit Hipp. *ut scilicet dicitur*, hoc est, qui ex seipsis, & sine præceptore, quem sequantur, artem medicinę edificare se profitentur, in innumeros errores incidere, qui quidem non sine insigni ægrotum damno, & periculo committuntur, nec certē id mirū est: nā fallax omnino est, & admodū periculosum, si lectis his, quæ ab antiquis, & probatissimis medicis, literarū monitū mentis circa dosim medicinarū sunt tradita, illis vsquequaque hæreamus, prius diligenti examine, & iudicio non adhibito, non quod illi non fuerint excellentissimi, & illius autoritatis, ut fides omnino eis non sit adhibenda; sed quoniam per tot annorum curricula eorū libri in manibus tot literas ignorantium, & negligentium librariorum versati sunt: ut in his, quæ ad pondera, & mensuras medicamentorum, tum simplicium, tum compositorum pertinent; ut sæpe in libris de compo. medicamen. per genera, & secundum loc. Gal. animaduertit: tanta errorum congeries orta fuerit, ut, nisi recto iudicio fuerint omnia æstimata, faciliē possimus errare: quod ex multis locis possemus ostendere; sed vnus nobis satis sit, qui potest aperte rē hanc patefacere, de dosi. enim hyeræ dia aloes semel. 7. meth. semel. 2. & bis 8. de composit. medi. secundum loc. Gal. habuit sermonem, quæ loca si quis conferat, facile errorem in uoluisse aliquo eorum locorū iudicabit, nam interdum dandā ad summū dragmam ait, alibi completam dosim esse tres. 5. dragmas, sed quis, quæso, qui ea, quæ de his simplicibus medicamentis, de quibus præsens est instituta tractatio: legerit, non miretur, sicuti iure admiratus est Auic. 2. can. cum viderit, quā varii, & diuersissimi fuerint antiquiores auctores in eorū pondere limitando, & definiendo; quo illa ad purganda corpora possint tutò dari; nam ut à scammonio, quod in frequentiori vsu est, incipiamus: Dioscorides posse ad dragmam vsque tutò dari censuit, quamuis deinde dicat posse interdum satis esse semidragmam, ut liberalis fiat purgatio; duo vero oboli, hoc est scrupulus potest commodè aluum ciere, & ita videtur sentire dosim elus esse à scrupulo ad dragmam: Paulus uero 7. libr. suæ medicinæ ait dandos esse obolos quatuor, qui pendunt duos scrupulos, cum quo consentiunt Aetius, & Aëtuarus. Mes. verò, quem omnes ferme Iuniores sequuti sunt, non audet scrupulū dare, immò confusulit non esse excedenda grana duodecim, sicut minimum quod dari potest,

Cap. 1. circa principium.

Cap. 1. ubi agit de iis, qui ex stomacho caput dolent.

Cap. 2. circa principium.

Cap. de scammonio.

potest, ut utrū soluat, uoluit esse grana quatuor. Quid de elaterio dicam? de quo sensit Dioscorides non esse excedendum obolū, qui semisrupulum equat, sicuti minimum, quod dari adultis possit, ut commode purgare possit, satis esse dimidium oboli, hoc est pondus granorum quinque, Paulus tamen tres obolos, hoc est semidragmam dari posse autumat, itidem Aetius, & Actuarius, Me sue uerō cum Dioscoride sensisse uisus est, qui à granis decem usque ad scrupulū progreditur. Sed & dosim colocynthidis hic esse ait à granis sex usque ad decem, cum Dioscorides triobolum det, quod ad dragmæ dimidium accedit. Si uellemus per alia id genus simplicia uagari, non deesset amplum huic orationi argumentum, sed tempori parcere uolumus: unusquisque enim ex collatione eorum, quæ scripta reperiuntur, quod reliquum est, huic sermoni addere poterit; nos alia, quæ nostra sententia utiliora sunt, tractemus. In hac autem tanta sententiarum diuersitate, siue illa ex erroribus originem habuerit, siue ex eorum auctorum proposito, ne relinquamus animos iuuenum, nō modo suspensos, sed etiam perplexos, rem hanc diligentius examinemus, hoc primum expōitō, quod longè cautiorem oportet esse medicum in his metiendis medicamentis, quando ipsi res est cum eō purgando corpore, cuius naturam non habeat perspectam, quoniam uidelicet pacto liberales purgationes ferat, quā facile, & obediens sit medicamētis, quia si naturam exploratam habeat, & nouerit, an leui medicamentō facile soluatur, an uerō astrictiorem aluum habeat, modō prudens sit medicus, multi negotii res non erit: ut insinuare uidetur Gal. 2. de rat. uict. in auct. morb. accommodatum pondus, uel mensuram medicamento præscribere; sed ubi ignota sit purgandi corporis ratio, maior æstimatio, & diligentior pensatio est adhibenda, ita uidelicet, ut neque eorum sententiæ hæreamus, quamuis multæ essent auctoritatis, qui amplam copiam exhibendam putāt, suntque in dandis medicamentis liberaliores, neque illos etiam se quāmur, qui nimis timidi in exhibendis medicamentis esse uidentur: sed eorum, qui uia media incessere, uestigiiis insistamus: quod eodem loco Gal. innuisse uisus est, cum dixit, in illis, qui nobis minime noti fuerint, tantum medicamenti esse dandum, quantum pluribus datum solet mediocriter purgare: duo enim sunt extremi errores, qui, quantum fieri potest, sunt à medico declinandi; primus, ne immoderata fiat uacuatio, hoc enim corporis ægro

tantis

Com. 9.

tantis vires potest deicere: alter, ne si iussu imbecillior sit medicina, ita ut nihil vacuet, & plus calefaciendo noceat, quam profit per uacuationem, & interim morbus crescat, aut moueat quidem non vacuet tamen, aut longe minus vacuet, quam mouerit; vnde postea humores vitiosi, moti, non educti, maiorem, ut sensit Gal. 2. de cau. sympto. molestiam afferant. Quod si quis fortasse petat, & vnde à iuniori medico, qui nondum medicinam faciendo, & per experimenta artem, uel peritiam vsus medicamentorum sit consequutus, hæc sunt perdiscenda. Dicimus, quod, quemadmodum citharædi citharizando, non autem solum disciplina, ut docuit Arist. fuit, ita & omnes artes per exercitationem, & usum tandem absoluunt, præsertim illæ, quæ opem manus, vel alioquin corporis ministerio utuntur: nam tunc, nisi ipse artifex se exerceat, & manum, vel aliam partem assuescat, nihil efficit; artes vero, quarum peritia corporea artificis exercitatione non pendet, sed ingenio; potius, & iudicio nititur, non modò ex ipsius artificis usu absolui potest: sed etiã, si, quid alii periti agant, obseruauerit: vnde iunior medicus, si aliquandiu in maiori aliqua ciuitate uersetur, ubi multi sint medici; qui plurimum sint exercitati, & eos sequatur, & obseruet; quoniam pacto medicamenta metientes illis utantur, multis inter se collatis, quæ soleat esse communis eorum dosis, facile percipiet, quæ frequentius mediocriter homines in ea regione solcant purgari, neque minus etiam illi proderit, diligenter libros seplasiariorum legere, in quibus illi medicamenta ex medicorum suorum præscripto describunt, ita enim non multo tempore, si diligens fuerit, eorum ferè omnium, uel saltem quæ in maiori usu sunt, peritiã assequi poterit; sed neque hoc prætermittendum est, quod non pauci momenti est, nimirum, quod quotiescunque iunior circa dosim alicuius medicamenti præscribendam dubius fuerit, potius partior esse debet, quam liberalior, hoc enim Auic. 4. fen. primi canon. monuit, cum dixit, melius esse in purgando, uel alioquin euacuando, infra subsistere, quam exquisitissime uacuare, cui sententiæ consensere Hippo. & Gal. 1. aph. qui præcipiunt uacuationes immodicas esse fugiendas, ut quæ periculosæ sint, nam facilius deinde est, repetita uacuatione per alterum medicamentum, addere id, quod in priori uacuatione defuerit, uel aliquo clysteri leuius medicamentum adiuuare, & detrahare id, quod motum, nec tamen eductum fuit quàm immodicam uacuationem reprimere, & corpus, post factas

imbe-

imbecilliores ex nimia uacuatione vires, reficere. Nec minori diligentia vti medicum oportet circa medicamenta, quibus usus est: vt videlicet perspectum habeat: quomodo illa se habeant, nimirum an pharmacopola, apud quem diuertitur, sit vir bonus, & in eligendis, & emendis optimis quibuscunque medicamenti peritus, & diligens, atque in illis recte seruandis sollicitus, num item medicamenta noua sint, vel iam inueterata; noua enim plerumque fortiora sunt: huiusmodi autem animaduertere plurimum expedit, neque aliquid est, quod maiorem medico honorem, & ægrotantibus vtilitatem possit asserre, cum hinc non parum viribus medicamentorum, & addatur, & detrahatur: verum & loci, in quo medicamenta nata sunt, & vnde allata, ratio nobis habenda est: nam locus multum, aut viribus medicamenti addit, aut de illis detrahit: & fortasse id in causa fuit, vt tanta inter probatores medicæ artis authores in pondere, & quantitate simplicium medicamentorum præscribendis varietas exorta fuerit, quantum superius ostendimus: nam ut à scammonio exemplum petamus, Dioscorides illud aliis præfert; quod in Mysia Asiæ Prouincia oriatur: unde triobolū dari, hoc est samidragmā cēsuit, credo enim magis huius sententiæ fuisse Dioscoridem, quàm quod integram dragmā ausus sit concedere, arbitror mendum esse in libris etiam Græcis, & ita putatum Paulum, tum Actium voluisse, Arabes verò, & præsertim Mes. illud, quod in Antiochia colligitur, anteponunt: at Plinius Colophonium, mox Pirrenense, crediderimque fortè, quod mitius erat scammonium ex Mysia allatum, unde & liberalius poterat cōcedi, acrius verò id, quod ex Antiochia, quo Mesue. & alii, quos ille sequutus est, utebantur, & ideo timidiores fuere, neque istud sanè nostrum commentum est; sed hoc primus, quem legerim, animaduertit Auic. cap. de scammonio: quod autem ex loco, & regionibus medicamentorum vires mutantur: nullus sanus medicus unquam ignorauit: possumus autem nos id exemplo à iunioribus accepto demonstrare; nam Rha. si respiciamus, ad antiquos, qui de eo scripsere, Græcos inquam, illi Ponticum tantum nouere: Arabes vero & illud, quod Barbarum nuncupatur, quod ad nos nunc, vel ex Persia, vel ex India fertur: & vt doctissimus Manardus scripsit, qui vtrumque vidit, & illud ex Pōto à sarmatis allatum, & hoc nostrum, quo utimur, videtur ad vnā speciem vtrumque pertinere: nostrum tamen odoratissimum est, cum

cum Ponticum odoris insignis sit expertis: quod (ut ille retulit) & si purget, longè tamen minus efficax est, quàm nostrum: unde antiqui nunquam illud inter ea medicamenta recensuerunt; quæ aluû quoquo modo ciant; nostrum uerò uim eam ciendi habet, & eam quidem satis insignem, quæ diuersitas non nisi à loco, uel regione oritur, sed de his satis. Porro nec minus à medico considerandus est modus, uel ratio, quæ uti medicamentis his uolumus, nempe hunc crudis, uel coctis: præterea, solis ne, uel aliis additis, præsertim uerò illis, quibus, si quid malitiæ est in medicamento, corrigitur: nam si de eis medicamentis sit sermo, quibus decoctis uti solemus, sicuti sæpe scammonio, interdum colocynthide, sæpius polypodio, epithymo, quandoque uerratro nigro, uel semine cnicî, uel (ut Arabes,) cartami, turbith, item semine, & flore genistæ utimur, cû per decoctionem eorum acrimonia mitescat; & malitiæ obtundatur: primùm, quia per decoctionem partes acriores, & igneæ, partim ui concoctionis digeruntur; partim cum aliis magis mixtæ temperatiores fiunt, deinde uerò, quia solent plerunque ex alia re coqui, quæ, aut caliditas obrûditur, aut acrimonia, aut tãdem quicquid in ea sit, de quo timemus, ne uentriculi, uel aliorum uiscerû uires lædat, liberaliores in eorû usu esse possumus: nam ut scammonium primùm tanquàm in exemplum proponamus, id cum parari uario modo soleat, inodus is præsertim ab omnibus probatur, ut ex malis id fiat, aut communibus, aut cotoneis, per coctionem autem paretur, ex malis quidem communibus ita, ut accepta olla, aut testaceo, & mundo uase, malis primùm fundus ad certâ crassitiem, uerbi gratia digitalem, sternatur, deinde tantundem scammonii imponatur, mox iterum tantundem malorum superponatur, & sic subinde, donec uas plenum fuerit, mox aut carbonibus accensis, aut in camino imposito uase, atque eo optime triticea pasta operato, quantum satis sit, coquatur; satis autem coqui dicemus, cum mala induruerint: in cotoneis etiam coquunt, atque ita coquunt; illis acceptis, extracta duriori illa parte media, in qua semina continentur, recisa tamen superiori quasi lamina, in cauum partem scammonium induunt, illâ replentes, mox lamina, quæ prius fuerat recisa, additâ, cooperiunt, triticæq; pastam circumquaq; malo cotoneo obducunt: ac ita coquendû apponunt; quosdâ tñ uidi, qui succo ex cotoneis expresso, eo scammonium macerantes parant; sed omnibus in cõperto esse potest, per coctionem longè magis scammonium

monium mitescere: nam, vt rectè, hac saltem parte, monuisse mihi videtur Mesue, per decoctionem acrior eius pars, & quæ ferosior est, digeritur, & absuitur, sed & id, quod à calore ventriculi in statum digeritur, qui ventriculum distendere, & subuertere solet, per coctionem etiam discutitur, per quam item quasi maturescens, lenius, & minus nocuum euadit: ex cotoneis verò, quæ moderatè astringunt, purgatoria eius vis hebetior fit: vnde & tutius, & cum minori molestia fit purgatio: insuper verò liberaliores esse in vsu eius possumus, cum diagridio utimur, sic enim scammonium ex cotoneis per coctionem paratum appellant, quàm cum crudo utimur, licet sit ex eo succo per macerationem paratum: & mea quidem sententia, licet cotoneorum succus astringendo maius ventriculo, & reliquis visceribus robur, quàm alia communia mala, asferre possit, & magis vim solutoriam obtundere, tamen, cum ex aliis malis scammonium coquitur, plus ad temperandum, & moderandum eius violentum motum, & acrem qualitatem coctura potest; quàm astringens, & refrigerans succi illius crudanatura: quare & amplior eius dosis concedi potest; quàm do ex malo cotoneo quàm quando ex aliis malis coctum est: item magis, cum ex his, quàm quando ex maceratione in succo cotoneorum: & magis ad purgationem videtur facere, cum ex hoc succo paratum est, quàm si sine hoc detur: quod autem de coquendo scammonio diximus, illud idem aliis aptari potest, nempe, vt semper & cocturæ rationem habeamus, & eorum, in quibus, vel cum quibus coquenda sunt: his nimirum bene perpensis, non solum quatenus ad eorum qualitatem pertinet, sed etiam ad quantitatem, sicuti, vt exemplis etiam agamus, diximus superius; fuisse antiquos solitos medicamenta purgantia cibis incoquere; præsertim verò ptisanæ, quia nullus fortasse cibus est huic negotio aptior: nam potest refrigerando, humectandoq; siccitatem, & calorem eorum remittere, lenitate acrimoniam, & exasperationē lubrica eius natura, & sua deterfione id efficere, vt citissime vis medicamentosa ab ore ventriculi, cui est maxime noxia, descendat; unde tantam vim habet hæc coctura, ut, quemadmodum prius monuimus, idèò medicamentum potius medicamentosus cibus sit, quàm simpliciter, & absolutè medicamentum, vel saltem ad ordinem mitissimorum medicamentorum deduci possit, ita ut antiqui sint ausi in viscerum inflammationibus, & acutis morbis illis vix: post ptisanam

sanam est ius pulli gallinacei iuuenis, quod facultatem: vt Gal.& Anic. testantur: omnem succorum acrimoniam temperandi habet: proxime etiam ad hæc ferculum ex farre accedit, neque panis ex iure, uel aqua coctus mihi ab hoc negotio esse alienus uideretur; præsertim si lotus sit prius: item & ius album antiquis in maximo usu fuit, & alia multa ferculorum genera, quæ ad huc usum possunt transferri; sicuti ex lente, & id genus aliis; ut Dioscorides etiam docuit: sed si quis iure lentium tuerit usus, id etiam illi considerandum est: multum referre, an primum illud ius sit, prima uidelicet aqua non abiecta, in qua primum ferbuerit, ac altera addita, in qua postea plene coquatur, nam nisi mutetur aqua, dum lens coquitur, ius illud aliquid nitrosi à cortice lentis contractum retinet, quod ad alui deiectionem facit, & calidius: aliquāto est: alterum uero ex abiecto priori, & altera superinfusa potius fluentem aluum supprimit, quàm cieat, astringit siquidem: quod fit, ut hoc ius magis purgatoriam medicamenti uim reprimat: unde magis uentriculi robur tutum ab ea noxa seruabit, quam illi solent medicamenta hæc afferre; primum uero, & si communi ratione, cum in cienda aluo imbecillius sit alijs purgatorijs medicamentis, eorum quoquomodo uires possit remittere, minus tamen, quàm alterum reprimet, cum non sit adeò astringens, sed potius aliquo modo illa iuuat: unde in secundo purgatoriũ medicamētũ liberalius inspergi poterit, quàm in primo: sed, & copia considerata est, tũ iuris, tũ aliorum ferculorũ, uel decoctorum, uel aliorum alioquin liquorum, in quibus purgatorium medicamentum inspersum, uel maceratum, & dilutum, uel etiam decoctum exhibemus: quia, sicuti uinũ, quod magis aqua diluitur, eo & magis temperatur; imò & eius potentia remittitur: nam si cyathis uini cyathum aquæ addideris, minus potens erit, quàm si tantũ semicyathum, quāuis totum bibatur: ita si semiscrupulũ scammonii, uel ueratri in unciijs tribus decocti alicuius, uel alterius liquoris incoxeris, aut insperferis, uel maceraueris, ualentius omnino medicamentum erit, quàm si sex unciijs indideris, & hoc in uniuersum intelligendum est: quod quotiescunque purgatorio medicamentũ ea addiderimus, quæ minus aut uim, aut acrimoniam, aut aliqua incommoda, quæ in eo sunt timenda, corrigendi habent facultatem, quod ea maiori addiderimus copia, eo etiam tutius illis possumus, tanquàm facilioribus, uti: nec modò id in simplicibus, uerũ & in compositis, ut inferius dicemus, hanc eandem retinere rationem:

rationem: nisi ea sint addita, quæ exacuant, & vim medicamenti maiorem reddant: particularim uerò quæ sunt, quibus soleant, uel possint uti medici in corrigendis, aut temperandis, aut reprimendis purgatoriis medicamentis, nolumus in præsentia exponere, quia & libellus noster nimis iam, & supra id quod putabamus excreuit: præterea hæc diffuse ab antiquiorib. medicis, Paulo, Aëtuario, Mesue, Serapione sunt literis tradita, & opportunum iam esse uidetur: ut de compositorum medicamentorum usu; quibus in purgandis agrotis frequentius his nostris temporibus utimur, uerba faciamus: nam si de omnibus, quæ scripta apud authores sunt; sermo nobis esset habendus, nunquam ferè coronidem huic libro imponere mus, & præter utilitatem longiores iustò essemus, cum istis recte perceptis facile deinde possint & alia cum his collata percipi.

De compositis medicamentis, quibus medici solent in purgandis corporibus uti. Cap. I.

DE compositis quidem medicamentis. secus omnino censendum, ac de simplicibus censuerimus, nam quamuis illa ex his conficiantur, & uires suas ab his mutuentur, & hæc, quantum ad uires, & ad corrigendi rationem, & ad dosim pertinet, omnino experientia penitus percepta sunt; composita tamen primùm, neque recte confici, neque confecta iudicari, neq; in usum tutò deduci possunt, nisi rationali methodo innixi fuerimus: ita tamen, ut experientia sit perquam necessaria: hoc enim Gal. testatus est, tum alibi sæpe, tum uerò quarto de compos. medi. per genera, ubi ita ait, ut medicamenta citra rationalem methodum componi nequeunt; ita citra experientiam nemo uim eorum certò, & accurate scire poterit; quia, ut idem quinto de san. tuen. testatur, experientia fidem inuenti medicamenti comprobatur, unde & id medico, iuniori præferim, consuluerim, ut omni sua ope iis medicamentis compositis utatur, quæ & in frequentiori usu sint, & sæpius fuerint experta: atque probatissimorum medicorum, & iuniorum, & antiquiorum sequatur experientiam; neque ex usu nouorum medicamentorum, sub quodam secretorum prætextu, fauorem, & popularem auram afficiet, nouissimum enim ille debet, quod omnes antiqui in hoc consentiunt, medicamentum id, quod plures experti sunt, illi esse, quod experientia comprobatum non est, longo intervallo præferendum: unde Gal. quinto de compositio. medicament. secundum

Cap. I. cir-
ca h.

Cap. II.

secundum loc. hoc institutum sequutus ait, quæ ex consentiente experimento iudicata sunt, ea stabiliora sunt: & ob id etiam 6. de tuen. sanit. cap. 14. semper in vsu medicamentum experientiam, quæ illa comprobata sunt: pro norma esse habendam consulit, & eò vsque progressus est; ut nequæ aliqua medicamenta tanquam vtilia conscribenda, & publicanda esse censuerit; nisi prius experientia fuerint probata: utrisque ergo tanquam instrumentis purgatoria medicamenta examinanda, & æstimanda sunt, ratione nempe præcedente, & experientia subsequente. Hoc ergo quasi fundamento iacto magis particulation negotium hoc tractemus, & cum medicamenta aluum soluentia (de compositis nunc quidem loquor) si formam, & consistentiam respiciamus, partiri in duplicem differentiam possint; in ea nimirum, quæ passim electuaria dici à iunioribus medicis solent, qui Arabes in hoc sequuntur, & in catapotia, quamuis non negauerim, quòd ex zuccharo parentur medicamenta, & quòd ita parentur, ut in quasdam veluti placentulas solidioris formæ redigantur, quæ (vt diximus) vulgò, sicut alia dulciaria, confectioes dicuntur, & quòd fiant pastilli, vel trochisci, qui vim purgandi habent, ut qui à violis nomen habere, præterea & pulueres, fiantq; etiam syrupi, omnia tamen hæc possunt ad has duas differentias referri; neq; enim pastillis nisi in catapotia, aut puluerè redactis in purgâdo utimur; pulueres verò aut aliquo liquore dilutas bibēdas damus, aut melle, vel syrupo assumptas ad modum electuarii deductas exhibemus: syrupi verò nonien potionem significat, dilutis verò electuariis utimur, sunt enim ex his potiones; sed de his primùm agemus, mox verò de catapotis, vt tamen istius meminerimus, quod nobis non parum ad breuiorem doctrinam facere poterit, nempe quòd composita medicamenta, quibus in purgandis corporibus utimur, si ea, ex quibus conficiuntur, melle excepto, contusa possunt in puluerem redigisilla in quemcunque modum, & formam voluerimus, parari possunt: nam assumptis pulueribus ex melle, vel aliquo syrupo fiet, quod vulgo electuarium appellamus, sin autem dissoluto zuccharo ex aliqua aqua, vel aliquo decocto decoquatur ad absorptionem ferè liquoris, ex quo fuerat dissolutum, moxq; vase ab igne detracto pulueres inspergantur, fieri placentulæ possunt; quæ vulgò confectioes dici à seplasiariis solent;

E nemo

nemo autem non videt ex eisdem pulveribus posse & pillulas, vel catapotia fieri, si tantillum alicuius liquoris superinfundatur, quanto possint assumptæ pulveres colligi, & consistere, & cum purgatoria medicamenti vis ex pulveribus pendeat, unusquisque videre potest, quod maiorem vim habet pillularum dragma; quam semuncia medicamenti aliis modis parati, quia solent pharmacopolæ, dum medicamenta parant secundum alios modos, quibus parantur, quæ confectioes, vel electuaria appellari diximus, ad libram mellis, vel zucchini tres specierum uncias iniicere: quibus & id accedit, quod, ut superius fuit expositum, quod maior est copia materiæ, quæ ijs, quæ purgandi vim habent, immisceatur, eò robur in purgando remissius, & mitius fit: sed de his satis. Agamus tandem particulatim de his medicamentis, quæ electuaria in præsentia appellant, in qua tractatione, quæ de iis dicemus, ad ea etiam erunt referenda, quæ vulgò confectioes nuncupari diximus: neque tamen omnem horum medicamentorum compositorum sylvam complecti hoc capite volumus; quorum descriptiones in quibuscunque libris de medicamentis à celebribus medicis editis perspicere possumus: nam ut iusto longior, ita & superuacuis esset eiusmodi labor; sed eas tantum descriptiones sectabimur, quæ frequentiores sunt, & in maiori, & frequentiori usu: porro cum præsens institutio versetur circa ea medicamenta composita, quæ purgando corpori apta sunt, purgatio verò necessaria tantum est, ut sapienter Gal. & Hipp. docuerit: ubi copia est vitiosorum humorum: ubi enim citra materiam est affectus, corpusque mundum fuerit, imperiti hominis esset vel meminisse uacuationis; unde etiam Hipp. eam sententiam protulit, quod sana corpora exoluuntur ab usu medicamentorum; & proinde primum superuacuis, & vitiosus humor purgandum esse indicat, in purgatione verò ratio præterea habenda est præter naturæ corporis purgandi vires, etiam ætatis, temporis & regionis, ubi sit purgatio: quare in medicamentorum compositione, electione, & usu, hæc omnia respicienda sunt, nam cum omnia simplicia medicamenta, quæcunque vim purgandi habent, si vere purgatoria sit ea vis, calefaciant, exiccent, corpus turbent, vires laxent, & dissoluant, hæc omnia nobis in causa sunt, cur potius compositis (ut superius fuit expositum) quàm simplicibus utamur medicamentis purgantibus ut obsistamus

mus omnibus illis incommodis, quæ assumpta medicamenta sequi solent, & quamvis primum & præcipue sit considerandum, ut id eligamus medicamentum, quod eum humorem detrahendi vim habeat, quem aut putamus in præsentia ægrotanti corpori negotium facessere, aut, ne in posterum faciat, dubitamus, quia tamen medicamentum correctione eget, neque semper expedit, ut eisdem corrigatur, quia alia corrigentia opportuniore sunt aliis in morbis, ut in calidioribus, vel frigidioribus: alia in aliis ætatibus, ut senili, vel iuuenili: alia in aliis temporibus, ut æstate, vel hyeme: alia in aliis naturis, ut calida, uel frigida temperatura: præterea in imbecilliori, & laxiori uentriculo, atque adeo etiam in uniuerso corporis habitu, aut infirmiori, & solidiori: inde pro horum omnium ratione diuersis, & variis medicamentis opus erit, ut morbos curare commodè, & citra noxam medicus possit; undè cum prima, & præcipua indicatio sit, quæ ab affectu, vel eius causis accipitur: ideo basis (ita enim solent iuniores loqui in componendis medicamentis) inde accipienda est, reliquorum verò, quæ illi addenda sunt, ratio ab aliis postea, quæ præterea exposuimus, erit petenda: primum itaque medicamenta, de quibus sermonem sumus habituri, distinguemus secundum eorum humorum rationem, ad quos purgandos exhibentur, & cum tres sint purgandorum humorum differentie, tres iidem erunt ordines, vel potius quatuor medicamentorum, de quibus agemus; nam aut simplices sunt humores, aut mixti, simplices, ut bilis utraque, & pituita: primum itaque de his, quæ purgandæ bili potius accommodata sunt, tractationem instituemus, mox de his, quæ pituitam purgandam vim habent: tertio de iis, quæ atram bilem purgant:

postremò ea subiungemus, quæ plures, & diuersos humores simul purgant.

*De usu, & compositione medicamentorum, quæ bilem flauam uacuant,
quæque pituitam, & quæ plures humores. Cap. 16.*

Medicamenta composita, quæ vulgò electuaria nuncupantur, teneram quidem substantiam, & quasi eorum medicamentorum consistentiam habent, quæ eclegmata à Græcis, loch ab Arabibus dicuntur; ab aliquibus autem posterioribus medicis communi antidotorum nomine appellantur, eorum cum multa sint purgando corpori apta, non omnia in hunc locum congesta exponemus, sed ea duntaxat (ut sæpe monuimus) quæ his temporibus in Europa ubique ferè in frequenti sunt usu, & apud omnes pharmacopolas conficiuntur. Hæc itaque in maiori usu habentur, diaprunon, vel diadamasconon, quod à prunis, præsertim damascenis, idèd nuncupatur, quia medicamenti huius non dixerim (ut iuniores loquuntur) basis, & præcipuus scopus, sed potius in hac compositione materia sunt. De eo autem in præsentia loquimur, quòd solutiuum appellant, addito uidelicet scammonio; (non solutiuum enim in lenientibus medicamentis ponimus) Alterum uerò est, quod ex succo rosarum conficitur, & ab eo etiam appellationem habuit, & vtriusque auctor, aut saltem expositor fuit Nicolaus. Huic etiam negotio accommodata item sunt duo ex Mesuë libris decerpta electuaria; alterum, quod rosarum Mesuë uulgo dicitur, diuersum quidem ab eo Nicolai; alterum uerò, quod ex psilio, hoc est ex succo, uel mucore ex semine psilii per eius conuassationem ex aqua extracto, conficitur, à quo & nomen habuit. Hæc si in examen aliqua adhibita diligentia reuocauerimus, satis fore putamus: nam si aliqua præterea reperiri possint medicamenta, quæ huic præsentii instituto possint accommodari, si illa cum his conferantur, & ad horum examen reuocentur, facilis quoque cognitu erit eorum ratio: sed prius aliqua fundamenta iaciamus, quæ his rebus, de quibus nunc agimus, non parum lucis sunt allatura: porrobilis, quam detrahendi vim habere hæc medicamenta omnibus in confesso est, primùm humor est, qui substantia est tenuis, qualitatibus uerò calidissimus, siccissimusq; aliorum omnium, acris, & mordax, sapore amarus; unde omnes morbi ab hoc humore excitati, ardentes, ignei, & acuti sunt, qui præter dolores, & incòmoda, quæ afferunt,

afferunt, præsertim hoc mali habent, quòd corpora accendunt, & quasi urunt, argumento sunt ardentes febres, quæ causi Græcè dicuntur, tertianæ, æresipelata, herpes, pleuritides, phrenithides, ophthalmizæ, & id genus morbi. His uerò & illud addendum est, quòd ut bilis, quemadmodum Hip. & Gal. in lib. de natura humana testati sunt, & suis qualitatibus in regionibus, tempestatibus, temperaturis, anni temporibus, maxime uiget, & dominatur; ita in omnibus temporibus, regionibus, tempestatibus, naturis, ætatibus, omnia morborum genera possunt pro uariarum rerum occasione excitari; frequentius tamen excitantur in orbi, qui conformes naturæ sunt temporibus, ætatibus, & reliquis nuper expositis conditionibus: unde istiusmodi, quos ex bile ortum habere diximus, morbi frequentissime in iuuenibus, & natura calidioribus corporibus, atque locis, & tempestatibus calidioribus, atque æstate medicis negotium solent facessere. At uerò cum simplicia medicamenta, quæ eiusmodi humorem medicari, id est purgare illum possunt, insigniter calida, & sicca sint, & acria, præter id quòd (aucta nimirum intemperie à calido, & sicciori humore impressa) non parum possunt obesse, humoris quoque calorem, & acrimoniam, tum calida, & sicca sua temperatura, tum etiam motu, cum motus calefaciat, exacuunt, quò fit, ut præterea uiscera laxata enerventur: unde neque administrari tutò medicamenta possunt, nisi his omnibus incommotis prospiciamus: quatenus enim ad acutos morbos pertinet, quàm cautum in usu soluentium medicamentorum esse medicum oporteat, ostendere Hippo. & Gal. multis in locis, præsertim primo aph. sed & quantum horum medicamentorum usus noxius esse possit æstuosis temporibus, & locis, cum quibus etiam ætas, & naturalis temperies corporis calidior consentit, ostendere iidem 4. aph. quo loco & robur corporis à ui medicamentorum exolui apertè pronunciauit Gal. unde cauti, & in arte periti medici hæc omnia prospicientes compositiones medicamentorum excogitarunt, quibus possent tutò, & cum opus illis fuerit, uti, quia soluentium quidem uim purgatoriam moderatam retinent, si quis modeste & opportunè utatur, ad eò autem uis calefaciendi, & siccandi temperatur, & ipsorum acrimonia obtunditur, roburque uisceribus additur, ut hac ratione præparata insignem aliquam noxam in purgandò corpore non possint afferre, immo (sic enim in purgationibus admonerat

Com. 24.

Com. 5.

Gal. eodem 1. aphor. planè videmus maiorem nòxiis humo-
 ribus uacuatìs ex purgatione sequi vtilitatem, quàm id sit, quòd
 sæpe ex medicamentis necessariò sequitur, detrimentum: sed rem
 hanc magis particulatim explanemus, eo medicamento in exem-
 plum proposito; quod diadama scenon nuncupari à prunis dama-
 scenis superius diximus, hoc tamen prius considerato, quòd istius
 compositionis duplex est ratio; nam primum sine scammoniò sit,
 & vulgò non solutiuum appellant, quod si ita fuerit confectum,
 ad præsentem tractationem non pertinet; neque enim in his me-
 dicamentis ponendum est, de quibus is sermo in præsentia insti-
 tuitur, sed magis in lenientibus, vt & superius monuimus, sed, vt
 de solutiuo plena habeatur notitia, de simplici antea dicendum vi-
 detur: conficitur autem ex prunis, ex uqua coctis, & per cribrum
 transmissis; in quorum decocto inspergantur uiolarum recentiu,
 aut aridarũ flores pondere sesquiunciaz, qui ubi paulisper incocti
 fuerint, percolètur, postea uerò illud prunorum, & uolparum deco-
 ctum accipe, & libris duabus zucchari additis ad consistentiam sy-
 rupi coquatur, addito prunorum succo, qui ex tribro fuerat colle-
 ctus, ad pondus libræ; ubi autem spissior fieri per decoctionem ex-
 pit, accipere oportet tamarindos, & interiorem cassiæ egyptiæ me-
 dullam, singulorum uerò unciam unam, utraque autem ex eodem
 decocto dissoluantur, & colata medicamento indantur, ac ad con-
 gruam spissitudinem coquantur, semper cum spatha, ut aiunt, mi-
 scendo, & agitando: postremò uerò inspergatur, & immisceatur is
 puluis, uidelicet, ut accipiantur sandali rubei; & albi, spodion, rha-
 barbarum, cinamomum, singulorum dragmæ tres, rosarium arida-
 rum, uiolarum, seminis portulacæ, scariolæ, berberis, succi liquiri-
 tiæ, tragagathi, singulorum dragmæ duæ, seminum eiergii, sine cu-
 curberis, melonis, cucurbitæ, mundatorum, singulorum dragmæ;
 omnia contusa, & cribrata in tenuem puluerem deducantur, cum
 quibus huiusmodi electuarium conficiatur: simplex itaque com-
 positio, quæ & non solutiuũ dicitur, in hunc modum se habet: in
 qua (si rem rectè uelimus examinare) præcipuum medicamentum,
 & quod confectiõis huius est, vt loqui sunt ores nostri solent, ba-
 sis, sunt pruna, quæ, vt Gal. 2. de ali. facul. ait, sua humiditate, &
 lentore, nempe leniendo, aluum subducunt: Arabes uerò illis
 vim aliquam bilem detrahendi concedunt, refrigerant uerò mo-
 dicè; cætera autem propter aliquam commoditatem adduntur;

quia

quia enim modicam vim pruna habent, addit author huic compositioni tamarindos, & interiorē cassiæ medullam, quæ & si ferè ad idem genus medicamenti, tam humoris purgandi ratione, quàm modi, quo cienti aluum, pertineant; omnino tamen maiorem vim subducendi habent, præter id quod magis refrigerant tamarindi, magisque feruorem bilis extinguunt, augent quoque vim prunorum, eaque non parum iuuant: at verò quia illius, qui componendum sibi proposuerat hoc medicamentum, scopus erat, ut commode in biliosis, & acutis morbis, & calidioribus temporibus eo possimus uti: idèò nondum ex his nidebatur compositio vim tantam refrigerandi habere, quantum ad id satis esset, idèò violas addit, quæ magis refrigerant, & leniunt, fructus autem berberorum (quos idem esse volunt, quod oxiacantha apud Dioscoridem) semina scariolæ, vel seridos, cucumeris, melonis, portulacæ, & cucurbitæ, quæ & refrigerant, & aperiunt, & proinde præter refrigerationem eam præstant utilitatem, ut possint etiam vias aperire, ac faciliorem transitum humori educendo parare; succus verò liquiritiæ, & tragacanthum lenire, & remittere acrem, & mordacem bilis naturam possunt; ne, dum transiunt partes sensus participes, molestiam, purgando, vellicando, & mordendo, corpori afferant: quia tamen eiusmodi omnia partim refrigerantia, partim humectantia ventriculi, & aliorum uiscerum substantiam laxam, & languidam possunt reddere; idèò, ut & huic in eomodo occurreret, (& rectè quidem expedire arbitratu est) rhubarbarum addidit, quod omnia uiscera colligendo laxam eorum substantiam roborat, & quod ad primum scopum non parum facit, potius bilis educationem adiuuat, quàm quod eam possit impedire, sed & cinamomum, quia & ipsum robur addit, & uentericulum mirifice roborat, & gratò odore gratiam illi conciliat, & cordi amicum est; quod uitæ fundamentum est: merito ergo posteriores omnes summis hoc medicamentum latidibus esse sunt, tanquam morbis, & temporibus calidioribus accommodatissimum: sed hætenus quid præter præsens hoc nostrum institutum euagati sumus, talis igitur sit diaphrani compositio, quæ si, ut ait Nicolaus, uoluerimus ex lenitiua laxatiua reddere, cuique iam huius compositi medicamenti libræ septē diagridii dragmæ sunt immiscendæ; sed hic parumper consistendum, & considerandum; quod additum scammonium medicamenti ordinem & na-

turam mutat, quia amplius in numero lenientium non est, sed iam ad genus eorum pertinet, quæ vere purgatoria sunt, & solvendo, bilemque attrahendo liberaliter corpus vacuant, neque tunc amplius eius medicamenti præcipuum fundamentum sunt pruna, sed tota earum compositio tanquam apta, & commodam illius medicamenti materia facta est: & primum nunc locum obtinet scammonium, nam quod ualide bilem attrahat, hoc scammonio acceptum refert, reliqua uero, quæ in compositione posita fuere, ad id faciunt, ut facilius, & minori agitatione, atque adeo etiam minori purgandi corporis noxa hat bilis purgatio; dum prior compositio corpus leniendo iuxta præceptum Hippocr. fluuidum illud efficit, acrimoniam scammonii reprimat, refrigerando calorem eius temperat, modica astrictione simplicium quorundam, ut rhabarbari, cinamomi, berberorum, laxitatem, quam afferre solent laxantia hæc medicamenta, corrigit: unde medicamentum istud adeo moderatum, & tutum redditur, ut eo facile, & sine timore uti possimus in temporibus etiam, ætatibusque, & regionibus, atque constitutionibus calidioribus, ac item in acutis morbis, quando opportuna purgandi occasio fuerit. Sed nonnulla prius consideranda sunt, quam ad alia transeamus. Primum enim scammonium post absolutam medicamenti concoctionem adiicit Nicolaus, quia cum iam prius seorsum coctum in malo cotoneo fuerit, opus illi non est, ut iterum coquatur, nimis enim eius uis dissolueretur, quod in alijs etiam compositionibus aduertendum est, ne, npe, ut cum diagridii fit mentio, id non indatur, nisi post eorum, quæ coquenda sunt, concoctionem. Deinde uero quatenus ad eius pondus, seu dosim metiendam pertinet, hoc ignorandum non est, quod semuncia, ut quotidie experientia ostendit, ea eius portio est, quæ plures liberaliter quidem, sed citra noxam solet purgare; dum enim Venetijs medicinam facerem, animaduerti uulgares, & minus artifices sponte sua, sine medicorum consilio, cum purgari uolebant, ad pharmacopolas accedere, ab hisque efflagitare, ut semuncia succi prunorum sibi traderetur: ita enim ipsi hoc medicamentum appellabant, & medicamento, ætate præsertim, accepto, facili, & sine ulla molestia, ac liberali fruebantur purgatione; neque tamen hoc exquisitè in omnibus seruandum adeo est, ut putemus nunquam id pondus esse uariandum, rarissime

rissime tamen id est excedendum, interdum etiam minus dari-
 dum pro ratione roboris, corporis, ætatis, facilitatisque, & lubri-
 citatis, ut & in leuioribus medicamentis superius monuimus.
 Tertio & illud est animaduertendum, quod hæc, quæ nuper expo-
 suimus, ita intelligenda sunt, ut locum habeant, quando solo hoc
 medicamento uteremur, quia si eo tanquam stimulo aliorum me-
 dicamentorum uteremur, sicuti si cassiæ addere uellemus, aut le-
 nituo appellato electuario, uel alteri alicui medicamentorum, nõ
 erit integra hæc dosi seruanda, sed minorinam tantum addendum
 erit, quantum alterius medicamenti infirmitas, & purgandi cor-
 poris ratio uidebitur requirere, interdum uerò paulò plus. Quar-
 to etiam id considerandum, quod iunioribus medicis fortasse
 dubitationem afferet, quia ea nimia uidetur esse istius medica-
 menti copia, quam nos diximus habendam pro ea dosi, quæ
 communi ratione pluribus potest esse satis; nam semuncia scrup-
 ulum ferme diagridii, uel saltem uiginti grana comprehen-
 dit, cum tamen Mesue ad grana duodecim ultimum terminum
 præscripserit. Huic obiectioni facilius potest esse responsio, si cor-
 quæ superius fuere exposita, simus memores; neque enim nunc uo-
 lo repetere, quod alii non minoris, quàm Mesue, auctoritatis me-
 dici, secus sentire, & ampliores terminos huic dosi constituere,
 sed seruata etiam Mes. auctoritate dicimus, quod sciamonii ratio,
 alia quando in Diagridium (ut iuniores appellant) mutatum
 est; hoc est quando ex malo cotoneo paratum, & correctum est:
 item quando solo eo utimur, & quando in compositionibus: dum
 enim aliis miscetur, ut superius declarauimus, eius uis remittitur:
 sed & huic rationi mox & experientia adstipulatur, & ita eorum,
 quæ ad composita medicamenta pertinent, cognitio, & peritia ab-
 soluitur, quemadmodum enim sæpe Gal. prædicat, ducit ratione
 medicamentacomponuntur, & inueniuntur: sed postea exexpe-
 rientia probantur: in his fuimus longiores, quia accommo-
 dari sequentibus etiam poterunt. Sed iam ad alterum medica-
 mentum ex succo rosarum confectum transeamus, quod hoc
 modo conficiunt: accipiunt zuecharum, & rosarum succum,
 singulorum uncias sexdecim, atque illis simul coctis syrupum
 faciunt, eo modo quo syrupi recte parantur, cui syrupo hos pul-
 ueres addunt: accipiunt tres santalorum differentias, album uide-
 licet, rubrum, & citrinum, singulorum autem. drach. vj. spodi,
 drach.

drach. 3. diagridii, hoc est scammonii ex cotoneo cocti drach. 12. camphoræ drach. 12. omnia contusa, & in puluerem redacta inspergenda, & ita insiliscenda diligenter, ut ad consistentiam, & formam appellati non electuarii deducantur. quod si cum diadamaſceno conferatur, primum, quatenus ad primum, & præcipuum scopum pertinet, similem atq; ferè rationem habent, si uerò ad uim, & facultatem purgatoriam respexerimus, basis seu præcipuum medicamentum simplex, in utroque est scammonium, cuius primaria facultas est bilem uacuare, reliqua uerò tantquam adiuuantia apponuntur, ut faciliorem, & cum minori molestia, & noxa reddant operationem, quam scammonium redderet quod alioquin uolentum medicamentum est, nam primum omnia refrigerant, & astringunt, quamuis enim rosarum succum Mes. dixerit esse calidum, & ferè ad primum usque caliditatem ordinem redegerit, Galatamen in refrigerantibus 10. meth. Illum ponit, & tertio de simpl. medicamentorum facultatibus si græca, & manuscriptoria; & antiqua exemplaria sequamur, uentriculo item, & cordi, & omnibus uisceribus aptius est, tum modice astringendo, tum uero grato odore, quasdam tamen partes calidas immixtas habet, quibus detergere, digerere, & aperire potest, in quibus amaritudo, & aromaticus etiam odor fundatur, sed & tantali refrigerant & astringunt, unde & languenti, & æstuanti uentriculo, cordiq; ex calidiori aliquo affectu laboranti opem ferunt, mitificesq; succurrere creduntur: de spodio uerò non habeo quid dicam, nempe an credam spodium hoc, cuius Arabes, & Nicolaus meminere, esse rem nostris incognitam: neque de camphora etiam sermonem habeo, creditur tamen refrigerare, quamuis acrem, & quasi grauem odorem spiret: in purgandi itaque facultate similem ferè medicamentum hoc priori est, nisi quod (ut nunc dicemus) mea quidem sententia prius aliquantisper potentius est, quam hoc, aliis autem facultatibus hoc magis refrigerat, nam prius rhabarbarum, & cinamomum recipit, in hoc autem omnia præter scammonium refrigerant: sed & illud ex prunis leniendi, & humectandi uim maiorem hêt, nã & prunorum succus, & cassia leniunt, & humectant, & uisq; & liquiritiæ succus, & tragacanthû, roseq; hoc aut magis desiccant, omnia enim in eo siccant, unde & maior in hoc est laxiorum uiscerum astrictio, & roboratio: & ideo accommodatius est hoc medicamentum illis affectibus curandis, quibus calida fluxione sunt excitati, ut

Cap. 9.
Cap. 13.

sunt podagra, chira, & tandem articulares dolores ex tenuioribus, & biliosioribus humoribus ortum habentes; nam præter id quod vitiosos succos detrahât, fluxionemque reprimat, & mēbra astrigendo roborat, & tertianas quidem febres curare potest, quotidianas uerò (ut illi tribuit Nicolaus) nō uideo, quo modo possit, cū calidos, & biliosos succos purgandi uim præcipuam habeat, & refrigeret etiam, ac quotidiana pituitæ uacuationem, attenuationem, & detersionem insignem, præsertim in inclinatione, requirat, nam etsi scammonium pituitam quoque detrahere possit, primum tamen bilem purgat, & alia, quæ addita sunt, potius bili, quam pituitæ temperandæ accommodata sunt; denique ubi uiscerum, & particularum maior sit laxitas, & imbecillitas, hoc ex succo rosarum paratum medicamentum alteri est præferendum; ubi uerò morbus sicciior sit, & sitis uehementior, aliudque magis astricta, mihi magis alterum ex prunis cōfectum probaretur: unde & in tertianis, & in febre ardente Diadamasenon Nicolaus laudat; sed quatenus ad dosim pertinet, cum in priori uoluerit libræ medicamenti scammonii dragmas septem addendas esse, cum solutium facere uoluerimus, huic autem toti cōpositioni, quam ad duarum librarum pondus contraxit (ita enim dixit, quod terila pars totius compositionis, quam suo maiori antidotario descripserat, ut ipse inscripsit, sunt libræ duæ) drag. 12 scammonii addiderit, sex dragmas libræ quæque accipiet; minor ergo scammonii copia in hoc erit, quam in priori, præterquam quod & minor est in hoc, quam in priori, astrictio, & fortiora sunt alia cōsentientia, cassia nympha, & iamanadi in medicamento ex prunis: unde si solū de his hoc ex rosis, uel tantundem, uel etiam paulo plus, quam prius dare possumus. Tertium uero medicamentum, cuius meminimus, est, quod sitidem ex succo rosarum conficitur, describitur à Mesuo; & appellatur, propterea electuarium rosatum Mes. quod quidem, & uiribus, & compositionis ratione priori Nicolai simile admodum est, & quatenus ad scammonii copiam nulla ferè differentia; nam licet medicamentum Nicolai diagridium, hoc est scammonium ex malo cotoneo paratum, & cōfectum accipiat, quod non habeat tantam uim, sicut crudum, & in hoc à Mes. scammonii Antidoti sit mentio, quod refertur ad id, quod crudum est; quia tamen Nicolaus post cocturam addendum præcepit; Mes. uerò uoluit ex zuecharo, & rosaceo succo dilutus eoqui, res tandem eadē euadit,

succi fumiterræ vnciæ tres, quatuor assari, spicæ nardi duæ, mox coquenda; ut tamen semel tantum bulliant, atque post factam ebullitionem indantur illi violarum vnciæ tres, duæ autem epithymi, ac iterum parumper bulliant, deinde coeuntur succi, & commodè exprimantur (liceat mihi vobis vſitatis iis vocabulis uti, ita enim apertius, & dilucidius hæc, quæ nobis proposita sunt, explicabimus) ac illis abiectis ex succo macerentur iterum, per diem, & noctem vnciæ quatuor seminum psilii, vel pulicaræ herbæ; postea mucilaginosus succus omnibus simul conculsis extrahatur: his recte factis accipiendæ sunt quatuor istius mucilaginosi succi libræ: quibus zuehari duæ libræ & semis sunt immiscendæ, scammonii item in pomo cocti vnciæ tres & semis, atque facili coctura omnia mox coquenda, cui subinde inspergendi sunt hi pulueres, ut accipiatur, trochiscorum diarhodon, ex spodio, ex rhabbaro, singulorum vncia, ex berberis semuncia, ut omnia contusa in puluerem redigantur: hic tamen primùm illud est animaduertendum, quod licet in hoc medicamento copiosum ingrediatur scammoniũ, quia tamẽ duplici coctura afficitur, primũ nempe ex pomo, mox uerò iterũ ex succis, & zuecharo quasi syrupus fit: & propterea adeo uis scammonii remissa miscet, ut facile neque plurimũ soluens fiat medicamentum, ita ut turò, cum solo eo usuri sumus, semunciam etiã possimus excedere, sed quatenus ad eius vires, & facultatem spectat, morbis quidem biliosis, & id genus febribus confert, sed, ut & Mel. testatur. iis etiã, quæ curatu difficiliores sunt, nimirum cum bilis exusta iam est, & per asationem crassior facta, vt iam in humoris mēlancholici naturam uergat, id enim folliculorum senæ, & epithymi, & succi fumaris, vel fumiterræ admistio respicit, neque ab hoc scopo alieni sunt succi utriusque, (ut ipse ait) buglossæ: unde quia calidus humor, & asper est, ideo mucilaginem psilii accipit, quæ lenire, & refrigerare potest, sicuti & succus endiuiz, & pastilli ex spodio, & berberis: crassior autem factus humor aliquam requirit attenuationem, & apertionem, quod quidem præstare possunt succus apii, & pastilli diarhodò, & qui ex rhabbaro dicuntur: hi. n. attenuant, ac aperiunt, & iecur, ventriculũq; & viscera omnia roborant: vnde diuturnis febrib. quæ hominẽ ad aquã intercutẽ solent perducere; tollẽdis summopere cõducere credẽtur: Bartholomæi autẽ Montagnanę descriptio ab hac nõ parũ differt: neq; cũ ea cõuenit nisi in mucilaginoso psilii succo, scammonio,

monio, & senam: nam pruna, sebesten, tamarindos, senam, uiolas, & passulas accipit: singulorum uerò uncias quatuor, polypodii uerò libram unam, eaque immerfa libris decem aquæ dulcis per diem ac noctem macerata, mox ad medietatem decoquit, decoctumque percolatum, & expressum accipit, & calefacit, illique imponit seminum psilii libram, ita tamen, ut ex ipsis itidem per diem ac noctem maceratis, & agitis, mucosus succus extrahatur, cui dein de zucchini libras quatuor immiscet, additis liquore calsiæ, & tamarindis prius ex eo decocto dissolutis, post decoctionem congruam, pōdere semilibræ: præterea uerò & infra scripto puluere: uidelicet facto ex diagridii uncias quatuor, spodii, rhabbari, santalorū amborū, rosarū, uolarum, seminis papaueris albi, portulacæ, endiuicæ, scariolæ, lactucæ, fœniculi, anisi, tragagathi, amyli, gumi arabici, rasuræ eboris, berberis, fumaricæ, liquiritiæ, singulorū uncias tribus, myrobalanorum indarum, & emblicarum, singulorum dragmis quinque, & semis, ex quibus omnibus tandem, conficiendum est medicamentum: quod si ad dosim respiciamus, eadem potest esse quæ & priorum; nam quantum ad scammonium pertinet, ferè quælibet istius medicamenti uncia diagridii paulò plus scrupulo accipit; quod si uires respiciamus, satis potens medicamentum est ad uarios humores uacuandos, præsertim uero pituitam crassam, & bilem, quia præcipue aluum cient, polypodium, cuius copia insignis accipitur, præterea & scammonium, nam tamarindi, & calsia adhibentur potius, ut leniant, & aluum fluidum efficiant, & ut reliqua postea, facilius, & cum minori molestia, & conturbatione purgent: sed ob eandem lenitatem gummi, & amyli, uiolæque, & liquiritiæ; rhabbarum uerò, & utræque myrobalani, tum ut substantiam uiscerum roborent, & colligant, quæ uipurgantium dissolui, & laxari solet, tum ut senam iuuent, & polypodium in uacuandis pituita, & humoribus aliquibus exustis, & melancholicis; cætera uerò apposita sunt ad temperandum purgantium medicamentorum calorem: præter anisum, fœniculum, & fumaricam, quæ possunt crassos humores attenuare, & flatum discutere; ualet ergo in febribus tertianis nothis, & aliis affectibus, qui ortū ab humoribus tū biliosis, tū pituitosis habuere. Sed & de medicamento ex palmulis, uel dactylis (ut iuniores loquuntur) quod & græco vocabulo diaphænicon appellauit Mef. cuius descriptionem, & compositionem omnes ferè his temporibus sequuntur, aliquid dicemus

camus: conficitur autem hoc pacto: ut palmularum, quæ per triduum fuerint in aceto macerata; dragmæ centum accipiantur, penidi-
rum autem dragmæ quinquaginta, amigdalarum dulcium optime purgatarum dragmæ triginta; turbith dragmæ triginta, quinque scammonii, duodecim zingiberis, piperis longi, foliorum arido-
rum rutæ, cinamomi, maceris, ligni aloes, seminum anisi, fœniculi, dauci, galangæ, singulorum dragmæ duæ, & semis. deinde omnia exquisite trita cum melle cocto, & despumato, quantum satis sit, commisceantur. Huius medicamenti compositio, siue à filio Ze-
zar, ut Mes. refert in suo appellato antidotario, fuerit excogitata, siue à Iohannitio, ut alibi videtur asserere, ad exemplum Actii ser-
mone tertio. & Pauli libro. 7. compositum est, præterquam quod illi turbith non apponunt, utuntur tamen palmulis, sed ex aceto co-
quunt, non autem macerant: verum illa misla faciamus, de hoc, quod à Mes. relatum est, sermonem habeamus, præcipuum medicamen-
tum, & totius compositionis basis est turbith, de quo, quid anti-
qui senserint, & quo nomine græci id appellauerint, prætermite-
mus in præsentia, ne iusto simus longiores. Hoc saltem mihi satis videtur manifestum: id quo nos utimur, ex aliqua harum planta-
rum, quæ succum lacti similem habent, & ideo lactariæ herbæ, uel
lacticinæ appellantur, fuisse acceptum eius autem facultas est,
ut crassam pituitam, cum rectè paratum est, purget, eamque à re-
mota locis etiam partibus trahat, reliqua verò; quæ huic medica-
mento, præsertim ob apparatus turbith, induntur, tum, ut eius uim
& facultatem adiuuent, induntur, tum ut (si qua est) malitiam
corrigat: cum enim hæc habeat incommoda, quod per se, nisi iue-
tur, debile est medicamentum, parumque & tardè purgat, præ-
terea quod flatulentum est, & quod excitato statu ventriculum sub-
uertit, & fastidium illi affert, & subinde lædit: est calidum, item &
siccum insigniter: experientia autem docuit roborari illud addito
zingibere, ut testatur Mes. acceleratur verò eius operatio addito
scammonio, neque putandum præterea apponi, ut ipsum sit, quod
uacuet: nam tota compositio pondus librarum quinque circiter
æquat; in quo dragmæ duodecim scammonii apponuntur, ut una-
quæque uncia xij. grana scammonii habeat, semidragmam autem tur-
bith, & præterea circiter grana quinque: portio autem scammonii
ad turbith ostendit scammonium esse additum, ut turbith opera-
tionem acceleret, & iuuet, quamuis ab eo tolli non possit, quin bi-
lem

lem & ipsum purget: in ea enim portione est, ut in ea dosi, quam Mes. præcipit, possit bilis aliquid detrahare, sed penidia leniendi causa apponuntur, & ut remittant vim calefaciendi, & siccandi turbith: ita & dulces amigdalæ, palmulæ verò & ipsæ, præsertim si dulces fuerint, idem enim significare puto cheyron arabicum vocabulum, quod caryotæ græcum, ita enim quæ teneræ, & dulces sunt, græcè dicebantur: quam autem in tollendo ventriculi fastidio vim palmulæ habeant, quod soluentia medicamenta concitant & adeò eorum abominabilem saporem obscurant, ut possint gustum fallere; testis est Gal. tertio de faculta. medi. simpli. vti autem aceto in coquendis, vel macerandis palmulis solebāt antiqui, ut legere est apud Aetium sermone. tertio. & Paulum lib. 7. propterea forsitan, ut aliquam vim ex aceto contrahant, qua præterquam quòd astringendo confirmant ventriculum, possint etiam humores crassiores uacuandos attenuare: reliqua verò aromata duplici ratione accipiuntur: prima communis est, videlicet propter odorem gratum, quo ventriculo gratia conciliatur, & robur membris præcipuis additur: altera verò quia flatu discutiendi vim habent: ex quibus facile quisque percipere potest medicamentum esse maxime opportunum febribus diuturnis à crassis humoribus accensis; in quibus multa, lenta, & crassa pituita mixta est: sicut solet in autumnalibus febribus contingere: item & affectibus, qui frequentius solent hyemalibus, & frigidioribus temporibus oriri, & qui ex flatuosa materia excitari possunt, ut est colica, & id genus alii: sed etiam si medicauentorum simplicium, quæ in hac compositione accipiuntur, copia sit æstimanda, nempe scammonii, & turbith, cum solo vsuri sumus, possumus accedere ad dosim à quatuor vsque ad sex dragmas, & ultra etiam quandoque; accipit enim vncia huius medicamenti scammonii circiter semiscrup. turbith verò ferè semidrag. ut tamen semper ratio sit habenda naturæ corporis purgandi, quatenus ad facilitatē, & difficultatē purgationis pertinet, item ad ætatem, & vires, & alia id genus consideranda. Indum verò in vsu est, quod maius à Mes. nuncupatur: accipit autem cinnamomi, gariophylorum, spicæ nardi, rosarum, cassiæ, maceris, cypri, singulorum dragmas. iij. santalorum citrinorum dragmas. ij. s. li gni aloes, nucis moscatæ, singulorum dragmas. ij. turbith optimi dragmas quinquaginta, zuchari, & penidiarum, singulorum drag. xx. galangæ, cardomomi, assari, masticis, singulorum lescuidra gram

mam, scāmonii cocti ex pomo dragmas xij: hæc omnia prius sunt
 ex oleo amigdalino fricanda, deinde accipiendi sunt succi cotō-
 neorum malorum, item & punicorum, præterea apii, singulorum
 autem semilibra, qui addito melle optimo, quantum satis sit, coquē-
 di sunt ad congruentē spissitudinē, ac postea pulueres inspergen-
 di, & cōmiscendi: si eorū, quæ de præcedenti medicamento dicta
 sunt, memores sumus, faciliē omnia, quæ ad indum attinent, petci-
 piemus: nā si turbith pondus cum scāmonii pondere conferamus,
 quadrupla proportio ē turbith, & aliquatō etiam maior ad scāmo-
 nium; quare præferim, & primum, & maxime pituitam crassam, &
 lentam purgare medicamentum poterit, licet & aliquid bilis, ma-
 gis tamen in eo scāmonium iuuat, & turbith operationem accele-
 rat, q̄ ipsum, præferim cū coctū accipitur, insignē possit uim pur-
 gandi bilē habere; sed zuccharū, & penidiæ leniendi causa apponū-
 tur, reliqua uerò, tanquā (ut arabes loqui solēt) consolātia, sicuti
 aromata, quæ possunt flatū discutere, quem suapte natura turbith
 excitat, & id attenuando, & calefaciendo, aromatico uerò, & suauī
 odore vires reficere viscerū, quæ sedes sunt præcipuarū facultatū,
 sed spica, rosæ, santali, cinamomū, cassia, mastiche, & succus malo-
 rum cotoneorum, punicorumq̄; quāuis & calorē aromātū, & alio-
 rum medicamentorum cū rosis, & santalis tēperēt, astringentia ta-
 men cum sint, ventriculo succurunt, ne ab exsoluentibus medica-
 mentis, quæ maxime illi aduersaria sunt, eius natura dissoluatur,
 aromata uerò omnia tenuitate partium, crassam & lentam pituitam
 attenuando, & secando uacuationem iuuant, quæ adiuuant & succi
 fœniculi, atque apij: erit ergo accommodatum admodum medica-
 mentum purgando corpori, quod refertum sit eiusmodi crassa pi-
 tuita: & curandis morbis ex ea excitatis: dosis uerò ea, quam Mc-
 sue præscribit, si æstimare uoluerimus, quòd tota compositio acce-
 dit ad libras sex, & uncias quatuor, uel circiter, ut attestantur, qui
 componendi periti sunt, & quòd integra medicamenti uncia con-
 tinet scrupulos duos turbith, aut paulò minus, scamonij uerò pau-
 lò minus decem granis, quod coctum mitius, & facilius euadit, est
 satis exigua, nec uideo, cur, cum solo sumus usuri, nō posimus &
 quinque, & sex etiā dare: si quidē liberaliori uacuatione opus fue-
 rit: sunt autē facultatibus admodum similia duo hæc medicamēta.
 Medicamētū uerò, quod in Hamech Arabē auctorem refertur, his
 cōstat, ut accipiātur myrobalanorū citrinarū, uncie iij. chebularū
 F indarum

indarum, rhabarbari, singulorū vnciæ duæ; agarici, colocynthidis, polypodii, singulorum dragmæ decem & octo, absinthii, thymi, fenæ, singulorum vncia, succi fumariz libra, pruna sexaginta, passularum exacinarum vnciæ sex; ac infusa in sero lactis macerentur in vase, quod strictum os habeat, vsque ad quintum diem; mox parumper simul bulliant, postea colentur, & ex eo decocto dissoluantur cassiæ egyptiæ vnciæ quatuor, tamarindorum quinque, manna duæ, ac omnia manibus fricata iterum colentur, & postea addantur zucchari sexquili bra, scammonii sesquiuncia; iterumq; coquantur ad mellis consistentiam; postremo additis his pulueribus omnia miscenda sunt, nimirū, vt accipiamus trium generū myrobalanorum, singulorum semunciam, belliricarum, emblicarum, rhabarbari, seminis fumariz, singulorum tres dragmas, spicæ verò nardi, & seminis anisi, singulorum dragmas duas, contundatur omnia, & cribro excernantur, vt fiat pulvis subtilis: hæc autem medicamenti confectio vim habet, si ad simplicia, ex quibus confectū est, respiciamus, vt multiplices, & ferè cuiuscunq; generis humores purget; præsertim verò si & violarum addantur dragmæ quindecim, epithymi duæ, anisorum, rosarum, sceniculi, singulorum autem sex; vt aliquando solere addi ait Mesue: ex agarico enim, & colocynthyde præcipuè habet, vt pituitam detrahat, ad quod facit, & myrobalanorum chebularum mixtio, quæ quamuis cæteris omnibus infirmiores sint, dum tamen ab aliis valentioribus iuuantur, aliquid omnino & ipsæ possint: nam ea, quæ in puluerem redacta postremo insperguntur, non plurimi fecero, quia, mea quidem sententia, addita illa sunt potius ad cæterorum correctionē, quàm quod ea vim alicuius momenti possint in vacuando habere, myrobalani quidem, rhabarbarum, semina fumariz, & spica, & rosæ: propterea vt colligendo, & astringendo, robur viscerum, quod plurimum dissoluunt purgantia medicamenta, seruare possint; anisum, vt flatus, qui, cum mouentur succi, excitari solent, & conturbant, atq; ventriculū reddunt nauseabundum, discutiat, id ipsum & sceniculi semen, si addatur, efficit. polypodium verò, vel, vt latini appellant, filicula, commodè quidem pituitam purgat, nihilò tamen minus & melancholicum humorem, quē & thymus, & epithymum, si addatur, uacuant, quamuis hoc, q̃ modicum imponitur; non possit multam vim habere, sed & inde myrobalani hūc spectant, sene verò vltos, & assat os humores detrahit, & hæc omnia aqua

nia aqua casei nonnihil iuuat, & fumariz succus, ex quibus fit maceratio, & decoctio, citrinæ autem myrobalani, rhabarbarum, & scammonium præsertim bilem purgant, quæ deinde cassia, manna, & tamarindi iuuant, quamuis maior ex ipsis utilitas sit, quod acrimoniam leniunt, & obtundunt, caloremque soluentium medicamentorum remittunt; sicuti & passulæ, & pruna, & violæ, cum & ipsæ imponuntur; vnde quamuis ex vehementibus admodum, & virosis medicamentis simplicibus hoc confectum sit, adeo tamen eorum uirosa uis corrigitur, & temperatur, ut facillime deinde tutoque, & citra ullam ferè molestiam, & conturbationem uentriculi, uel aliorum uiscerum purgare soleat: ualet autem plurimum ad tollendas diuturnas, & autumnales difficilesque febres ex omnium humorum copia ortas: ex æstate enim præcedente multa congesta est bilis, & ea assata, ex esu aut pluriū pituitosorum cibariorum, ut sunt fructus, radices, & olera, tum ex imbecillitate contentricis facultatis, tum ex resolutione caloris naturalis ex priori æstu, tum ex inequalitate constitutionis temporis, multa pituita colligitur, sed incineratis ex putredine humoribus ex febribus longioribus plurimus eo tempore gignitur melancholicus succus: unde autumnus multus est quartanarum prouentus; autumnalibus ergo febribus curandis optimum est medicamentum, & aliis quoque morbis ex uitiis humoribus subortis, præsertim crassis, elephantiasis, uulgi ginibus, cæterisque difficilioribus cutis affectionibus, sua uerò dosis ad quatuor, & quinque dragmas accedere potest, & ultra etiam, cum solo eo utimur, nam cum tota compositio resoluatur tandem in libras circiter sex, & semisseni, unaquæque uncia colocynthis, agarici, & polypodii habebit grana 14. uel paulò plus: scammonii uerò grana viiij. paulò plus, reliqua potius uim horum reprimunt, & temperant, quam augeant. Postremo de eo medicamento aliquid dicendum est, quod diaturbith appellatur cum rhabarbaro, & est Bartholomæi Montagnanæ inuentum, alicubi uerò in multo usu est, solet autem fieri ex zuccharo probe cocto, adeo ut in placentulas, uel rotulas concrefcere possit: cuius compositio in hunc modum se habet; acceptis santalorum alborum, & rubeorum, uiolarumque, & zingiberis, singulorum sesquidragma, seminis anisorum, cinamomi, croci, mastiches, singulorum semidragmam, turbith, hermodactilorum, singulorum uncia, rhabarbari electi dragmis decem, diagridii dragmis quatuor, zucchari optimi libris dua

bus, decoſto zuccharo ex aqua, reliqua trita & in puluerem redacta inſpergantur, & fiat ſolida conſectio in placentulis, uel rotulis: poteſt eiufmodi compoſitio pituitam, & bilem purgare, præſertim uerò pituitam craſſam, & ratione tam turbith, quam hermodactilorum: utriuſque enim uis eſt, ut craſſam educant pituitam, cum adiuuantur à rebus, quæ proprietate quadam naturæ, & ſuis etiam qualitatibus naturalibus iuuare poſſunt: ut poteſt zingiber, ſemina aniſi, & cinamomū, eam extenuando: ſed & ſcammonium eorum uiribus quidpiam addit, rhabarbarum uerò illi præſtat cū ſcammonio, ut poſſit bilem detrudere: in morbis ergo ex miſcella horum humorum excitatis ſuccurrere laborantibus poterit: præſertim uerò articularibus, podagricisq; & chiraagricis doloribus, & coxendice, q̃ turbith, & hermodactilus pituita à remotis partibus trahunt: poteſt & eſſe utilis febribus diuturnis, ut ſunt tertianæ non exquisitæ, & eſt medicamentū facile, & ſatis tutū, quamuis enim & turbith, & hermodactilus in his ſint, quæ nō parū turbant: præſertim uētriculū, ſunt tamē, cū ex cinamomo, & zingibere, tum uerò ex ſemine aniſorum, ut præteream rhabarbari multam copiam, admodum correctæ; nam ſtatus craſſiores, quos hæc medicamenta alioquin concitare ſolent, & à quibus ſubuertitur uenter, zingiber, cinamomum, & aniſum potenter diſcutiunt; rhabarbarum uero ſcra omnia laxata aſtringendo roborat: de eo enim prædicat Auer. quod ipſum ut nulla æget correctione, ita alias omnes medicinas corrigit: quamuis autem auctor præſcripſerit & doſim à dragmis duabus uſque ad ſex, non uideo tamen cur dari non poſſit integra uncia, ſi conficiatur, ſicuti paſſim conficitur, ita enim pulueres diſtribunt, ut uncia zucchari dragmam ſpecierum accipiat: accipiet ergo uncia diagridij circiter grana ſex, turbith autem, & hermodactilorum, ſingulorum grana circiter duodecim, & dimidiū, rhabarbari circiter ſexdecim, ex ſuperius autem explanatis, nemmo eſt, qui non percipiat ſantalos, & uiolas cæterorū medicamentorum temperare calorem, ſed uiolas præterea lenitatem addere. Hoc tamen circa uſum iſtius medicamenti aduertendum, quòd pueris etiam illud medici exhibent: quamuis enim ea accipiat medicamenta, quæ in his à medicis cenſentur, quæ laborioſe, ut ipſi aiunt, ſoluere ſolita ſunt, adco tamen omnia recte caſtigata ſunt, ut uel etiam tenera ætas hoc ferre poſſit, & proinde ita ab exigua doſi eius terminos ſum—
pſit,

psit, à duabus nimirū dragmis; nam rarò, cū pueris dandū est, duas, vel tres ad summum dragmas excedunt, facilius autem sæpe hoc medicamentum accipiunt, ex ratione modi, ac formę compositionis: id enim sub prætextu dulciarii cuiusdam admittunt, & in febribus, & vernibus satis opportunum est medicamentum: De his ergo medicamentis satis hæcenus esse dictum putamus. Vnde si aliqua præterea de hyeris maioribus addiderimus, ad pillularum, vel catapotiorum tractationem conuertemus orationem nostram, neque in ipsis erimus admodum longi, cum neque his temporibus sint in frequenti vsu, nisi quòd in clysteriis sæpius accipiuntur; capimus tamen Venetiis vti hyera, quam Scribonius Largus in suo libello summis effert laudibus, & in Pacchium refert auctorem: de qua præter alia multa, hæc etiam literis ab eo tradita fuere, quòd quamuis virosum admodum medicamentum videatur, tamen non modò non lædit ventriculum, verū potius, supra quàm quis credere posset, confirmat, diacolocynthidos autem appellatur, multæ tamen reperiuntur confectioes sub hoc nomine descriptæ: sed, quam retulit Scribonius, eadem ferè est cum ea, quam Mef. Paul. & Aetius describere: non tamen eam in Pacchium, sed in Ruffum Ephesium referunt; & si in quapiam re euariant, id potius contigit ex librariorum errore, si quis rectè rem examinet, eandem verò compositionem reperiimus in exemplari antiquo manuscripto, quod erat in bibliotheca Excellentissimi Ducis Vrbinatis: nisi quòd in ponderibus erat aliqua diuersitas, in simplicibus autem nulla, aut modica; eius facultas (nam eius descriptionem nolumus particulatim referre, ut potè quæ passim reperiatur) est, quemadmodum Gal. 1. de composi. medic. secundum loc. & in libello de facil. parab. medici. vt pituitosos humores vacuet, quamuis & alios etiam aliquantisper purget: nam in colocynthide, sagapenoque, & opoponace vis est purgandi pituitam primū, quamuis non eam solam purgent, sed & idem facere posse agaricum nemo non nouit; omnesque ferè conueniunt circiter quatuor dragmis dosim eius comprehendere. Quia verò diximus varias eius confectioes in vsu antiquitus fuisse, id & Scribonii testimonio, & Gal. possumus ostendere. Scribonius. n. huic descriptioni interdū, vt valentiorē redderet, duplū prioris pōderis colocynthidis addebat; opoponacis autē, & sagapeni dragmas tres; quæ cōpositionis ratione vtendum au-

Cap. 1.
Cap. 6.

daſter eſſe dixit ; vbi diuturniores , & rebelles magis morbi facti ſunt. Gal. vero 2. de ratio. viſ. in acut. mor. variè hoc medicamentum parari ſolitum eſſe, & in multo fuiſſe uſu, & non eſſe medicamentum, quod plurimum periculum habeat ; cum plenitidis illud poſſe tuto dari, ſi illos non angit acuta febris, autumat: addit tamen compoſitionem illis eſſe congruam, cum accipit veratrum nigrum, non autem ſcammonium : ex quibus verbis facile eſt cognoſcere; quòd interdù hæc hyera ita in uſum deducebatur, vt fuit primum deſcripta : quæ cum vim purgandi maiorem ex colocynthide habeat, deinde & ex opoponace, & ſagapeno: idèd licet poſſit & alios humores purgare , maxime tamen purgat pituitam , cum verò illi alios etiam purgandi vim addere uolebant: ſi melancholicum humorem, nigrum veratrum, uel epithymum: vt 1. de comp. medi. ſecundum loc. docuit Gal. ſin autem bilem , ſcammonium : vnde interdum alterum addebant, interdum vtrunque , interdum neutrum, & id pro ratione naturæ morbi, naturæ corporis ægro- tantis , & uirium ipſius. De Benediſta nuncupato medicamento, & de eo, quod Eleſcoph Meſ. Epilcopi ab Auic. dictum, nolumus longiorem habere ſermonem: neq; enim ita frequenti in uſu ſunt, ſicut hæc alia, atq; benediſtæ uſus frequentior in clyſteriis eſt , ſed neq; difficile eſt, ſi quis recte perpenderit ea quæ diximus de aliis; inire etiam eorum omnium rationem, quæ ad hæc pertinent: vnde ad pillulas exponendas tranſeundum eſt; ſi modò prius hoc etiam expoſuero non inutile iunioribus medicis , quòd nos aliquando fortioribus his medicamentis latiores terminos, & ampliorem doſim præſcripſimus : non propterea, ut hortaremur medicos iuuenes, vt in uſu eorum ſint audaciſſores, & plus etiam iuſtò interdù: ſed vt id ſciant, quòd aliqua ſunt corpora, quæ & robuſtiora ſunt, & aſtrictiora: in quibus interdum, liberaliores ni fuerimus, nihil ef- ficiemus ; ſemper tamen modeſtos eſſe tutius eſt , & circa medias doſes potius verſari, quàm extremas : ſed præterea , & hoc etiam aduertèdù, qd cū hæc valentia leniētibus, & aliis leuioribus medica- mentis immiſcemus , & ſit eorum copia, quanta poſſit commo- dè aliud ciere ; non ſunt hæc maiora multa copia iniicienda: vt videlicet accedant ad maiores limites præſcriptos in his : ſed ſi horum aliquid illis uerbigratia vnciæ caſiæ, aut lenitiui ap- pellati medicamenti , aut diſcenæ, aut iſtiusmodi alterius ad- dideris , ſatis tibi erit duas, aut tres dragmas addidiſſe ; & quan-
doque

doque vnam tantum, pro ratione uidelicet roboris medicamenti,
& natura expurgandi corporis.

De pillulis, uel catapotijs. Cap. 17.

Pillulas nunc medici in globulos efformata medicamenta appellant, quæ catapotia: eoquod integra deuorantur, græce dicuntur, & interdum à similitudine coccia. Duæ autem commoditates eos adegere, ut pillulas, uel catapotia conficerent, altera in accipiendo, altera in operando: quæ in accipiendo, duplex est, nam & minus euadit medicamentum, cum in pillulas redigitur, contusis enim medicamentis simplicibus, ut ex eis puluis fiat, & adiecto melle modico, quanto possint assumi, ut cohereant, & non dispergantur, fiunt pillulæ; raroque dosis earum excedit sesquidragmam: deinde uero, cum solida, & integra deuorentur, & sæpe ex aliquo liquore, ut aqua, uel aliquo accommodato syrupo assumantur, citò descendentes, neque uniuersum os inficiunt, non ita ingrato tamen sapore, tum odore offendunt, aliqui etiam aliqua re inuoluunt; nam aut inaureant, aut illis, quas nebulas uulgò appellant, uel quibus sacerdotes conficiunt sacramentum, inuoluunt, ut nullam molestiam ex ipsis percipiant: in operando autem commodus est istiusmodi medicamentorum usus, quod cum solida sint, à calore uentriculi non ita facile dissoluuntur, neque ita cito diffiluunt, unde longiorem moram ibi trahunt, à remotioribus partibus, sicut sunt articuli, & caput, ualentius trahere possunt: quapropter eorum frequentior est usus in capitis, & articularum doloribus. De his ergo cum in præsentia sit agendum; earum autem sylua ingens in libris, tum recentiorum, tum etiam antiquorum medicorum reperiatur, non omnes earum compositiones persequemur; sed, ut instituiamus, eas solum exponemus, quæ in communiore, & frequentiori usu sunt; habito tamen sermone de illis duntaxat, quæ propriè in purgatoriis ualentibus poni possunt, quæ de facilioribus, & leuioribus, quantum uidebatur posse esse satis, scripsimus superius. Et incipiemus à cochiis appellatis; quas descripsit Rasis 9. lib. ad Almanforè in hunc modum: accipit enim pulueris hyere, quæ simplex à iunioribus, amara dia aloes à Gal. dicitur: drag. x. colocynthidis drag. iij. & serupulū, scāmōni drag. ij. s. turbith, stæchados, singulorum drag. v. ex his omnibus in puluerem redactis, & ex aliquo liquore assumptis

Cap. 1.

F 4 fiunt

hūt pillulę, ipsa at cōpositio ostēdit, q̄ purgare p̄sertim pōt crassa, & pituitosa excremēta, ferē. n. balis sunt turbith, & colocynthis: duplū. n. est pōdus turbith ad scāmōniū, sed & colocynthis superat scāmōniū, nā quotaq̄q; dragma accipit circiter grana octo, vel paulōminus colocynthidis, turbith aut grana circiter vndecim, vel paulōplus, scāmōniū verō circiter grana quinq; quia tñ & scāmōniū ea est copia, vt possit & ipsum solū purgare, iō & mediocrē vim bilē detrahendi medicamentū habebit, q̄ p̄sertim insinuare videt̄ auctor crudū id esse imponendū, quod & efficacius est hoc modo: reliqua uerō, tanquā ea, quę uim corrigendi habēt qualitates vētriculo, & cāteris uisceribus noxias: in hoc medicamento accipiūt, sicut hyera, quę roborat, & firmat ventriculum, & alia uiscera, si quod aliud medicamentum, sed & stœchas p̄dicatur ab omnibus tanquā id, quod vim habeat magnā roborandi omnia viscera, & vniuersum tandē corpus: vt Gal. 8. de simpli. medi. facul. Arabes verō dicunt p̄terea esse & purgatoriū medicamentū, quod tamē non nouisse in eo antiqui videntur; qui p̄terea capiti plurimum vtile esse aiunt: & hac ratione puto Rasim his pillulis addidisse, quibus in omnibus ferē capitis affectibus vitur, confert tamen & ob id, quia potest aperire obstructas vias, per quas ducenda est purgatio, & purgādos humores crassos extenuare, ex quo patet, quā hallucinantur iuniores Papienses: qui in expositione 9. lib. ad Almansorē inuehantur contra has pillulas, eas nimis fortes appellantes; in quibus acerrima accipiuntur medicamenta, & ea non correctā; quis. n. nō videt ex hyera tum ratione aloes, tum aromatū optimē & turbith, & colocynthim corrigi: sed stœchadis etiam naturam, & facultates si estimauerimus, cū duplum accipiatur hyerę ad turbith, triplū ferē ad colocynthim, par autē portio cum colocynthide accipitur stœchadis; non video cur nō possint haberi tanquā correctā, & tēperata, quantumlibet acria, & vetriculo, visceribusq̄ue noxia hæc simplicia alioquin sint: nā Gal. tanquā correctas habuit suas ex colocynthide pillulas: quarū & 1. de cōposi. med. secūdū loc. & in lib. de facil. parab. medi. & 14. method. meminir cum tamē essent, confectę ex colocynthidis parte vna: aloes verō, & scāmōniū pari pondere, duabus nēpe partibus, quibus ipse & partem vnā absinthii addit: quę postea assumuntur succo brassicę, & magnitudine erui pillulas fieri ait, dari verō undecim, eas aut videtur in frequentissimo v̄su habuisse; in quibus nihil est aliud, nisi aloes

unde

cap. de stę
chade.

Cap. 1.
Cap. 5.
Cap. 8.

1. 90

unde longe videntur hæc correctiores, in quibus illi tantum momentum, & difficultatem ponunt: immo cum iam pluribus annis ubique ferè sint in maximo vsu, facile purgant, neque cum multa molestia, pro ratione tamen istius ordinis compositorum medicamentorum, modò quis recte eis vtatur, & ex ratione. Vnum duntaxat animaduertendum; quòd Mes. vbi de cura doloris capitis ex frigido, & pituitoso humore agit, harum pillularum meminit: ait: quæ iniiciendum scammonium paratum, & coctum ex malo coto-neo: Rasis tamen huius nullam facit mentionem, sed si ita fiat, etià faciliores erunt, & tutiores, vt superius fuit expositum: quatenus autem ad earum, vt aiunt, dosim pertinet; quæ res maioris considerationis est, animaduertendum, quòd Rasis quidem dosim earum integram esse ait, vt dentur decem, neque, cuius illarum ponderis sint, exponit. At Mesue pondus præscribit: ait enim dosim earum esse drag. ij. s. quæ copia considerato robore harum pillularum in purgando maior fortasse iustò est: vnde suspicandum est esse mendum in numeris, & existimarem legendum drag. j. s. ea ratione adductus, quòd si recte sint confectæ hæc pillulæ, quotidie videmus, quòd plurimi vnica accepta dragma facile, & copiose purgantur, accepta verò sesquidragma liberalissime: immo si consideremus modum, quo vtitur in exponenda harum pillularum dosi, videbimus Rasis huc spectasse, cum enim ait dandas esse decem, ad consuetudinem omnium ferè antiquorum respicit, qui cum catapotia formabant, ad magnitudinem, aut erui, aut ciceris formabant, ita. n. & Gal. in libello de facile parab. medi. cap. de manantibus vlceribus capitis loquitur: ita & in libris de compos. medi. secundum lo. sapissime, nunc erui, nunc ciceris magnitudine conficiendas pillulas ait: itidem & Nicolaus ferè loquitur, quæ si ita formentur ciceris magnitudine, decem circiter sesquidragmam pendent, si erui, etiam minus, vnde Gal. suas ex aloe, scammonio, & colocynthide confici noluit magnitudine erui, atque dandas decem & septem, pariter & aureas pillulas Nicolaus ciceris magnitudine efformatas, aut nouem, aut vndecim dari voluit; quasi eodem spectans, quòd Rasis, vnde modesta dosis cochiarum erit dragma, liberalior verò sesquidragma: quamuis interdum vidi duas dragmas datas, scilicet etiam, præsertim verò in graui sopore, vel valida apoplexia: cum adeo attoniti, & sopiti sunt ægroti; vt violentè cum illis sit necesse agere: nam aliqua aqua duæ dragmæ dissoluantur

Victoris Trincauellij

luuntur; & vi aperto ore cochleari vi deglutiente traduntur, nam tunc, & quia natura sopita, & stupida nisi irriteretur valentius, non excitatur ad excretionem, tum etiam, quia liquida, quæ facilius de ventriculo, & citius diffiluunt, non ita copiose uacuant; sed de his satis. De pillulis aureis, quæ facultate purgandi, & robore his cochiis ferè pares sunt, iam sermonem instituas: conficiuntur autem acceptis aloes, & diagridii, singulorum dragmis quinque, rosarum, seminũ apii, singulorum dragmis duabus, & semis, seminum anisi, fœniculi, singulorum sesquidragma, croci, mastice, colocynthidis interioris, singulorum dragma: trita hæc omnia assumentur aqua, in qua fuerit maceratum tragacanthum, deinde formandæ sunt pillulæ magnitudine ciceris: in his momentum maius, & (vt aiunt) basis in scammonio est parato, & cocto ex cotoneo malo; de quo satis supra diximus: nam & si addatur colocynthidis, aliarum tamen rerum comparatione non potest vim insignem habere, aloes autem, & mastix adduntur, vt ventriculo, & reliquis visceribus succurrant, ne à caliditate, & acrimonia soluentium medicamentorum laxentur, & dissoluantur: quòd magnam utilitatem semina hæc odorata, quæ accipiunt, afferant; nimirum anisi, fœniculi, & apii, cum satis superque id prioribus capitibus ex sententia Gal. & Hippo, fuerit expositum: non repetam; crocus verò & coriandri amicus est, & facile potest vim medicamenti ad caput ducere: facile enim caput petit: vt secundo de compositi. medi. secundum locum docuit Gal. ex multa itaque ratione confectum est hoc medicamentum, cuius vis præcipua, & prima, quatenus soluens est medicamentum, ea est, vt valenter, & à remotioribus partibus possit pituitam attractâ purgare: unde dolorib. capitis, & articularũ eius cõgruus vsus ualde utilis esse potest: potest tamen & aliquid pituitæ de trahere, sed longe aptius est medicamentum purgandæ bili: ex feminibus præterea illis discutere status satis commode poterit, & eius quidem communis dosis, qua liberaliter purgat, est dragma; quamuis, vbi astriCTOR sit aluus, accedant medici aliquando ad sesquidragmā; præsertim verò in robustioribus corporibus: si enim rectè supputare voluerimus, dragma continet circiter grana quindecim diagridii, vel paulò minus; quæ copia, si velimus rationem præparationis habere, & estimare, quantum mitescit vis scammonii, quando coquitur ex malo cotoneo, neque maior æquò videbitur: sunt autem ex quidem aureæ biliosis affectibus accommodatiores,

tiores, cochiz uerò pituitosis. Sine quibus pillulę sequuntur, quas Nicolaus describit, quasi nefas sit eas paratas non habere propter earum summam utilitatem: de illis quoque breuem sermonem habebimus: accipiunt autem dragmas quatuordecim aloes lotę, quinque myrobalanorum: singulorum scilicet 3. j. masticis etiam, absintię, & rosarum, præterea violarum, agarici, senę, cuscutz, singulorum itidem horum. 3. j. scammonii mox triti, & ex ea copia succi feniculi dissoluti, ac transmissi, uel colati ex linteo, quantafatis sit ad assumendos hos pulueres: ita ut ex eis possint pillulę confici: drag. vj. & semis: si recte compositionem velimus æstimare, primum quidem bilem purgabit: nam aloë alia omnia superat, mox scammonium: hæc vero rhæbarbarum, & citrini myrobalani aliquantulum adiuuabunt; purgabunt tamen & pituitam; nam aloë præsertim adiuta ab agarico, & myrobalanis chebulis, emblicis, & bellericis potest & pituitam detrahere, sed & scammonium, quod colliquandi pituitam, & attenuandi, detergendique, cum calidum, & amarum sit, vim habet, potest addere facultatem aloë, qua possit & pituitam detrahere, sene uerò, & myrobalani in di aliquid facere possunt ad purgandos exustos, & atros humores cum uerò & myrobalani, & rhæbarbarum, & mastix, & rosę astringendo plurimum ualeant simul cum aloë in roborando, & purgando ventriculo, atque ascensum uaporum ad caput prohibendo; iō in affectibus oculorum, præsertim calidioribus, atque adeo etiam magis, si ex consensu ventriculi foueantur, non parum utiles sunt: sed laboranti quoque ventriculo, & multis vitiosis humoribus scænti, præcipue si astrictior sit aluus, ut facilioribus medicamentis non facile cedat, conducent, neque etiam esset earum inutilis usus in doloribus articulorum, vel calidis, vel mixta materia: sed in febribus quoque biliosis, ubi iam concocta esset materia, & obstructiones apertę: nam optime correctum est medicamentum, primum etenim myrobalani, & rosę, & rhæbarbarum, mastixque possunt, ut ostendimus superius, omnium medicamentorum acrium violentiam reprimere, & ventriculo, uisceribusque, si timeamus aliquid ex scammonio, vel agarico, robur conciliare, præterea & qualitatibus satis temperatum est medicamentum; quia primum aloë lotam accipit, quę ex lotura plurimum sit minus calida; deinde sunt myrobalani, rosę, violę, quę possunt aliorum medicamentorum calorem temperare; sed si etiam, quod his temporibus plerique

que facere solent, non crudum scammonium iniiciatur, sed præparatum, quodque diagridium appellant, eò etiam facilius, & lenius medicamentum, & tutius erit: quamuis Nicolaus crudum uoluisse videatur: dosis autem earum potest esse à dragma vsque ad sesqui dragma, & erit etiam satis facilis, & tuta operatio, quam possumus interdum excedere, præsertim si acceperis diagridium; vnaquæque enim dragma accipit circiter grana vndecim, vel etiam paulò minus, infirmiores enim sunt hæc pillulæ prioribus duabus. Sunt præterea quibusdam in vsu & pillulæ arabicæ nuncupatæ, ab eodem Nicolao descriptæ, quæ præcipue bilem, & pituitam purgant, nam eam vim habent aloë, diagridium cum myrobalanis citrinis: admixto autem castoreo, & assaro, quæ crassam pituitam tenuant, aloë vim acquirit, vt & pituitam detrahat: sed bryonia, quemadmodum testantur Arabes, & Dioscorides, crassam pituitam purgandi facultatem habet, atque eam ex capite detrahendæ sed & beliricæ, chebulæque, & emblicæ myrobalani, præter id quòd cum reliquis myrobalanorum differentiis corrigunt bryoniæ, & diagridii calorem, & acrimoniam, dissolutionemque viscerum: vt potè quæ refrigerant, & astringunt, sicut & rosæ, & masticæ, faciunt quoque ad detractionem pituitæ: inde verò licet præ aliis minorem vim habeant, possunt tamen aliquid melancholici humoris detrahære, multiplices ergo humores purgant, præsertim verò pituita, & bilem: affectibus verò capitis tollendis accommodatum est medicamentum, vt quod & purgare, & roborare, firmareque, tum caput, tum ventriculum possit, neque tamen plurimum violentum est, sed potius satis modestum, cum enim accipiat aloës vncias quatuor, myrobalanorum verò quinque: præterea masticis, diagridii, rosarum, & radicum assari, singulorum dragmas quatuor; additis autem castorei dragmis tribus, & vna croci, omnibusque assumptis succo, vel scœniculi, vel absinthij fiant catapotia, vncia medicamenti continebit aliquantò minus vigintisex granis diagridii, vt quælibet dragma habeat paulò plus tribus granis diagridii: alicubi tamen non semunciam, sed integram vnciam diagridii ascriptam reperi, quod neque multa esset copia, nam dragma circiter septem grana capiet, tutò ergo possent dari dragmæ duæ, & longè etiam plus, si non vncia integra, sed semuncia apponatur: ait verò auctor, quòd potest curare dolorem capitis vel etiam diuturnissimum, id verò intelligendum frequenti, & repetito eius vsu, ne-

que

que enim adeò ualidum medicamentum est, ut semel, aut iterum assumptum eradicare possit ex longo tempore difficiliore morbos factos. Aliquibus autem in usu sunt & pillulæ, quæ arthetica & quoddam articularibus morbis utiles sunt; nos tamen nolumus omnia sectari, ex his enim, quæ nuper expositæ fuere, & earum quas non exponimus, has cum illis conferentes, ipsarum etiam ratione poterit ex se unusquisque inire. Ad eas autem orationem conuere uolumus, quæ ex Mesue excerptæ passim uenire in usum medicorum, neque tamen omnes descriptiones ad examen reuocari, sed solùm eas, quæ magis celebres habentur, nam his recte examinatis, ex earum ratione, & aliæ faciles erunt perceptu. Et quia alephanginæ ad priorem ordinem medicamentorum potius pertinent, ideo illis prætermisissis de stomachicis priorem sermonem habeamus, quæ possunt colluuiem omnium uitiosorum humorum è uentriculo, aliisque etiam remotioribus partibus, sicuti è capite, & aliis partibus, detrahare, & utilis sanè confectio, & satis correctæ est, quæ in hunc modum se habet, ut accipiantur hyeræ picræ, quam simplicem nunc appellant, drag. vii. myrobalanorum trium; uidelicet, citrinarum, chebularum, indarum, absinthii, scammonii, singulorum drag. iij. agarici, salis indi, singulorum drag. ij. epythimi cretensis, anisorum, singulorum drag. ij. s. Turbith drag. x. ex scammonio quidè, & citrinis myrobalanis vim habent bilem flauam educendi, chebulis verò, & agarico, & turbith pituitam, vel etiam crassiorrem: præterea & ex sale indo, ex hyera verò verunque humorem, epythimo autem bilem atram; sed si vires, & copiam medicamentorum æstimauerimus, primùm pituitam, postea bilem flauam, minorem autem vim habebit atram bilem educendi, calorem autem, & acrimoniam medicamentorum contemperant myrobalani, & tres penidiarum dragmæ, succusque scariolæ; quo assumendæ sunt pulueres, ut fieri possint pillulæ; lenitatem præterea aliquam penidiæ addunt medicamento: dosis autem earum esse poterit à dragina usque ad alteram dragmam, ut dragma modeste quidem sit purgatura, sesquidragma satis liberaliter, duæ verò dragmæ si liberaliori sit opus purgatione: facile, n. præsertim in fortioribus corporibus ferri possunt duæ dragmæ; singula. n. dragma hêt grana ferè iiij. diagridii, turbith verò circiter tredecim, agarici verò paulò minus tribus. Has sequuntur pillulæ aggregatiue, iādiu celebratissimæ ab oībus, quæ & ipsæ purgando aggregant

uarios

Victoris Trincauellij.

varios, immo omnes ferè vitiosos humores, componuntur aut ex
 eis simplicibus medicamentis, quæ præter purgationem excremen-
 torum, quam expectare oportet ex his medicamentis, quæ vim pur-
 gandi habent, possunt viscerum obstructions aperire, & ea etiam
 roborare, accipiunt enim succi absinthii, & eupatorii singulorû drag-
 iij. & quamuis Mesues aliud eupatorium nouerit, quàm Gal. & Dio-
 scorides, attamen si etiam in his uteremur eupatorio, eo videlicet,
 quod agrimoniam appellant, nō putarem deteriolem fore compo-
 sitionem: sed totidem rhabbari dragmæ ad aperiendas obstructio-
 nes, & roboranda viscera, non parum faciunt, sicut & anisum, & zin-
 giber, quorum singulorum accipitur dragma: quatenus verò ad pur-
 gandi rationem pertinet, cum agarici, colocynthidis, polypodii, &
 chebularum myrobalanorum singillatim dragmas duas accipiat, fa-
 lis autem gemmæ dragmam, turbith dragmas sex, insignem vim ha-
 bebūt pituitam crassam educendi; totidem verò dragmæ aloes, &
 præterea diagridii, vel scammonii, quod idem est, ex pomo cocti, cū
 rhabbaro, & pari pondere citrinarum myrobalanorum, non mi-
 nus in purganda bile poterunt, quæ etiam iuuare poterit electua-
 rium rosatum, de quo superius verba fecimus: sed & aliquid præte-
 rea atri humoris, licet inodicum, ex dragmis duabus indartum my-
 robalanorum, & vna epythimi: quamuis & polypodium hæc non ni-
 hil iuuet, zingiber verò, & anisum ad extenuationem crassorum hu-
 morum proderit vnâ cum sale; rosæ item aridæ cum myrobalanis,
 & mastiche, cuius quoq; dragmam accipit, poterunt temperare cali-
 diora medicamēta, & colligere, vnireq; substantiam viscerū, ne vio-
 lentia purgatiū medicamentorū laxata dissoluantur, correctum ergo
 medicamentum, & tutum, satis tamen efficax; quod plurimū pōt ad
 diuturnas, & nothas febres; quales sunt autūnales, quæ variis humo-
 bus, & pertinacibus putrescētibz solent excitari: ita etiā in aliis mor-
 bis ventriculi, capitis, instrumentorum sensuum, in obstructioni-
 bus lienis, & iocinoris, quæcunque purgationem liberalem re-
 quirere visa sunt: dosi vero medicamenti istius est, vt usque ad
 sesquidragmam accedat, nam dragma satis copiose purgare po-
 test, quia præter id qd habet & electuariū rosatum, quo reliqua assu-
 muntur: singula dragma continet grana circiter septem scammonii,
 totidemq; turbith, agarici autem, & colocynthidis paulò plus gra-
 nis duobus, liberaliori autem purgatione si fuerit opus, possit &
 sesquidragma accipi. Pillulæ autem quæ ex rhabbaro nomen ha-
 bent,

bent, non illæ quæ ex arabico uocabulo hoc est Rhauet habent nuncupationem, nullū accipiunt forte, uel uiolentū medicamentū, accipiunt enim dragmas rhabatbari tres, succorum autem absinthii, & liquiritiæ dragmam, citrinarum myrobalanorum dragmas duas, & semissem, hyerę aut picrę simplicis dictæ decē drag. uñ neq; in hoc medicamentorum ordine sunt ponendæ, sed in primo: dosi uerò earum, si etiam duas dragmas excederes, obesse minime posset, sed utiles admodum essent, ubi ex longioribus febribus, ex ualidis obstructionibus adeo esset robur tum uentriculi, tum uel maxime iocinoris factum imbecillum, ut iam in hydropem, & malum corporis habitum res procliuius esset: nec dum amplius ualidas purgationes uiscera languentia possent perferre, uacuatione tñ egerent: uerū leui, & facili. Sed ne simus longiores, agamus de pillulis, quas in das appellauere, atque in Hali auctorem arabes retulere: conficiuntur autem acceptis myrobalanis indis, & ueratro nigro, polypodio quę, singulis ad dragmas quinque, epithymo autem, & stæhcade ad dragmas sex, agarico, lapide cianeos, quem lazulum Arabes, & iuniores uocant: & eo quidem optime loto, itidem & colocynthide, & sale indo, singulis ad dragmas quatuor, succo autem eupatorii, insuper & spica, singulis ad dragmas duas caryophyllorum ad dragmā, hyera picra ad dragmas decem, & ex eis assumptis ex succo apii fiūt pillulæ, quæ utiles admodum sunt purgando succo melancholico: nam nigrę myrobalani, ueratrum nigrum, & polypodium, & epithymum, lapisq; caneus præsumt purgationi melancholici humoris, ex colocynthide uerò, & agarico, & sale indo aliquid etiam puitæ purgare poterunt: uñ præsertim, cōmodū medicamentū his erit, qui tentantur melancholicis affectibus, ut sunt quartanæ febres & iſteritia nigra, quæ uitio lienis concitatur, & cancer, & elephantiasis, & reliqui melancholici affectus: harum autem dosi commoda erit ā dragma ad sesquidragmam, uel paulò plus: quamuis ad tres usque dragmas accesserit Mesue: ualentia enim satis simplicia accipit, & si scammonii sit expertus, nam & nigrum ueratrum, & colocynthim, & lapidem caneum, & sal copiose satis accipit: quæque enim dragma continet circiter quinque grana, tam ueratri, quàm polypodii, agarici autem, colocynthidis, & lapidis canei circiter grana quatuor, itidem & salis. Sed & in foetidis pillulis, quas ideo foetidas fuisse dictas puto, quia sagapenum, & opoponacem & castoreum, quæ grauem spirant odorem, copiosa accipiunt, & de quibus

Victoris Trincauellij

quibus sermonem nunc habere volumus, amplior aliquanto mihi dosis illis præscripta à Mesue videtur, quàm ratio requirat, mihi-
que videretur satis esse posse modestam dosim, dragmam, vel ad
summum sesquidragmam, quòd si diligenter rem æstimemus, mul-
ta accipiunt valentia simplicia, nam præter eas, quas gûmas Arabes,
& iuniores appellant, accipiunt colocynthim, scammonium, & tur-
bith satis copiosa, componuntur enim in hunc modum, vt accipian-
tur singulorum horû dragmæ quinque, nimirum, sagapeni, ammo-
niaci, opoponacis, bdelii, colocynthidis, sylvestris rutæ, epythimi,
aloesque, duæ autem tum hermodactilorum, tum eius, quam vul-
go esulam appellant; scammonii verò, itemque turbith quatuor, ci-
namomi, spicæ, croci, castorei, singulorum dragma, zingiberis ses-
quidragma, euforbii quinque scrupuli, compositio his omnibus fe-
re constat, quæ crassos, & crudos humores possunt euacuare præ-
ter epythimum, & scammonium, quorum alterum potius atram, al-
terum magis flauam bilem purgat: nam aromata, vt zingiber, cina-
momum, spica, crocus, & bdelium, & ammoniacum, etiam accepta
sunt tanquàm corrigentia, & reprimentia malitiam purgantium
medicamentorum: nam bdeliuni, & ammoniacum crassos, & indu-
ratos humores, vel etiam in articulis emollire possunt, & digestio-
nem iuuare; sed potentia sunt omnia ferè ea medicamenta, vt vim
habeât trahendi pertinaces humores à remotioribus partibus, vt
sunt articuli: vnde in articulorum doloribus, qui à frigidiori humo-
re excitantur sunt in frequenti vsu, neque tamen his adeò valenti-
bus medicamentis inter initia, antequam maturescat aliquantiſper
crudus humor, temerè vti oportet, quod & quidam iuniores no-
nuere, sed prius coquenda est cruda materia, accipit autem singu-
la istius medicamenti dragma primorum circiter grana quinque,
scammonii, & turbith circiter grana quatuor, vnde potest sæpissi-
me dragma esse satis, vel ad summum sesquidragma, quatenus ad
dosim earum pertinet. Pillulæ autem leucis maiores, quæ & ipsæ
sunt in frequenti vsu, præsertim uerò in affectibus oculorum, sed
& aliorum sensuum instrumentorum, faciles, & lenes satis sunt, nā
quamuis habeant turbith, & colocynthim, præterea uerò, & agari-
cum, dragma tamen priorum duorum grana neque duo capit, agari-
ci uerò paulò plus tribus, ut præterea scnam, rhabbarbarum, epythi-
thimum, & aloem, quia omnia sunt facillima medicamenta: nam
imprimis aloes uidetur tanquàm basis huius medicamenti, deinde
agaricum,

agari cum, & sena: unde præcipuè pituitæ purgandæ erunt accõmodatæ, agaricum enim iuuant colocynthis, & turbith, & myrobalani tres: videlicet chebulæ, emblicæ, & bellericæ, vt præteream opoponacem, & sagapenû, quæ præter id quod & ipsa aliquid faciunt ad pituitam ducendam, addunt etiam vim, ut possint à remotioribus attrahere, aromata vero omnia, & semina attenuantia, vt, dum de hyera haberetur sermo, ex sententia Gal. exposuimus, addita aloë, & aliis medicamentis leuioribus id præstant, vt facilius, & valentius possint crassos humores, & pertinaces detrahere: unde illis additis, turbith, & rhabarbarum & aloë, & sena idem præstare poterunt: purgant tamen hæc pillulæ præterea & bilem flauam, & exustam, quæ iam in atram uergat; nam rhabarbarum, citrinæque myrobalani, & aloë, flauæ bili purgandæ: indæ verò, sena, epythimûq; atræ ducendæ accommodantur, multiplices ergo, præsertim uerò pituitosos humores purgant, & earum modesta dosis potest capere dragmas duas, quamuis ad tres usque Mesue concesserit: sunt enim faciles, & tutæ: harum autem confectio in hunc modum se habet: accipiunt rosarum, uiolearum, absinthii, colocynthidis, turbith, cubebæ, calami aromatici, nucis moscatæ, spicæ, epythimi, carpobalsami, xilobalsami, siseleos, seminis rutæ, schænantii, assari, masticis, caryophyllorum, cinamoni, anisi, fœniculi, apii, cassiæ, croci, macis; singulorû dragmas duas, myrobalanorû quinque, rhabarbari, singulorum dragmas quatuor, agarici, senæ, singulorum dragmas quinque, euphragiæ dragmas sex: plurimû autè ualere aiunt euphragiam ad acuendum uisum, sicut & fœniculum. Nonnullis deinde interpositis tandem describuntur à Mes. pillulæ, quas ubiq; pillulas de agarico Mesue appellant, & parant; quibus etiam quàm frequentissime, & fœlici successu utuntur in affectibus pectoris, & instrumentorum sensuû, cû obsidentur à crassa, & lenta pituita, sicuti in asthmaticis, & diuturna tussi laborantibus: accipiunt autè agarici drag. 3. iridis, marubii, singulorum drag. 1. turbith drag. 7. hyeræ picræ drag. 4. colocynthidis, sarcocolæ, singulorû 3. ij. myrrhæ 3. j. harû ferè basis in purgando est turbith: cætera uerò partim adiuuant, vt colocynthis cum agarico, partim corrigunt, ut picra, partim detergunt, & attenuat crassos, & lêtos humores; sicut radix iridis, marubium, & myrrha, ut facilius possint detrahi: harum dosis potest accedere ad sesquidragmâ, quâuis sæpe & dragma purgat modeste, quæq; n. dragma totius medicamēti

continet turbith ferè grana sexdecim, agarici verò paulò minis no-
uem, colocynthidis circiter sex. Multis in locis in aliquo vsu sunt
pillulæ, quæ habuere nomen à lapide cianeo, quem lazulum vocâr-
nini rum ad purgandos melancholicos humores, exustosque: qua-
rum confectio est, vt accipiantur lapidis cianei drag. vj. agarici, epy-
thimi, polypodii, singulorum drag. viiij. scammonii, nigri veratri,
salis indi, singulorum drag. 2. s. garyophyllorum, anisi singulorum
drag. 4. hyeræ picræ drag. 14. omnia autem assumantur in pillulas
ex succo endiuiz: si rectè autem rem velimus æstimare, pituitam
etiam præter atram bilem, licet valentius atram bilem, purgant, &
sunt aliquantò indis fortiores; vnde & aliquantò minor est earum
dosis; ad sesquidragmam enim ferè potest accedere, quamuis &
dragma possit madeste purgare. Sed & de pillularum ex hermo-
dactylis, tam maiorum, quàm minorum, ratione pauca quædam di-
camus, & huic capiti finem imponemus: ad podagras, & articula-
res dolores vtræque possunt, sed non eodem modo; nisi quòd, si-
cuti ferè semper hi dolores ex mixta materia, tum calida, tum fri-
gida excitantur; quamuis interdum calida frigidam; & copia, &
viribus superat; interdum verò contraferes habet: ita vtræque
confectiones utrosque humores purgant, magis tamen frigidos
maiores; calidos verò minores: accipiunt enim maiores hermo-
daetylorum, aloes, citrinarum myrobalanorum, turbith, colocyn-
thidis, bdellii, sagapeni, singulorum drag. 6. castorei, sarcocollæ,
euphorbii, rutæ syluestris, apii, singulorum drag. 3. croci drag. 1.
s. formentur ex succo caulium: vnde priorum medicinarum cir-
citer duodecimam partem singulæ æquant totius medicamenti,
vel parum admodum plus; singula enim dragma continet vniuf-
cuiusque earum ferè grana quinque: secundus verò ordo medi-
cinarum vigesimam partem, vnaqueque enim dragma continet
vniuscuiusque earum ferè grana duo & dimidium: nemo autem est,
qui non percipiat maiorem vim habere purgandi pituitam, & fri-
gidos humores: harum vero dosim posse extendi vsque ad sesqui-
dragmam: quamuis sæpius & dragma possit esse satis. Minores ve-
rò conficiuntur ex drag. v. hermodaetylorum, duabus & semisse
scammonii, tribus myrobalanorum citrinarum; duabus rosarum,
& decem aloes: quæ omnia, quòd exceptis hermodaetilis pur-
gent bilem, res satis clara est, capit autem singula dragma pau-
lò minus septem granis scammonii, hermodaetylorum, verò du-
plum;

plum; sed & electuarium rosatum, ut in priori capite ostendimus, aliquam insignem vim habet purgandi; unde nunquam, vel rarissime excederet sesquidragmam: sed sæpius mihi satis esset dragma.

De trochiscis, in quibus vis purgatoria est insignis. Item & de pulueribus.
Cap. 18.

ANtequam finem libro primo imponamus, adhuc paucula quædam nobis exponenda videntur: quædam enim medicamenta sub trochiscorum nomine in usum frequentem medicis in curandis ægrotantibus veniunt; quæ tamen vim purgandi insignem habent: sunt autem hæc præsertim tria. Primum pastilli; vel trochisci, qui ex violis passim nuncupantur, & ab eodem Mesue referuntur, ubi de asthmatis curatione agit: horum verò confectio in hunc modum se habet; ut acceptis floribus violarum, qui neque plene virides, & humidi sint, neque omnino aridi, sed medio se habuerint modo, ad dragmas sex, turbith ad dragmas 4. succo liquiritiæ, manna, & scammonio, singulis ad dragmas duas; ratio compositionis ostendit eos vim habere, quæ leniant partes in pectore contentas ex violis, & succo liquiritiæ; & moderate humectando possint facilem excretionem facere excrementorum, quæ instrumenta spiritus obsident, ex turbith verò, eò quod acuitur, & iuuatur à scammonio, possunt crassam pituitam; vel in remotioribus partibus residentem purgare: accipit autem singula horum trochiscorum dragma scammonii grana septem, & dimidium ferè; turbith verò grana quindecim; unde & dragma una satis liberaliter purgare potest; plerunque tamen aliis medicamentis immiscemus, easque sæpe, sed & potionibus, quibus plus, minusve, cum his voluerimus uti; pro ratione medicamenti hos trochiscos immiscemus; nam cum vncia mannæ, vel simili medicamento facilis, & levis, commodaque, & liberalis sequetur purgatio; sed cum aliis solventibus, & valentioribus medicamentis cautius erit agendum: verum & id aduertere oportet, quod apud plures pharmacopolas dupliciter seruatur hoc medicamentum: nam & completum, ut nuper fuit expositum, nempe

cum scammonio, præterea, & non ita completum, sed in quo desideretur scammonium, & hoc modo solum est turbith, in quo sit vis purgatoria propriè: atquè ita leuius longe medicamentum erit, minusque acre; ita ut sæpe vnciæ cassiæ, vel alterius medicamenti, vel aliis potionibus, ætate præsertim, cum minus calefacere, & minus exagitare corpus volumus, duas etiam dragmas, vel sesquidragmam damus: solent autem cauti medici, ne error committatur, præscribere seplasiariis, quos nam velint iniici, vel commisceri medicamento, quo vsuri sunt, atque ista illis indicare, accipe trochiscorum ex violis sine scammonio: si illos opportuniore fore putauerint; vel cum scammonio: si hos, draginam exempli gratia vnam. Sed ad alios transeamus, si illud prius addiderimus, nempe quòd qui citra scammonium accipiuntur, pituitæ purgandæ accommodatiores sunt, nam in eis præter turbith nihil est, quod vim propriè purgandi habeat, reliqua enim potius temperant, & leniunt: qui verò scammonium accipiunt, non minorem facultatem habent educendi bilem, quàm pituita. Dux præterea sequentes pastillorum compositiones, illi quippe, qui ex agarico dicuntur: & qui arabico nomine alhandal appellantur, excogitatæ sunt propter correctionem colocynthis, & agarici: ut videlicet hæc duo medicamenta, quæ antiquis medicis solita sunt esse in vsu frequentissimo: vbi esset purgatione pituitæ opus, præsertim ex remotioribus particulis detrahenda: semper parata haberent: nec quo tempore eis utendum esset, parare statim cogerentur: partim igitur propter commoditatem parata ex arte haberi uoluere: partim verò propter vtilitatem: nam si diutius parata seruentur, atque composita cum illis simplicibus, quæ vim haberent aut vires eorum augere, aut malitiam corrigere, melius in unionem quandam venientia, simul unitis singulorum facultatibus, & mutua, ut iuniorum non inepto uocabulo utar fermentatione faciliora & magis correctæ, temperatæque sint; agarico verò in his trochiscis illa addunt, quæ vim maiorem in purgando habeat (accelerant enim eius operationem,) alioquin lente vacuat, atque ut facilius à ventriculo, præsertim verò ab ore eius descendat, cui molestiam asserre, & fastidium, sæpe etià uomitum concitare præ leuitate sua possit: contra verò colocynthim potius illis parant, quæ vim eius, & acrimoniam obtundat, & deliniant

deliniāt, mitioremq; in purgādo reddant. Trochisci verò ex agarico (quos & hoc nomine significant medici:& interdū agaricū trochiscatū appellant) ita parantur: accipiunt electissimū agaricū (nihil. n. maioris momenti est in pharmaceutice medicinæ parte:& ea præsertim, quæ versatur circa purgantia medicamenta, quàm ut ea eligantur, quæ optima sunt: alioquin omnia cedunt in ruinam vitæ ægrotantiū, & honoris medicorum) idq; in puluerem redigūt: demerguntq; sæpius in vino, in quo fuerit zingiber maceratū, aliqui addunt & spicam: deinde pastillos conficiunt, sæpissime verò & sal gemma, & oximel addunt: & tunc vulgò agaricū præparatū dicitur, ex mistione verò salis gēnæ redditur aliquantò acrius medicamentū, & quod citius possit operari, mitius verò, si citra id fiat: horū trochiscorū aliquando sesquidragmā: interdum & dragmas duas, vel seorsum citra aliorū misturam: vel si leuibus, & lenibus medicamentis immixtos deuorandos offerramus: sed si cum aliis valentioribus misceamus: pro ratione aliorū metimur copiam horū: ne totū postea cōpositum medicamentū nimis acre, & potēs euadat. Alahandal autem ita parantur: accipiantur colocynthidis interior pars abiectis seminibus, & incidatur, quantum ars requirit: mox macerentur tragachantum, gummi, & bdellium ex aqua rosacea: in his enim facultas est, qua possit mitescere, & leniri omnis acrimonia, & calor temperari, quo peractio colocynthidis eo glutinoso humore perfusa, & assumpta in pastillos formanda, qui in umbra deinde siccandi sunt, & postea iterum exquilitate terrendi, rursusq; aspergendi eodē humore, iterumq; formandi pastilli, qui postea cōgrue seruandi sunt: his medici in cōpositionibus vtūtur pro colocynthide, ut potè, quoniā longe mitiores, & magis tuti, quàm colocynthidis sola: deoq; de illis nihil præterea dicendū: cū de colocynthide sit superius sermo habitus. Sed & pulueres quidā in vsu esse solēt ad purganda corpora: nobis autē duorū memuisse satis erit. Prior autē est, cuius superius facta est mētio, qui puluis senæ præparatæ dicitur: cuius duplex est apparatus, primus, & simplicior: de quo superius habuimus sermonem, & alter, qui accipit diagridium ad dragmā mediam; salis indi ad semunciam, senam ad uncias quatuor, faccē uini ad uncias 4. macerē ad tres dragmas, cinamomū ad sesquidragmā: eius facultas est, ut præsertim melēcholicos et exustos humores purget, sed & aliquid pituitæ, & flauē bilis additur enim sal indū, senæ, huius uncia accipit paulò minus granis

sex scammonii: variis tamen in locis plus minusve addunt scammoni: quantum verò ad medicamentum pertinet; non est adeò accere, quin possint dari etiam tres dragmæ: nam capient senæ dragmas duas: salis gēnæ sex, vel septem. Alter verò pulvis hermodactylorū dicitur, qui & pulvis hermodactylatus vulgò dicitur: vtuntur autem eo etiam vulgares nullo etiam medico instituyente, quando obnoxii sunt podagricis, vel articularibus doloribus, & accepta semuncia liberaliter, & sine multa molestia purgantur: cuius compositio accipit anisorum, zingiberis, cinamomi, singulorū scrupulos quatuor, hermodactylorum dragmas duodecim, diagridii dragmam vnam, mediā autem salis indi: semūcia autē scrupulos octo hermodactylorū continet, diagridii verò supra duodecim grana: vnde non ita temere dandum omnibus id pondus medicamentū: nisi corpus sit robustum: alioquin enim valēs adeò medicamentū est, ut tres dragmæ, & minus possint satis copiosam moliri vacuationē.

De ratione commiscendi mutuo medicamenta composita, atque composita cum simplicibus, & de potionibus. Cap. 19.

Quamuis de ratione componendorum medicamentorum in uniuersum, quantum huic instituto satis esse poterat: superius abunde egerimus, quia tamen non solū simplicia mutuo componuntur, sed interdum & simplicia cū compositis, atq; cōposita cū compositis cōmiscentur; quarū sanè cōpositionū modus licet illis, quæ in uniuersum exposita fuere, recte perceptis, cognitu non sit difficilis: cum tamen tyronibus, & adhuc inexpertis medicis scribamus, qui solent nonnunquam in his etiam, quæ facilia sunt, hæsitare (qui enim uersati aliquandiu in hac arte sunt, nostro non egēt libello) ideo non ab re fore censemus: si particularim etiā de hoc aliqua verba fecerimus, vt tamen de his medicamētis duntaxat habeamus in præsentia sermonē, quibus in purgando corpore utimur: de aliis enim suo postea loco erit agendū. Sed hoc primum tāquā īstius negotii fundamentū ponamus: medicos peritos: cū medicamenta cōmiscant; & addunt aliqua simplicia illis, quæ recte fuerant composita, aut cum composita compositis admiscant, eos non temere, neque inconsulto, sed potius ex ratione id agere: vnde hoc nobis in præsentia onus incumbit, vt rationes explanemus, quas sequentes iuniores medici aptè & ipsi has mixturas moliri discant:

scant: vniuersa autem istius rei ratio, vt & prius exposuimus, à natura medicamenti, aut à natura affectus, aut à natura corporis purgandi petenda est: à natura quidem medicamenti: aliquando enim aut valentius est medicamentum, aut infirmius, quàm ratio aut morbi, aut roboris corporis, aut copiz humorum purgandorum requirat: quare, vt id valentius, aut infirmius reddamus aliud tum simplex, tum compositum addimus: sicuti, vt particulatim rem tractemus, exempli causa; ponamus duos esse purgandos, qui capitis dolore tententur ab eodẽ humore, quorũ alter iam sæpius fuerit purgatus, super sint autẽ aliq̃ reliquie, sed non multę: alter verò nondum fuerit purgatus: inmo scateat excrementis: ita vt copiosam requirat purgationem, velim autẽ vti pillulis cochiis appellatis: sed earum dragma alteri sit nimis, alteri sit parum: alterum duorum faciemus, nam vel in altero de pondere detrahemus, dabimus autem scrupulos duos tantũ: in altero verò addemus semis scrupulum, aut scrupulum integrum: vel in priori miscbimus cochias cum aliis leuioribus pillulis: vt sunt exempli causa, quę ex simplici hyera, aut quę ex ea addito agarico cõfectę sunt: singularum autem accipimus semidragmam: at verò quia ea omnia, quę in hyera accipiuntur, vim habent corrigendi acrimoniam medicamentorum fortium, quę cochiaz accipiunt: ideo pillulę factę, & ex his duabus mistę faciliorem purgationem, & cum minori molestia molientur, quamuis pondere, & copia alias, quę constant solis cochiis, superent: in altero verò vel cochiarum pondus augebimus addito præterea semis scrupulo, aut integro scrupulo, aut simplex aliquod addemus, quod eas exacuat, & id simplex addemus, quod nobis ostendet ratio vacuandi humoris: nam aut diagridii duo vel tria grana adiiciemus: aut veratri, aut colocynthidis: sed interdum non tantũ causa vacuandi plus minus ve addimus: sed ratione alterius alicuius qualitatis, quam moderationem cuperemus: quemadmodum si æstate nobis videretur esse dandas pillulas, timeremus autem calorem, cum pleręque calefaciãt, aliquid permisceremus, quod vim refrigerandi habeat: sicuti si dragmę pillularum adderemus aut semis scrupulum myrobalanorum, vel, vti aliqui, santalos; aut ipsas reformari, vt dicunt, vel iterum assumi ex succo rosarum institueremus, vel violarum, vel cicorii, vel alicuius id genus alterius, vel saltem ex aliquo refrigerante syropo, aut vti consilio Auicennę 4. Fen. primi can. pillulas ex

aliquo de octo exhibendas curaremus, uel, ut ipse ait, ex apozima
 te facto ex rebus, quæ aut refrigerent, aut lenitate faciliorem adiu
 uent purgationem, aut si refrenationem aliquam pillularum in pur
 gando desideraremus, fieret ex astringentibus, de quibus postea
 suo loco sermonem habebimus. Nonnunquam etiam componimus
 simul pillulas cum aliis simplicibus, vel cum aliis pillulis alia pla
 ne ratione, quam insinuare uoluissè primo de compositione medi
 camentorum secundum locos Gale. visus est: nimirum, ut medi
 camentum, quod aliqua particulatim ratione nobis fore utile puta
 remus: non tamen tanta in eo vis esset aliquos noxios humores
 purgandi, quanta egeremus, quia illud alterius humoris magis pur
 gatorium cognosceremus, quem illius, quem nos esse purgan
 dum censuimus, aliquod simplex immiscebimus, quod ipsum
 promptius ad humorem hunc vacuandum reddat, exemplo au
 tem rem hanc a Gal. eodem loco petito explanabimus: hyera quæ
 primum fuit in medicamentum, quod hoc nomine ideo fuit appella
 tum, ut 8. eiusdè operis libro testatus est Gal. quia erat tanquam sacra
 anchora, ad quam confugiebant prisca medici in arduis, & maximis
 morbis, cuius, ut superius ostendimus, fundamētū est in colocyn
 thide: unde & diacolocynthidos græce dicta est, postquam & aliis
 medicamētis nomē id inditū est; sicuti illi, quæ dialoes nuncupata
 est distinctionis gratia: unde hæc, ita ut secundū primā cōpositionē
 se habet, pituitam euacuat: sed interdum, ut eodem primo de com
 po. med. & 2. de ratione victus in acut. mor. scammonium addebāt;
 interdum uigrum ueratrum: & hoc, cum erat atra bilis educenda
 illud verò cum flaua: eodem modo nunc Patavi cæperunt hæc ea
 dem de causa cochias pillulas habere paratas, in quibus pro colo
 cynthide trochiscos alhandal apponunt, atq; longe minori ponde
 re hos ponūt, quā colocynthim imposuerint Rasis, & Mes. cū tamē
 Mesue consulat, ut, cū pro colocynthide trochiscis illis sumus usu
 ri, pro duabus dragmis, & scrupulo colocynthidis iniciamus qua
 tuor eorū trochiscorum, copiosius postea veratrū apponunt: nimi
 rum dragmas duas, & minimā portionē diagridii; nā circiter semi
 dragmā: unde hæc pillulæ bilis quidē, & pituitæ, aut parū, aut nihil
 educunt, primū autē atrā bilē purgandam respicient: alii verò pro
 suo arbitrio mutant tū veratrū, tum aliorum simplicium portionem;
 de quibus non est, cur hic particulatim agamus, cum hæc in exēplū
 sint proposita: quia tamen res hæc nō modici momenti est: ideo nō
 unico

Cap. 2.

Cap. 3.

unico exēplo, aut altero contenti aliis etiam utamur: interdum ergo: si nobis propositum fuerit aquosos purgare humores: sicut in aqua intercutit: Mesue autē hēt pillulas ex chamēlea, quā mezereō ipse vocat in suo grabadin, & illas esse huic officio aptas ait; Nicolaus verō pillulas de elaterio: verum raro ad eō in vsum veniunt, ut semper ferē sint inueteratæ: ut facile existimare possimus, iam earum vim esse exoletam, aut si etiam recentes fuerint, timemus earum acrimoniam, & agitationem; quare, ut res magis tute succedat, accipiemus aliquas pillulas faciles, & quæ acrimonix sint expertes: immo sint potius suapte natura tales, ut & roborare viscera, defendereque possint, & reprimere malitiam auctorum medicamentorum: sicut sunt pillulæ, quas superius descripsimus à Mesue ex rhabarbaro appellatas, & scrupulo earum vni, vel alteri iniiciemus grana tria, vel quatuor elaterii: eisdem etiam; si crassior, & pituitosior humor esset educendus, aut trochiscos alhandal, aut colocynthim adderem ad id pondus, quod nobis videretur fore satis, ut quatuor, vel quinque, vel sex grana, & ulterius quandoque: sæpe verō eadem ratione pillulas cum pillulis miscemus: ut interdum cochias cum aureis: & eas pari pondere: nam cochix crassos, & pituitosos magis: tenues vero, & biliosos aureæ: nempe cum pariter volumus utrosque humores purgare; sed si aliquanto plus videatur purganda pituita, aurearum vnum acciperemus, cochiarum vero duos scrupulos: sicuti contra, cum plus bilis esse expurgandum videretur in capitis doloribus: ita in affectibus oculorum pillulæ, quas sine quibus appellari diximus, utiles sunt, & eas esse aptiores diximus calidis, & biliosis humoribus, pituitosis autem, frigidisque purgandis congruæ sunt, quæ lucis maiores dicuntur, utraque verō commiscemus; quandoque pari pondere; quandoque verō inequali: ita quandoque non modò duas: verū & tres componimus ex eadem ratione. Quibus autem de causis solent pillularum fieri compositiones, vel plurium earum mutuò, vel cum simplicibus medicamentis, eisdem etiam, & totidem quotidie fiunt diuersarum medicinarum, quæ teneriori substantia constant, quales sunt, quæ ab Arabib. & nostris iunioribus electuaria passim dicuntur, nā & cassiæ sæpe alias addimus cōpositas: interdū diastbestē interdū diaphænicon, interdū diadamascenō, & alia quæcūque fuerit superius exposita secūdū eandē rōnem, secūdū quā & pillulas misceri diximus: interdū verō simplicia immiscemus simplicibus: sicuti agaricū cassiæ, præsertim in affectibus pectoris, addere solemus:

tamarindos

Victoris Trincauellij

tamarindos autem, ubi sit opus maiori extinctione, ita Gal. cum uel
 let purgare bilē, immiscuit sero lactis scāmōniū: sed & cōposita cō
 positis, ut electuario lenitiuo uel diacatholico addimus, uel dictā
 confectiōem hamech, uel indum electuariū, uel illud, quod
 ex psilio fit, nempe ut hęc leuia exacuamus, & illis uim ma
 iorem, uel uarios humores purgandi addamus: ita interdum
 diaphænicon cum rosato, uel cum hamech, uel cum aliis:
 nec, quantum ad hoc pertinet, aliam rationem habemus; quam his
 addamus: præter eas, quas de pillulis exposuimus: nisi hanc, quod
 hæc teneriora medicamenta diluendo ad potioniis formam, uel con
 sistentiam deducimus, quod & si in pillulis etiam fieri possit, & ab
 aliquibus etiam fiat; raro tamen id accidit: idē de his, uel de eorū
 usu in hunc modum pauca quædam dicenda sunt, antequam clau
 damus hunc librum: & accipiemus initium ab eo, quod in superio
 ri loco fuit expositum, nempe quod, quatenus ad formam medica
 menti pertinet, pillulæ, uel catapotia magis euacuare solent, quàm
 quæ electuaria, uel boli dici solent, & boli, quàm potiones: diximus
 autem, quatenus ad formam, uel consistentiam pertinet, quia id in
 telligendum est seruata in cæteris paritate: nisi tamen pillulæ inter
 dum adeo exiccatæ induruerint, ut quasi lapidis quidam superari, &
 ad actum deduci à ventriculo nequeant, quod si acciderit: turbare
 quidem possunt, neque tamen purgant, quare huic rei consulere vo
 lētes medici iubent, ut uel uomitu reiiciantur, uel superbibito iure
 aliquo procurent, ut humescant, & molliantur: unde fortasse fa
 ctum est, ut plerunque aut ex modica aqua, aut ex uino, aut ex iu
 re accipiantur, sæpiissime etiam medici, quando exhibituri sunt pil
 lulas, præcipiunt eas ex aliquo liquore (ut aiunt ipsi) reformari.
 Sed cum de aliis satis esse possint, quæ hæctenus exposuimus, pauca
 quædam præterea dicamus de illis, quæ pertinet ad rationem me
 dicamentorum, quæ potanda quotidie dantur: constat autem po
 tiones fieri ex simplicibus aliquibus medicamentis decoctis ex ali
 qua aqua, & ea, uel communi, uel arte facta: ut sunt stillatitiæ, uel
 ex iure aliquo, uel ex medicamentis demersis, & maceratis ex ali
 quo liquore, uel aliquo decocto: iuniores infusiones appellant; aut
 tertio ex medicamentis simplicibus: ut sunt casia, inanna, & tama
 rindi, diluunt, uel dissolutis ex aliquo humore, ut sunt aqua com
 munitis, uel stillatitia, uel decocta, uel ex his, quas infusiones vulgo
 diximus appellari: sed & ex compositis, quæ passim electuaria dicū
 tur

tur, eodem modo, quo ex simplicibus diximus, portiones parari solent: ex communi tamen aqua, qua ex puteo, vel fonte haustain potu, aut cibis coquendis vitimur, nunquam, aut saltem rarissime primum sunt medicinales portiones: sed ea tanquam materia ad paranda decocta vitimur: vnde neque de hac faciemus multa verba. Agamus ergo primum de stillatitiis aquis, quæ ex variis herbis per distillationem extrahuntur: neque tamen volumus in præsentia quæstionem illam examinare, an possit in his aquis aliqua vis remanere qualis erat in herbis, antequam fieret distillatio: quia mihi uanus uidetur is labor: cum experientia ipsa per tot annos attestetur aliquas vires seruari in istiusmodi aquis: sæpissime enim uidimus puerperas, quæ parce purgabantur, usu aquæ ex capillis ueneris distillatæ habuisse liberales purgationes, & in aliis quoque affectibus idem accidisse animaduertimus: neque mihi etiã præterea illi, qui secus sentiunt, rationem aliquam habere videntur, quæ non lubrico fundamento fundetur: aiunt enim, quod neque seruant odorem, neque saporem earum herbarum, ex quibus stillarunt: sed primum dicimus, quod si in uniuersum id loquantur, falsa dicunt: nam ex herbis habentibus insignem aliquem odorem aut saporem, itemque ex floribus multæ aquæ extrahuntur, quæ priorem saltem odorem seruant, sæpe etiam saporem, plerunque & alias facultates: aqua. n. rosaceam quis negat seruare odorem rosæ, præterea & quæ ex floribus citri, quæque ex floribus, quos gelsaminos appellant: sed longum esset nimis: si omnes uellem aquas persequi, quæ odorem retinent: immo multi etiam; qui peritiores sunt in arte distillandi, aquas per distillationem eliciunt, quæ saporem etiam seruant: præsertim uerò: si in duplici uase id fiat: quis enim non nouit: modo animaduertente, aquas ex cinamomo, & cæteris aromatibus extractas seruare acrimoniam tum odoris, tum saporis: quod uerò & cæteras qualitates seruent, quæ naturam, & formam, uel totam substantiam sequuntur, ipsa experientia apertissime demonstrat: nam ex rhabarbaro distillat, si illi in distillando diligentia adhibeatur, aqua, quæ pariter, uel saltem paulominus, quam ipsum rhabarbarum, uentrem purgat, & bilem flauã educit: sed illis præterea donemus multas esse aquas, in quibus nihil remaneat, quod odore, uel sapore id referat, unde distillarunt: quamuis multæ etiam sint, quæ referant tamen præterea non efficient, illas esse omnino inutiles: nam quotidie multis uiliter utimur in conficiendis medicamentis, quæ dum

seruan

Victoris Trincauellij.

nantur, aut alioquin parantur, odores eos mutant, aut omnino amittunt, quos prius habere: nam quædam sunt, quæ odores, ite & saporem fundatum in tenui quadam substantia dispersa in summis partibus habent, quæ facile, dum res arescunt, digesta à calore circumstantis aeris euaporat: quanta enim differentia est inter rosarum, & violarum flores, postea quàm aruerint? vtrisque tamen aridis in medicina utimur: sed addamus vnum, quod non est ab hoc instituto alienum: amigdalæ quæ amaræ sunt, insignem, & conspicuam habent amaritudinem, dum comeduntur: oleum tamen ex eis expressum: si tantisper quiescat, donec residente fæce clarescat, aut nullum, aut admodum obscurum seruat amarorem: ita ut à dulci modicissime differat sapore: attamen quis non expertus est illud nihilò secius, quàm amigdalas, esse viribus efficax. Sed de his satis: rem persequamur: cum aquas, vel decocta accipimus, vt medicamenta bibenda dari possint: illis aquis, uel decoctis diluenda sunt medicamenta, quæ, præter id quod ab eis dissolutiora euadunt possint etiam aliquam vtilitatem præstare, & adiuuare medicamentum, uel etiam se opponere alicui noxæ, quam ab ipso medicamentum timeremus: vtilitates autem has nobis ostendunt, aut natura loci affecti, aut natura affectus, aut natura, & facultas medicamenti: natura quidem loci affecti; quia si particulatim morbus aliquam in corpore particulam tentet, non sit autem qui totum corpus affligat, aquas, vel decocta parabimus, quæ præsertim sint illi particulæ commoda: vnde in affectibus instrumentorum respirationis, & pectoris ex illis simplicibus aquas, vel decocta parabimus, quæ, præter id quod sint apta scopis, quos nobis morbi natura indicat, familiaritatem quandam cum illis particulis habeat: unde si sit humor aliquis, qui eas partes calefaciendo, & siccando exasperet utemur aquis violarum, boraginis, maluæ, althææ, capillorum veneris, & si milibus: decoctis verò, ex floribus item violarum, maluæ, boraginis, radice althææ, radice dulci, uel, vt solemus appellare, liquiritiæ: fructibus et, quales sunt ziziphæ; vel, vt iuniores vocat, iuiubæ, & myxæ, uel, ut nunc appellant, sebesten: si uerò obsideantur partes à crasso humore, utemur hyssopo, bettonica, marubio, addita radice dulci, & sebesten: sed si aquis uti malle, aquis uteremur, quæ ex his eisdem herbis destillassent: in affectibus verò iocinoris endiuia, cicoreaceaque omnia, oxalis, seu acetosa, essent accommodata simplicia, ex quibus aut aquæ, aut decocta parentur: quam

do calidiores essent affectus. absinthii verò, & eupatorium, quod nunc agrimonium appellant, & marubium etiam: quando iecur à frigido, & crasso humore obsideretur, & obstrueretur. ita etiam si renes, illa essent accipiendæ, quæ renes suapte natura respiciunt, ut tamen & à scopis non sint aliena, quos nobis morbus affert: ubi verò morbus non sit addictus alicui definitæ particulæ, sed sit vniuerso corpori communis, habita ratione naturæ vniuersi corporis, quod à calidis, vel à frigidis soleat facilius male affici: morbum imprimis spectabimus: eis paratis decoctis, vel aquis, vnde sunt purgantia medicamenta diluenda, quæ adiuuent ad tollendum morbum, refrigerando, vel calefaciendo, vel attenuando, & aperiendo, vel reliqua præstando, quæ nobis esse agenda demonstrant indicationes, & scopi à morbo oblati, sed & natura medicamentorum, quæ vim purgandi habent, nobis rationem ostēdet aquas eligendi, vel decocta parandi, quibus potiones conficiendæ, & diluendæ essent: nam aliquando medicamentum dissoluendū vel diluendum: & si quatenus ad purgatoriam facultatem instituto nostro sit accommodatissimum, habet tamen annexam aliquam qualitatem, quæ non minus nocere possit, quàm purgatio prodesse: propterea quia nimis & calefaciat, & siccet, aut quia nimis acre, aut quia laxat, & turbat ventriculum, & reliqua viscera, vel quia saporem, uel odorem nimis ingratum habet: unde decocta parabimus, vel aquas eligemus; quibus corrigatur ea omnia, quæ possunt lædere, neque tamen impediant eam utilitatem, quam ex medicamento, quatenus purgatorium est, expectamus: vnde in febribus, in quibus uehemens est calor, quales solent in iuuenibus, præsertim uerò ætate, excitari, aquis refrigerantibus, ut sunt cicoreæ endiuix, oxalidis, sem. acetosæ, uel id genus aliis utemur in diluendis purgatoriis medicamentis, uel decoctis refrigerantibus, ut est decoctum fructuum, cuius Rasis, Auicenna, & Mesue meminere: quod in hunc modum se habet: acceptis prunis octo, sebesten uerò sex, & totidem iuiubis, tamarindorum semuncia, omnia coquantur ex aqua, ut ars requirit, & deinde abiectis fructibus hoc decocto utimur ad diluenda medicamenta: priores tamen authores addunt cassiam, & mannam: sed tunc tanquam integro medicamento utuntur ad purgationem facilem bilis: sine his autem eo utimur tanquàm apta materia ad diluenda alia medicamenta: sicuti ipsi mannam

& cassiam

& cassiam diluunt. mutant tamen medici interdum ipsius rationem, & quandoque detrahunt tamarindos, appellantque decoctū, vel aquam fructuum sine tamarindis: & hoc præferunt in quibus languet, & male habet ventriculus, & frigidiori intemperie: vbi verò ventriculo non timent, & rem maiori extinctione egere illis visum fuerit, duplum tamarindorum, nimirum vnciam apponunt, & appellant aquam fructuum duplicatis tamarindis, hyeme verò: vbi morbus ex crasis, & pituitosis humoribus ortum habet, alia decoctorum ratione erit opus, alia etiam aquarum, nam accipiemus passulas, liquiritiam, radicem, vel semina apii, fœniculi, & aliorum id genus radices: interdum verò si sit in iocinore, vel ventriculo infirmitas, eupatorium, seu agrimonium; præterea & absinthium, vt accepta semuncia passularum: liquiritiæ dragmis tribus, cæterorum parum, fiat decoctio ex aqua: sed si lien affectus videatur, pro absinthio, & agrimonio, accipiemus scolopendrium, & cuscutam, nam eiusmodi decocta attenuando, & aperiendo faciliorem facient futuram purgationem: præterea verò in melancholicis morbis decocta parabimus, quibus utemur in diluendis purgatoriis medicamentis congruis atræ bili expurgandæ, quæ & ipsa iuuabunt eam purgationem: sicuti si ita fiat, vt accipiantur senæ electæ drag. iij. epithymi drag. j. s. prunorum iij. passularum drag. iij. liquiritiæ drag. ij. semper enim hæc, quæ leniunt, vt sunt passulæ, liquiritia, & pruna, magnam afferunt in expurgandis melancholicis humoribus vtilitatem: his autem ex aqua communi, vel ex destillatione facta, decoctis, deindeque colatis fit commoda materia potionibus: possemus plurima verba de his facere: sed hæc in exemplum proposita satis fore putamus. Nec modò decocta hæc sunt apta materia potionibus: sed etiam macerationes: vel, vt vulgo loqui solemus, infusiones diuersorum medicamentorum simplicium: eorum inquam, quæ uim pungendi habent, commodam, & utilem materiam præstant, de quibus infusionibus pauca quædam dicamus. Non est vna, & simplex ratio, quæ monuit medicos, vt simplicia medicamenta macerarent: sed multiplex, & varia: sicuti neque vnus est scopus, qui nobis id esse agendum ostendit: nam interdum, vt malitiam & noxam medicamenti corrigamus: sicuti colocynthim infundere docent in aqua rosea: in qua tragacanthum, & bdellium fuerint dissoluta, vt in trochiscis alhandal ostendimus: interdum vero, ut & robur medica-

menti

mentis addatur, atque eorum operatio acceleretur: nam hac de causa agaricum in acetum, in quo prius fuit inaceratum zingiber, sæpius demergunt, ut priori capite exposuimus; interdum etiam fiunt eiusmodi inacerationes, uel infusiones, ut diuersę partes, quę in eo medicamento sunt, quęque diuersas naturas habent, separantur; & eis uti possumus, quę nostro instituto sunt accommodatiores. & hac præsertim ratione rhabarbarum consueuere medici infundere: docti quippe ab Arabibus; nam in eius diluto post infusionem remanent partes illę, in quibus maior est aperiendi uis: minima uerò astringendi, & dum percolatur dilutum, quò leuior sit expressio, eò minus particeps est astrictionis, & quò magis exprimitur, eò magis astringit. quę infusio, seu maceratio facienda est ex aquis, uel decoctis magis nostro negotio aptis, habita ratione temporis, uel morbi, nempe ut refrigerent, si aut calidior morbus, aut temporis constitutio requirere uideatur caliditatem rhabarbari temperandam, uel si ualidę essent obstructions, ea acciperentur, quę rhabarbarum iuuarent aperiendo, & attenuando: agaricum ergo interdum macerare soleo uel simul cum rhabarbato; uel seorsum ex alio decocto, si utroque simul uti noluerò, & id, quia fastidium, & uomitum ea præsertim ratione concitet, quò leuitate sua facile ascendit ad os uentriculi, & illud irritat, cum uerò infunditur, ac deinde colatur, remanet ferè sola uis, aut si aliquid substantię pertransit, illud adedò tenue, & parum est, ut non multam afferrat molestiam, unde sæpe obseruauì, quòd in hunc modum si exhibeatur minus uentriculum turbet, sed hoc præterea animaduertendum, ut cum paramus eiusmodi diluta cum medicamentis macerandis, ea interponamus, quę corrigendi, frangendique maliciam uim habeat, quęque accepta ex longa auihorum experientia sunt. Et si iam tempus opportunum uideatur, ut huic capiti finem imponamus: attamen, quia multa superius exposita sunt pertinentia ad pòdus, uel (ut aiunt) ad dosim tam simplicium, quam compositorum: semper autem addidimus: si illis utamur solis: & quia in hoc capite monuimus, quod sæpissime non solis utimur: sed uel composita mutuo miscemus, uel illis alia simplicia addimus: uidetur autè modus is loquendi insinuare non esse eandem rationem seruandam: cum solis utimur, & cum ea cum aliis præterea componimus: unde rationi consonum esse putarem, ut hac de re, antequam finem faciam, particula quædam subnectere: sed ponamus primùm hoc.

tan-

tanquā principium istius considerationis, quod tanquā certum, & cōstitutum ab omnibus ferè iunioribus acceptum est: nempe, quòd quemadmodum in aliis qualitibus contingit medicamentis: ita etiam in hac facultate, qua purgant: nam si alicui medicamento calefacienti alterum immisceamus, quod aut non calefaciat, aut minus quàm primum, remittitur vis calefaciendi, vt id minus calefaciat, quàm quando solum in vsum veniebat: atque ita de laxantibus, vel astringentibus, vel de aliis medicamentorum viribus sentiendum: quare cum sint aliqua medicamenta, quæ purgatoria sunt, & alia, quæ nullam vim purgandi habent, & in his, quæ purgatoria sunt, varii reperiuntur ordines, vt ostendimus; quia alia maiorem, alia minorem vim habent purgandi: quando simul miscemus quæ purgāt cum illis quæ non purgant, vel quæ in purgando infirmiora sunt: & id quidem siue de simplicibus medicamentis sit sermo, siue de compositis: semper vniuersum id medicamentum, quod ex ea mixtura resultat, remissiorem vim purgandi habet, & in ferioem ordinem, quàm haberent valentiora medicamenta, ex quibus id compositum fuit: vnde, sicut mutatur ratio virium in purgādo, ita etiam mutatur ratio dosis: nam quamvis in aliquo medicamento accipiantur, quæ in vltimo ordine sunt, vt scammoniū, colocynthis, & elaterium: quia tamen hæc habetantur, & remittuntur ex mixtura aliorum, quæ inferiora sunt, vel etiam quæ vim nullam purgatoriam habent; totum illud medicamentum ratione mixturæ deducetur ad secundum, vel tertium ordinem: & proinde liberalior erit dosis illius, quod cōmixtum est ex illis omnibus, quàm si vnum, vel duo administrarentur; sed neque mihi inepta videtur consideratio iuniorum, qui aiunt, quòd, cum plura commiscenda sunt medicamenta diuersi ordinis, non sunt ita temere commiscenda, & sine vlla ratione, & mutua comparatione; sed unumquodque eorum prius seorsum æstimandum est, quæ possit esse eius secundum se integra, & congrua dosis: deinde mutuò conferenda, & simul æstimanda, quanta possit esse horum, dum mixta sunt, apta dosis. neque vtriusque accipienda integra dosis: exempli gratia, si diaphaniconis, vel cōfectionis, quæ hashech dicta est, integra dosis se muncia: diahebesten verò compositi cum scammonio possit esse dosis congrua vncia, cum hæc componere simul voluerimus, non erit ex ratione factum, vt illius compositi ex utrisque detur sesquiuincia; nam non modò minus utriusque seorsum: sed longe magis purgabit:

gabit: ita magis purgabit, qui pillularum aurearū, & earū, quæ al-
 laiareth dicuntur, singularū autem dragmā accipiat, & eas mixtas
 dederit, quā si solas aureas pondere dragmę, & id quidem ratio-
 ne quantitatis, vel copię maioris, nā etiam leuia medicamenta mul-
 ta exhibita copia liberalem possunt moliri vacuatione: & interdum
 liberaliorem, quā modesta corū, quæ valētiora, & fortiora sunt,
 est. In trita philosophorū sententia, quod in maiori quāto vis ma-
 ior est: vnde considerandū est quādo medicamēta cōmiscēda sunt,
 quod & inter initia monebamus, an altero tantū egeamus: alterum
 verò addamus, ut illud, quod nobis præcipuū est, iuueamus, & ex-
 cuamus: nā si ita propositū sit, nō oportet id quod addimus, ad eius
 integrā dosim accedere: quia ipsum erit, quod euacuabit: nō illud,
 quod nolēbamus esse præcipuū, sed satis erit, si quasi calcar irrita-
 re, & excitare præcipuū medicamentū valeat: vnde vncię, vel ses-
 quiuncię cassię, itē & electuarii lenitiui, vel similis alterius adde-
 mus dragmā, aut rosacę, aut diaphēnicę, aut diaphēniconis, aut id
 genus alterius, vel etiā paulò plus: quod si vtriusq; ope egemus, quia
 varii sint humores purgādi, sicuti bilis, & pituita, accipiemus ro-
 sacę electuarium, & diaphēnicon, ex vtrōq; quantum videatur ex
 vtriusq; cōpositum medicamentū posse vnā dosim integrā confi-
 cere: ut si vtriusq; seorsum dosis sit semuncia, vtriusq; accipiemus
 drag. ij. sed si maiorē purgationem bilis volumus, accipiemus tres
 rosacę, & unā diaphēniconis, vel cōtra, si liberaliori esset opus pur-
 gatione pituitę, ita si sit opus pillulis cochiis, & aureis, vel singulo-
 rum semidragmā, vel alterius scrupulum, alterius scrup. duos: sed
 si miscendę sunt aureę cum mastichinis, aurearū semidragmā acce-
 piamus, mastichinarū dragmā, nisi primū vellemus mastichinas:
 illis autē exacuatō gratia aureas, vel cochias addendas putaremus,
 nam satis esset tunc dragmę mastichinarum addere scrupulum alia-
 rum, sed si mastichinas apponeremus, ut reprimere, & mode-
 rarent vim aliarum, tunc dragmę aliarum scrupulū, aut semidrag-
 mām mastichinarū adiceremus: quando ergo medicamenta sunt
 miscenda, ex omnibus oportet intergam dosim conficere, ut si alte-
 rius dimidiam dosim acceperis, dimidiā & alterius accipias, si par
 vtriusque fuerit necessitas, quod si inæqualis: alterius accipies tertiā
 dosis partē: alterius, reliquas duas tertiās, vel si quartam unius: al-
 terius tres quartas, si duo sint tantū necessaria: si verò sit opus tri-
 bus, seruāda est eadē particionis ratio. Huic tamē cōsiderationi &

H illud

illud addendum est, quod & hoc animaduertendum est, quod nullo medicamento, neque simplicis, neque compositi ratio dosis in quodam impartibili consistit: sed ampliores (ut superius fuit expositum) fines habet: est enim eorum summa dosis, est minima, & est media, quæ, ut sunt inuentæ in medicamentis seorsum, & secundum suam propriam rationem consideratis: quæ tamen ratio accepta est à collatione medicamento cum natura corporis, cui offerendum est medicamentum: ita & cum simul miscentur, spectare oportet & rationem morbi, propter quam purgamus, qui, ut ab humoribus concitatur, ita pro modo, & copia humorum, huius, vel illius medicamento plus accipimus, sed & naturam, & vires purgandi corporis inspiciemus, quia si corpus sit facile, ut à medicamento soluat, vel si vires non illæ sint, ut possint facile liberariorem, & conferim factam vacuationem ferre, continebimus nos intra fines mediocris etiam dosis; omnibus illis simul æstimatis, ex quibus commiscemus vniuersum medicamentum exhibendum: si autem corpus ualidum fuerit, & quod non facile purgetur à medicamento, ad terminos amplioris dosis accedemus: & aliquando, si indicationes, quæ nobis ostendunt miscenda medicamenta, non fuerint æquales, non æquales etiam sequemur doses: alterius enim, quod indicationem sequitur fortiolem, medietatem accipimus dosis maioris, alterius verò, quod accepimus ratione indicationis, quæ vim minorem habet, accipimus medietatem minoris dosis: possemus autem & exemplis hoc ostendere: verum quia nemo est, qui modò coram memor sit, quæ in prioribus capitibus exposita fuere, non facile hæc possit percipere: nos autem longiores etiam fuimus, quæ statim ab initio statueramus: ideo hic consistemus, & huic sermoni, qui est de medicamentis, quæ per os accipit purgant per inferiorem aluum, finem faciemus: & factis paucis verbis de his, quæ per sedem iniiciuntur, ut sunt clysteres, & glandes: posteaquam eandem ferè purgandi rationem habent, præterea verò, & de illis quæ per uomitum, huic primo libro coronidè imponemus.

De clysterijs.

Cap. 10.

Clysteres, quibus medici tanquam apto instrumento tam ad custodiendam, quam ad recuperandam sanitatem uti solent, & si sint uiribus, & officiis differentes, omnes tamen vnum commune

mune officium habent, quod aluum interiore inieci abluunt, nimium crassiora intestina, & abluendo, si qua in eis sunt, excrementa, educunt: unde clysteris nomen habuere apud Græcos à *κλύω*, quod ablueri significat: sunt ergo quidam eorum, qui nullum ferè aliud officium habent, nisi illud, unde nomen habuere: nempe quod eluant aluum inferiorem: & ab his sanè excrementis, quæ in eis suapte natura congeri solent, munda seruiunt, qui etiam vulgò communes clysteres solent appellari: alii verò acriores sunt, & vim maiorem habent: ut qui ex ea materia constant, quæ magis medicamento sã sit, & vim attrahendi habeat excrementitios humores à remotioribus partibus, quique acres clysteres à medicis nuncupantur: alii deterforii sunt, & vim detergendi habent, quibus solemus uti in vlceribus, præsertim intestinorum, cum illa fordida, & maligna fuerint, alia, quæ vim desiccandi, & consolidandi habent eadem vlcera: quædam quoque sunt, quibus utimur ad deliniendos, & demulcendos dolores, qui anodini etiam dicuntur, quorum triplex est differentia, quia alii primò dolores, alii facultatem, qua dolores percipimus, tertii verò proxime causas dolorum respiciunt: primi his constant, quæ propriè temperato quodam calore, & leni humectatione laxando particulam sedant dolores: alteri stuporem asserrentes dolenti parti, & ideo sensum ferè auferentes, occasione sunt, ut dolor non sentiatur: tertiis nitimur ablata causa dolentibus particulis consulere; sicuti cum flatus in intestinis, vel in aliis partibus aliquem consensum habentibus cum intestinis excitati dolores concitant, paramus clysteres, qui vim habeant flatus discutiendi: sunt postremò & clysteres, qui astringendi vim habent, quibus præsertim utimur ad suppressenda molesta alui profluvia, interdum verò, ut robur addamus intestinis laxioribus: ut ex ea causa facile suscipientia vitiosas fluxiones, à variis corripiantur morbis. Anteaquam omnes clysteriorum differentias particulatim persequamur, quædam in vniuersum de hac re tractemus: primum, quod clysteris nomen multiplex est, & aliquando instrumentum, interdum verò medicamentum, quod usi eo instrumento iniicimus, ut aluum abluamus: de utrisque autem aliqua neque ea multa dicemus. Ergo ut in rationali medicina cetera ferè omnia ab indicationum ratione deprompta sunt, ita & quæ ad clysteres pertinent: siue pro instrumento accipiantur, siue pro medi-

Cap. ult.

camento, indicationibus quibusdam nituntur, nam figurā, & con-
formatio istius instrumētā liti, & figura particule, per quam in al-
vum infundi medicamenta solemus, ut 4. meth. docuit Gal. desum-
pta est: cum enim necesse sit per rectum intestinum eiusmodi, ali-
quid intrare, oportuit ea instrumēta, quib. fieret hæc iniectio, illi
particulę esse accōmodata, & quatenus ad materiā, ex qua facta sint
& quatenus ad formā, vel figuram pertinet, unde instrumentū hoc
oportet, vt fistulam teretem habeat longitudine, & crassitie accō-
modatam parti, adultis enim ea longior, & crassior erit opportu-
na: pueris vero brevior, & tenuior; præterea verò vt ex materia du-
riori constet, vt vi possit adigi: neq; cedat, & flectatur, dum impo-
nitur, sit etiam expers cuiuscunq; asperitatis, ne atterendo partē,
in quam infigitur, irriter eam, & dolores concitet: præsertim verò
in his, quibus hæmorroides sunt molestæ: vnde ab hac ratione
edocti homines aut ex buxo faciunt has fistulas, aut ex æbo-
re, aut ex metallo aliquo, præsertim verò ex aurichalco: aliqui ex
argento, exterius autem deterfas, & optimè leuigatas, & lenes: im-
mo & eo tempore, quo vsuri sunt, eas aut oleo, aut butyro, aut
pingui alia re eiusmodi fistulas oblinunt, vt minorem afferant mo-
lestiam: hanc verò fistulam oportet esse affixam, aut alligatam
alicui alteri instrumento tantæ capacitatis, vt eam medicamenti
copiam capere possit, quæ sit huic rei opportuna, & per quod
impellatur ea materia, & cogatur introrsum in aluum ferri: vnde
duplex excogitata est figura, & materia conficiendi eiusmodi
instrumentā, altera ex metallo, vel etiam ex ligno in figuram lon-
gam, & teretem interius cavam, quasi crassam quandam fistu-
lam formatam, similem illi instrumento, quo vtuntur hi, qui
folles, hoc est maiores pilas lusorias instant vi spiritum, inter-
ius impellentes, & adigentes quasi syphone quodam, & in
hoc clysterium modo maior est vis impellendi in interiorem al-
uum materiam, vel humorem contentum in clysteri, & ad superio-
res partes, & hoc inuentum, mea quidem sententia, nouum est, cu-
ius non memini factam esse mentionem ab antiquioribus medicis:
alter verò modus horum instrumentorum, qui tritissimus est,
& domesticus, mulieribusq; familiaris, præsertim uerò in pueris,
est huiusmodi, ex uno enim capite fistulam illam tenuiorem ue-
sicæ alligant, eamque quasi in ventriculi figuram conforma-
tam accommodato humore deinde implent, & adacta in anum
fistula,

fistula, manu ex altero capite vesicam apprehendunt, & præmunt versus fistulam, quasi humorem in intestina per fistulam vi expri-
mentes: quidam verò ex molliori corio conficiunt vtriculum figu-
ra, & capacitate vesicam immitantes: fit & alio quodam modo hoc
instrumentum ligneum: accipiunt lignum longum cubitali ferè
longitudine, aut paulò minus, & torno formant hoc pacto, ut in
superiori parte imitetur figuram, & capacitatem vasis, quo utimur
in exponendis ferculis, vel etià grandioris calicis, totum autè per-
tulum, vel concauum, ut quasi canale contineat vsque ad alterũ cap-
ut, cui fistula affixa est, in quo nulla alia vis est, qua impellatur
humor, nisi grauitas superioris humoris, qui comprimendo cogit
inferiorem vltèrius ferri, donec effluat in intestina: qui autè ex ve-
sica fiunt clysteres, antiquis videntur fuisse in maiori vsu: eorum
enim frequens est mentio apud Gal. & priores quidem magis pro-
cul, & ad superiores intestinorum partes adigunt medicamenta:
quàm alteri: hi vero, quàm tertii, quemadmodum autem Gal. 13. Cap. 17.
meth. testatur: rarò clysteres vltra crassiora intestina prouehun-
tur: interdum tamen; si plurimum nittaris, ait ipse, pertingunt ad
tenue intestinum, quamuis in aliquibus vsque in vtriculum;
ut idem tertio de causis symphomatum testatus est, ascēderint: id Cap. 2.
tamen rarò: sed de instrumento hæc satis sint. De medicamen-
tis agamus, quæ hoc instrumento sunt iniicienda: clysteriorum
multiplex est differentia: quemadmodum enim docuit Gale.
primo de ratione vict. in acut. mor. clysteriorum ratio à ventris
affectu, & ab indicatione, quæ ab illo depromitur, accipienda
est, vnde pro variatione affectuum, & indicationem, quæ ab
ipsis affectibus ortum habent, variæ etiam differentię clyste-
riorum excogitatæ, & inuentæ sunt: quod ut exquisitius, & cla-
rius exponamus, illud repetendum, quod paulò ante proposui-
mus: nempe quòd quæ per clysteres iniiciuntur, plerunque infe-
riorem aluum abluunt, aliquando tamen ad gracilius intestinum
pertingunt, rarissime uerò ad vtriculum ascendere possunt:
quò fit, ut præsertim, & primùm accommodata sint medica-
menta curandis affectibus crassiorum intestinorum: deinde verò
& aliarum partium, quæ vel ratione, vicinitatis, vel alterius af-
finiuitatis cum intestinis consensum habent. At verò cum vari
sint affectus in intestinis, qui nobis commodum clysteriorum
usum, & administrationem indicant, vel in illis, quæ aliqua ra-
- 3 - tione

ratione cum intestinis consensum, & connexionem habent: variæ
etiam sunt clysteriorum differentię, quatenus ad vices eius humo-
ris, & ad medicinale materiam pertinet, ex qua conficiendus est
humor per clysteres iniiciendus: nam & copia excrementorum,
siue ea sint primæ concoctionis: siue secundæ: siue alio quouis
modo in intestinis, vel aliis particulis ad intestina pertinentibus
fuerint congesta, indicant usum, & iniectionem clysteriprum: ne-
pe ut excrementis illis per vacationem detractis ab omni mole-
stia, & afflicto homo liberetur: præterea verò, & flatus copiosus,
vel in intestinis genitus, vel aliunde in ea delatus, si distendens af-
fligat, clysteres, qui digerant, & discutiant flatulentam materiam,
indicat, dolores quoque interdum admodum vehementes, ut non tan-
tum temporis permittant, quod causæ doloris remouendæ incum-
bamus, indicant eam rationem clysteriorum, qua leniri, & sedari
dolor possit, vel demulcendo cum his, quæ verè anodina sunt, vel
cum illis, quæ stuporem inducentia, sensum potius sopiunt, quàm
dolorem leuent: sed & vlcera, quæ intestina occuparunt, certam
quandam, vel potius certas quasdam clysteriorum differentias in-
dicant, cum nulla medicamēta in crassiorum intestinorum affecti-
bus melius, & præstantius possint locum affectum attingere, quàm
quæ per clysteria iniiciuntur: unde si sordidum fuerit ulcus: re-
quireret detergentium clysteriorum naturam: si autem ulcus fue-
rit erodens, valide exiccātium, si mundum, consolodantium, si au-
tem facta sint laxiora, & imbeciliora: quam ob causam viciosorum
humorum fluxiones accipiunt, roborantium, & astringentium:
præter id, quòd si inflammatione tententur, primùm repellenti-
bus opus est; mox digerentibus, ut de aliarum partium inflam-
mationibus sæpe aliàs disputauimus: sed de illis prius sermo-
nem instituamus, quæ euacuationis causa iniicienda sunt: ac-
cepto inde initio, quòd intestina cum ventriculo: præter quàm
quod continua sunt, habent etiam naturam non parum similem:
siue rationem substantiæ spectemus: siue naturales facultates:
nam & ipsa non sunt expertia alicuius facultatis, qua possunt ci-
bum concoquere: ut si quæ cibi reliquæ supersint, quæ effuge-
rint primam concoctionem in ventriculo, concoquantur pos-
tea, & perficiantur in intestinis: quod Gal. quarto de usu par-
tium exposuit: vnde & eorum medicamentorum, quæ inferius
iniecta vacuant, natura non est admodum ab illis diuersa, quæ supe-

superius per os assumpta corpus purgant: nec modò in uniuersum: verum & particulatim. Vnde clysteriorum, quibus, ut euacuemus, utimur, multiplex est natura, quemadmodum multiplicem esse naturam medicamentorum diximus, quæ cibaria, vel deuorata purgant, quædam enim abluendo solum uacuant, & quoquomodo leniendo intestina: alia detergendo, alia attrahendo, & soluendo purgant: in hoc verò clysteres à medicamentis, quæ per os accipiuntur, differunt, quod clysteres adstringendo, & comprimendo non possunt aluum ciere: nam quæ comprimunt, & adstringunt, si inferius iniiciantur adstringendo inferiores partes sistunt potius fluentem aluum, quia adstrictioribus factis inferioribus partibus inhibetur transitus excrementorum, quæ à superioribus deferuntur; quæ verò per os sumuntur, superiores partes adstringendo, & quasi comprimendo inferius contenta excrementa descendere compellunt. Sed primò, quæ communia sunt exponamus: deinde particulatim eorum rationes persequemur: in uniuersum ergo hæc consideranda: nempe copia, vel quantitas humoris iniiciendi per clysteres: deinde qualitas, & natura materię, ex qua parantur clysteres: tertio hora, vel tempus, quo aptius, & salubrius imponendi sunt. Quatenus ad copiam, vel (ut aiunt) dosim humoris iniiciendi pertinet, non est eius una certa mensura, sed varia, pro ratione ætatis, & nature corporum: in adultis enim rarò minus libra, aut plus sesquilibra paratur: & alii quidem facilius ferunt ingentes clysteres. alii verò uix mediocres: unde in his plurima ratio habenda nature, & tolerantie corporis, cui imponendi sunt clysteres: quæ si nobis ignota fuerint; prudens medicus primum mediocritatem tentabit: pueri verò non ferunt multam copiam clysteris: ut in tenella ætate sit satis semilibra, aut paulò plus. De qualitate autem, & natura clysteriorum paulò post dicemus, quia ea multiplex, & varia est, & diuersas habet differentias pro ratione diuersæ indicationis, & scopi, quem nobis ostendit diuersa natura affectionis curandę. Dicamus prius aliqua de hora, vel tempore apto clysteriis imponendis, in uniuersum ergo dicimus, ut descriptum etiam est breuissima sententia: nec inepte quidem, in eo libello, qui medicus, vel introductio scribitur: quis istandem eius fuerit author, quod si respiciamus ad horas diei: tempus congruum imponendis clysteribus est ante cibum assumendum: ingesto enim cibo nõ

est inferior venter commouendus; ne concoctio turbetur, aut co-
 gatur cibus, antequam concoquatur, è ventriculo descendere: in
 morbis qui periodos habet, tempore interuersionis clysteres sunt
 imponendi: in accessionibus enim, præsertim verò febrium, quò-
 minus fitri potest, corpora mouenda in medicamentis sunt, vt & Ari-
 cenna cõsuluit, nã in vehementib. doloribus sæpe cogit necessitas
 in accessione vti clysteri, vel saltè tẽpore remissionis clysteres sunt
 imponendi: loquimur de clysteriis, quibus vtimur, vt ventrẽ vacue-
 mus: sed seretipiciamus ad generalia morborum tẽpora, multiplex
 eorum usus est, pro ratione multiplicis naturæ clysteriorum, &
 multiplicis occasiois ea administrandi, nã eorum quidã sunt le-
 nes, & molles: ita enim à Gal. sæpe appellantur: & illis vti possumus
 omnibus morbi temporibus; si sit opus alui lenitate: nimirũ tam
 in initio: quàm in incremento, vel vigore; quia non agitant, neque
 conturbant crudos humores in uenis contentos, neq; eorum con-
 coctioni impedimento sunt: alii sunt, qui acres appellantur, & ve-
 hementiores sunt; quorũ ratio variatur pro varia ratione scopi illis
 vtiendi: cũ. n. consten. medicamentis, quæ vim habent attrahendi à re
 morioribus etiã partibus; nõ est eorũ vsus congruus nisi post mor-
 bi concoctionem: & id, si euacuandi gratia primum, & præcipue ad-
 ministrantur; q; si reuellendi causa præsertim & primum, ut reuul-
 foriis utitor, nam remedia hæc laudauit Gal. 2. de compo. med. se-
 cundũ loc. ex Archigenis sententia, & illis reuellendi causa usus est
 loco misionis sanguinis. v. meth. cũ Romanam matronã curauit,
 quæ sanguinẽ ex salsa destillatione explebat, quorum tempus op-
 portunũ, & accommodatum illud idem est, quod & reliquorũ au-
 xiliorum, quæ vim reuellendi habent: hæpo principium morbi: re-
 uellentia. n. remedia principiis congrua sunt: sicut deriuantia inue-
 terascentibus morbis: vt tamen de clysteribus hæc intelligenda sint,
 quæ in eo genere sunt, quæ inter uacuatoria auxilia à Gal. 3. artis
 medicinalis recẽsentur. Agamus modò de qualitate clysteriorum,
 & eorum differentiis acceptis à natura, & qualitate materiæ, ex qui-
 bus fiunt clysteres: primæ autem eorũ clysteriorum, qui ciendæ
 alui idonei sunt, lencisq; sunt: qui molles clysteres dicti sunt à Gal.
 & 4. de rat. vi&. in acu. mor. & 1. ad Glau. & alibi sæpe, alii verò for-
 tes sunt, qui longe maiorem vim euacuandi habent, & hi acres cly-
 steres ab eodem vbiq; nuncupantur: particulatim uerò utriusque
 gene-

Cap. de iis
 quæ Archi-
 genes scri-
 psit post pri-
 mã dictio-
 nem.
 Cap. 13.

Cap. de cõ-
 muniassi-
 ma inten-
 tione cura-
 riua. &
 Cap. d. cau-
 sis præfer-
 uatiuis.
 Tex. 116.
 Cap. 14.

generis plurimæ sunt differentiæ, & ordines, pro ratione quâ alter altero in suo genere, aut mollior est, aut acrior. Sed primum de molli clysteriorum genere agamus tanquam de simpliciiori, faciliiori quæ, & quod frequentius solet in usum, & quocunque tempore venire: primum ergo locum inter molles clysteres est, qui ex oleo cômuni, vel simplici sit ex parte salis, & astrictiõis, cuius meminit Gal. 12. aneth. & 4. de ratione vict. in acu. mor. qui quidẽ clysteris modus vtilis præsertim est: vbi alius astricta plurimum sit, & sicca, & quæ referta arido, & duro stercore: mollit enim fæces, & lenit aluum, eamque lubricam relinquit: præterea verò vbi aliqua est acrimonia humorum vellicantium, & mordentium intestina: lenit enim, & obtundit eorum acrimoniã: copiã aut olei voluit esse hæminam, quæ continet circiter vncias nouem: interdum verò addit Gal. ut ibidem legere est, ut magis anodinum faciat, adiciunt anserinum, aut gallinaceum: est verò præcipuus horum usus in doloribus ventris, præsertim ex acrimonia humorum, sicuti quãdo flatulentus dolor est, & ex pituitoso humore excitatus, in eo quãtur aut rucha, aut semina, in quibus sit vis discutiendi flatus: proximus huic, quatenus ad mollis clysteris rationem pertinet, est ille, qui sit ex iure pingui, vt est ius decoctorum intestinorum bubulorum, vel vitulinorum, quæ quotidie venalia in cibum veniunt, & adeps aliquis dissoluitur, aut veruecis, aut hyrci, aut id genus alterius: neque alienus ab hoc ordine censendus est clyster, qui sit ex lacte, in quo sæpe & butyrum dissolunt; quæ quidem omnia maxime congruunt in doloribus intestinorum, & torminibus concitatis ab acri aliqua fluxione: sed & in pueris, qui à vermibus cruciatur: lac enim & butyrum cibus est à vermibus petitus, sicuti dulcia omnia, vnde in inferiora intestina injectum allicit ad se vermes interdum ascendentes ad ventriculum, & plurimum facscientes negocii: qui sæpe deinde, dum clyster reiicitur, lacti immixti consequuntur, & ipsi educuntur: idem ferè præstat ius pingue, in quo sit butyrum dissolutum addito zuecharo: vt si siliabæ iuris sesquiuncia butyri, & uncia zuechari imponatur. Sed neque hoc prætermittendum, quod etiam mulierculis notum est, quod sicuti vermes lac, & butyrum, & pingua: dum modo salis sint expertia, maxime sequuntur, ita olea omnia, & sal fugiunt, tanquam maxime aduersariũ, à quo et interuuntur si oleũ sæpe pueros vermibus laborantes lædit, si per clysterẽ supponatur, refugiunt enim

Cap. ultimi
mo textu
107.

107

ab his ad superiores partes: sicuti lac, & butyrum sequuntur: unde mulieres quæ puerorum gubernandorum peritæ sunt, oleo, præfertim verò omphacino cibos condiunt. ab eo autem per clysteres supponendo cauent maxime: sicuti etiam à sale abstinent, & loco eius copiosius zuccharū indunt: abstergendo siquidem causa est, cur citius reddantur clysteres, sed ad eundem ordinem pertinent clysteres ex pissana hordeacea parati, leniunt enim asperitatem, & acrimoniam acrium excrementorum, & præterea modice detergunt, & refrigerant, & tandem sunt epycherastica facultatis: aliquam maiorem vim habent clysteres, qui erant antiquis in usu frequentis: præfertim verò in acutis, & calidis morbis: & eorū nemini Gal. 8. & xj. meth. constant autem ex mulsæ, & oleo: ut accipiantur mulsæ unciz decem: olei uero dug. his autem. t. j. metho. aliquid salis, aut nitri, aut aphronitri addit, quæ addita clysterē reddūt aliquāto acriorem: sicuti si una, uel altera dragma salis addatur: inam hoc in usu est nostris his temporibus: cum ferè nitro careamus: præter id quod arte conficitur ad bellica instrumenta: sed in præsentia sunt in maiori usu clysteres, quos multi communes appellant, confecti ex iure carnis alicuius, ad decem, uel duodecim uncias, unciis duabus, uel paulò plus olei: una autem zucchari impuriore, quod rubeum, uel crassum appellant, in eo enim maior est detergendi vis, quàm in illo albiori, & per plures decoctiones magis purgato: maior etiam in illo zucchari quasi excremento, quod uulgo hic melacium, iuniores mel canæ appellant. verum hoc: nisi parumper in iure, uel decocto, de quo paulo post dicemus coquatur, conuersum in statum dolores ventriculi ciet: zuccharum inquam accipiūt ad unciam, uel sesquiunciam, addunt deinde salis, quantum nuper diximus, sal autem, præter id quod est in eo uis incidendi, & detergendi, attenuandique uiscidos, & pituitosos humores intestinis hærentes, stimulat etiam expultricem facultatem ad expellendum clysterem: ne, dum nimis continetur, magis conturbet, & molestat, aliquantisper autem uim maiorem habet, qui etiam in usu frequentis est nostris medicis, & mulierculis notissimus est, clyster cōfectus ex harum herbarum decocto, nimirum malua, beta, & foliis herbæ violariæ, accepto singulorum manipulo, & simul illis decoctis, & earum decocto additis oleo, zuccharo, & sale, ut nuper diximus, conficiunt clysteres: aliquando uerò & manipulum mercurialis cū aliis coquendum addunt, & ita clyster fit ualentior: nam mercurialis

Scilicet quod
est in oleo
701

Cap. 5.
Cap. 9

rialis uim aliquam medicamentoſam habet: ut quæ etiam com-
 meſta poſſit purgare: ſicuti malua mollit, folia uiolariz leniunt, &
 refrigerant, beta uerò nitroſas quaſdam partes habet, quæ incide-
 re, & detergere poſſunt. Sed interdum aliquod eorum medicamen-
 torum, uel ſimplicium, uel compoſitorum, quorum paulò ſuperius
 fuit habita mētio; adiungimus; ut liberalior ſequatur uacuatio: co-
 rum inquam, quæ in inferiori aluo congeſta ſunt, & pro ratione ad-
 diti medicamenti uariatur uis, & natura clyſteris: quia ſi addatur
 medicamentum aliquod ex his, quæ ſint in ordine lenium medica-
 mentorum, non propterea reducetur clyſter extra ordinem leniū,
 & mollium clyſteriorum: ſolemus plerunque aut caſiæ egyptiæ li-
 quorem, aut electuarium, quod appellari lenitiuum diximus, à ſe-
 muncia uſque ad unciam addere, & mel roſaceum, ut paulò antea
 diximus, ad uncias duas, pro zucharo: Apothecarii tamen quoddā
 medicamentum cōpoſitum habent, & conſectum ſeruant ad uſum
 clyſteriorum, & caſiam tractam, uel caſiam pro clyſteri uulgo
 appellant: conficiunt autem hoc modo: accipiunt prunorum viri-
 dium libras quatuor, tamarindorum duas, paſſularum ſex uncias;
 uiolarum duas, capillorum ueneris, beta, maluæ, mercurialis, ſingu-
 lorum manip. duos, & s. hordei libram, quæ omnia in libris ſex de-
 cim aquæ ad medietatem coquenda ſunt, ac mox fiat omnium pro-
 ba contritio, & hoc decocto ex arte parato diſſoluantur caſiæ ex-
 tractæ ex fiſtulis libræ ſex, mellis libræ duodecim, atque ad mellis
 craſſitudinem coquantur: interdum ergo unciam, interdum plus,
 minusue addunt clyſteri: interdum uerò ſimplicem liquorem caſ-
 ſiæ clyſteri addunt, ſequiturque liberalior uacuatio, neque tamen
 adhuc clyſteres hi excedunt limites mollium, uel leuium clyſterio-
 rum, quibus uti facile poſſimus in febris, & reliquis etiam acu-
 tis morbis. Alter ordo eſt, qui clyſteres acriores, uel, ut iuniores
 loquuntur, acuti clyſteres appellantur, quique ex acrioribus, &
 propriæ purgantibus medicamentis conficiuntur, uel decoctis, uel
 inmixtis: decoquuntur autem plerunque ſimplicia: imiſcentur ue-
 rò compoſita: neque enim compoſita ulteriorem requirunt coctu-
 rā: cum ſatis coquantur, dum conficiuntur. Simplicia autem medi-
 camentā, ex quibus decocta ad acriores clyſteres fieri ſolent, hæc
 ferè ſunt: (de his autem loquimur, quæ uim purgandi habent,
 non de his, quæ calefaciendi, uel refrigerandi, attenuandi, ſtutus di-
 ſcutiendi, & alia id genus faciendi) nimirum, colocinchis, agari-
 cū, ſcimen

semen cnici, uel, ut Arabes, cartami, quoquomodo tritum, præterea cyclamini radix: arthanita in libris Arabum dicitur, centauriū minus, hyfopus, interdum & polypodium: composita uero, quæ solent immisceri clysteriis: cum eos aciores reddere volumus: imprimis uisatissimum est hyera: quam præcipue picram sepalsiarii, appellant: alii uero hyeram pro clysteri, quia raro consuevit in usum venire nisi in clysteribus nostris his temporibus: quamuis alicubi fiant pillulæ addito melle, quantum satis sit ad assumendos pulueres: aliquando autem nuncupatur hyera ex sexdecim rebus: ex sexdecim enim simplicibus præter aloem constat, in quibus est colocynthis, epithymum, agaricum, & turbith: & describitur à Niccolao, ubi de hyeris agit: sed & aliquando utuntur medici & diapheniconi, & indo uocato electuario: interdum uero & eo medicamento, quod benedicta à Nicolao nuncupatur: præsertim uero in muliebribus affectibus, & articularibus doloribus, & eo, quod à Mesue' elefscoph' dicitur, ab Auicenna uero episcopi. Hoc autem, quæcumque hæc omnia medicamenta pertinet, aduertendum quod plerumque non utimur acrioribus clysteriis ratione uacuationis, nisi in affectibus, qui fouentur à crassis, & frigidis humoribus, & ad educationem difficilioribus, sicuti sunt pituitosi, & melancholici, raro uero in calidioribus, & tenuibus: nisi, si aliquando reuellendi gratia, ut in lippitudine oculorum, & capitis doloribus, Gal. uero & in destillatione salsa: unde pleraque hæc composita, quibus in clysteriis acrioribus utimur, purgant pituitosos humores, aliquid etiam melancholici: sed & possunt biliosos reuellere, & tenues, quia rara sunt simplicia purgatoria: quæ etiam bilem cum aliis non purgent. Sed ut magis particulatim agamus de usu clysteriorum: præsertim uero acrium, sicuti eorum non una est ratio, quantum ad acrimoniam pertinet, ita neque temerè & indiscriminatim eis oportet uti: uerum in his, sicut in omnibus aliis, quæ uim habent purgandi, primum quidem morbus respiciendus est, & pro eius magnitudine, & difficultate, aciores, & uementiores clysteres eligendi sunt, aut molliores, & faciliores, deinde uero ad tempus morbi, ut paulò ante insinuauimus. Nec minus etiam, ut primo de ratione victus in acutis morbis docuere Gal. & Hippo. spectandæ sunt uires, & ætas: nam sunt uires imbecilles uix molles quidè clysteres perferre possunt: nec dum acres, & uementiores: pueri etiam uementiores clysteres non ferunt, sicut neque aliud forte est medium

medium: pro horum ergo ratione metiri oportet vim clysteriorum exacuius verò clysteres, si prioribus hæc addiderimus, quos leues, & molles appellauimus, de quibus priorem fermouem habuimus: nempe, vt exemplis agamus, si decocti ex beta, malua, & mercuriali accipiamus librā, aut alicuius alterius, de quibus prius multa fecimus verba, & illi salis cōmunis addiderimus dragmas duas, hōrum verò medicamentorum compositorum, quorum nuper meminimus, semunciam: vt hyerz illius, quam magnam Nicolaus vocat, aut diaphæniconis, aut alterius: & id pro vt medico magis videbitur oportunum, nam si præter vacuationem desideraret etiam flatus discursionem, hyera vtetur, aut diaphænicone: & tandem, ne tēpus conteramus, consideratis facultatibus horum medicamentorum, & cum natura morbi collatis id eliget medicus, quod magis accommodatum iudicauerit: & quandoque vnum ex his, interdū duo, vel plura addet: singulorum verò semunciam: nam rarò excedimus unciam, vel sesquiunciam, omnibus simul computatis: postremò verò mellis rosacei duas vncias. Quia vera solent omnibus ferè clysteribus mulieres vnum, aut alterum luteum oui iniicere, de eo quoque aliqua dicenda sunt; ideò sanè imponuntur, quia asperitatibus intestinorū, quæ acrimoniam medicamentorum, aut humorū sequuntur, remedia sunt, cum mitigatoriam facultatem, & aliquantisper emplasticam habeant, & leniāt. At vero aciores adhuc clysteres fiunt, si decocta, quibus conficiuntur, fuerint magis medicamentosa, vt potè, quoniam fiant ex simplicibus; quæ uim insignem purgatoriam habent, qualia ea sunt, quorum nuper meminimus, vt cnici semen, agaricum, & turbith: vehementiora sunt cētauriū minus, cyclamini radix, aristolochia; colocynthis quorū tantū apponemus, quantū præ acrimonia, & uis eorum videatur perferri posse: exempli gratia, colocynthidis dragma, vel sesquidragma, agarici, turbith, cnici semuncia, & ultra, ita & centuarii, & cyclamini, additis etiā malua, & beta, & accepto decocto ex his confecto, quārum satis esse videatur, ex illo deinde, addito melle, vel rosaceo melle, oleo, & sale, ouique uitello, conficiunt clysterem, cui sæpe, vt valentior euadat, adiiciunt aut vnciam, aut etiam plus aliquorum compositorum: sicuti nunc exponebamus: aliquando unius: aliquando plurium: plerunque autem medici his soluentibus medicamentis, & acrioribus lenientia immiscent: generale enim est hoc medicorum peritorum præceptum, quòd lenientia

lenientia acrioribus medicamentis mixta faciliorem eorum operationem, & faciliorem reddunt, vnde cassia, vel simplicis, vel cōposita, quam pro clysteri appellant, semunciam, vel etiam ultra addunt semunciam, vel vnciam eorum compositorum clysteribus iniiciendorum. Si autem exempla horum clysteriorum describere voluerimus, accipiemus ea tum à Rasi nono ad Almanforem: tū à Mesue in capite de cura lethargi, quæ, quia vulgata sunt, & ab omnibus legi possunt, in his exponendis non conteremus alioquin tempus. Sed hoc addamus, quod eiusmodi clysteres euacuant, & reuellunt, & licet proxime non ferratur vltra crassiora intestina, vel parum vltra, tandem tamen in vniuersum corpus pertingit vacuatio, reuellunt autem à remotissimis etiam partibus, vt sunt articuli, & caput. Sed vt diximus, fiunt sæpe clysteres, non tam vacuandi causa, vel reuellendi, sed et ob alios scopos medicis à natura morbi, vel symptomatum propositos, in doloribus enim vetosis fiunt decocta ad clysteres ex medicinis, quæ attenuant, & discutunt flatus quemadmodum, si accipiamus camemelum, anethum, absinthium, his fortiora sunt salvia, pulegium, calamentum, abrotanum, marubium, artemisia, matricaria, præsertim in doloribus vterinis, & super mensuris: præterea verò semina anisi, sceniculi, carui, amii: ex his ergo fiunt decocta attenuantia, & discutientia flatus: utilia autem in doloribus ex flatu excitatis, quibus & olea adduntur eodem spectantia, vt sunt camemelinum, anethinum, ex amigdalidis amatis, absinthinum, ex spica, & id genus aliis. Sed fiunt interdum mixti clysteres ex utraque facultate: nempe purgatoria, & discussoria, vt si ex his fiat decoctum, quæ nunc fuere exposita, cui addamus cassiam, & hyeram, vel diaphænicon, vel electuariū indū, vel benedicta vel alia id genus, aut si & decoctū sit perinde mixtū, vt si exempli cā accipiamus maluā, betam, mercurialem, anethum, camemelū: semen cnici, agaricum, & ex his facto decocto, ac eius accepto, quantum satis sit illi, addamus cassiam, hyeram, aut alia. In fluxibus autem, præsertim verò in dysenteria, fiunt alia clysteriorum generā aliquando enim, vt acrimoniam humorum erodentium obtundamus, doloremque sedemus, & emplasticis: intestina oblinamus, & quasi defendamus ab excoriatione, deinde verò illis vtimur, quæ detergant, ut si iam ulcera putemus sordida facta, aut si abluenda putamus intestina, & acres humores detrahendos, qui vellicant tertio verò his, quæ consolidant, & roborant: materia priorum
his

his continetur; primum oleum simplex cum adipe gallinaceo, uel anserino, cuius clysteris superius meminimus, ita ius pingue, præsertim intestinorum bouis, uel vituli, uel capitis ueruecis, uel, ut aiunt, castrati: ut accipiamus elicui us istorum iurium nouem, uel decem uncias, uel plus etiam, cui addamus adipis hyrci, uel renum capræ unciam, olei rosacei tres uncias. zuchari rosacei dissoluti ex iure, & recte colati unciam, ouum totum: hoc est album, & luteum unum, uel alterum: miscemus autem omnia, & paramus clysterē: aliquādo uerò accipiamus lactis quantū nobis sit satis, in quo sit butyrum dissolutum ad unciam, uel etiam plus, quibus & ouum addimus, & ita per clysterem iniicimus, quòd si esuat sanguis, quem suprimere uolumus, addemus unam, aut alteram dragmam boli armeniae, uel lapidis hæmatitis. Deterforii uerò erunt clysteres, si fiant ex aqua, uel decocto hordei, cui addatur uel zuchari sesqui-uncia, uel mellis rosacei, uel etiam fiant, ut antiqui facere solebant, ex prissana colata, uel hordei cremore, clysteres additis zucharo, uel melle rosaceo sine sale: nisi quando iam uiderentur ulcera fieri putrida, & plurimum sordida, tunc enim & acrioribus utebantur prisce medicinam & muria, & Andronis trochiscis, & id genus reliquis: ut ad arsenicum aliquando prouherentur: his tamen temporibus rarò hæc aggredi audemus. Sed si consolidare uolumus, his agimus, quæ exiccant, & astringant, unde ius, uel decoctum lentium excorticatarum abiecta prima aqua, decoctum etiam rizi, & decoctum brasicæ, abiecto primo iure, in quo est nitrosa qualitas, & accepto secundo, in quo brasica bene cocta fuerit: sistit enim fluxum, & siccando consolidat; quibus addunt aliquid adipis hyrcini; id enim magis deliçcat, succi plantaginis, uel polygoni uncias duas uel tres: præterea bolum armenam, uel hæmatitem lapidem, fiunt præterea & magis astringentia decocta ex rosis aridis, malicorio, citinis mali punici: interdum & gallis, & aliis istius facultatis, quibus decoctis addunt oleum mastichinum, uel melinum: hoc est, ex malo coroneo, uel rosaceum omphanicum secundum modum, uel dosim sæpius expositam. Et quantum ad clysteres pertinet, hæc factis sunt, agamus & de glandibus.

De Glandibus Cap. 21.

Quos balanos græci, glandes latini appellant: à figura quidem omine deducto, quia oblongâ glândem imitantur: est enim longioris

Victoris Trincauellij

gioris, & teretis figuræ, perinde ferè, vt quercina glans, & eiusdem etiam crassitudinis, iuniores medici suppositoria appellant, quia sedi supponantur. Horum ergo officium vt & clysteriorum, diuersa sunt genera: nam aut molles sunt, aut acres, mollissime omnium, & faciliores sunt, quæ fiunt ex sæpo, præsertim hyrcino, interdum & bubulo, hæc enim cum concrescunt, magis indurantur, fiunt autem citra salem, & quantumuis, antequam liquecant, & dissoluantur, alium quoquo modo stimulo ciant: cum liquefiunt, postea molliunt & dolorem sedant: unde aptiores sunt, his qui duras, & dolentes hæmorrhoidas, quique in ano fistulas habent, quia in eo sæpe vis est aliqua digerendi & consolidandi, cum aliquam aliis sæpis, uel adipibus multis maiorem inesse siccitatem sciamus, sæpe etiam usus sum glandibus ex butyro confectis, præsertim verò hyeme: concretum enim butyrum magis ex frigore indurefcit, ut in glandes incisum conformari possit, vt sæpum: sed æstate etiam id fieri potest: si in aqua frigida id fiat; usus autem his sum in his qui tumentes, & dolentes, & quasi inflammatas habebant mariscas, præsertim internas, nec illis parum profuit, nam molliat, & digerit, & dolorem lenit. Quædam etiam mulieres conficiunt glandes ex asungia porcina: verum si accipiatur salita, non est expers alicuius acrimoniar, unde magis quidem stimulat aluum, non ita autem molliat, & dolorem sedat: adipe autem confectæ glandes viles præterea sunt illis, in quibus uermes in ultimo intestino propè unum gignuntur, qui ascarides dicuntur, cum enim rebus pinguibus delectentur, his glandibus à sæpo illecti insiguntur, & cum eis exeunt. Familiarissimæ uerò, & leuissimæ glandes sunt, quæ à mulieribus puerulis imponuntur: fiunt autem ex melle cocto ad crassitudinem, & inspissationem aptam, ut inde fieri possint glandes, quæ si citra sal fiant, lenissimæ, & facillimæ sunt, quia tamen nihil interdum faciunt, si astrictior sit aluus, ideo sal tenuissime tritum addunt, quantum illis satis uisum fuerit, sed aliquam ita acrimoniam consequuntur, interdum verò & stercus muris addunt, quod & ipsum non parum acre est, unde & magis irritat intestinorum facultatem expultricem: imo aliquando utuntur pro glande stercore hoc ita integro, ut uiderim aliquando mouisse plus quam uoluissent. Aciores autem glandes interdum fiunt ex re facili paratu, accipiunt enim

enim saponem, quo detergunt, dum lauant vestes, & eius frustum in formam glandis adducunt: recisis circuncirca partibus, atque ita imponunt. sæpius verò rem hanc mandant seplasiariis, ut fiat, decocto melle, & postea additis pulueribus hyeræ illius, quam magnam vocari à Nicolao diximus, in hunc modum: accipe pulueris hyeræ picræ dragmam, salis gemmæ, (hoc enim acrius & valentius est) dragmæ dimidium, mellis quantum satis sit. misce, & fiant glandes, vel suppositoria duo. Istiusmodi glandibus utimur in morbis capitis: interdum ventriculi, & superiorum aliarum partium: cum reuellendum potenter est: atque cum ægroti in nimium somnum proni sunt, ut euigilent: sicuti in febribus tertianis nothis, & quotidianis, in lethargo, soporeque, & id genus aliis sæpe usui esse experimur.

De medicamentis, quibus cietur vomitus.

Cap. 22.

VT autem hoc primo libro omnem medicamentorum rationem complectamur, quæ purgando per superiorem, uel inferiorem aluum, corpus uacuant: anteaquam ad aliam eorum rationem transeamus, de uomitoriis etiam agamus: quantum ad præsens institutum satis esse possit. Et quia non exercitatis, & perfectis medicis scribimus: sed illis, qui nuper faciendæ medicinæ initiantur, quique aliquod rudimentum in hac requirunt: ideo non multa dicemus de illis uomitoriis medicamentis, quæ, licet antiquis illis, & absolutissimis medicis in frequentissimo usu essent ad curandos diuturnos, & difficillimos affectus: nostris tamen temporibus, ac superiori ætate ab omnibus ferè intermissa sunt, qui ab Arabum maledictis adeo deterriti fuere, ut eorum usum omnino fugiant: loquimur autem in præsentia de elleborismo à Græcis appellato, hoc est de purgatione per uomitum excitatum ex ueratro albo. neque in hoc tamen cum arabibus authoribus consentio, qui hoc referunt in naturam nostrorum hominum: hoc est, qui nostris his temporibus oriuntur, & uiuunt, quæ adeo sit reddita imbecillis: ut non possit hoc medicamentum perferre; hanc enim fabulam esse puto: & anilem quidem, cum enim cætera medicamenta perferantur à nostris hominibus sicuti à præfiscis ferebantur: non uideo, cur & hoc non possit ferri:

I sed

sed potius ex timore medicorum hoc accidisse putari: quem ab imperitia ortum habuisse existimo, cum non crederent se posse moderari vim, & operationem istius medicamenti, sicuti eam moderabantur antiqui. Verum neque is sum, qui velim iunioribus, & incipientibus medicis consulere, ut in tyrocinis suis sint primi, qui introducant in usum hoc medicamentum: ne, si forte res non felicem successum sortiretur, statim à principio suæ professionis malum nomē sibi comparerent. Vnde nos dimisso illo, de facilioribus & familiarioribus sermonem habebimus. Quia verò vomitus propriè ea excrementa primùm vacuat, quæ in ventriculo congesta sunt: siue in eo fuerint genita, siue aliunde ad ventriculum confluerint: ideo per vomitum non modò ventriculus, sed vniuersum etiam corpus vacuari potest: nec modò vacuandi vim tantum habet verum & reuellendi: reuellit autem præsertim ab infernis partibus: vnde in coxendicis, & podagricis doloribus, præterea renum, vesicæ, & vteri, & intestinorum affectibus reuulso- rium & præsentaneum remedium est vomitus: in superiorum autem partiū affectibus, sicuti pectoris, & capitis, non ita commodū: nam caput repletur ex vomitu, nec non & oculi. Sed & illud priuilegium habet vomitus, quod cum in initiis accessionum in febribus putridis, atque etiam in ipsa accessione omnes aliæ ferè vacuationes nocuæ sint, solus vomitus utilis est, & spontaneus, & ab arte excitatus. cum autem duplex sit ostium, quo vacuari possunt, quæ in ventriculo continentur, alterum superius, & os eius appellatur, quæ per hoc ostium reiicienda sunt, vomitu reiiciuntur: per inferius autē, quod & portanarium, vel ianitor nuncupatum est, deiciuntur, quæ per inferiorē aluū sunt purganda, atque in his, quibus validū est os ventriculi, difficilis est vomitus, sicuti facilis, in illis, qui id laxum, & imbecille habent: sed & ratione humorum fit, ut facilius, vel difficilius fiat vomitus: tenues enim humores, qui præterea & leues sunt, cum facilius ascendant ad os ventriculi, ut serosi, aquosique, præterea verò & biliosi facilius vomitu purgantur: crassi verò, ut pituitosi & melancholici facilius per secessum. Ex quo fit ut non sit simplex ratio eorum medicamentorū, quæ vim habent ciendi vomitum: alia enim laxant, & molle reddunt os ventriculi, & id ad vomitum pronum: alia verò humores aptos reddunt, ut per os reiiciantur: sicuti qui eos attenuat, detergunt, & incidunt: quædam etiam ad ventriculum excrementa attrahentia ea mouent

movent ad superiorem partem, sicut sunt, quæ proprie vomitoria
 medicamenta dicuntur. Sed rem hanc tandem particulatim tracte-
 mus: vomitum primo modo mouent, quæcunque pinguis, & olea-
 ginea constant substantia: sed & tepida ventriculum facilem, & pro-
 pensum in vomitum faciunt: varii quoque cibi, & diuersæ naturæ
 in copiaque comesti, & multus vini dulcis potus nauseabundū ven-
 triculum reddit. Altero autem modo: hoc est parando humores,
 ut facile vomitu eiici possint, vomendi in causa sunt, quæcunque
 secandi, attenuandi; vim habent: familiarissime verò utimur; præ-
 fertim verò in febricitantibus vomituris, posca tepida: hoc est
 aqua, cui parum aceti fuerit immixtum: oximel quoque simplex
 ad duas, vel tres uncias bibendum datum ex aqua tepida, post quæ
 nisi sponte succedat vomitus, iuuare illum oportet intro misso di-
 gito, vel penna in fauces: quod si digitus vel penna fuerit oleo
 delibuta prius, facilius succedet vomitus. Tertio autem modo vo-
 mitum ciere potest raphanus, seu radícula concisa in tenues par-
 ticulas, & comesta ex oximelite, & familiaris facilisque vomitus
 est, qui ex hoc medicamento cietur. Antiqui utebantur bulbo,
 quem vomitorium appellabant, quia concitat vomitum: tanquam
 facili vomitorio; quem coctum prius ex aqua oximelite condie-
 bant: ut in libro de facile parabilibus medicamentis paulò ante
 finem testatur Gal. ac mox comedeabant. Nostri autem tempo-
 ribus mulierculæ, & vulgares multi vomitu purgaturi ventricu-
 lum, atque adeò etiam corpus vniuersum, vtuntur floribus geni-
 stæ, exhibent autem circiter dragmas duas, & aliquando etiâ plus:
 & quia succedit postea copiosa per vomitum, & interdum etiam
 per secessum vacuatio, & excrementorum diuersorum colorum,
 & diuersorum saporum: dicunt eos fuisse falsinatos. Neque hoc
 fuit ignotum antiquis medicis: flores genistæ, & surculos, & semi-
 na vim purgatoriam habere per vomitum: nam Gal. dixit semina
 & surculos strenuè attrahere: Dioscorides vero ait, quod flores,
 & semina genistæ, si tusa ex mulsa bibantur, purgant per superiora
 sine periculo, perinde & veratrum: semen verò per inferiora pur-
 gare ait: & re vera flores hoc nostro tēpore comesti, & per superi-
 oria, & sæpe per inferiora etiam purgant: Gal. verò & in melonū,
 & melopeponum vim esse ciendi uomitū ait in lib. 2. de alimento

Ca. 4. & 5.

Cap. I,

nem eorum, quæ paulò ante dicta sunt facere potest, finem primo huic libro imponemus: nimirum, quod si propterea volumus vomitum ciere, vt acres humores, & calidos vellicantes os ventriculi educamus: sicuti sæpe necessarium est in biliosis febribus, hydræleum, hoc est aqua & olcum id præstantissimè faciet, vt Gal. in primo ad Glauconem docuit: nam præter id, quod ciet vomitum, obtundit etiam acrimoniam eorum; & aluo lenita causa est, cur & eorum pars, quæ per vomitum non ita facile poterat educi, per secesum defluat, vbi verò crassi, & lenti succi sine vomendi: vt in tertianis nothis, & quotidianis, & sæpe etiã in quartanis, aptius medicamentum erit ex posca, veloximellite, vel etiam ex acetoso syrupo. Sed, & hoc addamus, quod ventriculus facilius post cibum concitatur in vomitum; quàm ieiunis: cùm verò cibum damus, vt euomant: præter id quod oportet cibos esse diuersos, præstabit etiam, vt in his sint, quæ secent, & attenuant, vt sunt salita. Plura quidem in præsentia à nobis consultò ommissa cum de purgantibus medicamentis, tum etiam de clysteribus, & glandibus, & quæ diximus, vberius, & latius declarari poterant, sed ne vastum quoddam pelagus ingrederemur, & vos tyrones adhuc in inextricabilem labyrinthum deduceremus: vnde uos explicare sine magno negotio non potuissetis: ea tantum in præsentia asserere volumus, quæ ad breuem & compendiariam tyronum institutionem, & isagogem facerent. Quod etiam in proximo libro obseruauimus: vbi de reliquis medicamentorum generibus agemus: quæ omnia vobis iuvenes studiosissimi proximo anno describemus, & describenda offerremus. His itaque interim fruimini, & illud vobis persuadentes velim, me vobis esse deditissimum, & nulli alii rei magis incumbere, quàm vt aliquid excogitem, quod vobis utilitati futurum sit, vos tamen rogo: vt ea, quæ primo hoc libro tradidimus, æquo, & benigno animo perpendatis, & tanquàm rude, & impositum commentariolum, quod aliàs perpolitura sumus, accipiat: non enim descripsimus, vt iustum, & absolutum volumen componeremus, nec certe is noster animus fuit, & vosmet huiusce rei iudices esse poteritis, nam cum perspicietis nos generalioribus, & magis necessariis præceptis, tantum operam dedisse, cæterorum verò omnium, quæ in iusto atque absoluto aliquo libro requiruntur, nullam rationem habuisse.

non poteritis non illud pro certo habere, me illa vobis, quasi pri-
uatas quasdam prælectiones, & præceptiones dictasse: & ne hoc
vos lateat, hæc quasi specimen, & compendium quoddam sunt eo-
rum, quæ latissime, vberissime, & exacte de medicamentorum cõ-
ponendorum ratione Deo fauente tunc edituri sumus, cum tan-
tum otij nacti erimus, quantum ad maximum illud opus

perficiendum poterit esse satis: & nobis, ne
diuturnior illa mora molesta es-

set, hoc primi libri

compen-

dium

obtulinus: & secundi item proximo anno

offeremus. Interea ualete,

& me amate.

Finis Libri primi.

68

VICTORIS
TRINCAVELLI
PHILOSOPHI ET MEDICI
VENETI

De compositione ac vſu medicamentorum,
LIBER SECVNDVS.

Quid ſit huius libri ſcopus: ac de humorum concoctione, & præparatione in vniuerſum. Cap. 1.



VAMVIS, ſi ad ſcopum medici reſpexerimus, qui morbos eos curaturus eſt, in quibus purgatione eſt opus, prior videatur eſſe tractatio, quam ſuperiori libro perſecuti ſumus: ſi tamen rationem, eâ ſpectemus, quæ medicamenta in opus, & vſum deducuntur, longe priora ea cēſenda eſſent, de quibus in hoc libro ſermonem ſumus habituri, nam medici rariffime ab initio morbi purgantibus medicamentis, quæ verè purgatoria ſunt, vti ſolent, duntaxat enim in morbis, qui turgere ab Hippocr. dicuntur: plerunque autem, & ſæpius poſt aliqua, quæ ad leniendam aluum faciunt, ab illis medicamentis curationem inchoamus, quæ tum corpus, tum verò vacuandos humores ad faciliorem purgationem parant, & hi quidem, dum coquuntur, & corpus dum fluidum ſit, ad facilem vacuationem parantur, hoc enim Hippo. partim primo, partim ſecundo aphoriſmorum duobus illis aphoriſmīs nobis inſinuat re viſus eſt, nempe concocta medicari oportet, non cruda, neque in principio. Item corpora, ſi quis purgare voluerit, oportet ea prius fluida facere; quæ maxima ex parte vi & ope medicamentorum moliri ſolemus nos tamen, tum quia vſus, & ratio purgatorum medicamentorum maius in re medica momentum habet, ut potè in quibus maiori periculo aberretur: tum uerò quia im-

Apho. 22.
Apho. 9.

penſus à nobis vos diſcipuli partem illam eſſagitatiſtis, priorem de illis tractationem inſtituimus. illa itaq; abſoluta reliquum eſt, vt in præſentia ad aliud genus medicamentorum, quæ alterantia appellant, tranſeamus. Et licet non ſolùm ea corpus vacuent, quæ aluum ſuperiorem, inferiorem ve cient, ſed præterea & ea, quæ vrinas, ſudoresq; item & quæ digèrunt, & per eam vacuationem inaniunt, quæ inconſpicua eſt, & ſenſus latet, tamen in ratione vacuationis magna inter illa medicamenta, de quibus in priori libro egimus, & hæc, quæ per lotia, ſudoresq; & tandem per digeſtionem in halitus vacuant, intercedit differentia, quia illa quadâ proprietate, quæ formam eorum propriam ſequitur, ſuapte natura prædita ſunt, nec eam nos poſſumus in primas qualitates quoquomodo referre: unde non modò vim vacuandi habent, ſed eligendi etiam certum, & diffinitum humorem, quem attrahant, vacuèq; quæ autem ſudorem, & vrinas proleſtant, ea aut per ſuas qualitates, & propriam temperiem id agunt, aut modo ſuz ſubſtantiæ, quatenus aut tenuiorû, aut craſſiorû partium ſunt, quæ omnia, ut ſ. de facultatibus ſimpl. med. Gal. expoſuit, in temperiem, & partium naturam referri poſſunt, non autem in aliquam propriam facultatē, qua hunc humore, magis q̃ illū euacuent: nā calefaciendo, attenuando, ſecādoq; agūt, quicquid agunt: quo fit deinde, vt illis eiſdē non minus ad parandos humores, & corpus ad faciliore purgationē vtamur: præſertim verò ſi illi craſſi, & lenti fuerint, & hoc obſtructionibus ſit occupatū. Sed redeamus, unde digreſſi ſumus. Vt ergo vacuatio, vel potius purgatio ſcēlici, ac facili ſucceſſu præcedat, opus eſt cōcoctione, maturatione ve eorū extremētorū, quæ per medicamēta detrahēda ſunt. nā Hipp. ac Gal. apparatus materiz purgandæ tum maturationē, tū verò concoctionem nuncupare ſolēt. Præterea verò opus eſt, ut corpus fluidū fiat: ſed de hiſc etiā, antea q̃ rē magis particulatim aggrediamur, nōnulla ſunt expiananda, primumq; de concoctione, vel maturatione agemus. Eſt autē hoc in primis conſiderandū, vt quæ dicēda ſunt de eorū medicamentorū ratione, quibus ad maturandos, aut cōcoquendos humores, qui in purgationib. detrahēdi ſunt, exquisitiſ percipi poſſint, q̃ concoctio nihil aliud eſt, niſi tranſmutatio, quæ fit à natiuo calore, in materiāq; concoquitur. hoc. n. Ariſt. 2. de Anima, & 4. meo. hoc itē Gal. 2. & 3. de naturalib. fac. & aliisq; plurimis locis apertiffime expoſuere, primū. n. & proximum cōcoquēs eſt calor natiuus:

natiuus: at verò sicut non eadem est ratio, & natura rei, quæ concoquitur, ita neque eadem est concoctionis rō, & modus. cum enim, Cap. 4.
omne, quod transmutat aliquam rem, id eò illam transmutet, vt in Cap. 7.
substantiam sui similem conuertat: ea vera, & absoluta concoctio
censenda est, in qua id, qđ concoquitur, in substantiā concoquentis
conuertitur: id aut, qđ eo modo cōuertitur, quandā habet suapte
natura, vt tradidit Gal. 2. lib. in 1. de morb. vulg. cum re concoquen- Com. 43.
te familiaritatem: vnde quò maior intercedit ea familiaritas inter
rē concoquendā, & partē ad quā concoquere pertinet, eo & plures
partes, & melius in substantiā concoquentis transmutatz cedunt.
nunquā tamen tanta est inter hæc duo naturæ affinitas, vt id quod
concoquitur secundum oēs suas partes vertatur in substantiā rei,
quæ concoquit: quæ ergo partes ita exquisitz coqui nequeunt, ex-
crementa sunt; quæ interdū plura, interdū pauciora, pro ratione,
aut rei quæ concoquitur, vt potè quæ vel aptior, uel ineptior sit ad
concoctionem, aut ēt pro robore natiui caloris concoquentis, re-
linquuntur. Excrementa aut et si omnino exquisita transmutationē
in naturā rei concoquentis conuerti minime potuerint, neque ta-
men omnino cruda relinquuntur. nam & ipsa aliquo modo versus
naturā & substantiā rei concoquentis transmutantur, saltem. n. se-
cundū qualitates cōuersa sunt, nempe in colore, in rōne tempera-
menti, itē crassitie, vel tenuitate, & in id genus aliis; unde omnes
rationē referre volentes, cur optimū in abscessibus signū sit, quan-
do, aut sponte, aut ex incisione effluit pus album, & lene, item &
vrinæ in febribus, quando Hipostasim hēnt albam, & lenem; aiunt,
quia indicant natiuum calorem qui sedē suā hēt in solidis particu-
lis, uicisse, atq; transmutasse materiā illā excrementitiā, quantum se-
cundū propriā eius naturā transmutari poterat; neq; n. talis erat, ut
in utilē, & alimēto aptā substantiā posset transmutari: nisi interdū
pituita quæ in generatione humorū plene transmutari non potuit:
per ulteriorem. n. concoctionē, si non vniuersa, saltē ex aliqua par-
te cōsequitur eā concoctionē, qua, vt 2. de rōne victus in morb. ac. com. 45.
docet Gal. in utilē, & alimonię corporis aptū succū cōuerti possit:
hæc itaq; est cōcoctio, q̃a in humano corpore cōcoquūtur in mor-
bis, atq; ēt in sanitate vitiosi, & excrementitii succi qui occasione esse
possunt, cur morbi cōcitentur. est. n. (vt 3. de crisib. ait Gal.) eorū Cap. 1.
trāsmutatio, à calore naturali eos superante, & eorū cōtumaciā vin-
cēte, à vitiatānāq; cōcoctione, cū natiuus calor quā natiuus est, ma-
teriā nequit superare, copia malorū humorū cōgeritur, quos ille fa-
tus

lem temperiem redire possit: nam nisi id fomentum detrahatur, nunquam intemperatura poterit remoueri, solet aut aliquando materia sine ullo medicamentorum usu detrahi, ut quando id mixtione sanguinis fit, quod ad nostrum institutum nihil in præsentia pertinet, nonnunquam autem per excretionem vi, & sponte naturæ solius factam, vel adiuuantibus medicamentis purgatoriis, quæ quidem excretio nunquam utilis esse potest, nisi, ut paulò ante diximus, præcedat eorum, quæ excernenda sunt, concoctio, & quam natura sponte molita sit, aut adiuta à medico, qui sua adhibuerit instrumenta. His præterea addamus quòd sæpe multus excrementi vis humor infarctus est in te nues, & angustos meatus, per quos difflatio corporis, euentatioque calor fit, unde maxime eius seruetur naturalis temperatura; causa autem illius infarctus, quæ non facile remouetur, est materia multa, aut crassa, aut lenta, quam necesse est, ut sanitas pristina redeat, vacuare, vacuatio autem rarissime, ne dicam nunquam, fieri poterit sine opera medicamentorum, quæ attenuent, discent, & detergant, aliquando etiam tanta est excrementorum, præsertim crudorum, & crassorum congeries, ut ferè calor natiuus ab eis stranguletur, à quibus præterea multæ in uisceribus difficiles, & contumaces obstructions excitantur, quæ scirrhus, & alios plurimos morbosos, prauosque affectus adducunt: & sæpe natura ab his sponte sua nequaquã pòt se explicare, immo medici auxilium opportunum desiderat, & expectat: sed hæc omnia, ni fallor, duobus illis aphorismis, tanquam generalioribus præceptis Hipp. complexus est, nempe concocta medicamentis vacuatis esse tractanda, & ante uacuationem purgantibus medicamentis moliendam oportere purganda corpora fluida redderet; & quamuis òn parum & alia medici instrumenta sæpe oportuna, & necessaria sint; tamen qui pharmaceuticem medicinæ partem tractamus: de medicamentorum ratione, ut in priori etiam libro fecimus, in præsentia sermonem habebimus. cum uerò in uniuersum duplex sit eorum medicamentorum usus, quæ

nunc in considerationem nobis propozita
sunt: nam aut per os assumuntur,
aut exterius adhibentur:

primum de illis, mox de his etiam
tractatio nem instituemus.

Quòd

*Quod medicamentorum alterantium natura distincte prænoscenda est,
de quæ indicationibus, à quibus rectus eorum usus pendet,
uniuersalis præceptio. Cap. 2.*

Vniuersa verò horum medicamentorum ratio, quæ ad humores parandos pro facili purgatione medico in vsum venire soleat, siue ea simplicia sint, siue composita, in his duobus præsertim consistit, nimirum in distincta cognitione virium, vel facultatum, quibus eorum vnumquodque præditum est: siue illæ ad primas qualitates referantur, siue ad secundas, tertiasue: nec modò (vt in priori libro de vacuâtibus quoque diximus) in vniuersum, verùm particulatim, & distincte, & per suos ordines, uel (vt iuniores loquuntur) per suos gradus: præterea se in exquisita cognitione eorum scoporum, qui medico indicant, quæ facultates sicut futuræ vtilis, & aptæ ad tollendum affectum: horum verò cognitio, à natura curandi affectus petenda est: demum, & tertio, in exquisita cognitione naturæ corporis, vel particulæ laborantis. itaque de his tribus agemus quidem, sed eatenus, quatenus nostro instituto posse satisfacere videbuntur: nam si omnia particulatim proficui vellemus, nobis esset opus vniuersam ferè medendi methodum cõplecti. Initium verò, à sermone de scopis sumemus: quia tractatio de facultatibus medicamentorum, tam penès primas, quàm secundas, & alias subinde qualitates, non modo particulatim, sed penè èt singillatim adeò distincte, & exquiste à Gal. Aetio. Paul. & aliis Arabibus, & Latinis auctoribus fuit instituta, vt superuacaneus omnino labor esset, eadem iterum in considerationem reuocare: quã obrem nobis satis fore putamus, si ea tanquàm constituta acceperimus, quæ ab antiquioribus auctoribus fuere exposita, illisque tanquàm principiis, & fundamentis ad ea explananda vti fuerimus, quæ ad rationem compositionis, & vsus eorum, quæ proximius ad præsens institutum pertinent. Porro sicut sagittatores sibi signum aliquod, uel locum aliquem præfigunt, quò collimant, dum sagittas impellunt, & ad quem omnem impulsus, & momentum sagittarum dirigunt: id autem scopum Græci nuncupauere: ita necesse est, vt omnis artifex, qui verè artifex dici meretur, & non temere, sed ex arte sua agit, sibi id, quod circa materiam, circa quam operatur, agendum putat, tanquàm scopum proponat, quodquæ deinde illi sit tanquàm regula, ad quam omnia, quæ agenda sunt, referat. Quare & medicus, qui affectum aliquem in humano corpore cura-

rus est, nisi temere & casu medicinam faciat, oportet, vt primò cognoscat, quid sibi agendum sit, vt recte curare possit, & illud postea, tanquam scopum, què præsertim in omni ratione curandi, quæ postea vsurus est spectet hoc aut natura affectus curandi, vt. 3. metho. probauit Gal. præsertim ostendere potest, nam, vt ille ait absurdissimum esse putare, qd aliud sit, quod rōne curationis indicet, q̃ morbus, qui curandus est: vnde pro diuersa natura curandi affectus varii et exoriuntur scopi, qui statim, percepta natura ipsius curandi affectus medio, perito, & diligenti se offerunt. Quia verò affectus non semper eodē modo, à medico consideratus: aliquando. n. in vniuersum, & secundum suā cōem, & generalē rationem, interdū verò particulatim: vt consideratur, ita semper suas habet secundum easdem rationes respondentes indicationes: ecce enim morbus secundum communem, & generalem rationem res est naturæ, & sanitati aduersaria, actiones impediens: vnde statim medico, qui semper nittitur sanitatem tueri, & corpus, à morbis vindicare, insurgit indicatio communis, morbum omnino tanquàm hostem profligandum. cum autem ea, quæ se mutuo oppugnet, cōtraria sint, ideo hoc primū se illi offert tanquàm scopum, inueniendum esse aliquid, quod morbo aduersetur, cuius vsu morbus depellatur, sed hoc in vniuersum fieri nequit, nam neque morbus in vniuersum aliquem affligere potest, sed oportet, quod certus sit, & determinatus morbus, vt tandem vsque ad vltimas differentias descendendo, & diuidendo progrediamur, & si enim singularia ea sint, quæ primum curanda se offerunt, in artibus tamen exponendis non cōsue sit progressus, sed satis est ad vltimas usque species prouenisse, cum ergo morbus diuidatur in tria prima genera, respicientia tres illas primas naturas, à quibus pendet vniuersa sanitatis ratio quæ sunt, apta temperatura, tum vniuersi corporis, tum verò cuiusque particulæ: recta, & proba earundem conformatio: & unitas, seu continuitas: prima quidem natura particularis simplicibus, uel, ut solitus est Arist. dicere, similaribus primum ac per se tribuenda est, altera uerò, compositis, quæ & instrumentariæ dicuntur, utrisque tertia communis. Vt nunc quorundam iuniorū ineptias ptereūdas censeamus, q̃ in Gal. & alios hac in re latrātes putāt celebre nomē sibi cōparaturos, aiūt hi eos morbos, q̃ in solutā cōiunitate m referūtur, nō esse utriusq; particulis cōs quorū alii simplicib. pprios: alii uerò cōpositis instrumēariis esse:

Victoris Trincauellij

voluere. Nos verò, cum istius quæstionis disquisitio ad hunc locū minime spectet: impresentia sequamur Gal. & agamus primū de eo genere, quod natura primum est, quodq; in intēperatura consistit, sicuti. n. sanitas in apta, & cōcinna symetria, & tēperie primarū qualitatū: ita necesse est morbū suū esse habere in vitiata tēperie, & mēsuræ eorundem: utpotē qui sanitati opponitur, non quasi extremū extremo, sed vt extrema medio, morbus siquidem ortum suum habet ex recessu à tēperie, & mediocritate cōtrariarū qualitatum: nempe calidi, frigidi, humidi, & sicci, qui excessus interdum simplex est, interdum compositus, simplex dicitur, quando in vna tantum contrarietate fit, à mediocritate recessus, vt in calido, vel frigido duntaxat, seruata mediocri temperatura inter siccum, & humidum, vel contra etiam potest interdum fieri excessus in sicco, vel humido: seruata tamen mediocritate in calido, & frigido: & hi vel simplices morbi, vel simplices appellantur intemperaturæ, cōpositi verò, quando in vtraque contrarietate vitium est, vt si excessus contingat in calida, & humida, uel calida, & sicca tēperie, itē in frigida, & humida, uel frigida, & sicca: cæterum huiusmodi compositionis, (modus ita liceat mihi impresentia appellare,) est quædam intemperatura, citra fomentum vllius materiæ contrahitur aliqua intemperatura siue simplex illa sit, siue composita: sicuti exempli causa de hectica febre dicimus, quod sit intemperies calida & sicca, aliquando verò ea intemperatura à præsentia alicuius materiæ fouetur, custoditurque, ut in tertiana febre, herypelatēq; calida, & sicca intemperatura ortum, & fomentum habet à biliolo succo, aut infarcto, aut defluente per particulas. Quemadmodum autem morborum ad primum genus pertinentium multiplex hætenus facta est partitio: pari quoque ratione, vnaquæque harum differentiarum, per quas facta est hæc partitio, suam propriam, & accommodatam habet indicandi rationem, à qua & proprius scopus depromendus est: sicut enim morbus sua communi ratione me dico indicabat se esse tollendum, ut cum quicquid per se ab aliquo tollitur: necesse est vt illi sit aduersarium, vel (vt communiter dicere solemus) contrarium, contraria enim ea sunt, quæ mutuo se expellunt: unde inueniendum est unicuique differentię, per quam sumus partitionem morborum moliti, id, quod imprimis illi tanquam aduersarium opponatur: & cum vnaquæque intemperatura, aliam intemperaturam oppositam habeat, simplex simplicem, &

compoli

composita, compositā, neque calida intemperies corrigi possit nisi per refrigerantia, frigida verò per ea, quæ vim calefaciendi habeant, & eodem modo humida, per ea quæ desiccant, vt sicca per humectantia: scopus, quem sibi medicus præfigit in morbis, qui consistit in calida intemperatura, est, refrigerandum esse, contra verò in illis, qui sequuntur intemperamentum frigidum, calefaciendum esse, atque ita etiam, in sicca, vel humida humectandum, vel exsiccandum esse, nec non & in compositis, in frigida, & humida calefaciendum, & siccandum, contra verò in calida, & sicca, & in aliis etiam eodem modo. Vbi verò præter particulæ intemperiem adsit etiam materia, quæ illam intemperiem efficit, & fouet, necesse est, ut tum indicationes, tum scopi inde exoriantur multiplices, & varii; nam præter communem illam indicationem, quæ vniuscuiusque morbozæ materiæ rationem communem sequitur: nimirum quòd morbos ex repletionem factos vacuatio sanat, quæque ad priorem librū potius pertinet, vt præter alteram, quæ à qualitibus primis, quibus ea materia prædita est, & à quibus pendet, & fouetur intemperatura contracta in mēbris. Sunt & alii scopi, & aliæ indicationes, tum à modo, & ratione substantiæ, tum verò ab aliis illius qualitibus præter primas, quæ obstant, quò minus primo, & communi scopo, nisi cum magna difficultate, & incommodo satisfacere possimus: prior siquidem; & communis scopus erat vacuandam esse morbosam materiam, cur autem difficilis, & non sine incommodo fiat vacuatio, in causa est, quia autem nimis tenuis sit, dum enim attrahitur in tenuioribus, & angustis meatibus earum particularum, per quas transitura est, quasi absorbetur; ut inde non possit facile educi, aut quia crassior sit iustò; crassæ enim materiæ ad educationem, vacuationemque sunt difficiles, aut tertio, quia lenta sit, lentus enim succus adeò tenaciter hæret locis, in quibus cōtinetur, & per quæ trāsīt, ut idē nequeat medico negotio diuellis sed & à mō, quo in ea particula continetur, oritur difficultas vacuationis, & detractionis materiæ, quia si peruasa quasi, vt Gal. 1. & 8. de comp. medi. secūdum loc. exposuit, distuat, facilius est illius euacuatio, sed si sit veluti absortus in substantia particularum, & infarctus, inculcatus quæ ut in iunioribus præter naturam, nempe in inflammatione in hærysipelate, in scyrrho, & id genus aliis, longe difficilior erit vacuatio: præterea etiam facilius est vacuatio eorum, quæ in viis cōmuniibus continetur, per quas fit vacuatio, vel in locis vicinis, & ad

Victoris Trincauellij

ad ea pertingentibus, ut sunt uentriculus, intestina, & uenæ ad hæc pertinentes: nempe mesaraicæ, & concaua iocinoris pars, quando per aluum futura est vacuatio; renes uerò, & cōuexa eiusdem pars, si per lotia. Et quia non solum cogitare oportet, q̃ uancuādum sit, sed & quo modo possit facile, & citra noxam uacuare, ab omnibus medicus aliquam particulatim indicationem petit, à qua propriū scopum depromat, quem deinde spectans accommodata his omnibus, & oportuna medicamenta reperire, adhibereq̃; possit. Quāuis autē de his hæctenus perinde egerimus, ac si ea propria duntaxat illis morbis sint, qui ad intemperaturam pertinent: si tamen uelimus rem exacte disquirere, in hos tandem scopos, & cætera morborum genera, in quibus medicamentis opus est, necesse est resolui, quia si medicamentum proprie dicendum est, quod corpus nostrum transmutare potest, & omnis transmutatio fiat per ipsas qualitates: tandem hūc in omnibus confugiendum est: nam aut calefaciendum, aut refrigerandum, aut incrassandum, aut incidendum, aut detergendum, aut rarefaciendum, aut densandum, constipandumque, aut alstringendum, aut laxandum, hæc enim omnia, vsu & ope medicamentorum fieri possunt, & quotidie à medicis fiunt, quibus si addiderimus, quod interdum agglutinatione partium opus est: interdum uerò, illis quæ uim habent septicem, aut causticem, hoc est, putrefacientem, vel vrentem, omnia ferè complexi erimus, quæ in vsu, & electionem, compositioneque horum medicamentorum, de quibus in præsentia sermonem sumus habituri, queri solent. Neque tamen ad rectam, & exquisitam rationem tam cōpositionis, quam vsus istius generis medicamentorum, hæc, quæ nuper à nobis exposita est, cognitio, satis medico esse poterit, nā ea adhuc nimis generalis est, quia non modò illi nouisse opus est, quod aut calefaciendum, aut refrigerandum sit, humectandumq̃; aut exsicandum, & sic etiam de aliis omnibus, quæ nunc proposita fuere: uerum & quatenus calefaciendum, uel refrigerandum, uel humectandum, uel siccandum, uel attenuandum, uel incrassandum & itidem de id genus reliquis dicendum, nam alioquin si ita temere calefaceremus, refrigeraremusue, & alia agere tentaremus, neq̃; nobis terminos aliquos in his præscriberemus; facile ab vno extremo in aliud, & aliquando deterius fieri transitus posset. nobis uerò illa eadem terminos præscribere, atque ostendere poterunt, quæ priores illos scopos etiam indicauerunt: si eorum distinctam notitiā habueri-

mus: cum. n. illa, vt paulò ante dicebamus, in quodam, dixerim, recessu à naturali mediocritate consistant, nullus autè recessus huiusmodi indiuiduus sit, sed aliquod quasi spaciū habeat (iuniores latitudinem dicerent) secundum eā recessus rationē, qua aliqua vel magis, vel minus ab ea mediocritate recedere dicuntur, quatenus agendum sit, nobis indicatur: si quidem in hoc mediocritatis, recessu ut Gal. tum alibi, tum vel maxime. 3. lib. artis med. testatus est, possunt non secus ordinēs notari, atq; in viribus medicamentorū, optimè annotarūt & Gal. & alii ferè omnes posteriores. Distincta ergo cognitio rationis excessus in morbis, vel in morbosis causis, describere medico facilè poterit modum, limitesq; vltra quos nō oporteat ī his, q̄ nuper exponebamus, progredi. At verò q̄a isthæc illius recessus rō deprehēdi nunq̄ poterit, nisi ex collatione cū ea naturali mediocritate, à qua recessus factus est, ideo oportet prius nouisse naturalem statum, tum corporis egrotantis, tū etiam partīculæ, si aliqua particula male affecta sit, vt tandem sit necesse perspectā, quoad fieri potest, habere naturā partiū omnium in humano corpore, quibus medicamenta sunt à medico administranda, nec modo quantū ad earū temperaturā, sed & ad substantiā, & ad munia, ad dignitatem, & præstantiam pertinere potest, quia multa exterius adhibita externis partibus vtiliter, & citra noxā administrantur, q̄ si interius assumerentur, perniciem afferrent; præterea in dignioribus particulis magis cautos nos esse oportet, & semper earum robori prospicere. Sed & ad situs earū non paruā rationem habere oportet; nā quò remotiores partes sunt, & quò per lōgiore viā medicamentis iter futurū est, anteaq̄ ad locum affectum pertingant, eò ē valentiōra, & fortiora requirūtur medicamēta: quia eorū vires semper in transitu remittūtur, atq; res hæc tantam vim habet, vt sepe sit necesse oportunis medicamentis aliquid intermiscere, quod alioquin, quatenus ad eius naturā pertinet alienū, immo & aduersariū est curando affectui: utile tamen ea ratione est, qua iuuat alia accommodata medicamenta, vt facilius, & citius perueniant ad morbosum locū, vt in medicinis dolori capitis oportunis acetū immiscemus. Sed de his exquisitis in sequētib. mox agemus. Hęc itaq; in primis sunt, quæ ab antiquioribus medicis: p̄sertim vero à Gal. multis in locis interdum breuiter, & per compediu: interdum verò diffusè, & per diexodum exposita, & probata sunt: de p̄p̄tia quidem ex principiis, & decretis Hippo. Nos vero tanq̄ cō-

stituta, & probata accipimus, illis postea vsuri tāquam initiis ad ea subinde explananda, quę magis particulatim facere possunt ad viā, & rationem apposite, & accommodate componendi, & vtendi, medicamentis in tuenda sanitate, & morbis depellendis.

De artificialis coctionis communi ratione, & cur tam simplicia, quā composita medicamenta coquantur de quę aqua, melle, & zuccharo nonnulla scitu digna. Cap. 3.

Quoniam autem plura eorum medicamentorum, quę tam interiorius assumuntur, q̃ exteriorius adhibentur, præsertim verò si ex pluribus cōficiantur, per decoctionē fiunt, & ad vnā formā, vtrāq; constitutionē deducuntur: ideo mihi nō ab re fore videtur, si prius de cōmuni decoctionū ratione sermonē instituerimus: & primū quibus de causis adducti sint medicī, vt medicamenta interdū sola, simpliciaq; interdum plura, interdū pauciora simul ad ignē decoquant; quāq; vtilitatem se inde consequuturos sperēt: sed vt rem distinctius tractemus: primum distinguenda est cocturę ratio, nam ea, vt philosophi, & medici docuere, duplex est: nempe elixatio, & assatio. Elixatio quidem est coctura, quę fit à calido in multo humido. Assatio verò ea est quę fit à calido sicco, & igneo, ut 4. meteor. docet Aris. licet autē vtroq; modo coquātur medicamēta, frequentius tamen coquūtur per elixationem, præsertim verò, quę interiorius sumuntur, deuorāturq;: imò & eorū plurima, quę exteriorius administrantur, vt quę a iunioribus linimēta, vnguentaq; dicuntur, itē emplastra, cerataq;: & oleorū quamplurima. Primū ergo sermonē de his habebimus, q̃ ad ignē ex multo humore coquūtur, & quasi elixātur; & q̃a horū alia simplicia sunt, alia mixta, & cōposita, de simplicib. prius loquamur. Simplicia verò sunt, vt succi tū fructuū, tū herbarū, liquoresq;: & ī his ēt aquā ponemus, nō est autē vna eadēq; ratio, cur hæc coquātur nā aqua quidē, vt ab ea, ut potē quę aliorū, quę coqui possunt, simplicissima est, sumamus exordiū à medicis: quantū ego me hætenus legisse memini, duplici de causa coqui solita est, nimirū vt aliqua particulatim detrahatur malicia, vnde crasse, palustres, & limosę aquę coquebantur ab antiquis, quia facilius terrenę, & limosę partes, postquā refrigeratæ per naturā aquę, vi ignis segregatę descendunt, & sublimē detrahitur enim substantia aquę per decoctionem, ac ideo facilius extrahat partes secretę descendunt, nō coquebātur autē aque ut potum

ut potū salubriores essent, ab antiquiorib. medicis, si suapte natura defecaret & bonę erant: ad corrigendā ergo aliquam eius malitiam, quā aque inesse dubitamus, eā coquimus: præterea vero, aqua excoquitur, ut magis refrigeret, in regionibus. n. in quibus fontes, vel putei aut nulli, aut rari admodū frigidi habentur, ut in Egypto cū opus est aqua frigida, eam, ut testis est Gal. 4. li. com. in 6. Epid. primū decoquūt, mox verò noctu sub dio acri exponunt, ita. n. magis, & facilius refrigeratur: præsertim quando prius efferbuerit: prōptius namq; eā sic rarefactā subit frigus, facilius enim transmutantur quę rara sunt, quā quę densa, sed præter aquā succi quoque præsertim plantarū, & fructuū, coqui solent: nepe ut seruari in putres possint. Cæteri enim succi præter viminū, oliū, & mel, ut 3. de facul. simpl. med. testatus est Gal. facillime putrescunt, nisi statim coquantur, consumitur siquidē, dum coquuntur, aqueus quidā humor, qui putredinis in causa est. Decoquuntur autē interdū, ut condensentur & indurentur, sicuti succus radicis dulcis coctus cogitur, & induratur, succus etiam absynthii, & ut idem 6. de cōpo. medi. secundum loc. ait succus Hypocistidis, vū accerbat, & cē taurii, & quā plures alii, qui ut ibidem ille scribit, si fuerint plurimū excocti, exiccantur, crassescuntq; & tandem indurantur per cocturā, ut & multi alii liquores, sicut resine omnes, præterea & mel, immo & lac, coquūtur præterea succi, liquoresq; ut ab eis aliquid, quod nocere alicui posset, detrahatur, quē admodū lac, & mel, quę cruda flatulenta sunt, atq; interdū excitato flatu ventriculū, & aluū conturbant, & dolores concitant, vnde coquuntur, ut partes illę per cocturam absumentur, quę apta materia sunt ad flatum excitandos, cum. n. 4. de ratione vict. in acut. morb. lac Asine coctum ad laxandam aluum præciperetur, illud coqui propter flatum dixit Gal. item 3. de alim. facul. mel ait, nisi probe coctū sit, flatus gigneret: interdum verò coquimus, ut aliquā qualitatem his adimamus, quę tū ad nostrum institutum pertinet, vlti futura non est: sicuti exempli causa, lac quidem, & mel accepta citra cocturā, aluū ciet inferiorem, sed & stomachum quoque mouet mel, si, ut ibidem testatur Gal. copiosum delingatur; sed decoctum non amplius ciet inferiorem aluum, nec uomitum, siquidem mel cuiusdam acrimonię particeps est, quā ventrem aliquid tantulum soluit, lac uerò cum nitro sę qualitatis particeps sit, solnendę aluo quandā facultatem obtinet: unde mel coctū, cum acrimoniam deponat per decoctionem, amit

Com. 10.

Cap. 15.

Cap. 3.

Com. 7.

Cap. 39.

rit etiam vim subducendi aluum, & potius urinam prouocat, facile enim hoc modo per venas permeat, cum ventrem prius moueret, ad id incitantibus acrioribus partibus, ita & lac, si eatenus coquatur, vt serosus humor absumatur, non modò non ciet aluum, sed potius eam sistit, & astringit. Vnde antiqui præsertim alinino lacte ad purgationes inferioris ventris utebantur, & eo quidem cocto, quantum poterat esse satis, ne flatu gigneret: coctura verò modesta non tollebat vim purgatoriam; cum enim in genere lactis longe huiusmodi lac, serosius sit, nequit vis soluendi: moderata coctione ab eo adimi; & hæc quidem satis quatenus ad simplicium succorū cocturam seu liquorum pertinere potest. Nunc verò de ea coquendi ratione agamus, qua plura simul composita, & commixta coquuntur, sicut quando syrupi, & medicinalia decocta, & alia medicamenta quæ à medicis, vel eorum ministris coctione parantur, Nam de oratione, & causis compositorum medicamentorū in vniuersum nunc agere, atque exponere quam vtilitatem afferat compositio plurium simplicium in vno, eodemq; medicamento, quæque necessitate medici ad componenda medicamenta fuerint cōpulsī; superuacaneum videtur, cum de hac re copiosè in priori libro fuerit actum, sed tantum de coquendi ratione sermonem instituemus. primumque quam vtilitatem consequuntur medicamenta per aptam cocturam, cum simul plura simplicia medicamenta commixta coquuntur indicabimus, deinde quam commoditatem medicamentis coctis nonnulla afferant, quæ ipsa ex se aut nullam, aut saltem non insignem vim, vel facultatem habent qua in tractatione minuta quædam, & læuia, quæ pharmacopolis, & eorum peritiæ vltro committere medici omnes solent, & nos quoque interim omitemus. Quatenus ergo ad primum pertinet, hoc imprimis considerandum est, quòd cum ars naturam, quoad per eam fieri potest, imitari nitatur, natura verò in generatione corporis commixti ad vnionem, seu ad vnā formā diuersa simplicia corpora per concoctionem factā à calore natiuo, & insito rei deducit, ea enim est eius vis, vt siccum elementum cum humido permiscendo, rem illam in vnā perfectionem, & formā conducat, quæ inter ea quæ miscentur media est, viresq; omnes, & facultates sub quodam modo, & quadā mensura eorum, ex quorum miscella per genita est, in se continet. Ita & medicus illā imitatus nititur per decoctionē diuersorum medicamentorū vires,

vires, & facultates diuerſas in vnā quaſi mediā formā vnire, quā illas vires, quā prius diuerſe ſparſim, & ſeorſum in diuerſis illis medicamentis habebantur, per eorum compositionem, & decoctionem collectas contineret, ut illis poſtea ad morbos, in quibus interdum multæ ſint complicatæ indicationes, poſſet vti magna ſiquidem eſt artis, & naturę in miſcēdis, coquendiſq; rebus ſimilitudo, vt etiam ipſemet Ariſt. 4. meteor. translatis ab arte nominibus naturalem concoctionem, & eiꝯq; differentias expoſuit. Nam voces hæc Concoctio, Elixatio, & Aſſatio quæ artis ſunt, per ſimilitudinem quandam ad res naturales tradūxit coquuntur igitur medicamenta, ut ad vnā quandam mediā formā deducantur. Vnde Gal. in libello pro puerō laborante comitiali morbo reddens rationē cur oximel, hoc eſt, acetū mīlſum, quod fit ex aqua, melle, & aceto ſimul mixtis, decoq. voluit Hipp. cū ea omnia liquida ſint, & quæ mutuō facile citra coctionem miſceri poſſint, dixit, vt melius, & exquisitius vniantur. Addit autem præterea, ut & aceti acrimonia obtundatur, mollisq; ſtatus diſſoluatur; ſed & cerata, vel emplaſtra, quæ componuntur ex litargiro, & aliis mineralibus ex oleo decoctis, vel ex alio liquore, meliora eſſe ait 1. de compo.

med. per genera, quō magis cocta fuerint, rationem verō, unde ea quæ coquuntur, facilius ad vnionem & æqualitatem deducuntur, viſus eſt inſinuare voluiſſe 1. de alimentorum facul. ubi hæc ſcripſit: omnibus enim quæ coquuntur in aliquo humore vſu euenit, vt quidam ab eius facultate in ſe deriuent, ac etiam vt viciffim de ſua portione aliquam impartiantur: commiſcentur itaque, vt hæc ratione ſaltem facultates exquiſite diſfundantur per totam medicamenti ſubſtantiam, & digerātur in eius partes omnes, & ita in unū coeant. Habet præterea & aliā commoditatē decoctio, quæ priuatim illis medicamentis vtilis eſt, quæ diutius parata ſeruātur: de illis loquor, quæ liquida ſunt, ut ſunt, potiones præfertim ſi mel, vel zuccharum accipiant, nam hæc duo maxime id præſtant, ut diutius durare poſſint integra medicamēta, & illa maxime quæ ex herbis, fructuumq; ſuccis parantur, ut ſyrupi multi ſiunt, nā quāuis uini magnam habeant medicamenta à putredine cuſtodiendi corrumpuntur tamen, niſi ſint probe cocta, adeo vt extranea humiditas, quæ putrefactionis fomentum eſt, abſumatur: de aliis uerō medicamentis quæ exterius illinuntur, aut apponuntur, ut ſunt olea medicinalia, emplaſtra, & id genus alia ſuo loco dicemus,

Cap. 9.

Cap. 10.

sed neque id in præsentia prætermittendum, cuius & in priori libro meminimus: nempe quod quamuis ea præsertim simplicia in componendis his medicamentis, quæ per decoctionem parantur sint eligenda, quæ vis facultatibus possunt aliquid conferre ad scopum, quæ in curando affectu spectandum nobis proposuimus, vitimur tamen sæpissime, & aliis quibusdam, quæ cum his componimus, quorum facultates præcipue ad nostrum institutum faciunt; quauis ea vel nullas, vel satis exiguas vires habeant, quæ possint aliquam præstare utilitatem proposito scopo, & tamen eorum usus, vt 3. de comp. med. per gen. docuit Gal. & si non primū: secundario saltē multam afferunt commoditatem, nec eam vnā tantum, sed multiplicem: primā quidem commoditatem tribuunt aliqua medicamenta simplicia in compositione accepta, quod tanquam materiæ aliis medicamentis officium præstant, ad quod officium, ea imprimis idonea sunt, quæ, ut tū ibi deinde docet Gal. tum vero 11. de facul. simp. med. non sunt vehementi aliqua facultate prædita, valentioribus. n. medicamentis hæc se tanquam materia exhibent, in illis enim fortiorū medicamentorū vires, & qualitates commiscetur, & quasi, ut diximus, confunduntur, & vniuntur per decoctionem, cum. n. nullam eximiam qualitatem, vel vim habeant, non possunt insigniter aliquo modo validioribus facultatibus obstare: vnde hac ratione oui albo, immo sæpe & toto ouo vitimur in componendis, & miscendis multis medicamentis, parandisq; tū ad oculorum affectus, tum ad alios aliarum partium: vbi fugiendam eorum mordacem vim censemus, in ceratis verò, & emplastris multis, & id genus aliis medicamentis, præsertim oleo communi vti solemus, nā oleum vetus, & quædam alia olea propriè non pertinent ad hoc manus, quia iam sibi coparauere maiorem digerendi, & desiccandi facultatem, quam requirat hoc officium: eadē quoque ratione plurima medicamenta, quæ in modū emplastri conficienda, sunt lythargirum, hoc est, argenti spumam, & eam sæpe copiose accipiunt, nā hoc simplex nullā habet eximiā facultatem, quæ maioribus, & difficilioribus vlceribus, admodū conducere possit, quia tamen potest liquari per decoctionem ex oleo, vel vino, uel aceto factā; ideo vt cōmoda materia ad deducendum, componendumq; medicamentū ad formā emplastri, ut ibidē 1. de comp. medi. p. gen. exponit Gal. accipi solet: eundē præterea usum præstat aqua in potionibus, decoctisq; multis, & epythematibus, quæ præter alias commoditates, & hanc habet, quod vi eius humiditatis, vt Gal. tradidit uim habet,

bet, ut tandē per omnia illa permeet, & penetret q̄ in ea macerātur, uel coquuntur. Multa ē accipiūtur tanquā cōmoda, quamuis ad primariū scopum, uel nihil, uel parum admodū faciat, neq; ea præterea sint, quę munere materiæ fungi possint: sed alio modo uilia sunt, nā uedicamēta reddunt minus ingrata, & insuauia, nimirū ut facilius admitti, & cōtineri ab assumentibus possint, quæ. n. admodū ingrata sunt, abhominatiōē mouēt, uentriculū subuertūt, & turbāt, unde aut reiciūtur, vomitu, aut si detineātur vi, adeo exagitant, & conturbant etiā vniuersum corpus: non modo uentriculū, ut ea cū turbatione magis obsint, q̄ prodesse possint, atq; huius præcipue in his ratio, ut Gal. 6. de comp. med. secundū loc. & 1. de Antidotis monuit, habenda est, quæ ore summenda sunt; hæc. n. maxime fastidium cōcant; duo aut sunt, quæ præsertim molestā, ingrata, insuauiaq; redunt eiusmodi medicamenta: nēpe fædus odor, & molestus, tirstis sapor, & cū maxime purgatoria medicamenta, de quibus fuit i. libro habitus sermo, tum suo odōre, tum sapore, tum quandam naturali inimicitia sint uentriculo aduersaria: ideo Hipp. & Gal. 2. de ratione uict. in acu. morb. & 8. de comp. med. secundū loc. & aliis in locis consulerunt esse illis semper admiscenda aliqua, quæ tum suauis, & aromatico odore, tum familiari sapore gratiam conciliare medicamento possint, ut tamen, quatenus ad odorem præcipue pertinere potest, hoc sit aduertendū, quod neq; in sapore est negligendū, eiusq; & Gal. meminit, q̄ quāuis huius conciliandæ gratiæ ratio aliqua sit habenda: attamen non ea est habenda, ut primariis nobis propositi scopi sit obliuiscendū: idq; procurandū quantum fieri potest, ne ea quæ huius conciliandæ gratiæ assumimus, omnino superent, & impediā aliorū uires, quæ propositū scopum primario respiciunt: unde uel ea eligenda sunt, quæ his non habeant uires aduersarias, uel illis adēd modeste utēdū, ut non possint de aliorū uiribus multū detrahere. Et quantū ad solutiua medicamenta pertinet antiqui, ut diximus, ea inniscebant, quæ aromaticū odorem spirabant, quorū cū pleraq; constarent calida, & tenui substantia, præsertim uerō crassiores humores attenuādo, & uias aperiendo poterant in purgatione iuuare, in præsentia uerō medici, & succum rosarum, ob gratū rosæ odorem, quæ re fert, immiscere, his medicamentis solent, in quo neque multus est calor, & uim detergendi aliquam, & attenuandi habet; quo & in aliis potionibus uti non esset alienum ab hoc instituto, quamuis ad

Cap. 5.
Cap. 1.

purgationem non essent confectæ. Quia uero iam diu inualuit cō-
suetudo in uniuersa ferè Europa, ut sæpe decocta bibenda ex aquis
per distillationem ex herbis extractis fiant, itemq; & syruipi appel-
lati eisdè diluantur, quæ dū destillant fumosum quendā odorē con-
trahunt, qui ingratus admodum est, & quò recentiores, & ma-
gis nouæ sunt, eò etiam magis ingratum odorem redolent: huic
incommodo sic occurrendum videtur, ut eas eligamus, quæ rece-
ntes non sint, sed à quibus iam magna ex parte euanuerit, & euapo-
rauit ille ingratus odor tempore enim euaporat, ut experimento,
tum ab aliis, tum vel maxime ab aqua rosacea tuto percipere pos-
sumus, sed præterea & id deprehensum est, quod si fiat destillatio
ex aqua, & ut dici solet, in duplici vase, vel ut iuniores dicunt in
balneo Mariz, non videntur aquæ illæ ita extractæ insignem, & ita
molestum contrahere odorē, sed neque hoc videtur negligendum
in usu odoratarum rerum, quod aliqui sunt odores, qui & si aliqui-
bus plurimum grati sint, eosque delectent: aliis tamen non parum
sunt noxii nam insignes & aromatici odores illis incommodi sunt,
quibus dolet caput, ut & Hipp. 5. aphor. docuit, multæ etiam mu-
lieres eos odores, ut sunt moschi, & ambræ appellatæ, & aliorū id
genus auersantur, præsertim verò illæ, quæ sunt vterinis strangu-
latis obnoxie, quæque Hystericæ dicuntur; menini namq; cum
Venetiis essem, & esset cuidam nobili mulieri oblatus syrupus bi-
bendus, quem apothecarius, qui paulò ante tractauerat quædam cō-
posita medicamenta, quæ hæc odorata accipiunt, illotis manibus
commiscuerat, mulier eo odore percepto statim cœpit ex vtero
strangulati. Quidam ut hæc incommoda deuitent, uas, unde bibem-
dū est medicamentum, lintheo madefacto ex aceto, & aqua rosacea
cōtegūt, relicto tātò foramine, ut bibi medicamētū sine impedimē-
to possit, acetum acris odor medicamenti odorē superat, fastidiū
uerò, quod ex ingrato sapore occasionē habet, imprimis tolli solet
eorū mistura, quæ grata, & familiaria sunt naturæ, qualia sunt dul-
cia, ut mel & zuecharū, & id genus alia: & proinde Gal. eodē 6. de
comp. med. secundū loc. laudat Archigenis sententiam, qui perce-
pit, in his quæ ad affectam columellam paranda sunt, semper mel
hac de causa immisceri austeris medicamentis, quorū necessarius
est usus in principio ad repellendā fluxionē, ut & ipse in principe
parte illius libri monuerat, & inde introductū est in usum, ut om-
nia ferè medicamenta bibenda, uel deuoranda præter pulueres, si-

Aph. 5.

Cap. 9.

ut uim calefaciendi habeant, siue refrigerandi, ex melle, aut ex diluto zuccharo coquantur, uel saltem condiantur: & id propter ea, ut assumentibus sint minus molesta: quamuis sæpe uires aduersarias illi habeant, quod nobis indicabat scopus primarius. sæpe enim is indicat refrigerandum esse, utrimur tamen syrupis, uel decoctis, uel placentulis confectis, uel conditis melle, uel zuccharo, quæ facultatem aliquam calefaciendi habent. Vbi & id aduertendum, posteaquàm interim de melle & zuccharo mentio facta est, quòd præter horum simplicium medicamentorum facultates proprias, quæ propriam naturam, & temperiem sequuntur, habent has communes in medicamentis compositis commoditates, primum, qui ea impetria, & incorrupta: si congruam cocturam fuerint assecuta, longo tempore, ut eodem loco insinuare visus est & Gal. seruari possunt, præsertim si succos fructuum, Cap. 3. uel herbarum receperint, ait enim ibi, quòd succi sine melle impetres diu nequeunt manere. Deinde verò, quia tollit medicamentorum in gratiù saporem, Naturæque familiare est. tertio facit reliqua medicamenta, quibus cum mistum fuerit, celerius transire, & in corpus permeare. quarto enim meth. ait idem Gal. mel est instrumentum digestionis medicamentorum in corpus, & celeris transitus ueluti uehiculum: id verò, tum dulcedinis ratione: tum uerò tenuitatis partium. Hic tamen considerandum est & hoc, has utilitates non solum mel: sed, ut paulo ante dicebamus, & zuccharum hebere, quod, quamuis antiquis temporibus Gal. & Hippo. esset cognitum, ut & Dioscorides, & Gal. uidentur indicare, uel nullus tamen, uel rarus saltem erat tunc temporis eius in medicamentis usus unde non erit præter institutum, si de his pauca quædam, & de eorum differentia dixerimus. differunt itaque, quòd mel quidè ut idem Galenus testatur, dulcius est zuccharo, itemque calidius, & tenuior substantiæ, & non oïno alicuius acrimoniæ expers. zuccharum uidetur suauiorè habere dulcedinem, præsertim id, quod optime purgatum, defecatumque est: unde eius frequentior est in mensis usus, minus calefacit, & minus mordet, dum detergit. Ex quibus in hunc modum expositis: facile perceptu est, quòd peritus medicus, qui his ob has communes utilitates est vsurus, non illis promiscue, & indiscriminatim utetur, nam ubi affectus, quem curare instituit, ex calidis,

Cap. 4.

Cap. 4.

lidis, tenuibus, acrioribusque humoribus ortam habeat, non ita cō-
modus erit mellis vsus, nam & Gal. in calida, & tenui destillatio-
ne curanda, 7. de comp. med. secundum loc. consulit, vt medica-
mentum, quod diacodion nuncupatur, valet autem plurimum ad
reprimēdas destillationes: prætermisso melle, ex sapa paretur: ex
melle verò, si humor destillans crassior, & frigidus sit. Nos vero
in tenuibus ex zucharo confecto solemus vii, vtpote, quod parū
calefaciat neque perinde vt mel attenuet, vnde sordida vlcera, quę
deterfione egent: si sint eximii sensus mel rosaceum propter eius
morsum ferre nequeunt, facile tamen sfrrunt syrupum rosaceum:
eum etiam, quę ex zucharo, & rosarum succo conficiunt. Sed nūc
temporis etiam in curandis affectibus, qui à calidis, acris, & te-
nuioribus humoribus originem habent, syrupis potius vtimur
ex zucharo paratis, q̃ ex melle, quales sunt violaceus, ex indiua,
vel cicorea, vel oxalide, vel iuiubis, & id genus aliis. in affectibus
autem à crassioribus, & lentis, frigidisque succis potius illis vti-
mur, qui mel accipiunt: vnde in tertiana exquisite, & id genus aliis
frequentius medici hac tempestate accipiunt syrupum acetosum,
& syrupum rosaceum, si illo sit opus: in nostris verò tertianis, &
quotidianis, sæpius oximellite vtuntur, & melle rosaceo. Possemus
& alia multa hoc loco describere quę à præsentī instituto non es-
sent aliena: nisi qnòd nimis in longum, & vltraquàm institueramus
sermo is videretur protrahi, vnde constabit iam receptui cauere,
postquàm satis sumus vagati, si enim hæc, quę hæctenus exposita
fuere, tanquàm exempla accipiantur, facile & alia omnia: si quę le-
gēti offerētur, cum his collata poterunt percipi, quare iam incipia-
mus ea exponere, quę magis particulatim ad compositionem, &
vsu medicamentorum, quibus hunc alterum librum dicauimus,
pertinere nobis videbantur, & primum de illis agemus, quę per os
assumenda offeruntur, & in his primum de syrupis, vtpotē qui hoc
tempore in maiori vsu sunt, & vbiq̃e fere parati reperiuntur. De
inde decoctis, mox de pastillis, vel trochiscis, postea de illis
quę vulgo electuaria, quęq; confectiōes dicuntur. Postremo in
tertio libro de ratione eorum, quę exterius administrari solent.

De syrupis, qui in frequentiori usu sunt. Cap. 4.

Syrupus arabicum vocabulum est, vel saltem ab arabico dedu-
ctum, quod, vt mihi quidam illius lingue peritus dixit, potum
uel

vel potionem significat, nescio an fuerit corruptū ex sorbet, quod Arabibus potionem significat: nonnulli nostra hac tempestate, ut fugiant arabicum vocabulum, & latiniore videantur, serapium vocauere, quo vocabulo vsi sunt Græci iuniores, qui Arabibus posteriores fuere, & ab illis multa nomina medicamentorum accepisse videntur, & multa etiam medicamenta describere, in quibus fuit Actuarius; sed & serapium neque Græcum, neque latinum vti que vocabulū est, verum ex arabico corruptum. Et quamuis syrupi isti nostri putentur esse inuenta Arabum: ego tamen non puto eos fuisse horum primos auctores, nam & Gal. quoddam medicamentum *℞. li. artif. cur. ad Glaunconem*, quod conficit ex quibusdam simplicibus decoctis ex aqua, & melle potionē appellat, & ex hoc loco forsitan & modum confectionis, & nomen syrupi, potionem in suam linguam transferentes, Arabes, deprompere: sed de his satis, ea incipiamus quæ magis ad negotium nostrum pertinent. Syruporum itaque, (liceat enim nobis hoc in præsentia trito vocabulo vti) duæ sunt primæ differentię, aliqui enim sunt, & dicuntur simplices: alii verò compositi: dicuntur verò simplices: non quidem, quod exacte, & vere simplices sint: sed per collationem ad alios, nam isti, & ipsi ex pluribus conficiuntur: saltem enim ex zucharo, uel melle & aliquo succo addita interdum aqua, sed quia in his unum tantum ponitur, in quo sit vis idagendi, quod in eo præcipue aquirimus, mel uerò & zucharum recipiunt, quasi medicamenti materiam, & propter alias commoditates, neque primum sed secundo admittitur: hac ergo ratione: si sint cum aliis, qui ex pluribus hoc modo conficiuntur, collati, dicuntur simplices, interdum uerò, & uere compositi sunt, & ex multis primum confectis: quia tamen diuersimode solent componi ita, ut pauciora interdum primo accipiant, & illis sæpe ita confectis utimur, postea ut ipsos efficacioris reddamus, alia priori compositioni addere solemus, ut quoniam sit utendum, indicemus; simplicem appellamus priorem, cum citra aliquam aliam alioquin additione eo vti volemus quemadmodum medici tripliciter syrupo, quem bizantinum, vel de bizantiis Mesue appellat, vtuntur: aliquando sine vlla alterius medicamenti additione, præter primam compositionē, & hunc simplicem vocant, nonnunquam acetum illi addunt, & hunc bizantinum cum aceto nuncupant, quandoque verò & alia quædam aromatica, vt suo loco dicemus, adiciunt, & byzantinum completum, vel compositum.

Victoris Trincauellij

compositum dicant. De simplicioribus itaq; prius, vt et rationi magis consentaneum esse videtur agemus. Hi ergo varij & diuersi ex propria eorum natura sunt: imo & inter se aduersarii facultatibus differentes, nec illis solum, quæ ad qualitates primas referuntur, sed & alijs etiam secundis, & tertijs appellatis: nec modo his differunt: sed etiam si cum varijs particulis humani corporis conferantur, sæpe enim ex illis duo reperiuntur, nonnunquam & plures, qui licet sint facultatibus similes, vterque enim refrigerabit, aut calefaciet & neque ordine, vt gradu (vt utar communi iuniorum loquendi modo diuersi admodum inter se erunt alter tamen ventriculo, alter capiti commodior erit: ita alter lieni, alter pulmonibus atque ita etiam de multis alijs possemus sermonem habere, nã cū ex medicamentis conficiantur, & ab illis suas uniuersas facultates habeant, pro ratione diuersitatis natura, & facultatum eorum simplicium medicamentorum, ex quibus conficiuntur, diuersas & ipsi vires habent, sunt aut syrups hi simplices, aut ex aliquo succo alicuius herbæ, uel fructus, aut ex eorundem decocto, uel ex aqua in qua medicamēta fuere demersa, & eatenus macerata, donec eorum vires in aquā transferint, iuniores dicunt eos syropos fuisse factos ex infusione sicuti appellāt syrupsū factū ex infusione rosarū, uel uio larū. Ex succis fiūt, q̄ ex endiuia simplex, quiquæ ex cicorio, qui ex oxalide, uel oxilapatho, uel, ut nūc loqui solemus, ex succo acetosæ, itē ex buglossa: quamuis in cōi oīum ferè medicorū snia hac nostra tempestate, herbam, quam vulgo buglossam uocant, non esse antiquorum buglossam, sed quomodocunq; sit: si ea non est, sicut & ego non esse arbitror, est saltem altera, quæ ab ea uiribus, & facultate non plurimum differt, præterea ex boragine, quæ uerum esse buglossum antiquorum nunc creditur, sit præterea & ex succo rosarum: item ex succo bettonicæ qui simplex & bettonica dicitur, ex succo fumaricæ, qui ex fumo terræ simplex in præsentia appellatur, ex succo quoque florum nimpheæ, quam uocabulo Arabico nenuphar nunc vulgo nūcupatur, itē & succo tusilaginis, quā farfarum seplasiarii Arabas sequuti nominant. Et ex succo yuæ, uel aiugæ, uel chamepyti hos alicubi paratur syrupus, Et succo itē lupi saliceti, qui nunc ex lupulis uulgo dicitur: item ex scabiosæ succo quæcunque sit scabiosa. Ex succis autem fructuum sunt syrups alij qui simplices, qui in multo sunt usu, ut ex succo mali punici, qui ex granatorum succo communi nuncupatione dicitur, item & suc

co malorū dulciū, qui vulgo de pomis simplex, & succo mali citri, vel medici, ex acetositate citri vulgo dicitur, ex succo limonum, ex succo malorū cotoneorū, vel cydoniorū, ex succo uuz acerbæ, vel (ut aiunt) acrestę; ex succo cucurbitę, ex succo fructus, q̄ berberis ab Arabibus dicitur, multi putāt esse quā oxiacanthā Gręci dicunt, item ex succo ribes, & ex succo fructus myrti, ex succo mororum præsertim sylvestrinū, quæ bati dicuntur. Sed sunt præterea tertio syrupi simplices, qui ex maceratione, uel, ut nunc loquimur, ex infusione ex aqua, ex qua deinde addito zucharo coquantur, & conficiuntur: præcipue verò fit in præsentia syrupus ex maceratione, vel infusione rosarum, & illum bifariam parant, nam vel ex foliis recentibus, hoc est, non aridis, & communiter vocant syrupum rosaceū recentem, vel aridis foliis aqua demersis vtuntur ad eiu(s)modi syrupi confectionem, eumque rosaceum ex rosis siccis passim appellant. Item & violaceum ex simili infusione, non quidem aridarum violarum sed recentium parant, quem violaceum simplicem vocare solemus, ex stęcade etiam macerato, ac mox decocto ex aqua simplicem conficiunt syrupum addito zucharo aquę. Hi itaque syrupi simplices ea ratione, quam nuper exposuimus, dicuntur, & iidem in curandis morbosis affectibus sunt in frequentiori usu, & parati maiori ex parte reperiuntur, de quibus priorem sermonem sumus habituri, neque in eorum confectionis ratione explananda ero multus, cum neque multa egeant explanatione, facile enim potest eorū facultas percipi: cum ex vno tantum simplici medicamento præter illa, quæ tantum ferè materiæ officio funguntur, cōstent, nam quatenus ad primas qualitates pertinet, alii quidē vim refrigerandi, & siccandi habent, alii refrigerandi, & humectandi, alii calefaciendi, & siccandi: alii & calefaciendi humectandi; refrigerant quidem, & desiccant endiuia (vtetur enim vsitatis in præsentia nominibus) intybus, vel cichorium, oxalis vel acetosa refrigerat etiam, & siccac rosarum succus, & Nimpheæ succus, sed & succus mali punici, & mali medici, uel citri, item qui limonum dicitur, cotoneorumque & uuz acerbę, berberis, & ribes, myrti, & mororum, præsertim immaturorum, quo præsertim nunc utuntur medici. Succus autem lupi, seu luppuli in controuersiam reuocatur à iunioribus, nam cum. Mesues illum iudicauerit parum refrigerare, quamuis & parum per siccare: iuniores tamen quidam potius calefacere credidere, ducto argumento quòd

Victoris Trincauellij

quòd odorem grauem flores habent, & calefaciant & siccent, nam & inebriant. Ego tamen, cum semper priores medici, qui Arabes sequuti sunt, tanquam medicamento parumper ab æqualitate per frigidum recedente vsi sint, & mirum videatur, quin aliquando fuisset in eo caliditas deprehensa à Mesue non possum hæc genus dissentire: præsertim cum neque id argumentum cogere videatur. nam non puto semper esse necessarium flores, & folia, uel surculos, & horum succû similis facultatis esse: succi verò violarû, & cucurbitæ refrigerant, & humectant: at bettonicæ, fumaricæ, stœcadis, quæ yue, uel aiugæ, & tussillaginis, & scabiosæ calefaciunt, & siccant: sicut calefaciunt, & humectant succus buglossi, & boraginis. Postea sequuntur facultates eorum simplicium, ex quibus conficiuntur. De dilutis verò vel, ut aiunt, infusionibus, non plura dicam, cum putem eas quoque sequi naturam eorundem simplicium quæ macerata fuere. Cum verò neq; in his, neque in id genus aliis medicamentis sit satis cognouisse eas facultates, quæ ad primas qualitates pertinent, sed cum & aliarum cognitione opus sit, ideo illis, quæ hæcenus exposita sunt, addendum puto, quòd horum quædam uim habent aperiendi obstructa uiscera à crasis, & lentis succis: imo eorum plura, nec modo ea, quæ calida à nobis constituta sunt: uerum ut ea, quæ frigida natura constant. Vnde quæcunque alicuius amaritudinis non sunt expertia, etiam habent exrenuandi vim, dessecandi quæ, & tandem aperiendi, utpote quia amaritudo in tenui substantia consistit. Aperiunt itaque inter frigida Endiuia, & magis cichoriû, vel intybus, qui amarior sit, oxalis verò, licet amara nõ sit; rōne tamen acoris potius aperit, nã & acidus sapor, ut Gal. 4. de facul. simpl. med. docuit, tenuitatis signum est, præterea rosa, fumaria, lupulus, nec non & succus mali medici, uel citrii, & lychnum in præsentia appellatorum eadem ratione aperiunt, attenuant, & dessecant: uel longe etiam magis, quia urinam valde cient, ut calculos in renibus atterere possint, aperit etiam & Bettonica, ut Gal. & Dioscorides ostendunt, fumaria quæ, & stœcas, & yua: horum præterea nonnullis & alstrictio non deest, qua uisceribus robur afferre possunt, neque tamen, ut idem Gal. eodem de simpl. med. faculte stis est, aliquid obstat, quominus uni, eidem quæ simplici medicamento ambæ hæc facultates possint attribui: quamuis inter se sint aduersariæ: nempe alstringens, & aperiens, atque à contrariis etiam causis ortum habeant, quia non ab eisdem partibus prodeunt, ple-
raque

raque enim medicamenta ex pluribus, diuersisque partibus constant, & illis etiam contrariis, hoc nanque experientia ostendit, quamuis ea diuersitas sensui non pateat: sed neque alioquin astrictio aperiendi impedimento est: immo, ut ille idem eodem libro probauit, potius astrictio in causa est, ut uim maiorem aperiendi habeant, nam præcedunt partes illæ, quæ aperiunt, quippe quæ tenuiorem substantiam habeant, sequuntur uero astringentes, quæ quasi impingendo ulterius, & intimius priores impellunt. Astrictio nis ergo participes sunt endiuia, cichoriū, rosa, uel eius succus, & magisetia arida, recens enim magis aperit arida uero magis astringit, unde cum magis astringere, quam aperire uolumus, utimur rosaridis, & syrupo ex illis confecto: cum autem aperire, succo, & tum ex eo, tum uero ex earum infusione syrupis, sed & fumaria particeps astrictionis est & stæcas; paruceps præterea astrictionis est bettonica, ut ex eius uiribus à Dioscoride relatis comprehendendi facile poterit: magis uero astringunt Myrtus, malum cotoneum: ita ut hæc parū aut nihil aperiāt præsertim naturalia uiscera, astringunt non nihil & mali citri succus, & mali punici. De oximellitibus uero, & syrupi acetosi utrorumque simplicium in præsentia non meminimus, nam ea quæ de illis paulò antea literis tradita sunt, mihi satis esse posse uidentur. Quæ autem de syrupi acetosi, & oximellitibus, uel aceti mulsi itē de mellis, zuchari differentia dicta sunt bene percepta facile, quæ inter sit differentia, ostendent inter syrupū & mel rosaceū, nā mel aliquanto minus refrigerat, magis detergit, & digerit, aperitque, quam syrupus ex succo rosarum confectus, aliquanto, fortasse etiam magis astringit. Scilliticum etiam oximel longe maiorem uim extenuandi habet, & aperiendi ex acrimonia & partium tenuitate tum scillæ, tum aceti, quamuis in calefaciendo non excedat secundum ordinem. Et quatenus quidē ad examen compositionis horum in medicamentorum spectat, hæc putarem nostro instituto posse esse satis. Potuisssem sanè hæc omnia, quæ hæcenus commemorata sunt, in suos ordines dirigere, quod etiam medico non modo utile est: uerum etiam quàm necessarium. Quia tamen cognita natura eorum simplicium, unde conficiuntur: habitaque ratione mellis, uel zuchari, quæ illis adduntur, facile eorum iudiciū de illis afferri poterit. Ordines uero ab omnibus, ferè auctoribus, qui de medicinali materia commentaria edidit, præsertim qui post Gal. scripsere, unā cum natura eorum simplicium exquisi

tē de.

æ descripti sunt. Vnde non ab re fuerit, vt de syruporum vsu, ac de eorundem, (cum sumus illis vsuri) miscella paucula quædam dicamus, quibus iuuenes erudiri possint, eatenus tamen, quatenus ratio artificiosæ eruditionis admittere potest, artificiosa verò eruditio, ni fallor, ea est, quæ rectam rationem, methodû ve sequitur, sed fortasse præstauerit, vt primo de cõpositis appellatis agamus.

De ratione, & methodo recti syruporum vsus. Cap. 6.

Caput hoc transferendam & ut sit ordiue sextum & sextû uno dandi in hûc locum

A Ccommodatus, ac cõgruens horum medicaminum vsus, mea quidem sententia, &, vt Gal. tum alibi sæpe, tum verò primo ad Gl. lib. insinuare uidetur, in his consistit. Primum vt medicamentum eligamus, quod ea sit natura, & illis qualitatibus prædictum quæ ad scopum nobis ab indicationibus propositum attineat, & illi satisfacere possit, tam secundum qualitates, quàm etiã secundum robur, vel ordinem, seu, (vt iuniores aiunt) gradum. Deinde, vt modum, vel pondus, seu mensuram præscribere discamus illi simplici, si simplici vti satis fore videatur: sin autem illud solum non sit satisfactorium, sed additione alterius egere videatur, qua mensura, & proportionem illa sint commiscenda. Tertio quo pacto illis oporteat vti. Quarto quo ordine. Quinto, quando, & quo tempore. Sexto quoties, & quousque ipsis vtendum. Quia verò omnium eorum, quæ à medico recte tractanda sunt, ratio ex mutua collatione, & comparatione duorum præsertim capitum deprehendenda est, nempe eorum, quæ humano corpori præter suæ naturæ rationem accidunt, deinde illorum, quæ ex propria eius natura illi conueniunt, in priori capite tria continentur, quæ tamen omnia ad vnum referuntur. Primum est morbus. Alterum est, quod ipsum præcedit, nempe eius causa. Tertium est symptoma, quod morbum semper sequitur: quæ omnia res præter naturam à medicis dicuntur. In altero autem, ea omnia, quæ naturalia ab illis vocantur, vt temperatura naturalis, tum corporis vniuersi: tum verò singularum particularum, quibus corpus coagmentatum est: præterea conformatio eiusdem, atque eorum omnium vnitas, continuitasve: ad quæ postea & multa alia, tanquam ad ea, quæ magis præcipua sunt, referuntur. Verum horum aliqua, utpote quæ ad institutum nostrum non plurimum faciunt: missa faciemus, ad rectam enim medicamentorum electionem, neque corporis

corporis conformatio plurimum facit: minus etiam unitas: præsertim uerò in eligendis qualitate, quantitateque, & natura medicamenti confert naturalis corporis temperatum, & ea quæ illi attingunt, ut ætas, regio, tempestas, & hora anni, ars, & vitæ instituta, & consuetudo, quæ eatenus considerantur, quatenus immutant naturale temperamentum. Quantum uero spectat ad primum caput, duo quidem prima maxime ad nostrum, de eligendis medicamentis institutum faciunt, nempe morbus, & causa, nam hæc maxime medico rationem agendorum indicant: at symptoma, parum admodum, & nisi, quia nonnunquam adeo excrescit, ut iam subinduat rationem causæ: sed exquisita horum definitio non pertinet ad hunc locum, præcipue ergo morbus, & causa indicant, non semper tamen utraque hæc simul, nam aliquando sola causa præsens est: aliquando solus morbus: interdum utrunque, & aliquando maiorem uim indicandi habet causa, aliquando morbus, ita ut interdum soli causæ prospicere oporteat, interdum soli morbo, nonnunquam uerò utrisque simul: ita tamen, ut aliquando prius quidem uni eorum, mox uerò & alteri. Non erimus autem multi in exponendo quòd proprie, & primum respicimus causa in ea parte medicinæ, cuius proprium munus est sanitatem tueri, quam iuniores præseruatiuam nuncupant, morbum autem, præsertim, & primum, in curatiue methodo: præcipue, si causa morbi nulla amplius præsens sit, sed uniuersa iam recesserit: quia ubi causa adhuc est præsens: sicut semper in morbis qui adhuc fiunt, nec dum omnino facti sunt necesse est, ut illa etiam suam habeant, propriamque indicationem: & sicut complicatæ sunt indicationes: ita mixta etiam sit actio medici ex curatione, & tutela, seu præseruatione, quauis, ut Gal. 2. aph. & 1. de differ. feb. testatus est, inualuerit apud medicos ea consuetudo, ut absolute & hæc curatio dicatur. In eligendis medicamentis aptis, & opportunis summe necessaria sunt duo hæc: primum exquisita cognitio naturæ ipsius morbi, ad quā pertinet, & causæ cognitio: deinde uerò & cognitio naturæ corporis, & particulæ laborantis, & si particulatim morbus locum aliquē occupet; nam ex mutua collatione indicationū, quæ ab his duobus depromendæ sunt, innotescet omnis ratio congruentiū medicamentorum: morbi siquidem ratio naturam, & qualitatem medicamenti opportuni in uniuersum indicabit: particulatim uerò illam distincti naturæ corporis, uel particulæ male affectæ. Sed quæ

Com. 11.
Cap. 4.

L hæc unus

hactenus generali quadam ratione tractauimus, particulatim exponamus: primum quidem in illis affectibus, qui communes præterea dicuntur, quia nulli certo loco sunt additi, ut sunt febres, & alij, in quibus non sunt peculiæ aliquæ indicationes, a certis ullis, definitisq; particulis desumptæ. Præsertim uerò, & primum de febribus agamus, quæ, cum aliquando unam simplicem habeant indicationem, nēpe ab ipsa febre, utpotè quia à nulla alioquin causa foueantur, sicut tum hæcticæ, tum etiam multotiens ephemeræ, in putridis etenim, quæ fieri non possunt, nisi præsens sit humor, semper mixtæ sunt indicationes à causa, & à febre, de illis ergo simplicioribus priorem rationem instituamus. In his sanè febribus, quando nulla alia est adiuncta affectio præter febrē, statim insurgit primum refrigerationis, mox & humectationis indicatio: cum sit affectus calidus, & siccus: unde nobis statim se offerunt, syrupi, quicunque superius numerati uim refrigerandi habent, & cum multi eorum desiccant, aliqui tamen & humectant, illi opportuniores erant, qui minus exsiccare possunt, sed quia diximus syrupum potionem significare, accipiam & alias potiones, quæ refrigerare, & humectare possunt (quanuis non soleant sub nomine syrupi contineri) tanquam huic scopo attinentes: occurreret ergo primum potus aquæ frigida, deinde aquæ ordeaceæ, nam & hæc in usu est his temporibus, deinde mulsa, tertio syrupus acetosus simplex dilutus ex multa aqua, item syrupus uiolaceus simplex, syrupus etiam ex floribus nimpheæ, syrupus ex papauere, syrupus qui ex ziziphis, uel iuiubis, quique ex portulaca dicitur, & alij multi similes, de quibus superius sermo habitus est: quatenus ergo ad effectum ipsum pertinet, nulla aliorum habita ratione, aqua frigida omnium aliorum præstantissimum esset rimedium: unde tanquam optimum: nisi alia obstat indicatio fortior, in ephemeræ, & febre ardente, ubi ea indicatio, quæ à morbo desumitur, superat illam quæ a causa a Gal. iudicatum est medicamentum, pariter refrigerans, & humectans. In hæcica uerò, nisi indicatio ab habitu, & uiribus corporis obstatet, utile & salutare esset, & Gal. in lib. de tabe, illam in principio antequam extenuetur corpus, & sanguis absumatur, uiresque fiant imbecillæ, utiliter dari posse autumat, sed ubi iam corpus attenuatum, & exangue factum est, uiresque languere incipiunt, ab his alia insurgit indicatio, quæ uim maiorem iam habet, quam illa quæ erat à morbo accepta,

accepta, indicans longe maiorem lationem subsequituram, quàm utilitatem, nam calor natiuus simul cum extraneo ab ea extingui facile poterit. In febre uero ardente optimum, & præcipuum id medicamentum futurum est, quando neque morbus crudus fuerit, neque alius affectus, cui id noxium sit, ut uisceris alicuius inflammatio, uel insignis destructio: horum enim indicationes priori illi omnino obstant, sed & uniuersi corporis ratio sua habenda erit, nam si imbecillum sit, si senile: si gracile, & attenuatum, non facile uim ferre poterit tanti remedij, nec minoris facienda est natura uiscerum: præsertim uentriculi, & iocinoris, nimirum si frigidiora, & imbecilliora hæc fuerint, quibus itidem addendum est, & tēpus anni, uel tempestas, nam istius remedij usus non æque hyme esset tutus ac æstate: addenda præterea est & consuetudo, nam facile, & citra noxam potius perferre possunt, qui sani citra ullum incommodum soliti sunt eam bibere, quàm qui insoliti: unde quando his de causis timemus ita confertim, & multum transmutare, mitius esset agendum, & leuiora essent attendanda, ut esset aqua hordeacea, & alia quæ subinde fuere proposita, quæ potius potestate, quàm actu frigida essent, nam talia, cum ad actum paulatim, & non in momento deducantur, non ita facile deterrent, lædunt, extinguuntque natium calorem. Ut tamen & illud sit considerandum, quòd eorum aliqua, quanuis ratione propriæ naturæ possent esse commoda, interdum tamen illa respuimus, ut philosophi sæpe loquuntur, per accidens, quia facile in bilem uertuntur, ut deinde ea de causa magis calefaciant, & desiccēt, quàm potuerint refrigerare, & humectare qua ratione mel, & quæcūque ex melle conficiuntur, aduersaria à Gal. 9. meth. iudicantur, ut est apomel, & mulsa: oximel tamē non ita facile in bilem uertitur, & quanuis desiccet, cum tamen dilutius est ex multæ aquæ mixtione, potius humectat, & proinde sitim sedat, sed acetosus simplex: magis etiam humectabit, & refrigerabit, quantum zuccharum melle minus calefacit, & siccatur. Violaceus uero pariter humectabit, & refrigerabit: in uniuersum ergo potiones, quæ refrigerent: itemque syrupi refrigerantes, & licet eorum multi inter ea medicamenta relati sint, quæ desiccet: febres uero hæc humectantia desiderent: dum tamen diluuntur, aut multa aqua, aut alio humore, quòd hemectet sicut esset ius galinacei

pulli iuuenis, eam etiam vim assequuntur, qua possint humectare. In affectibus autem, in quibus curationem mixtam oportet esse, propterea quia non modo affectus ratio habenda est, uerum & causa, quæ præsens fouet, & auget morbum item electio medicamentorum sit collatis primū inter se indicationibus; tum à morbo tum causis desumptis, considerandumq; num ea inter se collata in eandem conueniant temperiem, ut potè si ambo calida sint, nempe morbus, & causa, sicuti in tertiana, in causone, nam & humor, qui febris in causa est, calidus, & siccus perinde est, atque & febris, an uerò dissideant inter se, ut in quotidiana, & quartana: febris enim calidus, & siccus est affectus; pituita uerò suapte natura frigida, & humida, sicut atrabilis, frigida, & sicca, ubi id primum in ea collatione considerandum est, quòd febris, quatenus ad ipsam pertinet, cum sola temperatura morbi rationem habeat, ea enim operationes lædit, solam indicat transmutationem, qua lapsus naturalis temperamenti corrigatur: causa febris uerò, cum materia sit noxia qualitate, & quantitate: ratione qualitatis, & ipsa indicat transmutationem, quæ itidem uitiōsa eius qualitas, quæ morbum fouet, uel actu, uel potestate, emendetur; actu quidem, si suapte natura ea calida sit, potestate uerò, quia quandoque, licet natura frigida sit, calorem tamen putrescens contrahit: ratione autem quantitatis indicat uacuationem. Vnde quantum ad harum rerum rationem pertinet: cum causa morbum efficiat, foueatque, & augeat: licet primum desideremus morbum, qui proxime actiones lædit, remouere: tamen quia remoueri, aut non potest, aut non facile id fit, manente eius causa: ideo frequentius opus est curationem incipere à remotione causæ, aliquando tamen morbus adeo sæuit, ut timendum sit: ne dum causæ incumbimus, uires à morbo dissolutæ fatiscant, quò fit, ut cogamur statim ab initio reprimere sæuitiam morbi, quo id periculum euitemus, hoc uerò præsertim in ardentibus febribus timemus propter magnum, & continentem earum ardorem, nam quauis & exquisitæ tertianæ simile incendium in accessionibus afferant, quia tamen non continente, sed per longiora interualla affligunt, non ita insigne periculum minantur, rescidunt enim interim uires, dum intermittunt, & ideo in eis non adeo urget indicatio à morbo, ut cogat ab eo
summi

mi initium curationis verum cum utræq; indicationes, tam à morbo, quàm à causa semper, si alicuius sint momenti, tam morbus, quàm causa, aliquam vim habeant, nunquàm ita vni attendimus, vt nullam alterius rationem habeamus, sed semper & illi aliquid damus. Exi aliqua sint auxilia, quæ vtræque ratione, hoc est, tam causa, quàm morbo possint esse commoda, ab eis statim incipimus, sine vlla hæsitazione; modò vires non obstant, sicuti in febre ardente, & synocha statim sanguinem copiosum mittere solemus: vbi per vires licet, nam & refrigerat, & quantitatem detrahit: quatenus verò ad medicamenta pertinet: cum morbus maximus, & acutissimus sit, atque ideo etià præceps: indicat opus esse magna, & celeri extinctione: quod officium nullum medicamentum præstantius aqua frigida posset præstare: verum quia in febre putrida putredinis vniuersa ferè ratio ab obstructionibus pendet, quæ ab inipactis humoribus crudioribus fuere excitatæ, aqua autem frigida eos magis impingeret & inculcaret, præterea & recrudescerent ex nimio frigore: unde & cresceret subinde putredo, febrisque: ideo post sanguinis missionem tantisper indicatio, quæ à causa desumpta est, nos immorari, & disferre potum aquæ frigidæ cogit, donec aliqua concoctionis signa appareant, & sint aliquantulum apertæ obstructiones: cito autem concoqui incipit calidus, & tenuis humor, qui suapte natura potest iuuare apertionem: postea verò aquam propinamus: vnde extincto calore, qui vires dissoluebat, natura resumpta suo robore, & collectis viribus paulò post insurgens vniuersam noxiam materiam, aut sudore, aut per aliam illi commodiorem viam excernit: sed si vel ætas, vel tempus, vel affectus aliquis in visceribus aduersetur potioni aquæ frigidæ, allis erit agendum refrigerantibus, tum externis, tum internis, quæ non repente, & valde refrigerent, sed paulatim, dum tamen frequentius & ipsa administrentur, & si non ita cito, tutius saltem opus absoluunt, quales sunt syripi, decocta, cibi refrigerantes, olea, emplastra, epithemata exterius, & ipsa refrigerantia, vt methodus febribus medendi præscribit, quæ possunt & ex his confici, quæ refrigerant, non tamen stipant, & obstructiones augent, sed potius aperiunt, vt suo loco exponemus. Nunc enim sermo habendus est de electione syruporum, vel id genus aliarum potionum, quando magis, & prius in febribus inserui-

dū indicationib. est, quæ ad causam pertinent, & si causa cū morbo consentiat, facilis, & simplex ratio est: nam si tenuis, & æcis, calida quæ sit materia, refrigerantia medicamenta eadem ratione verique apta sunt, hoc tamen plus causa habet, quod concoctionem postulat, & excretionem, concoctioni verò, quantum attinet illi humori, oportuna sunt eadem: nempe refrigerantia, & humectantia: utpote quoniam satis coquuntur humores, cum eorum vitia corriguntur: verum quia semper in putridis febribus insunt obstructions, quæ & putredinem fouent, & excernendæ materiæ impedimento sunt, ut ex remoueantur, & corpus fluidum fiat, maximè vtilia erunt medicamenta, quæ refrigerent quidem; sed potius aperiant: vnde & syrupus acetosus simplex, & qui ex cichorio, vel endiuia, vel rosaceus etiam recens; præsertim vbi aliqua sit laxitas in aliquo viscere: & interdum oximel simplex, apri, & congruētes erunt; vbi verò sit ingens aliqua putredo, quæ febrem maligniorem reddit, acidæ res, aliis solent à medicis præferri ratione putredinis, ut recte Auicenna sentit, licet quæ ex oxallide, vel ex succo citri, vel limonis componuntur, vel vix acerbæ, nam febris, & calidiori, tum sua natura, tum ex putredine humori præsidio sunt refrigerando: exciccando verò, malignam putredinem reprimunt: præter id, quod horum multa etiam non nihil astringentis habent, quod visceribus robur addere potest, citra noxam, quæ ex obstructionibus esset suspecta. Difficilior verò institutio est, quando morbus, & causa sibi mutuo sunt aduersaria, ut in quotidianis; nam pituita frigidus, & humidus humor est uero febris: calidus, & siccus affectus: sed quia febris hæc non habet ingentem calorem: immo lenta est, & quasi suffocali cuiusdam caloris, non plurimum periculum minatur calor febrilis, nisi ex morbi diuturnitate, & periculum est ne extinguatur, & quasi stranguletur natiuus calor à crassa, lenta, frigidaque materia: ideo causæ superandæ præsertim operam nauamus: habemus tamen etiam febris aliquam rationem: nam eligimus imprimis syropos, & alia medicamenta, quæ vim aliquam calefaciendi habeant: insigniter tamen attenuant, & licet, aperiantque: præterea verò, quia viscera, ut ventriculus, & iecur, ab hac materia refrigerantur, laxaque redduntur, & obstructioni ea propter obnoxia sunt: ideo semper his aliquid immiscemus, quod vim habeat roborandi: incipimus tamen à facilibus, & leuioribus: nam facilius etiam, faciliora fert natura, quando paulatim assuescit:

assuefit: unde statim, à principio nittimur humorem secare; & attenuare: non admodum tamen calefacere, ne liquatus, & quasi fusus crassus humor, moxque in angustas venas digestus, augeat obstructions: utemur ergo oximellite, melle rosaceo, in utroque enim est detergendi, attenuandi que facultas, sed hæc maior est in oximellite ex aceto. In melle verò rosaceo, maior roborandi viscera ex rosis: verum & syrupus ex bettonica simplex: si eorum simus memores, quæ superius de eo dicta sunt, poterit esse medicamentum accommodatissimum huic negotio. Hi verò syrupi, si dilueantur decocto, vel diluto, aut, ut nunc aiunt, infusione absinthii, utiliores erunt; cum verò res in longius protrahitur, valentiora in usum introducenda sunt, ut esset oximel, quod compositum, vel de radicibus appellant, tandem verò ad syrupum ex hysopo, vel ex calamento, postremo ad syrupum acetosum diarhodon, cum iam adeo viscera facta sunt imbecillia, ut res in malum habitum, vel aquam intercutem procliuius esse videretur. Ego verò & oximellite scyllitico sæpe in his tandem feliciter sum usus, sed hos syrupos diluere solemus ex decocto ex radicibus communibus, de quibus prius quædam pauca diximus: interdum verò & ex decocto eupatorii veri, quod nunc agrimonium appellant: his enim, & causa antecedens febris ad facilem vacationem paratur, & corpus fit fluidum, & vires internorum viscerum custodiuntur, quatenus fieri potest. Tertia verò, quæ notha, vel spuria ab antiquis dicitur, media quodam modo est inter has duas priores, siue ad morbum, siue ad causam respiciamus; nam neque ita acris, & vehementis caloris est, ut exquisita, neque etiam ita obtusi, & veluti strangulati, ut quotidiana, sed quasi inter eas media est: materia etiam ex qua putrescente accenditur, media est & ipsa: tum acrimonia, & calore: tum crassitie & lentore, ut potè quæ ex bile flaua, & pituita mixta sit: quare & curationis rationem mediam, & mixtam requirit, nam aliquid requirit, quod non omnino sit expers facultatis calefaciendi, attenuandi, & sicandi: non tamen ita, ut in quotidiana. Itaque inter initia apti syrupi erunt oximel simplex, syrupus rosaceus & rosarum succo, quem Arabes appellant geleniabin ex züc charo, aliquando, & mel rosaceum, postea utemur syrupo, quem bizantinum vocauit Mes. qui ex mixtura fit, tum calefacientium, & attenuantium, & disseccantium, tum verò & calorem tempe-

rantium: postea accedimus ad eum cui additur acetum, & quem bizantiinum cum aceto dicunt, postremum etiam ad illum, quem completum: additis nempe aromatibus, appellant. Veruntamen quia istius modibilis, quæ putrescens hanc febrem excitat, non est semper sibi similis, nam in miscella bilis cum pituita multæ sunt differentię, pro ratione maioris, minorisue, nam & crassior, & minus crassa, & magis vel minus lenta est: ita etiam magis vel minus calida: vnde & syropi eligi debent, sicut & decocta, quæ huic diuersitati aptari, & accommodari possint, vt oximelli, & syrupo ex bettonica, addemus syrupum ex cicoreo, & si visum fuerit expedire, vt vtamur diluto, vel decocto absinthii, sicuti sæpe expedit, vt primo libro ad Glauc. præcipit Gale. illi & cicoreum addemus: ita & eupatorium, vel agrimonium cum cicoreo componemus, si iecur obstructum fuerit, & tensum, fiatque inde imbecillum. Nec admodum differens erit ratio electionis horum medicamentorum in melancholicis febribus, nam nec in ipsis adeo multus est calor, vt cogere possit medicum, postposita causa, morbo incumbere: vnde prior, & potior in ipsis etiam est indicatio à causa, & per comparisonem ad ipsas, medicamenta sunt eligenda, eatenus autem respiciendus est morbus, quatenus ipsum non nimis exacerbeamus, nam in quartanæ curatione oportet duplici nomine calefacere; primum quia humor frigidus est, & siccus, deinde quia crassus, & ferè terrenæ cuiusdam substantię, & ea propter attenuantibus, secantibusque, & aliqua ex parte digerentibus medicamentis opus est, quæ quidem hæc omnia agunt ratione partium calidarum, & siccarum, quarum non sunt expertia; verum quia hæc præterea non parum siccant, & siccatio huic humori omnino est aduersaria: ideo ea sunt eligenda, quæ quantum fieri potest, attenuent quidem: verum non multum siccant, & si aliquod quidem medicamentum huic scopo congruens reperiatur, eo vtetur, sin minus, plura componemus, sed quia quartanæ raro à principio inuadunt: plerumque autem aliās febres sequuntur: quod argumento esse potest, quòd vt Gal. secundo de differ. febrium exposuit sæpius fiunt quartanæ ex cinericia parte derelicta, quasi ex assaisione, & putredine humorum à quibus fouebantur febres præcedentes: ideo cum & in his sit optimum à facilioribus, & leuioribus incipere, solent statim à principio medici

uti

vii syrupo ex fumaria simplici, vel ex lupulis, nam exustis humori-
 bus sunt accommodati, verum quia in his semper nescio quid na-
 turæ igneæ seruetur post eorum vitionem; sicuti in cinere, & cal-
 ce, ideo multi ex cicorio syrupum addunt, vtitissimi præterea
 sunt syrupus de buglossa dictus, & ex boragine: nam herba hæ tem-
 peratum quendam calorem habent: sunt etiam, vt docuit Gal. 6. de
 simpl. med. facul. herbae humectantes, quæ hac ratione aptæ sunt hu-
 mori melancholico: interdum verò & syrupus ex pomorum dul-
 cium succo, imo sæpe venit in vsum: mox verò ad compositos fit ac-
 cessus, tam ex fumaria, quàm ex pomis, & alios qui magis particu-
 latim præcedenti capite expositi sunt. Verum quia quartanæ ple-
 runque à liene fouentur: sicut tertianæ à iocinore: ideo semper lie-
 nis rationem habemus in quartana, & vt in aliis febribus præser-
 tim laudatur absinthium, & eupatorium, ita in illis, ubi lien pro-
 spiciendum est, cappares, præsertim uero cortices radicum ipso-
 rum solent esse in frequenti vfu, & asplenium vel scolopendrium, quod
 in præsentia Arabico uocabulo citrach uulgo dicitur, ex quibus de-
 cocta fieri possunt, quibus syrupi diluantur. Quia uero præterea
 multi sunt morbi, qui non ita uniuersum corpus occupant: sed in una
 tantum particula consistunt à qua sunt suæ etiam indicationes de-
 promendæ, quippe cum & hæ uim maximam habeant ad aptæ eli-
 gendum congruentia medicamenta: ideo de his quoque aliquem,
 breuem tamen sermonem habituri sumus, non est tamen ad modum
 electionis medicamentorum diuersa ratio à priori: nisi quatenus in
 his, non solum spectanda ea est indicatio, quam uniuersi corporis
 natura nobis offert: sed & particulæ male affectæ natura suam pro-
 priam peculiaremque indicationem habet, quæ plurimum fa-
 cit ad electionem medicamenti: nam quod nobilior est parti-
 cula, & dignior, magisque necessariæ operationis instru-
 mentum, eò etiam maiori eget custodia, & magis, quantum
 ad medicamenta pertinet, caute tractanda; unde præter tria
 præcipua membra uenterculus, & lien, & pulmones, ma-
 gnæ uim habent, & magna custodia egent. In eligendis ergo
 medicamentis in affectibus harum particularum, particulatim ali-
 quantulum, & quò breuius fieri poterit, uersabimur. Et primum
 circa ea que pertinent ad iecur quod quidem: cum molli &
 laxa constet substantia, facile laxantibus, & digerentibus eius vis
 dissoluitur, facileque induratur à crassis succis, & à constipanti-
 bus

Victoris Trincauellij

bus, & insigniter astringentibus; cum etiam contextum sit tenuissimis, & angustissimis venulis, facillime ab obstructionibus occupari potest: unde in curandis eius affectibus horum imprimis cura habenda; nempe primum, ne dissoluatur eius robur, & proinde ea semper per medicamenta illi accommodanda sunt, quæ expertia omnino non sint alicuius astrictionis, nec tamen multæ; sed quanta possit conservare robur visceris, non tamen, ut in causa sit astrictionis: præterea verò, ut citata vim aliquam aperientem habeant; Unde præsertim ea medicamenta, quæ vel amara, vel subamara sunt, si tamen cum amaritudine & partes astrictionis alicuius participes habeant, & propterea in calidis affectibus sumopere commendantur endivia, cichorium, & cichoracea omnia, rosæque, & medicamenta omnia, quæ ex his conficiuntur: ut præterea ea etiam sint timenda, quæ confertim, & plurimum refrigerant; extinguunt enim eius nativum calorem: & proinde neque actu frigidis, tam exterius, quam interius administrandis vitium: in frigidis verò eius affectibus, laudantur absinthiū, Bettonica, fumaria, Eupatorium, silix, pistachia, marubium, chamæpithys, chamædris, priora tamē in maiori usu sunt, & familiariora, & ea omnia medicamenta, quæ hæc accipiunt, dum componuntur, siue syripi sint, siue decocta, siue trochisci, siue quæcunque alia. Non est autem ferè differens ratio medicamentorum, quæ ventriculo commoda sunt, nam & in suis medicamentis semper propter custodiam virium requirit astrictionem: à solis enim laxantibus plurimum læditur, neque facile fert, quæ eximie frigida sunt, unde ferè à, similibus medicamentis bene se habent ambo hæc viscera: cōmode enim refrigerantur à cichorea, rosaceisq; medicamentis: sed & utrunq; viscus, si opus sit, eisdem apte calefit: præcipue absinthio, bettonica, fumaria, eupatorio & cæteris id genus. Lien verò cū & ipsius actio ad sanitatem necessaria plurimum sit, ut à sæculento succo sanguis, & iecur depurgentur, constat autem substantia rariori, & laxiori quàm iecur, alitur verò crasso, & sæculento sanguine aptusque, ut in libro de ratione cur. perfect. uen. dixit Gal. ad suscipiendas fluxiones, unde propter necessitatem defecationis iocinoris, & sanguinis, oportet, ut eius robur seruetur, quare præcipiunt medici, quòd in usu, & compositione medicamentorum, quibus curandi sunt eius affectus, ea eligamus, quæ roboratione, & astrictione non careant, quæque attenuent, & detergant propter eius proclivi-

tatem

ratem in obstructions, & sciri hos ob crassiciem succi, quem attrahit, quoque alitur: unde & amara etiam probantur, & quæ imprimis tenuis sunt substantiæ, quæ tamen neque plurimum calefaciant, siccentque, & quæ in modum Gal. 5. de facili simpl. med. ait, eadem ferè medicamenta lieni, & iocinori accommodari possunt, præsertim in eorû obstructionibus, & syrrhis, quando neque inueteratus plurimum increuerit affectus, nam tunc ualentioribus opus erit uti tam in lienis, quàm in iocinoris affectibus. lieni enim ualentius opem ferût cortex radicû capparorum, radices item myricis, uel, ut nunc aiunt, tamarisci, sed & fraxini cortex, & scolopendrium, vel citraeh. quibus plerumque in decoctis utimur, quamuis ut idem eodem loco testatur, diuersus erat antiquius horum usus in affectibus utriusque visceris, in affecto enim iocinore illis secundum se, & seorsum utebantur, ut potè in pulcrem redactis, in lienè uò ex aceto mixtis, vel coctis, Ego autè uter oxmellite eorû de cocto inmixto: ino aliquando ex oxmellite scyllino: possemus & syrupum bizantinum addito aceto eorû decocto inspergere; maxime enim lienis acutum familiare est. Quatenus autem ad electionem medicamentorum, quæcunque per os sumenda sunt in capitis affectibus, eadè seruetur methòdus quæ in uniuersum de aliis particulis, quarum hætenus facta est mentio, exposita est, nam quia cerebrum, & ipsum inter præcipua membra est, & mollioris, humidiorisque substantiæ, & proinde quæ facile transmutetur: ideo, ut eius robur seruetur, maxime illi commoda sunt medicamenta, quæ præter alias facultates modice etiam astringunt, insuper, ut in refrigerando & calefaciendo, non admodum immodici simus, sed magis refrigerantibus cauendum est: facilius enim à frigore læditur: & quamuis Gal. interdum aqua, vel oleo niue refrigeratis, caput, cum estuat, perfundi iubeat, uoluit tamen mensuram refrigerationis accipi, & à magnitudine æstus, & inflammationis, & ab habitu corporis, sexu, ætate tempore, & quod ipse dixit de illis, quæ exterius administrantur, Putarim non esse etiam contemnendum in interius accipi edis, nam & diacodio, & ex papauere confecto syrupo utimur, sed id, cum cogit necessitas incommodi alicuius iam præsentis, aut futuri, præter alios autem syrnpos, quibus medici solent uti in affectibus capitis, si frigidi sint, & à crassiori aliqua materia foueantur, sunt ex stœcade syrupus à Mesue enim docti sunt, qui capiti stœcas esse utile medicamentum, ait. Dioscorides tamen

potius in thoracis affectibus laudat nulla facta mentione capitis: Galenus verò ipsum addere robur omnibus visceribus, eaque ab obstructionibus vindicare dixit, item ex bettonica, præterea mel rosaceum, quibus: si lentus sit humor, & oximel addunt: si autem calidus, rosacei syrupi in frequenti sunt usu, & cichoracei: ut tamen simplices prius, deinde compositi, ut qui fortiores sint, in usum veniant solent autem iuniores nostri Arabes imitari, illis aliquid alicuius aromatis addere, præsertim nucis moscatæ à nostris dictæ, siue sit myrica à græcis appellata, siue aliud, quod ideo addet, quia sperant facilius ad cerebrum deducendam medicamenti facultatē ope illius aromatis, & illius odoris, nam aroniatum vapor facile caliditate, & tenuitate sua, ut Hippo. in aph. inuisse visus est, caput petit, & cum ita sit, aromatizati syrupum aiunt. Quamvis autem instrumenta respirationis, ut thorax, & pulmones actionem exercent vitæ per quam necessariam, non tamen quantum ad horum naturam spectat, tantam in eis vim habet indicatio quæ indicat per astringentia esse visceri addendum robur, cum potius ferè astringentia inimica sint, vias enim spiritus exasperant, & angustiores reddere possunt: quas tamen apertas imprimis seruare oportet, & leues, ut & spiritus facilius per illas ferri possit, & excrementa, quæ naturæ instituto per aliam ferme viam expurgari nequeunt, minori labore educantur: unde potius laxantibus si non omnino, saltem ex aliqua parte opus est & aperientibus, quamuis, ut I. meth. ait Gal. morbus alioquin curandus esset astringentibus, ut in his qui sanguinem reiectant: sed & alia intercedit differentia inter has particulas, & naturalia viscera, quantum ad medicamentorum electionem pertinet, quòd dulcia ventriculo, & iocinori non admodum illis ægrotantibus conferunt, nam multum eorum usus, ut Gal. testatur ventriculum resupinat, in iocinore verò, præsertim si calidius sit, in bilem vertuntur, præter id quod eorum plurima illud obstruunt: partibus verò respirationi deferuentibus, tanta est cum rebus dulcibus familiaritas, ut sine mixtione alicuius dulcedinis nullum medicamentum possit esse efficax: unde siue lenientibus asperitates pulmonum, & thoracis opus sit, siue attenuantibus, secantibus, detergentibusve, ut in spirandi difficultate, quæ à crassa, & lenta materia impacta in viis spiritus, ut in lasante, excitatur; siue nobis incumbat munus astringendi, ut in reiectantibus sanguinē à thorace, uel pulmonibus, semper immiscemus dulce aliquod alijs

aliis oportunitis medicamentis , & id , quia hæc facilius , vt Gal
 exposuit , dum per gulam delibuntur deuorata in asperam arte-
 riam quasi refudantia assumuntur , quò fit deinde , vt quoniam
 præcipue profunt in transitu per gulam , parum autem , quando
 ad imum ventriculum iam descenderant , recte aò medicis insti-
 tutum sit , vt eiusmodi medicamenta , quibus vt in harum par-
 tium affectibus curandis solemus , non absorbeantur , uel deuorẽ-
 tur confertim , sed paulatim quasi delingantur , vnde syrupis se-
 pe uti solemus non alioquin ex aliqua aqua dilutis : uel si di-
 luantur , instituimus vt pitissando paulatim sorbeantur . Et hæc
 quidem sunt obseruationes , quæ à natura particulæ affectæ de-
 samendæ sunt , quatenus verò ad naturam affectus pertinet , in
 harum partium asperitatibus , quæ ab acris , & tenui , calidaque
 destillatione fomentum , & occasionem habent , syrupi utiles
 erunt violacei , & qui ex ziziphis , vel iu iubis conficiuntur , ne-
 quo etiam qui ex portulaca , erunt inutiles ; sed interdum , si ca-
 lida , & plurimum acris fluxio fuerit , & qui sit ex papauere non
 erit ineptus , sicuti & diacodion , præsertim confectum ex sapa,
 vel zucharo , quando verò viæ spiritus , & particulæ illi ministran-
 tes obsidentur à crassa , & lenta materia , simplex oximel optimum
 est : vterius verò re procedente syrupus ex radice dulci confectus ,
 quam vulgo liquiritiam nuncupant , postea & syrupus ex hyfopo ,
 tandem & qui ex passio , vel marubio conficitur , qui omnes sunt
 compositi : postremò præstantissimum medicamentum est oximel
 scylliticum , sed de electione & vsu medicamentorum horum , quan-
 tum ad institutionem nostram pertinet hætenus egimus , nam si cõ-
 tera omnia , quæ facerent ad curationem reliquarum particularum
 voluissimus prosequi , vniuersam artem medicam literis mandare
 nobis fuisset necesse , quicunque verò , quæ hætenus explanata
 sunt , perinde acceperit , ac si sint tanquam regulæ , per quẽdam
 exempla declaratæ ; illa quidem ad alia transferentes , facile
 & aliorum rationes assequi poterit . Vnde oportunum iam
 erit , vt alterum caput tractemus , nempe dum his medica-
 mentis , quorum hætenus sermonem habuimus , vtimur qua
 copia , quauẽ mensura , uel pondere illis uti oporteat , siue
 solis illis utamur , siue cum aliis commixtis , & ab ipsis sy-
 rupis initium sumamus , sicut hætenus fecimus . Consueue-

Victoris Trincauellij

re hac, & priori etiam tempestate medici, cum syropos gratia præparandi humores noxios, & corpus fluidum faciendi præbent, plerunque à sesquiuncia, in corporibus adultis, vsque ad duas vncias, exhibent, & cum vsus iam diu inualuerit, vt illi ex aliquibus stillatitiis aquis, vel ex aliquo decocto, ut paulò ante insinuauimus, diluantur, in more etiam est vt tres, aliquando uerò quatuor vnciæ accipiantur, ita vt vniuersa copia ad quinque, vel sex vncias perueniat: & id quidem mea sententia, quia id genus medicamenta neque odore, neque suo sapore grata sunt: imo ferè ventriculorum, dum assuntur, sæpius supinum reddunt: præter id quòd humor, quo constant, omnia enim saltem actu humida sunt, laxiorem substantiam ventriculi, & viscerum reddunt: ideo neque admitti, si maiori copia offerantur, neque etiam ferri facile possunt, nisi interdum calidioribus temporibus, quando ægroti multa siti cruciatur, tunc enim maxime si frigidi offerantur, longiores, vt dici solet, syropos cupiunt, præterea uerò, cum ita liquidi facilius de ventriculo disfluant, visum medicis est, quòd si minori darètur copia, parum possent prodesse. Et quod diximus de syrupis, id etiam ad decocta, & potiones sunt referenda. Quòd si interdum nò vnus syropus nostro instituto satisfacere posse videretur: sed pluribus sit opus: illorum pondus scopis aptandum est, qui nobis demonstrant pluribus esse opus, nam nos ad hanc compositionem, & mixturam accedimus, quia sint simul coniunctæ duæ, vel plures res, quæ diuersam rationem indicandi habent: sicuti esset morbus, & causa, vel duo morbi, vel quia, & si principaliter aliqd nos cogat ad vsum alicuius medicamenti: timemus tamen, ne alicui alteri particulæ noxam aliquam afferat: sicuti ventriculo, vel iocinori, uel utero, uel alteri particulæ, unde eligimus quidem medicamentum illud, quod præcipuo affectui accommodatum sit: sed illi aliud aliquid immiscemus, quod familiare sit alteri, cui timemus. Verum, si cut id quod præcipuum est, primum respiciendum est: ita & copia illius medicamenti maior est apponenda, quod iudicauimus accommodatius esse præcipuo scopo, indicationique: sicuti exempli causa: si sit febris biliosa cum laxitate, & dolore ventriculi, accipiemus quidem unciam syrupi ex endiuia, uel ex cicorio, & illi semunciam syrupi rosacei addemus, ita si causa morbi fuerit materia lenta, & crassa, morbus uerò, calidus saltem ob putredinem, utemur quidè syrupo ex bettonica, uel ex imelite composito, uel syrupo ex hyssopo,

po, prout uel ualentioribus, uel infirmioribus uisum fuerit esse opus, & horum unciam apponemus, semunciam uero cicoracei alii cuius addemus; semper enim scopis, & indicationibus secundum earum uim, & robur accommodanda sunt medicamenta. Modi quibus his syrupis utimur in uniuersum; nisi me memoria fallit, duo sunt, nam aut illis dilutis, & fluidioribus factis ex aliquo liquore; uel humore utimur aut siccioribus, & citra alterius humoris mixturem, hæc autem inter utrunque modum intercedit differentia, quod cum liquidi, & fluentes sunt: ut citius defluunt per gulam, & descendunt ad immum uentriculum, ita etiam facilius assumuntur & digeruntur per uenas etiam angustissimas, cum uero citra dilutionem accipiuntur: cum sit lentioris alicuius participes, in uia & transitu uentriculo herentes diutius immorantur, quod fit deinde, ut hæc de causa, quemadmodum paulo ante diximus, sæpe illis in thoracis & aliarum particularum eo contentarum affectibus utimur non alioquin diluti: nam dum diutius in transitu moram trahunt, facilius penetrant, & transumuntur à spiritalibus membris. Sed & in affectibus etiam uentriculi hoc pacto maiorem impressionem facere possunt. Ordo uero, quo illis solemus in curandis morbis uti, est, ut ferè semper à simplicioribus, & leuioribus incoemus, & paulatim ad magis composita, & ualentiora ascendamus, nam mutationes repente factæ, & confertim, naturæ molestiores sunt, utpote quæ uolentiores sint. Tempus autem opportunum accipiendis his liquidioribus, & dilutioribus medicamentis, quæ bibenda sunt, uidetur esse cum uentriculus inanis à cibo est, & eatenus ante cibum, ut ante illum ingestum acceptus syrupus, uel decoctum potuerit esse ad actum deductus, & iam de uentriculo defluerit à uenisque mesaraicis assumptus fuerit, nam si, dum cibus in uentriculo est, assumatur, miscetur cum cibo, & confunditur, & eius facultas à cibo, & alio potu remittitur; cum differentis sit naturæ, & qualitatis, præterea non atrahitur nisi post concoctum cibum simul cum eo: cui & hoc accedit, quod si cum cibo coqui cœpit accipiat, impedit, & remoratur concoctionem, sicut si ferulis, dum coquuntur, aqua inspergas, feruor intercipitur. Sed & id addamus, quod syrupi: & si uim medicamenti imprimis habeant, habent tamen & aliquid naturæ cibalis: quantum autem lædat alterum cibum ingerere, antequam prior sit confectus, & de uentriculo descenderit, nemo est qui nesciat, unde recte fieri putamus id, quod plerisque locis solet seruari,

seruari, vt eiusmodi medicamenta, quæ ægrotis tribuuntur ratione apparatus tum humorum, quâ corporis, per tres vel circiter horas ante assumendum cibum exhibeantur. Noui tamen aliquos fuisse & celebres medicos, quibus præsertim in affectibus capitis probabatur, vt istius modi medicamēta post cœnam tradantur eadem sanè ratione, qua & catapotia: nempe ut facilius à vaporibus à cibo elatis medicamenti vis ad caput offeratur. Sed mihi hæc eorum ratio satis inepta videtur, quia hæc medicamenta cum & ipsa à ventriculo, aut concoquantur, aut saltem ab eius calore transmutentur, dum in ventriculo coquuntur, non video cur minus eorum vapores ascendant ad caput, quàm cibi, & cur minus, cum per se coquuntur, quàm cum simul cum cibo. Quòd si vapores eorum citra cibum possunt ascendere, & suam vim magis integram seruent cum sola sunt, quæ cum confusa sunt in longe maiori ciborum mole & licet illis hoc conIodemus, quòd vapores vtrorumque mixti ad caput efferantur: longe tamen efficacior & ualentior erit medicamenti vis, quando seorsum tribuerimus, quâ quando erit cibo immixtum: non ibo tamen inficias, quin quòd interdum exhiberi vtiliter possint aliqua medicamenta liquida etiam, vt esset syrupus ex succo citoneorum aut consimilis natura: sed id alia ratione, quâ vt eius vapor ad caput feratur: sed potius vt astringendo tum robur ori ventriculi tribuat; tum etiam, vt potius reprimat vapores, qui ascendentes caput replere possunt, sicuti Diacytonite sæpe uti solemus, alioquin verò magis expedit vt hæc ventriculo ieiuno su mantur. Postremo verò considerandum quoties, & quousque id genus medicamentis vt in curandis morbis oporteat, nam si nimis modici, & paci fuerimus in vsu opportunorum medicamentorum cum illis utemur, vt naturæ in concoquendis & transmutandis humoribus laboranti opem feramus; aut illa non poterit, aut egrè tandemque uincet noxiam materiam, quatenus sanè ad auxilia medici pertinet: protrahetur etiam in longius euacuatio, quam sibi molit dam proposuit medicus: cum sit necesse concoctionem morari, sin autem immodici, & nimii fuerimus; cum pleraque eiusmodi medicamenta concoctionem iuuantia vim præterea habeant digerendi, laxandi que reddēt viscera laxiora, & imbecilliora, idem quoque de incidentibus & detergentibus dicere possumus: quæ cum caliditatis non sint expertia, possent calida intemperaturam asferre, sicuti contra, quæ refrigerant, frigidam, unde quandoque monuit Gal. sæpe

sæpe imprudentes medici, non curant morbum, sed potius in contrarium affectum transferunt. Oportet autem in hac re primum præ oculis habere primam indicationem propositam, & eatenus; vel medicamenti, quatenus præsens erit res, quæ nobis eorum medicamentorum rationem indicauit, quæ quidem remota, ab id genus etiam medicamenti abstinere, immo interdum, neque eatenus illis incumbendum: sæpe enim, ut testatus est Gal. natura ipsa citra vllum medicamentorum usum morbosa vitia corrigit; præsertim quando illa non sunt amplius ingentia, quod nos quotidie experimur: videmus enim quod posteaquam de morbi magnitudine non parum fuerit ope medici detractum, natura paulatim resumptis viribus, quæ fuerant prius labefactæ, reliquias præcedentis morbi sponte, & nullum exigens auxilium a medico, sæpe absunt. Et hoc fortasse spectans Auicenna prorsus vulgaram eam sententiam: non omnis ægritudo suo, ait ille, medicatur contrario. In multis enim sola sufficit regimini bonitas, & autem hanc sola prudentia, & peritia medici poterit moderari locum tamen indicasse ut cautiore sit in usu horum medicamentorum, non erit inutile. Sed de his satis, tadem tractatione de trochiscis, vel pastillis aggrediamur.

De syrups compositis, ac de ratione compositionis eorum. Cap. 5.

DE compositis, ut nunc appellant, syrups particulatim in præsentia acturi à frigidioribus inchoabimus tractationem: ab illis nempe, quorum frequentior est usus in febribus, diurnis præcipue: nam in illis sæpe prorogantur, & difficiliore euadunt, solent medici compositis uti syrups, ut potè, quos credant valentiores esse, & præterea quia id genus febres plerumque plures coniunctas affectiones habent, quæ multas indicationes, variosque nobis scopos offerrant, quibus facilius per composita medicamenta satisfieri potest; nam plerumque diurnæ febres a crassis, & lentis humoribus tormentum habet, qui attenuandos, & detergendos esse indicant ad hunc etiam obstructions, & illæ iam inueteratæ, quæ aperiendas esse indicant sæpe & imbecillitas ventriculi, nonnunquam, & iocinoris. Primum autem ad examē, & in considerationē deducemus syrupū de cichorio compositum, qui hoc tpe in frequentissimo usu ubique ferè est, eius autem auctor fuit Nicolaus Florētinus in capite de curandis obstructionibus iocinoris: in istius autem syrupi confectioe licet videatur ille unus & simplicis scopū primo inquit habuisse, compositur tamen particulatim

M scopos

scopos plures, qui depromuntur, tum a varijs affectionibus, tum verò a causis, nam cum obstructio plerumque ortum suum habeat, a crassis, aut lentis, aut multis humoribus in iocinore, infarctis: hi primum suas habent indicationes, tã ratione qualitatis, quàm quantitatis, nam quantitas, vel copia indicat, quo facilius, & minori pòt noxa, vacuandũ esse: crassities, & lentor, attenuandum, seccandũ, & detergẽdum, deinde verò, quia has istius visceris obstructions. solet sæpe febris sequi, vel si nulla etiam adsit febris: tamen obstructions interiorum viscerum cum distationem commodam eorũ, quæ in eis continentur, humorum impediunt: in causa etiam sunt, cur calor exacuatur, & incresecat, calidaque inde intemperies contrahatur, quæ & ipsa suam habet indicationem oppositam prioribus indicationibus, quia attenuatio, incisio, deterfio, & tandem apertio, & vacuatio per ea fieri solent, quæ calefaciunt: præterea verò quia in febribus diuturnis laudat auctores, vt & lotia citentur: præsertim verò, vbi experit aliqua apaxere concoctio, hoc autem syrupio frequenter in istiusmodi febribus vtimur: ideo & huius rationem habuit ille, qui illius primus fuit compositor: insuper verò, quia iecur, quodd præcipuum membrum est, nobis curandum offertur: ideo & ab eo etiam sua propria insurgit indicatio, quæ nobis significat semper curam habendam, ne relaxetur a medicamentis, & imbecillum reddatur, ad quod præsertim faciunt, quæ alicuius astrictionis non sunt expertia. Sicut ergo compositæ, & ut aiunt, complicatæ sunt indicationes: ita & varia multiplicique medicamentorum materia fuit opus. Vnde primum quidem Syrupus is accipit omnia genera cichoracearũ herbarum, quas Gal. & de comp. med. secundum lo. in affectibus præsertim calidioribus adeo extollit, vt dicat tãta familiaritate erga iecur esse prædita, qd in calido quidem affectu plurimũ profunt, quãuis aut refrigerent, in frigido tamen non nocent, & in febribus, iocinorisque obstructions ea ratione profunt, quia refrigerando quidẽm intemperiem calidiorẽ, tũ febrilem, tũ verò ab obstructione excitatã reprimunt, & aliquanrisper contemperant calorem eorum medicamentorum, quæ calidiora sunt, vt sunt lupini, radicesque fœniculi, apij, & asparagi, crassosque, & lentos humores attenuare, & dissecare possunt insunt: etiam quæ vrinam cieant, sicut haliacabus, quã alchechengi Arabes appellant, & asplenon, scolopendriumve, polyticum, adiantum, capillus veneris, & cuscuta, in quibus aliqua

qua calida, aliqua satis temperata sunt, aliqua etiam refrigerant, radix verò dulcis lenitatem quandam præterea habet, quæ & ipsa utilis est. De his autem simplicibus particularim non agemus, nam statim a principio prædiximus de simplicium medicamentorum natura nos nolle in præsentia disserere: nolumus enim cum nostris recentioribus nunc contendere, qui de his copiose scripsere, quia verò, ut dicebamus, diuturnæ febres raro per spontaneas excretiones iudicantur, neque etiam facile ualentioribus medicamentis ob inepritudinem materiæ cedunt: sed ut Auic. testatus est, quod tamen ex Alex. Tralliano deprompsit, sæpius magis prospere cedit res, quando paulatim, hunc humor crassus, & uiscidus paratur, ita etiam leuis sequatur vacuatio, ac verò quia nō est vnica, & simplex ratio ea vacuandi, quæ iecur obsident, & omnis diuersitas a natura istius visceris accipitur, nam quæ superiorem, & conuexā eius partem occuparunt, facilius per urinam ducuntur, quæ verò inferiorem, & cauam, per aluum, ideo in hoc syrupo præter ea, quæ urinam ci- cant, voluit & portionē aliquam rhabarbari imponi: tantā autem, ut ferè quotaquæque vncia scrupulum accipiat: nempe, ut siquid ab alijs medicamentis aptum ad excretionē sit factū: id leniter, & facili- ter, sine agitatione eorū quæ cruda, & nondum parata sunt, educatur. Vnde solēt medici hoc syrupo prius citra rhabarbarū uti: mox autem, ubi iam coqui cæpit humor, rhabarbarū addere, neque, his, quæ hætenus exposita sunt, id obstat, quod est frequens in ore me- dicorū: nempe contra rationem esse, simul contrarias motiones, va- cuationesq; molliri, quia illud uerum quidem est, quando motio- nes illæ insignes adeo, & valide sunt, ut altera alterā possit impedi- re, rhabarbarū aut, præter id qđ leuis, & facilis est medicina, eius etiā adeo modica copia imponitur, ut nullā insignē motionē possit concitare, immo non nisi facile, & paratā materiā mouere. His autē accedit, quod mirifice roborare potest uentriculum, iecur, & reli- qua tandē viscera, si autem singulatim perpēdere uelimus medica- menta, ex quibus is syrupus cōpositus est, non modo in iocinoris obstruktionē utilis esse poterit: sed & lienis, nam & asplenū, quod citrach appellant, & cuscuta creduntur esse medicamenta leni plu- rimum familiaria, atque hæc de syrupo ex cichorea composito. Sed pauca etiam de syrupo de endiuia composito dicamus, cū & ispa- ratus apud nostros pharmacopolas reperiatur: præsertim ex institu- tione Gentilis, qui cōficitur ex libris tribus succi endiuie ad ignem

M 2 depurati,

depurati; & totidem herbæ, quam iuniores medici hepaticam appellant, antiqui lichenem nuncupauere, in ea autem existimatione, vulgo & apud iuniores est, ut credât eam in affectibus calidioribus plurimum posse, atque aperire obstructions, quanuis antiqui non tanti illam fecerint, ipsam quidem refrigerare ait Gal. & exicare, aliquid præterea deterforij habere: unde neque præter rationem est, quod vim etiam obstructions aperiendi habeat; & aliquam digerendi, cum illita curet ictericos: nisi quis fortasse dicat, curatq; ictericos, id est laborantes inflammatione, & in temperie calidioris iocinoris, illis autem succis addit rosas, uiolas, folia lenticulæ aquæ ricæ, flores nymphææ, polytricum, singulorum semunciam, capillum ueneris, hordeum mundum, semina communia frigida, singulorum unciam: deinde his confecto syrupo addi voluit sandalos albos, & rubeos, & quos herberos Arabes appellât, greci fortasse oxiachantham, semina cotoneorum, lignum aloes, cinamonum, cortices citri: singulorum horum scrupulum. Mihi quidem is syrupus, quanuis multi in tertianis nothis utantur, & frequenter, & in aperiendis iocinoris obstructionibus: uidetur longe priore & cichorea appellato, infirmior, & minorem vim attenuandi, & aperiendi habere, atque maiorem refrigerandi: si mutuo simplicia conferantur, ex quibus uterque confectus est: unde putarem ad tertianas diuturnas, & ualidas obstructions priore præferendum, utpote qui magis possit attenuare, digerere, aperire, urinam ciere: sed ubi maiori esset opus refrigeratione, & roboratione, hic esset accommodatior. Præter hos memoratos & syrupo utuntur, quidam ex hepatica dicto a Franc. Pedemontano compolice, quæ dicitur ex herba lichenæ, & lenticula aquæ, additis floribus uiolæ, rosarum cucurbitæ, illisque ex succo malorum puniceorum, irroratis, at aromatizatis, inaiunt, ex dragma unci odorati: item & sandali, spediique, & addito zucharo, conficitur syrupus, qui tamen in multo usu non est. Sed potest esse utilis magis ad temperandam calidam iocinoris in temperiem, quam ad obstructions aperiendas, nihil enim accipit quod aperiendi vim habeat præter iuncum odoratum, cuius tamen non admittit insignem copiam: unde febribus tertianis exquisitis potest accommodari, nothis uero, & alioquin diuturnis, non admodum. Sed posteaquam in frigidis syrupis sumus, atque eos exposuimus, quorum maxime in febribus, aliisque iocinoris affectibus utilis est usus, ad alios accedamus, qui interne frigidi sunt, & pectori, atq; spi-

ritalium membrorum affectibus magis familiares sunt, primumq; de eo agamus, qui ex papauere albo, & nigro componitur fuit autem a Mesue cōpositus, uel descriptus, & duæ satis variæ sunt compositiones in Mesues appellato antidotario, altera prior, & simplicior, quæ potius ad proximum caput uidetur pertinere, altera uero quæ compositior est, & prior quidem, quæ fit ex decocto capitum papaueris, tum nigri, tum albi, quod addita pari copia zicchari, & penidiarum, ut appellant, ad consistentiam syrupi ducitur: uim habet refrigerandi imprimis, deinde humectandi: unde potest esse utilis ad conciliandum somnum: & hac ratione, in biliosis febribus uenire in usum pôt, quando vigilia nimis esset importuna, nam & quia frigidû, & humidum inedicamentum est, potest esse causa cur capiant somnum, nec minus etiam quia reprimat, & temperat calidos, & siccos, acresque uapores, qui uigilias afferunt: præterea uero in destillationibus calidis, acris maxime conferre potest, potest etiam aliquantò asperas arterias lenire, & tussi ab acri, & calido humore excitatæ conferre tamen secunda descriptio, quæ & in frequentiori usu est his temporibus: sicuti prior veteribus uidetur fuisse vsitator, maiorem uim leniendi pectus habet, nam capitibus papaueris addit capillum ueneris, radicem dulcem, zizipha, semina lactuæ, maluæ, & cotoneorum malorum, quæ omnia asperitates, præsertim uero pulmonum, delinire, & leuigare mirifice possunt: & cum alia refrigerent, radix dulcis, & capillus ueneris modici & temperati caloris sunt: unde in affectibus particularum, quæ respirationi inserviunt, maxime uero si fuerint excitati ex acriori, & tenuiori destillatione exasperante, vias spiritus, maxime conducere potest: non immerito igitur, laudatur tanquam tussi aridæ imprimis utilis: nam sistere refrigerando, & incrassando destillationem potest præter lenitatem, quam inducit: potest interdum & febricitantibus prodesse: præcipue uero ex bile putrescente tenui, & plurimum acri excitata febre: sed magis etiam, si comitem habeat vigiliam inmodicam, & importunam: nam facultatem imprimis habet somnum conciliandi. In uniuersum autem eius usus eximie potest esse utilis in curandis, uel deliniendis omnibus affectionibus, quæ ortum habent materia acri, tenui, & mordaci: sicut ardor urinæ etiam, & id genus aliæ affectiones, quales sunt erosiones oris, faucium, mariumque, sed de hoc non plura. Excipit uero hunc syrupus

iubinus dictus propterea quod in primis ex ziziphis, idest iuiubis conficiatur: facultate uero parum à priori euariat, componitur autem si ziziphis, ut numero sexaginta, non autem lib. decem, ut mendose legitur in quibusdam codicibus Mesuæ, adduntur tragacanthum, semina cotoneorum, papaueris, nielonis, lactucę, singulorum. drach. iij. capilli ueneris unc. j. seminum malinę, florum uiolarum: singulorum autem drach. v. licet non nulli codices, sed falso legāt vnc. v. radices dulcis. drac. viij. & totidem hordei mundati, quę coquantur in lib. iij. aquę & ex zucchini lib. ij. fiat syrupus, is, perinde ut prior refrigerat, & incrassat, leuigat autem, seu lenit partes respirationi ministrantes: si quando sint in calida destillatione exasperatę: unde præcipue solet esse utilis in calidis affectibus, ut est tussis, & pleuritidis quādo a calida, & ab acriteria excitatur, in pleuritide enim præsertim uero inter initia eo uti soleo, & sæpius quidem feliciter: in frigidis autē, non item, aliquanto autem minus quam prior refrigerat, incrassat ue, & minus etiam fluxionem sistit, quidam præterea eo utuntur in ardore urinę, & vesicę ulceribus, quibus & Auic. de iuiubis agens uidetur attestari, qui hos fructus in uitiis pulmonum, & ulceribus vesicę esse utiles ait, atque mihi horum sententia satis probatur, licet Gal. in 2. de alimentorum facul. cap. de sericis affirmauerit, ad tuendam sanitatem, uel profligandos morbos nullum momentum habere, nā neque arbitrarer uerba illa ad institutum nostrum facere, utpote quoniam de illis sermonem habet sub ea ratione, qua in cibos ueniunt, neque enim ibi ea reprobatur, nisi quia cibi mali sunt, & modicum alimentum comedentibus asserunt quodque difficiles concoctu, & ventriculo non sunt commodi, nam neque ad alui deiectiones, neque ad eam sistendam prosunt aliquid, nō autem, quod ut medicina ex decocto, uel alia simili ratione non possint aliquando esse utiles: præsertim cum optime matura sunt, nam & uulgo omnes ab experientia docti utiliter in tussibus calidis solent eorum decocto uti, & iuniores etiam eorum usum in multis medicamentis laudant. Iam uero, de syrupo violaceo, qui compolitus dicitur, sermonem habebimus, qui & ipse simili facultate præditus est, nisi quod differūt, quia qui ex papauere dicitur, his duobus sequentibus magis refrigerat, incrassatque, mox qui iuiubinus est dictus, minus autem his ambobus uiolaceus refrigerat, tamen & ipse lenit exasperatas partes à calidiori fluxione: præsertim uero pulmones,

mones, & partes ad ipsum pertinentes: sed & in calidis affectibus oris, faucium, & partium per quas vrina delata solet mordere, & ueluti urere: frequentissimus autem eius usus est in pleuritide, & peripneumonia, quanuis & in exquisitis tertianis non esset inutilis, conficitur ex uiolis pondere duarum unciarum: seminibus cotoneorum, & maluarum, singulorum drach.vii. uiginti autem tum ex iuiubis tum ex sebestem: simulque in aquae cucurbitae libris sex ad tertias coctis cum zucchari lib.i.s. fit syrupus utilis ad illos affectus ad quos & priores. Ab his autem ad syrupum transeamus, qui a Mesuae, & a nostris latinis posterioribus bizantinus dictus est, neque tamen tempus conteremus in exponenda istius nuncupationis ratione: cum nihil hoc ad institutum nostrum faciat: sed ad rem ipsam sermonem conuertamus: in frequentissimo usu apud omnes ferè est syrupus, & si eius compositionem examinare uelimus, non est vnus tantum facultatis, neque semper easdem uires habet, sicuti neque vnica, & simplex est compositionis ratio, nam prior, & simplicior compositio accipit succos endiuiae, apiique singulorum uero libras duas, lupulorum, ac boraginis, singulorum libram, quibus omnibus coctis & deputatis, ad confectionem syrupi addendum est album zuccharum eo pondere, ut quatuor succorum libris addantur zucchari librae duae, & semis, hunc uerò ita confectum syrupum nonnulli simplicem bizantinum vocant, alii sine additione, interdum uerò ex instituto Mesuae semisem aceti albi iniciunt ad succorum pondus, atque in communi usu est, ut bizantinus cum aceto nuncupetur: tertio uero & aliquando haec succis incoquenda sunt, nempe rosarum vnc.ii. radices dulcis vnc. s. spicae nardi drach.ii. anisi, fœniculi, seminis apii, singulorum drac.iii. nuncupatur uerò aut bizantinus completus, aut cum additione. Differunt tres haec confectiones, temperatura, uiribus efficariaeque, nam simplicior & prima compositio temperata quidem est, uel si temperamentum excedit, excessus modicus admodum est, quatenus ad primas qualitates pertinet, in reliquis modeste attenuat, nam & endiuiae succus, & apii, & lupullorum vim attenuandi, & aperiendi habet: aliquam & borago. Zuccharum uerò, aliquam detergendi, cum uero acetum additur, uis quidem attenuandi & secandi, subindeque aperiendi augetur, non tamen calefaciendi: nam acetum potius refrigerat. Additis autem reliquis rebus fortior in his omnibus redditur cum & aliquanto magis calefaciat, non tamen multum, nam

quāuis anisorum, fœniculique, & apii, semina satis calefaciant, unaquē & spica, rosarum tamen copia, quæ aliorum omnium pondus superat, potest eorum calorem non parum temperare, at radix dulcis, cum prope tempericm accedat, lenitatem quandam vilem sanè potest medicamento impartiri: non autem eius temperamentum in primis qualitatibus mutare: sed ex rosīs, & spica præter alia commoda, hoc etiam habet, quod possit non parum roborare ex eorum modesta astrictione, viscera interna: præsertim uentriculum, & iecur à diuturnis febribus laxiora, & imbecilliora reddita, si ergo recte examinare rem voluerimus, cum primum sit transitus in febribus putridis ab illis simplicioribus syrupis, quia iam maiori ope sit opus, & fortioribus medicamentis ad præparandas materias fouentes febrē, & ad eas concoquendas, quia iam uideatur facta difficilior, & pertinax, propterea quod aut per assationē facta sit crassior, aut quia sæpe inter initia tenuiores, & faciliores humores putrescunt: mox verò crassiores, aut quia mēbra naturalia à calore extraneo, & febrili facta imbecilliora, crassiores & crudiores progignūt humores: aut interdū natura ex uiciata temperatura, & aucto calore exustos, & in naturam humoris melancholici succos vergentes procreat: primus transitus plerumque fieri solet ad simplicē bizantinum syrupū: mox illi addunt acetum: postea vero ad syrupum acetosum compositum a ppe-latum, uel ex duabus radicibus, de quo paulopost sumus habituri sermonem, uel ad eundem citra acetum: sed cum aceto maiorem uim attenuandi, & aperiendi habet, ab hoc autem solet fieri transitus ad bizātium cum additione, uel completum, quo etiam fortior est acetosus ex quinque radicibus, additis præterea seminibus, sunt autem diuersi hi syrupi, qui eundem fere scopum talem quē indicationem respiciunt: efficacia tamen & viribus differunt, & id, quia non semper eadem omnino ratio est earū affectionum, & earū materierum, quæ fouent ipsas febres: Nam & obstructions interdū maiores, & difficiliores sunt, ita & humor qui quasi causa antecedens febrem fouet, quandoque crassior, & magis lentus est, quandoque minus, & quia remedia, medicamentaue cum morbis, & eorum causis conferenda sunt, ideo & pro eorum ratione sunt immutanda, sed pauca quædam de hoc syrupo acetoso dicamus, conficitur itaque ex decocto radicū, fœniculi, apii, endiuixque iniectis singularum earum vncijs tribus ac libris decem aquar

aque, additisque seminum anisi, sceniculi, apii, singulorum sane vicia, ac seminis endiuiz semuncia, hæc omnia ad medietatem aque coquantur, ac mox ex libris tribus zacchari fiat syrupus, cui ubi despumando claruerit, additur acetum sicut de bizantino diximus, & si consideremus, calidior aliquanto syrupus is est bizantino, & eo maiorem vim attenuandi habet, sed calidior & valentior in his ille est, qui ex quinque radicibus vulgo appellatur: his enim accedunt radices petroselini, brusci, asparagique: in reliquis autem sit sicut ille ex duabus radicibus, qui temperatior euadit additione radicis endiuiz, atque seminis eiusdem. Postremus vero inter compositos syropos, qui acetosi dicuntur, est qui à Mesue acetosus diarodon nuncupatur, & quo præcipue medici vtuntur in diuturnis febribus tertianis spuris, quas fouent difficiles viscerum obstructions maxime iocinoris, et lienis, ubi tanta eorum viscerum sit contracta imbecilitas, vt iam febricitantes in malum habitum, quem graeci cachexia dicunt, procliues esse videntur, nam vim non exigua aperiri, & crassos humores attenuandi habet, præterea languida viscera roborandi, tamen si probe velimus hanc compositionem cum illa syrupo bizantini, conferre, parum hæc ab illa diuersa est, nam illa succum boraginis, & lupulorum accipit, quibus hæc vacat, & hæc semina endiuiz, quæ illi desunt; vnde illa aliquanto exustis melancholicis; excrementis est accommodatior, in reliquis vero, parum admodum visceribus & facultatibus discrepant, sunt itaque hæc syrporum confectio nes febribus, quæ à crassis, lentis ve succis fouetur, atque adeo et asfectibus omnibus ex obstructionibus excitatis, vel qui adiunctas viscerum obstructions habent in primis opportuna, sed & in vteri asfectibus ab eadem dependentibus: & quamuis Hip. 1. de ratione victus in acutis morbis, usum aceti in affecto vtero obneruam eius naturam videatur habuisse suspectum, non tamen propter hoc plerique medicorum putarunt omnino, reiiciendos hos syropos, qui acetum accipiunt: præsertim in eius vitis à frigidioribus, & crassioribus succis originem ducentibus: dummodo modestus sit; sed potius illos in acutis, & dolorosis morbis, vt sunt inflammatio, præterea in vlceribus relinquendos esse putarunt. Porro opportunum fuerit iam, vt ad alios syropos explanandos transeamus, qui citra acetum conficiuntur, eos vero præcipue, qui in frequentiori usu sunt, & ubique ferè parati reperiuntur. Primum autem syrupum de eupatorio à Mesue descriptum exponemus, vt pote qui cum his: de quibus hæcenus à nobis actum

actu est, viribus nō parū similis sit, nisi forte, q̄ hic prioribus omnibus in aperiēdis obstructionibus, roborandisq; ex diuturno morbo afflicti visceribus præstat: vt possit & aquam inter cutē, aut curare, aut saltem illi plurimum prodesse, qui eo affectu implicatus sit, cōficitur autem acceptis duabus vncijs singularum harum radicū: nempe apii, fœniculi, endiuie: radicis autem dulcis, iunci odorati, cuscutæ, absinthii, rosarum: singulorum dragmis sex: capilorum ueneris, spinæ albæ, spinæ arabicæ, florum aut radicum buglosæ, seminum fœniculi, anisorum, eupatorii: singulorum dragmis quinque: rhabbari, mastichæ, singulorum dragmis tribus: spicæ, assari, foliis singulorum dragmis duabus, atque his omnibus ex aquæ libris decem ad consumptionem tertiæ partis decoctis, additisque præterea zuchari libris quatuor illi decocto percolato, fit syrupus, qui vim insignem attenuandi, & aperiendi habet: præterea vero robur infirmioribus visceribus addendi, & id ex astrictione cuius non sunt expertia iuncus odoratus, absinthium, rosæ, & ambæ illæ spinæ eupathorium, rhabbarum, mastiche, spica, & folium, longe tamē maior est in eo vis attenuandi, & aperiendi: quā astringendi, vnde duplex illi ex astringentibus inest commoditas: prima, quod roborant membra ex morbo facta laxiora: deinde quod astrictio, vt Gal. 1. de facul. simp. medicamentorum docuit, quando vis aperiens non superatur ab astringentibus, potius aperiens adiuuat, & propterea neque mihi probantur iuniores quidam, qui suo pharmacopolæ consulebant, vt in parando hoc syrupo pro spinis illis aliquid inderet, quod potius aperiret, cum scopus syripi sit aperire. Sed neque in hoc multam vim facere, siue verum iniiciatur eupatoriū, cuius græci omnes meminere, seu ea herba, quam Mesue descripsit in sua tractatione de simplicibus medicamentis, quia vtrunque: si gustu & recta ratione examinandum sit, vtile medicamentum est: nā amaritudinem cum aliqua astrictione habent, cui accedit & experimentum, nam syrupus is, cū suo eupatorio in usu & apud Arabes, & nostros iuniores latinos diu, & feliciter fuit, neque adeo ēt morosus essem, vt si cui agrimonia magis probaretur, propterea de viribus, & præstantia plurimum esse detractum putarem. Magnam vim roborandi viscera: præsertim verò ventriculum: maxime vbi deiecta sit cibi apetentia, habet syrupus qui de absinthio vulgo dicitur, non est tamen ea aperiēdi facultas, quæ est in priori: maior autem astrictio: sed minor etiam vis calefaciendi: posset esse
utilis

utilis in febribus illis, in quibus laxior, & languidior est uenter, ut tamen eo non utamur inter initia dum valde excrementis & multis obstructionibus scatet corpus; sed posteaquam & aliquanti sper fuerit aliqua ratione vacuatum, & concoctio aliqua visa fuerit. Aliqui non contemnendi medici in fluxu alborum menstruum ab utero per sæpe se eo feliciter usos autumnant: neque id præter rationem esse videtur, quia affectus ille, aut ortum, aut fomentum à ventriculo sæpius habere solet: præsertim quando alba & pituitosa excernuntur: alii etiam in laxitate & imbecillitate intestinorum laudant, componitur eutem accepto absinthio ad libram mediâ, foliis verò rosarum ad duas uncias; spica ad draginas tres, quæ in libris duabus & semisse vini antiqui boni & odorati, eodemque succi cotoneorum primum per diem ac noctem macerentur, postea coquantur ad medietatem: moxque additis libris duabus mellis fiat syrupus. Ex multa affinitate & similitudine quam habet syrupus qui à meta & nomen sortitum est, & confectionem, cum priori qui ex absinthio dicitur præsertim in roborando laxum & infirmum ventriculum, atque in eius incommodis succurendo, post illum hunc de menta describemus, cuius compositio constat ex succis tum cotoneorum amborum generum: nempe dulcium, & illorum quæ muza dicuntur, tum etiam malorum puniceorum trium ite generum: singulorum autem sesquilibra illis omnibus sanè addantur sexquilibra mentæ, aridæ & rosarum dragmæ duæ quæ omnia per diem ac noctem macerata mox coquantur ad medietatem: postea libris duabus zacchari vel mellis, additis tandem syrupus fiat, & postea aromatizetur, ut aiunt galia moschata, qui si recte perpendatur, calidus non est, vel parum admodum, nam & si menta prope tertium ordinem calefacientium accedat, ea tamè est succorum copia, in quibus coquenda est, ut possit vel parum calefacere, vel et refrigerare, quo fit, ut non possim non admirari, quod iuniores quidam scripserunt, commodum esse syrupum & aptum ad remouenda mala ventriculo molesta: si ex frigida causa ortum habeant, quamvis postea addant, quod etiam roborat ventriculum calido laborantè affectu, quæ non facile mutuo coherere possunt: nisi forte dicamus, quod cum temperatum sit medicamentum, potest in contrariis etiam affectibus esse utilis: equidem non negauerim posse esse utilem præsertim in mixto affectu & pendente à materia mixta, ut est bilis spuria, nam cum satis copiosam mentam accipiat,

aut horum ſequitunciam accipit, præterquã ipſi etiã ſua aſtrictione ro-
bur viſcerũ & particularũ ſeruare pōt, quẽ ab illis calefacientibus, &
digerentibus alioquin nimis laxatæ imbecilioresq; redderẽt, quibus
enim nonnulla eorũ nõ ſint oĩno aſtrictionis expertia; non tamẽ illa
videbãtur eſſe ſatis. Cũ aut non ſit admodũ in frequenti vſu iſ ſyrus,
non erimus in ei uſu poſitione longiores: vnde hoc tãtum addi-
to: nẽpe ipſius vſus non admodũ cõgruens eſſe pōt in iniitiis eorũ af-
fectuũ quibus accommodari pōt, cũ nimis vãlidã vim habeat, nam
ſemper ſerẽ præſtat curationẽ à leuioribus auſpicari: diuturnis autẽ
factis morbis, qñ hæc non ſunt ſatis, ad fortiõra manus admoũdũ
ſunt. Trãſeamus ad ſyrupũ ex ſtœchade cõpoſitũ, iſ vñ ilignẽ attenuã-
di, digerẽdiq; & e pſundo materias craſſas iſpaſſas particulis extra-
hẽdi hẽt. cõponit. n. ex multis q̃ calefaciũt & deſiccãt, & tenuiũ par-
tiũ, vel tenuis ſunt ſubſtã, quãta iſprimis pyretrũ, piper, zingiber,
origanũ, calamẽtũ, aniſumq; a quã natura neq; ſtœchas, & thymus
aliena ſunt, ſed & aromata, quæ poſtea addũtur, qñ appellantur ſyrũ
pus ex ſtœchade cũ additione, vel cũ aromatib. oĩa calefaciunt, te-
nuĩq; ſubſtantia conſtant. Vnde maxime vtilis, vt oēs atteſtantur,
affectib. qui ortũ, & fomentũ hẽnt à pituita craſſa, & lenta: præſer-
tim verò capitis, & neruorũ: & maxime illis q̃ à frigida, & craſſa de-
ſtillatione excitãtur, & fouentur: q̃ppe. n. ei uſmodi humores at-
tenuat calefacit, & digerit, eorũq; copioſam humiditatẽ deſiccando
tandẽ pōt finire, & ſi iſpaſſi in neruos, vel articulos ſint, inde euel-
lere: accipit autẽ dũ cõſicitur, ſtœchadis drag. xxx. origani, thymi,
calamẽti ſingulorũ drag. x. pyretri, aniſi ſingulorũ drag. vij. piperis
lõgi drag. iij. zingiberis drag. ij, paſſularũ exacinarũ drag. iij. ex
horũ aut decocto additis libris quinq; mellis fit deĩndẽ ſyrupus, q̃
ſine aromatib. vel ſine additione dĩ, & id q̃ interdũ dũ illa coquũ-
tur addũtur q̃dã aromata raro linteo ligata ſimul coquẽdã: nẽpe ci-
namomũ, calamus aromaticus, nardus, crocus, zingiber itẽ, & piper
lõgũ, p̃terea & nigrũ: ſingulorũ aut ſc̃ſq; dragma, quidã aut aiunt
hæc addẽda, vt calidior euadat ſyrupus, ut ſit efficaçior iſfrigidiori-
bus affectib. q̃d mihi nõ admodũ probat, nã ſi ea adderẽtur, q̃ maio-
rẽ uĩ calefaciẽdi hẽent, putarẽ ea addita, vt medicamẽtũ magis cale-
faceret. Verũ cũ oĩa q̃ in priori ordine ſunt, ſere ad quartũ, vel ſal-
tem ad terciũ ordinẽ calefaciẽtiũ accedãt, neque eam, quæ inſuper
addatur, aut plura, aut calidiõra ſint, non puto vt magis calefa-
ciant eſſe addita, nã calamus aromaticus, nardus, & crocus, parũ
extra ſecũdũ ordinẽ aſcendũt, piper verò longũ & nigrũ & zin-
giber,

Victoris Trincauellij

giber, & si insigniter calefaciant, prima tamen confectio & pyretrū, & zingiber, & longum piper magis copiosum habet, vt illud præteream quòd nigrum piper: & si videatur plus caloris habere longo, illud tamen, cum in tenuiori substantia quàm in longo fundetur, citius digestus euanescit, quàm vt possit multam imprimere: vnde puto alia de causa quàm vt magis calefaciant: nigrum enim piper additur, vt quamuis ipsius vis præpartium tenuitate cito dissoluatur, tamen antequàm dissoluatur adiuuat eorum penetrationem in intimiores partes, quæ deinde vim calefaciendi diutius integras seruare possunt: sicut longum piper & zingiber, quæ propter hoc ipsa repetita sunt in hac additione, crocus verò & concoctioriam vim habet, quæ non parum utilis esse potest vbi morbus à cruda, & crassa materia ortū habet, nardus, aut calamus aromaticus unā cū croco in tanta copia eorum quæ digerunt, & attenuant, & calefaciendo laxāt, ea astringendi mediocri facultate, qua suapte natura prædita sunt, possunt viscerum & particularum robur seruare. Cinnamonum autem præter id quod omnē ferè malorum humorum malitiam corrigit, & obstat quominus putrescant. Sed de eo satis; de syrupo qui ex corticibus citri paratur, aliquē sermonem habeamus, cum ipse quoque capiti imbecilo non parum conducatur. Sed & ventriculo & tandem omnibus visceribus: præsertim vero cordi: in affectibus tamen frigidis: quamuis si Gal. credimus de partibus mali citri agenti, non plurimum calefaciat, odore siquidem grato nature illorum non parum familiare est, amaritudine autem potest & calefacere, & attenuare, sed & cōcoctionē iuuare, vt secundo de alim. facult. docuit Gal. non conficitur autem ex tot simplicibus is syrupus, quin & inter simplices non potuisset: recenferi: sed hoc nihil aliòquin refert, modus confectionis est vt decocta libra corticum ex libris quinque aquæ ad cōsumptionem duarum partium, additaque mox libra zacchari fiat syrupus, qui deinde conditur, vel vt iuniores solent loqui, aromatizatur ex granis quatuor musci, aliqui autē, ait Mesue, dum coquitur hic syrupus, addito nempe zaccharo decocto ex corticibus, addunt aliquam portionem corticum citri coquendorum simul cum eo syrupo: Quod si fiat, vires sanè maiores sibi cōparabit, sed erit minus gratus, vt pote qui sit amarior futurus quidā etiam sericū coccineū cū eo syrupo coquendū imponunt, & id, quia ea omnibus Arabibus fuit sententia, quòd sericum illas vi-

res

res haberet, & cordi plurimum, & spiritibus recreandis conduceret, & longè etiam magis si cocco tractorio sit infectum, vt insinuas se uisus est Mes. quìs Auicenna illud crudum magis laudasse uisus sit, Græci tamen hæc non tanti facere, nam sericum in materia medicinali non recensuere, sed & coccum infectorium non his facultatibus, quas Arabes illi tribuere, præditum esse opinati sunt, sed facultate astringendi, & citra morsum desicandi: unde & in magnis uulneribus: præsertim neruorum utile esse medicamentum censuere, sed & mulieres has in ipso vires nouere præcipue obstetrices, quæ illo in puluerem redacto cum modico thure aut mastichæ ex ouo sorbendo utuntur in prægnantibus si timeant futurum abortum. tempus autem opportunum fuerit, vt ad syrupos qui maxime apti sunt melancholicis affectibus curandis siue & assatione fuerit generatus humor melancholicus: siue sit vt fex sanguinis, transitum faciamus, nam neque incongruus est is transitus; quia & præcedens multis horum non est ineptus, cum enim in istis melancholicis affectibus, tum caput, tum cor, frequenter male afficiatur vt in melancholia & furore seu mania, tum etiam ventriculus, vt in hypochondriacis, & iis omnibus præcedens syrupus non parum conducatur: nõ erit horum inepta connexio, sunt autem hi syrupi ex fumaria compositus, ex pomis Regis Sabor, ex pomis compositus, & ex epithymo, qui omnes à Mesue referuntur. In hoc uero syrupi hi conueniunt quod præterquam quod vim habent parandi materiam adustam biliosam quæ iam ad atræ bilis naturam vergit, & salis etiam, & acré pituitam, (multa enim accipiunt, vt paulopost magis particulatim exponemus, quæ demulcent siccitatem, asperitatemque horum uiciorum humorum eosque deliniunt) habent etiam, licet non insignem, aliquam tamen vim soluendi. Vnde eorum plerique, si aliqua copia exhibeantur, satis maiorem moliuntur, citata aluo, purgationem: sed & aliqua insuper accipiunt, quæ attenuant & obstructions aperiunt. Agamus tandem particulatim de ipsis, & primò de eo qui passim appellatur syrupus de pomis Sabor Regis, utpotè qui & simplicior sit: conficitur uero ex duabus libris succi domestice buglossæ, & totidè syluestris, tribus uero succi malorum dulcium, in quibus folliculorum senæ uncia iij. per diem sint macerata, ac uinica ebullitione bulierint, mox uero illis colatis additisque tribus zachari albi libris, conficitur syrupus, ita tamen, vt dum hæc coquantur, duæ dragmæ croci in linteis deligatæ additiantur: ac fructus

retur & pelinteus, vt vis oroci facilius excipi à medicamento possit. Sympus is inaxime vtilis est ad humorem melancholicum temperandum, nam succi illi buglossę vtriusque: nempe & quę nũc vulgo buglossa dicitur, & quę borago, temperata sua, & leui quadam caliditate, & præterea humiditate id præstare possunt, succus verò malorum dulcium, & bene olentium, & ipse humidus est, & ad aliquem calorem, vt secundo de alimen. facul. docuit Gal. inclinat, sed & cordi admodum gratus est eius odor suavis, quo præsertim cor roboratur & spiritus illius, cuius præsertim in melancholicis affectibus multa ratio, vt omnes testantur est habenda. Sene verò additur, vt: siquid illius humoris sit, quod iam paratum est, nec sit admodum pertinax, facile & paulatim, sine agitatione earum partium, quę non dum ad vacuationem aptę sunt educatur. Vnde in quartanis febribus & reliquis affectibus melancholicis in maximo vsu est syrupus hic: incipimus autem primum à syrupo de pomis simplici, mox vero ad hunc accedimus, cum gradatim progredi volumus. Post hunc de eo syrupo de fumaris sermonem habeamus, qui uel maior, vel compositus solet appellari, cuius hæc est compositio. Primum fit decoctum ex myrobalanorum citrinarum, ite & chebularum dragmis viginti; boraginis, violarum, absinthii cuscute, singulorum vncia vna, radice dulcis, rosarum, singulorum semuncia, epithymi polypodii: singulorum dragmis septem, prunis centum, passillarum semilibra: tamarindorum, cassiæ fistule egiptiæ: singulorum vnciis duabus, his omnibus decoctis vsque quo absumatur pars tertia, decocto percolato additis succi fumaris cocti & despumati libris tribus, & totidem zacchari fit syrupus, merito quidem laudatur hic syrupus, quod vim habeat roborandi viscera; præsertim verò ventriculū & iecur, nā absinthium, rosę, & passulę possunt id optime præstare, quę & obstructions iocinoris possunt referare, cuscitā verò potenter obstructions lienis aperire creditur: habet vero aliquam vim purgandī & myrobalanis citrinis & chebulis quarum satis magnam copiam præ aliis accipiunt, & eas adiuuāt excitantque epithymum & polypodium, & cum citrini myrobalani bilem flauam imprimis educant tenuemque: chebulę vero pituitam, epithymum, & polypodium illis vini addunt, vt & crassiores humiores, tum exustos, tum sallos possint præterea vacuare, cassia autem adiuuat qui dem & ipsa sua solutioia facultate: sed magis modo substantię lenitæque siccitatem eorum medicamentorum de mul

mulcent, tamarindi passulæ, & radix dulcis, flores boraginis, violarumque, & præterea pruna, quamvis & refrigeret ut tamarindi verum per eam facultatem, qua purgant eductis salis & exustis humoribus, utilis est eius usus cutaneis affectionibus ut sunt species lepræ, & impetiginum, utpote quia licet non insignē moliatur uacuationem, paulatim tamen & sæpe attrahendo ad inferiorem aluum, eos auertit à cute & assuefacit ut ferantur ad aluum inferiorem. quo fit deinde, ut cutis libera magna ex parte ingruentibus eam humoribus euadat. is autem est ordo in his cutaneis affectibus ut priori utamur syrupo simplici ex fumaria: mox vero cum inueterascit affectio & sit difficilior, ad compositum accedamus: sed & in affectibus a lue gallica aliquod fomentum habentibus utilis & frequens apud medicos est istius syripi usus. Tertius post hos describatur, consideraturque syrupus qui ex pomis compositus nuncupari solet, cuius descriptionem medici, & eorum ministri ex Mesue capite de soda frigida ab humore melancholico describere. ita autem se habet, Accipit capillos Veneris appellatos, radices utriusque buglossi, flores carūdem, polypodij, epithymi: singulorum unciam, folliculorum senę, clamepyrios, stœcados, singulorum dragmas septē, chamedrios, schœnāthi, helebori nigri: singulorū autē dr. tres, fumarię dragmas octo, eupatorij dragmas quatuor, succi malorum dulcium uncias octo, præter epithymum & succum, cetera ex aquæ libris quatuor coquuntur ad medietatem. quibus coctis, epithymum additur, quod una ferueat ebullitione, ac omnibus mox percolatis additis zaccharo & succo illi decocto cōficitur syrupus. in multo usu multoque in honore est is syrupus, in affectibus ex atrabile suam habentibus originē: præsertim verò si ab humore qui in melancholicum ex assatione degenerauerit. Vnde in furore vel mania Mesue illum summis laudibus effert: nam & uim insignem habet ad liniendā istius humoris siccitatem asperitatemque ex utriusque boraginis radicibus, floribusque, quæ temperati caloris cum humiditate sunt, itidemque & succo pomorum dulcium, qui quàm maxime in his affectibus utilis, sed & uim magis insignē habet attenuandi, quod ferè in his affectibus qui ab humoribus his crassioribus & terreis fouentur maxime conducit: attenuat autem chamedrys, chamepithys, schœnāthū, Eupatorium, & fumaria. quia autem scopus fuerat illi, qui istius compositionis fuit auctor, non modo parare uitiosum hunc humorem ad uacuatio-

nam faciliotē & eius asperitatē demulcere, ut minus moleſtus eſſet, Verum & facile ſine ulla uiſiſiquid paratum eſſet præterea detrachere non exagitatſi partibus illis, quæ nōdum ad educationem aptæ ſunt, ideo nigrū ueratrū, polypodiū, epithymum, ſenamque addidit, neque tamen ea copia, ut multam uim poſſint renitentibus & ineptis humoribus inferre, ſed quanta poſſet facile ſequentes humores quaſi allicere: Vnde facultatem aliquam purgandi habet iſ ſyrupus, & maiorem quā præcedens qui ex ſumaria maior fuit nuncupatus: poteſt autem melancholicos ac exuſtos humores modice & facile educere. Poſtremo uero loco ſyrupus ex epithymo in hūc ordinē conſtituatur, qui & ſi aduſtos præſertim & melancholicos cuiuſcumque ſere gēnetis humores purget, miſtos tamen humores ex omni excrementorum generatione detrachere etiam poteſt, ut pituitam ſalſam, & bilem. epithymum enim cuius eam copiam accipit ut ipſum ſolum, iſtius cōpoſitionis quaſi baſim, ut noſtri iuniores loquūtur, cōſtituere poſſimus, cui quidē facultas prima eſt melācholicum ſuccum detrachere. accipiuntur autem huius drag. xx, myrobalaſani uero omnes induntur, quarum aliz bilem, quædam melancholicum, quædam pituitoſum humorem ut primo libro fuit expoſitum, purgare creduntur indarum tamen. & citrinarum plus; nam drag. xv. iniiciuntur ſicuti ſumariæ & cuſcutæ drag. x. thymi calamētū bugloſi emblicarum, Beliricarum, radicis dulcis, polypodii, agarici, ſtœcadis ſingulorum drag. vi. roſarum, ſeminis feniculi, aniſi ſingulorum drag. ij. pruna. xx. paſſularum detractis acinīs drag. iij. tamarindorum unc. ii. ſ. ſapæ lib. 2. Sacchari uero quatuor. Agaricum autem & ſi multiplices humores poſſit educere, pituitam tamen, & bilem præcipue ſicut polypodium melancholicum humorem & pituitam præſertim ſalſam ducit. Thimum autem, calamētum, cuſcutæ, ſumaria, ſtœcas potius officium habent, ut craſſos humores attenuent, & corpus fluidum, uiſi ſanè apertis, redant cui conferunt; & ſemina, niſorum, & feniculi, quamuis hæc & aliam commoditatem, ut 2. de ratione uictiæ acutis morbis Gal. expoſuit, afferant: nam grato, & aromatico ſuo odore gratiam ventriculo & reliquis viſceribus conciliant, quominus quali abhominetur viroſum, & ingratum odorem, imino iniquam qualitatem medicamentorū purgantium. quæ adiunant, ſunt roſæ, ſtœcas, paſſule, & ſumaria: hæc. n. omnia robur addunt ſua modèſta aſtriſtione languſcentibus uiſceribus, dulcis uero radix, itemque & paſſulæ, prunaque:

prunaque: tamarindos etiam illis addiderim & sapam, quæ familia-
ritate & lenitate humiditateque suæ substantiæ possunt, & medica-
mentorū acriū, & humorum asperitatem demulcere, & vias delini-
re. Vnde præstans est medicamentum quod & ad apparatus humo-
rum, & ad facilem eorum uacuationē est apprime utile, in illis præ-
sertim affectibus, qui ex exusta bile, aut salsa pituita, uel ex melan-
cholicis humoribus mistim excitantur, ut scabies difficilis & prauæ
naturæ, & gallica lues, & capitis externi morbi, ut sunt arcæ, faui,
acores, & id genus alij: in lepris quoque, & incipiente elephātiāsi,
a græcis appellata affectione. sed ad alios iam syrupos transeamus,
qui in tussi, & affectibus membrorum respirationi inseruiētū, præ-
sertim verò cum à crassa & lenta materia obfidentur, utiles sunt, &
quamuis multiplices ubique in libris medicorum, tum antiquio-
rum, tum etiam recentiorum reperiantur, ad compositiones syrupo-
rum huic scopo attinentium. Nos tamen eas hoc loco exponemus,
quæ ubique ferè in usu sunt, atque paratæ apud seplasiarios repe-
riūtur. hæc uerò sunt, ut à mitioribus & lenioribus incohemus: syru-
pus quæ ex liquiritia uel glycyrriza, hoc est, ex radice dulci nūcupa-
tionē habet: deinde qui ex hisopo: tertio ille qui ex matubio seu
prasio, postremo qui ex calamēto: posset verò in hoc ordine collō-
cari, & scilliticū oximel: sed potius ad simpliciorum syruporum or-
dinē pertinere uidetur. Verū antequā rē hanc particulatim trācte-
mus, quædā in vniuersum exponēda sunt, ut horū cōpositionū ratio-
nes facilius possint explanari: hæc verò accepta sunt ex Gal. 7. de
cōp. med. sec. loc. cū partes ad superiorē appellatū vētrē pertinen-
tes crassa lentaque materia sunt refertæ, facta angustia in viis spiri-
tus, quia aut bronchia in pulmonibus obstrunt, aut spatiū in tho-
race repletū, fit angustius: unde difficilis cōcitatur tussis cū multa
spirādi difficultate. & quāuis plurima, & frequēs fiat tussis, nullata-
mē, aut modica sit excreatio, quia materia illa ob crassitiē, & lentorē
remittitur, ut non facile impetu aeris per tussim extra impelli pos-
sit, nisi postquā materia per cōcoctionē fuerit reddita minus cōtu-
max, & aptior ut elidatur. quod citius fit, & commodius, si medici
opera accedat, qui ea adhibeat remedia, quibus facilius pertinax ma-
teria possit superārī, & cōmodius educi. duo uerò sunt quæ impri-
mis, ut ibi docuit Gal. id præstare possunt: primum, ea, quæ attenu-
ent dissecantque & detergant crassos hos & lentos humores, qualia
sunt quæ calida sint & partium tenuiorū, ut tamen neque multa sit

horū caliditas, quāta nēpe possit eos siccando magis indurare, nam his potius deterior fiat affectio. Verūtamē neque hoc etiā satis est, verū oportet & id pręstare, quod in omni ferē vacatione (pręcipue si fiat per manifestas vias), maxime cōmodū est, ut fluidę & leues uiz reddantur, per quas uacuationē moliti sumus: id verō pręstantius sit his que mollire, applanare, leuigareque possunt, qualia sunt humectantia. Vnde ait Gal. qđ dissecantibus & detergentibus oportet ea addere, quę humectēt, tū in ratione victus administrata, & per medicamēta adhibita, quare in his cōpositionib. semper hi duo scopi spectādi sunt, quāuis nō pariter & equali rōne, sicuti neq; horū humorū, qđ partes has occupāt eadē est natura, qđ alij alijs sūt crassiores uel minus crassi, magis uel minus lēti. Examinemus igit primū syrupū, qđ a radice dulci uel, ut aiūt, a liquiritia nomē sortitus est, & a Mesue describit. Accipit aut radice dulcis duas uncias unā capillorū Veneris, mediā hyslopi, qđ simul macerāda sūt ex libris quatuor aque cōmunis, ac mox ad medietatē coquēda ac colāda. decocto uero iniiciēde sūt mellis Zacchari penidiarū singulorū quidē unciz octo, sex aut aque rosate: quibus additis ex arte cōficiat syrupus. quę si ad examen reuocemus in hyslopo satis insignis est uis attenuādi & detergendi: in capillis Veneris aliqua certe sed exigua uis attenuendi: & aperiendi: extenuat enim crassa excrementa in thorace, ut Gal. 6. de simp. medicamentorū facultatibus tradidit. maior in melle post hyslopum uis deterforia & attenuatoria: in radice uero dulci uis habetur moderate humectandi leuigandique & applanādi asperitates in thorace & alijs etiam partibus: Vnde medicamentum commodissimum tussientibus est: sed & zaccharū & penidię appellatę, eandē ferē vim habent: nēpe humectandi: pręsertim cū ex aqua coquuntur, ac tēperandi delinendique exasperatas pulmonū partes: aquā rosaceā cur auctor addiderit, non equidē possum aliam rationē asserre: nisi propter cōciliandā ex grato odore aliquā medicamento gratiā. nā quod nōnulli referunt, inicii, ut aliqua moderata astrictione robur particulis illis addat, ut deinde ualentius possint extrudere tussiendo infurcta excrementa. & si non damno non tū etiā admodū mihi probatur, quia adstringentia, ut loco antea citato monet Gal. quantum ad id quod primū pręstant, non admodū uiliter immiscentur medicamentis sputū iuuantibus: quod si aliquid emnino addendū sit ob partium illarum robur: id oportet, ut sit modicum. In alijs autē simplicibus ex quibus syrupus is cōficitur, tanta est

est astringens, quanta ad id officium potest esse satis, nā & radix dulcis nō est astringens expers, & eius ē magis particeps est capillus veneris. est autē syrupus hic tēperati cuiusdā & modici caloris, qui pleuriticis ē pōt esse cōmodus: si quando crassa & lenta expuant: nā citra noxā cū non possit calefaciendo inflammationē irritare, extenuans & dissecans crassiciē humorum, facilius sputum reddit. In hoc ergo horum syruporum ordine qui crassas & difficiles in thorace materias ad faciliē excreationē parant, post simplices, is primus sit & aliis mitior & temperator. secundū verò locū in his qui passim & ubiq; invsu sunt, est, qui ab hyssopo nūcupationem habuit, & ex his conficitur. Accipit autē hyssopi, radicū apii, sceniculi, radicis dulcis: singulorū drag. x. ordeī mūdi semūciā, seminū maluē, coto-
neorū malorum, tragacanti: singulorum drag. iij. capillorū veneris drag. vj. zizipharū, sebesten, singularū drag. xxx. passularum exac-
natarū drag. xij. ficuum aridarum pinguium, palmularum pinguiū singulorū tantundem, hoc est, decem numero, penidiarum albarum libras decem, prædictis decoctis ex aquē cōis copia quanta satis sit, decocto addantur penidiæ, & postea conficiatur per vltiorē decoctionem syrupus, qui priorem vim maiore extenuandi & detergendi hēt. præterea verò suo humore cū quodam lentore leuigandi & applanandi omnem asperitatem partium in thorace contentarum, nā hyssopo, qđ insigniter extenuat, addantur radices sceniculi apiiq; & liberalior copia capillorū veneris, qđ oīa, præter id qđ attenuandi facultatem habent, possunt & lotia ciere, quod si modeste fiat in his affectibus, non parum vtile est, partem. n. aliquā illius materie attenuatam per urinam deriuare poterunt, vnde & vulnerarij medici iā diu in illis curandis, qui ex thoracis vulneribus suppurati sunt tādē quibusdā vtūtur decoctis, quæ ipsi potiones ad castatos suo ipsi modo appellant, quæ præter vim dissecandi insigniter etiam lotia proritāt, qđ adiuuat & maluæ semen: caricæ vero pingues, ut Gal. 2. de facult. alimentorum testatur, vim habent detergentem, cuius & passulę hordeumq; non sunt expertes, quamuis & hæc & tragacantum, zizipha, sebesten & penidiæ, non minimam vim applanandi & deliniendi internas thoracis partes hēnt in eisdem autem affectibus syrupi istius vsus utilis est, in quibus & prior, nisi quod hic valentius eadem efficit, quæ & prior, utpote qui maiorem vim attenuandi & detergendi habent maiorem etiam leuigandi & deliniendi particulas in thorace. vnde à prio-

ri solemus incipere, & cum morbus inueterascit, & pertinacior fit, ad hūc mox accedimus, quemadmodum si pertinacior fiat affectus, & magis adhuc inueterascit, crassiorque & magis lenta euadat excreanda materia, syrupo plerunque utimur, qui ex prassio, hoc est, ex marubio nomen habuit. Conficitur autem in hunc modum. Accipit prassii uncias duas hyssoi, capilorum ueneris singulorum drach. vi. radices dulcis drach. i. calamenthi, anisi, radicum fœniculi, apii singulorum drach. v. seminum malæ, fœni græci, iridis, singulorum drach. iii. seminum lini, cotoneorum singulorum drach. ii. passularum excitatarum unc. v. ficus aridas pingues xv. numero, penidiarum, mellis despumati: singulorum lib. iii. Is ergo est alijs potentior calidiorque, & præterea uim maiorem habet extenuandi, digerendi, & detergendi. Nam prassium imprimis, uel ut latini dicere solent, marubium, satis insignem facultatem attenuandi detergendiq; habet, & digerendi, nec non & iris, præterea & calamentum, nec his caret fœnum græcum, quāuis non eam admodum uehementem, ut hyslopum. In præsentia, & capilum ueneris, radicesque fœniculi, & apij, & semen anisi præteream, ut pote quorum proxime facta sit mentio, de semine autem lini & cotonei mali. hoc tantum dixero, quod mea hæc est sententia ipsa in compositione istius syrapi accipi propter muscilaginosum succum qui in cortice est, quique dum hæc semina ex aqua: præsertim si aliquantisper sit calida concutiuntur, detrahitur, & a iunioribus muscilaigo appellatur, & uim habet deliniendi, & leuigandi asperitates omnes, neque enim eorū mihi probatur sententia, semen cotonei hic admitti, ut syrupus sit alicuius astrictionis particeps, nam capilus ueneris, ut supra testati sumus, potest hoc quātum satis sit præstare. Ad difficiliore ergo thoracis affectus, & ex crassiori magisque lenta & pertinaciori materia concitatos uim maiorem habere potest is syrupus. Reliquum esset ut & de syrupo ex calamento aliquē haberemus sermonem, qui & ipse in tussi difficili, præsertim in senibus plurimum laudatur ad extenuandos, & dirigendos crassos, & lentos humores: præterea uero, ad liberanda omnia uiscera ab infarctu & obstructionibus: præcipue uero lien, & merito quidem laudatur, nam utrumque calamentum syluestre nanque, & domesticum cuius utriusq; duas uncias accipit, potēter extenuat, detergit, & digerit idē etiā lygresticum, daucus & schinanthū præstare possunt: singulorum autem quinque dragmas accipit, passularum addi

tur semilibra, & ex mellis duabus libris conficitur syrupus, coctis nempe prioribus medicamentis ex aqua de more aliorum, additoque subinde melle: sed in hoc particulatim exponendo non erimus multi, hæc enim pauca satis esse possunt ei, qui probe memor sit eorum, quæ hæcenus litteris tradita sunt. Multi præterea & alii syrupi descripti tam in iuniorum, & latinorum libris, quam priscorum reperiuntur, quos si uellemus omnes persequi nimis in longum nostra protraheretur tractatio, unde cum maiorem eorum partem, qui in frequentiori usu sunt explanauerimus, præstiterit ut iam finem illi impresentia imponamus, nam si quis illis animum aduerterit, quæ hæcenus fuere exposita, facile & aliorum rationem assequi poterit, sed & de decoctis quibus pro syrupis sæpe utuntur medici, sæpe & ad diluendos syropos, quorum etiam usus antiquis syruporum uice fuit, nolumus plura uerba facere: quia si quis recte ad ea animaduertit, quæ de syrupis dicta sunt, non egebit longiori sermone, ut illi ea quæ ad decocta pertinent, explanentur: nam plerique syruporum fiunt ex decoctis, tum ergo ob hanc causam, tum etiam quia rarissime decocta seruari diutius apud apothecarios solent, aut possunt: nolumus in his explicandis tempus terere.

De Trochiscis. Cap. 7.

TROCHISCORUM, quos postillos latini uocant, non una est ratio, nisi quatenus ad eorum formam, & figuram, & confectionis modum pertinet, nam omnes ex aridis medicamentis tritis, & in puluerem redactis, moxque aliquo liquore, ut coherere possint, assumptis, ac in orbicularem figuram depressam tamen lupinis ferè similem confectioni componuntur: unde græce trochisci uel cicilisci a latinis uero, pastilli dicuntur facultatibus uero, & modo, quibus illis utimur, plurimum differunt, aliis enim utimur interius per os assumptis, & deuoratis, aliis uero, exterius administratis, quibusdā etiā utroque modo. Sed hanc diuersitatem usus exponemus ubi de illis particulatim agemus: primū enim hoc percipiendū esse arbitror, quod inter medicamenta quæ ore assumpta uim habent corpus immutandi, præsertim attenuando, secundo, digerendo, & exiccando, aperiendoque uidetur trochiscorum forma & usus maiorem uim habere, seruata tamen aliorum paritate, quia simplicia e quibus conficiuntur: secundum totā suam substantiā, & uniuersas uires ingrediuntur, & præterea

tur quæ suâ à rosis appellationem habuere, describuntur at à Mes. in hunc modum: accipe rosarum aridarum aureos vi. spicæ nardi aureos. ii. radicis dulcis aureos iii. ligni aloes aureos. ii. spodii aurei j. croci semiaureum, mastichæ drag. ii. ex vino albo assumpta omnia in troiscos redigenda sunt. in his priori confectioni additum est lignum aloes appellatum, vel agallochum, quod cum sit astringentis gustus cum quadam amaritudine, ut Dioscorides tradidit, vim habet obstructions aperiendi, roborandi viscera, extenuandi crassos humores, & humida ventriculi vitia emendandi, & iocinoris doloribus succurrēdi præter id, quod Auic. illi vim attribuit cordi roborando idoneâ, addit & spodium quod Arabes cânz appellant, eo quod ex quibusdâ cânarum radicibus cōbustis conficeretur, rem, mea quidē sententia, his temporibus ignorata. additur & parum croci q̄ calefaciendi aliquantulūq; exiccandi, & ipse vim hēt, & ut ait Dioscorides, ciendi urinā, præsertim verò concoquendi quæcunq; concoctione egent. roborant ergo viscera, aperiuntq; hi pastilli satis insigniter, excrementosum humorem deficcant, colligunt quæ laxiorem ex nimio humore redditum ventriculum, quare diu turnis febribus, quæ ad malum habitum, & aquam inter cutem adducūt, sunt maxime viles: tertium ordinem obtinere possunt, qui ex rosis maiores dicuntur, itidem à Mes. descripti, quorum compositio se habet in hunc modum. Accipiunt rosas aridas ad dragmas quatuor, agallochum ad dragmas duas, vel lignum aloes ut Arabes appellant: sesquidragmā verò mastiches, spicæ nardi, cinamomi, cassiæ, schēnanthi, Absinthii, singulorum dragmā. ex quibus tritis decoctūq; quinque radicum communium & vino veteri assumptis fiunt pastilli in his præter decoctum radicem, in quibus vis insignis aperiendi, & lotiatiendi, superioribus aduntur cinamomū, cassia, quorum quanta vis sit in aperiēdis roborandisq; visceribus, & putredini obsistendi, nemo non nouit, & ob id ēt in hoc describendo non erimus multi, sicut etiā in schēnantho & absinthio. Sed his etiam valentiores sunt, qui à rosis & eupathorio suam hēnt nuncupationem, nam præter rosarum drag. viii. & spicæ drag. iii. & spodii sesquidragmā, & tres dragmas radicis dulcis, accipiunt rhabarbari drag. iiii. quod præterquam, quod mirifice obstructions aperiat, crassas materias sua amaritudine & partium tenuitate attenuet & detergat, vi astringente laxata viscera ac imbecillia colligat & roboret, excrementitiamque humiditatem deficcet, aliquid etiam habet

Victoris Trincauellij

habet quod possit : siquid est paratum ad vacuat ionem , nulla vi ineptis illata ; vacuare . Accipiunt etiam succi eupathorii dragmas . x. de quo quia in syrupis loquuti sumus , in præsentia non multa dicemus , credimus siquidem in his nos , & vero eupathorio Dioscoridi , & Galeno noto uti posse , quod nunc agrimonium vocant , & Mesues etiam eupathorio , nam licet in nomine decepti sint Arabes , in facultatibus tamen illius herbæ , utpot e quia ab ipsa experientia fuerint edocti , non crediderim fuisse deceptos quin & quodd iocinori roborando & aperiendo comimodum sit medicamentum nouerint . Præstantissimi verò in obstructionibus aperiendis , & facile educendis humoribus , qui obsidēt obstructa viscera , illisque roborandis , atque etiam in lotio ciendo sunt pastilli , qui ex rhabbarbo dicuntur , rhabbarbari enim copia quam accipiūt longo intervallo alia omnia simplicia superat , accipiunt enim dragmas decem rhabbarbari , quatuor autem succi eupathorii : rosarum tres , spicæ , anisi , rubicæ , absinthii , seminum apii , asarij ; singulorum dragmam , amigdalorum amararum dragmas quatuor , vnde apparet quod maiorem vim aperiendi quàm superiores habent , & ciendi lotia , nam rubia , & asarum , & præterea apii semen , spicaque ea facultate sunt prædita , & ex ea rhabbarbari copia , maiorem etiam facultatem ciendi aluum . Vnde in diuturnis febribus , & illis in quibus iam adest cachexia , subestque futuræ aquæ intercutem suspicio , optimi sunt , & in multo vsu : si recte parentur . Sunt & eadem febres admodum viles qui ex absinthio dicuntur , & ipsi in frequentissimo vsu , quamuis qui de rhabbarbo dicti sunt valentiores sint : si quis recte extimare voluerit copiosius siquidem rhabbarbarum illi accipiunt , hi enim conficiuntur acceptis rosarum , absinthii , singulorum autem dragmis duabus , rhabbarbari , succi eupathorii , asarii , apii , spicæ , mastiches , malabatti , amigdalorum amararum : singulorum dragmam , illisque ex succo endiuivæ assumptis . Sed de his , sicuti etiam de illis qui ex eupatorio suum habuere nomen , & in hunc modum componuntur , ut accipiat mannæ & succi eupathorii , utriusque autem vncia , rosarum semuncia , spicæ tres dragmæ , rhabbarbari , asari , anisorum singulorum dragmæ . ij . s . spodii tres dragmæ componentur ex succo eupatorii , non multa sumus dicturi , ex illis enim quæ de alijs dicta sunt , facile & horum vires , & robur percipi possunt , quare superuacuum esse videtur in longius sermonem protrahere . Ad pastillos autem , qui à caparibus nomen habuere tran-

scamus

seamus : quique in plurimo usu sunt apud omnes ferè in curandis affectibus lienis: præsertim in validis, & antiquis illius obstructionibus, & schyrhosis tumoribus, nam ex omnibus ferè medicamentis quæ in his lienis affectibus quos nuper recensuimus, solent ab authorib. plurimùm cõmendari. Cõficiuntur aut̃ hoc mō, accipiunt. n. primum corticis caparorum, & agni casti, vel viticis seminum singulorum drag. vj. quæ utraque vim habent attenuandi, detergendi quæ satis insignem, cum sunt tenuis substantiæ, vel partium tenuiuũ, amaritudinis non expertia, cum aliqua austeritate, quæ indicat nõ deesse aliquam vim astringentem, qua robur viscerum seruari possit, quæque omnia sunt apprime, non modo vitilia, verum & necessaria ad aperiendas viscera præsertim iocinoris, & lienis obstructiones, & atterendos, discutiendosque duriores eorum tumores, accipiunt prætereanigellæ, calamenti, succi eupathorii, acori, amigdarum amaratum, nasturii, amoniaci, foliorum rutæ, aristolochiæ rotundæ singulorum dragm. ij. quæ omnia, excepto amoniaco, vim molliendi, insignem habent, & durioribus affectibus perquam commoda sunt: valenter enim attenuant digeruntque: postremo accipiunt cyperi, ac scolopendrii vtriusque dragmas duas, quorum primum incidendi, & extenuandi cum modica quadam alstrictione vim habet. De scolopendrio non est cur multa dicam, quod asplenon ideo dictum quia minuendo, lienis aptissimum sit medicamentum, unde: quod paulo antea diximus, efficax remediũ est ad tollendos inueteratos induratosque lienis affectus, quo non modo interius sumptum ex aliquo huic rei idoneo decocto (quale, id est, cuius Mesue meminit, nempe ex radice caparorum, frascini, & ex myricæ foliis ex vino decoctis, cui decocto Gal. oximel addidisset, nam in his affectibus censuit nunquam esse præmittendum acetum.) mirifice potest prodesse et̃ exterius aliquibus oleis, vel ceratis exceptum, & illitum, vel adhibitum non parum solet esse vtile. Sunt & aliæ duæ trosciscorum descriptiones, qui itidem tam exterius quàm interius administrati viles sunt, & eandem vim habent quique cum & ipsi in usu sunt, & parati reperiuntur, non sunt sub silentio prætereundi, habent autem consimiles ferè facultates, ambe enim possunt sanguinem reprimere, & sistere vnde cumque ille profluat, siue illinantur, siue deuorentur; primum autem de illis agemus, qui à terra lemnia vel sigillo lenio: vel terra sigillata à qua præcipue accipiunt nomen, quorumque auctor fuit Mesue

Mefue, & quia sanguis fluens reprimi nō vnica facultate, sed multi-
 plici pōt, nam & per refrigerantia, & per exiccātia, & per aggluti-
 nātia, & per astringētia, vt ea etiā præteream quę exurendo inducta
 quadā crusta; quasi operculo quodam præcludunt exitum fluētī san-
 guini, nā his nullus in medicamentis locus videtur esse, quæ deuor-
 anda interiusque sumenda sunt, signis diligenter compositionem
 horum pastillorum consideraue-rit, ex omnibus illis facultatibus
 constare facile percipiet. Conficiuntur siquidem in hunc modum,
 acceptis nempe tum sanguinis draconis, tum gumme arabicę ap-
 pellatę assatę, præterea verò ramich medicamenti, rosarumque ari-
 darum, earundem itidem seminum, amyliq; assi, item spodii, aca-
 tię, hypocystidis, lapidis hematitis, balaustiorum, boli armena, ter-
 rę lemniz, seminis canapis, corallorum, charnibz, hoc est, succini
 vel electri; singulorum dragmis duabus, Margaritarum, tragagan-
 ti, papaueris nigri, singulorum sesquidragma, portulacę assę, cor-
 nu cerui usti, thuris, gallarum, croci singulorum dragmis duabus.
 his omnibus tritis fiunt trocisci ex aqua plantaginis, in quibus ag-
 glutinant amyllum, tragacantum, non nihil & portulaca, quæ præ-
 terea, & refrigerat, exiccant cætera omnia, & eorum pleraq; astringunt,
 imo vt & magis exiccent aliqua eorum assantur, nam assatio,
 vt Gal. sæpe testatus est, siccitati & astrictiōi addit, siccant autem
 refrigerant astringuntque sanguis draconis, rosarum folia, & semi-
 na, spodium etiam Arabum quicquid illud fuerit siccit & refrige-
 rat, acacia autem, hypocystis, lapis hematites, balaustia, terra lēnia,
 corallius lapis, margaritę omnia refrigerant, siccantque plus mi-
 nusvè astringunt: sed & thus non sine astrictiōe est, quamuis ea
 non multa sit, adiuvat ad sistendum præterea sanguinem, tum quia
 emplasticam habet facultatem: tum verò quia & desiccet, crocus
 verò & ipse astrictiōis particeps est, & exiccat, quāuis calida hæc
 sint desiccando item & succinum fluxiones solet sistere, quamuis
 potius caloris quā frigoris videatur esse particeps, quòd autem
 nigrum papauer refrigerando possit sanguinem fluentem reprimē-
 re, nemo est qui non nouerit. potens ergo in hoc officio præstan-
 do est hoc medicamentum: si modo aliquibus, aut non careremus,
 aut rarissime ea haberemus, aut etiam ficta ea non afferrentur,
 nam neque lemniam terram, neque bolum armenam me vnquam
 vidisse putem, quæ vera & fidelia essent. Existimo tamen terram eā
 quam allatā ex oris orientis pro armena vtimur, non fore inutilē,
 quia

quia quæcunque illa sit, siue rubrica, siue quid aliud, refrigerat, desiccatur, præterea lentorem quandam habet, quibus nominibus & si non sit prorsus par bolo armenicæ, illa tamen non multo est inferior. Valet autem medicamentum hoc, non modo deuoratum: verum & per clysteres: præsertim verò in disentericis affectibus iniectum ex rebus & decoctis huic affectui accommodatis, imò & exterius si illis ex aliquo astringente succo, aut oleo illinantur particulæ vnde sanguis emanat. His autem facultate similes sunt pastilli item à Mesue descripti, qui ex charabe ab eo dicuntur, quia accipiunt charabe ut Arabes appellant, succinum verò, vel electrum, ut Græci auctores, vnde & Gal. vij. lib. de com. med. per loca tradidit litteris, confectionem pastillorum, qui dia electra dicti sunt, & in Asclepiadem relati, qui maxime vtilis esse dicuntur sanguinem expuentibus, Mesues hos suos vim habere ait reprimendi sanguinem vnde cunque manantem, eorum autem compositio talis est. accipiunt charabe vel succini partes sex, cornu cerui uisti quod dum vritur magis exiccat, & astringit, gummi Arabici, corallorum uistorum, tragacantæ, acaciæ, hypocistidis, balaustrarum, mastichæ lacæ, papaueris nigri assis: singulorum autem, partes duas, thuris, croci, apii singulorum partem & dimidiam. Hæc compositio cautè tractanda est, ut pote quæ non parum soporifera sit: & quamuis in ea nigrum papauer & tostum imponatur, quod, ut (ut 3. de comp. med. per loca ait Gal.) propterea torruere antiqui medici, ut aliquantulum vim soporiferam reprimant, adeò tamen copiosum opium recipiunt, si quis supputauerit, ut valde soporificum sit medicamentum: præcipue verò, cum nihil accipiat, quod vim aliquam habeat insignem, quæ possit se opio & facultati ipsius vehementi opponere de simplicibus autem quæ ad confectionem horum troscorum accipiuntur, nihil est cur plura dicamus quàm dicta sint in expositione priorum pastillorum: nisi quòd in his & lacca imponitur, siue illa cancamum Diosco. siue quodpiam aliud sit, nam de hoc nolumus in præsentia disputare. vnum tamen hic considerandum est, quòd cum vim imprimi habeat eiendi lotia, & obstructions aperiendi, non videretur fortasse satis apta huius cum aliis commixtio. possumus tamen huic rei respondere, quòd duplici nomine potest & hoc medicamentum esse in his utile, primum quia siccatur, deinde quia dum humores ad urinarias vias mouet, rationem reuellentis au-

xliii

Victoris Trincauelij

xlii sibi comparat, sed et hoc addendum, quod si illis vteremur in illis qui ex thorace vel pectore sanguinem exercent neque priores neque isti possent plurimum prodesse, nisi ex melle, aut sapâ, aut syrupo aliquo exhiberentur, quæ vt Gal. 7. de comp. med. secundum locos monuit, eos ad particulas quæ laborant, possent perducere. Postremo verò loco de pastillis sermonē instituimus, qui ab Arabibus: præsertim verò à Mesue, hi enim qui nūc passim sunt in vsu, ex eius libris descripti sunt, de alchechengi dicuntur, est autem alchechengi herba, quam inter species solani recensent tam Dioscorides quàm Gal. eā Latini vesicariam, quia rubentes fructus ceratis ferè similes in quibusdam quasi Vesicis ferat, Græci phyllalida & alicacabum nuncupant. Vnde & Paulus pastillorum, quos *πασίλλαι* appellat, meminit, sicuti Gal. in quarto de compo. medic. secundum loc. aliorum meminit, quos *πασίλλαι* nūcupant. Hi verò de quibus acturi in præsentia sumus, plurimum laudantur in ardore vrinæ & in renum & vesicæ vlceribus, & conficiuntur in hunc modum. accipiuntur fructuum vel granorum vesicariæ dragmæ tres, seminum cucumeris, melonis indi, quem nos vulgo anguriam nuncupamus, item cucurbitæ: singulorum dragmæ tres & semis, boli armenæ, gūmi Arabici, thuris, sanguinis draconis. s. papaueris albi, amigdarum amararum, succi radiceis dulcis, tragacanthi, amyli, granorum pini, singulorum dragmæ sex, succini seu charabæ, boli, seminis hyoscyami, opii, singulorū drag. duæ, sunt, autē pastilli ex iuleb, aut inulsa: si quis recte istius compositionis rationē inire voluerit, facile percipiet, in ea esse facultatem delinendi demulcendiq; omnē in lotiis acrimoniam nam primus medicamento rum ordo nempe fructus vel acini vesicariæ & tria illa maiora semina, quamuis vim habeant ciendi lotia, refrigerando tamen & subinde acrimoniam quæ soboles est nitrosarum & biliosarum partium, quæ mixtim cum vrina feruntur, & abradunt vellicantque vias per quas transeunt, obtundere & reprimere, & muliebri quadam humiditate demulcere possunt; sed radiceis dulcis succus temperato calore, & humore resistit acrioribus humoribus, & idem pineæ nucleus præstare potest, qui leuigare potest asperitates ab acri humore excitatas: semē autem papaueris albi & hyoscyami refrigerando: præter id, quod mitigant ardorem, & acrimoniam, obtundendo etiā quasi soporatū sensum, doloris scuitiā leuiores reddūt, thus maturando sua facultate concoctrice non parum vtile potest esse, tragacantha

tragacantha autem, & guimmi, & ipsa applanandi & leuigandi vim habent, quia verò vlcera anteaquàm ad cicatricem ducantur aliqua semper deterfione egent, ideo huic officio inseruiunt amigdalæ amaræ, quæ præterea vna cum seminibus apii aliam et cōmoditatem medicamento afferunt. nam cum alioquin ea, quæ dissecant, attenuantque, vt 4. aph. docuit Gal. aduersaria sint vlceratis renibus: cōmoda tamē est eorum intermixtio his medicamentis, quando non multa copia miscentur, quia vt idem Gal. x. de comp. med. secundum loc. docet, in causa sunt, cur medicamenta primaria citius & facilius perueniunt ad vlcerata loca. Curant autem vlcera tandem quæ desiccant, vt bolus armena, & altera etiā bolus, quæ multos quoque vel macra à medicis dicitur, & sanguis draconis, succinumque præterquam quòd & fluxiones ad vlceratam partem inhibent, vt antea etiam fuit à nobis expositum. Sed & hoc istis addendum est, quòd cognita videtur necessarium: nempe quòd duobus modis solent hos pastillos conficere; aliquando enim iniecto opio, aliquando verò, citra illud, opium videtur necessarium quando tanta est sæuitia doloris, vt ferri nequeat, aliquando enim adeo excrefcit, vt & febres & animi deliquium adducat, & vires deiciat. At uerò si alioquin facile fertur dolor, præstat citra opium illis vti. Multæ etiam; imo ferè præterea innumere, reperiuntur pastillorum formulæ descriptæ, quæ vel non sunt in præsentia in vsu, vel si quis eis vellet vti, illis cum istis de quibus hætenus habitus est sermo, diligenter collatis, facile erit & eorum rationes percipere. sunt & alii qui potius exterius administrari solent & præsertim in externis vlceribus curandis, & ad præsentem locum non videntur pertinere: quapropter huic capiti hic sinem imponemus.

De alijs medicamentis interius sumendis quæ vulgo Eleſtuaria vel cōfessiones solent appellari, quibus ad alia munia quàm ad purgationem utimur. Cap. 8.

Eleſtuarium vocabulum est medicorum Arabum, ab eo forsità deductum, quia ex electis præstantioribusque simplicibus confici solita sint id genus medicamenta, vt efficaciora postea sint. quòd vocabulum deinde à iunioribus nostris qui Arabas in medicina sibi vndeque sequendos proposuere, retentum in multo fuit vsu. Greci verò, quantum ex Galeni lectione assequi possum, hæc

hæc omnia medicamenta antidotos appellarunt: in primo enim de Antidotis libro statim inter initia libri, quid antidotus sit hoc modo explanat, quod est id genus medicamentorum, quæ non exterius administrata, sed intra assumpta malas corporis affectiones sanare solent: præsertim verò diuturnas. addidit ille idem 2. libro, unde & triplices antidotorum differentias exponit, quia nonnullæ veneno epoto opem ferunt, aliæ venenatis ferarum moribus auxilio sunt: nonnullæ verò morbis ex mala victus ratione excitatis vtilem operam præstare solent: quàmuis aliquæ etiam reperiantur antidoti, quæ triplici nomine & triplici hoc officio celebres sint, in quibus, tum ea quæ theriaca præsertim dicitur, cuius Andromachus auctor fuit, tum verò Mithridatica primum sibi locum vendicarunt: Sed de illis antidotis, quæ ad duas priores differentias pertinent, non sumus longiorem habituri sermonem, nimis enim longa euaderet hæc nostra tractatio: sed nobis hæc pauca satis erunt quantum ad institutum nostrum potest attingere, quod de venenorum, aut venenosorum animantium remediis, aut curatione ad præsentem libellum agere non videtur spectare, quia tamen composita medicamenta, quæ præsentanea sunt utrique generi venenorum, plerumque conficiuntur ex multis aromatibus, ac aliis quoque quæ similè cum aromatibus uim habent in calefaciendo, attenuando, digerendo, & aperiendo: præter eam facultatem, qua priuatim venenosæ qualitati aduersantur: ideo veniunt sæpe & in alios vsus, ubi nullæ est etiam veneni suspicio: præsertim verò in affectibus diuturnis: interdum capitis, interdum ventriculi iocinorisque ac aliorum præterea viscerum: sæpe utri & articulorum, & id maxime cum à crassis & frigidis succis ortum habent: nam istiusmodi medicamenta vim magnam attenuandi, digerendi & quasi atterendi crassos & pertinaces humores prædita sunt, præter id quod & robur addunt nativo calori, ipsis tamen non solemus uti inter initia horum affectuum, & non nisi prius aliquantisper expurgato corpore, & apparatis humoribus per concoctionem, alioquin enim exagitant ineptos & multos humores, quos, cum ob eorum pertinaciam non possint facile superare, maligniores & importuniores reddunt, quod sæpe quartanarii experti sunt, qui ante concoctionem & corporis expurgationem voluere uti theriaca, & quartanas duplicarunt triplicaruntve: imo interdum & incontinentes mutarunt, cum tamen alii, qui eam oportuno tempore sumpsere, liberati fuerint: sed de theriaca

theriaca & mytridatica antidoto vberius fortasse alibi dicemus. nunc ad tertiam antidotorum differetiam, utpote quæ magis nostro instituto sit opportuna: eas nempe antidotos continentem, quæ in morbis excitatis a mala uictus ratione curandis accommodatæ sunt. & quia in electuariis ab Arabibus appellatis est et magna pars eorum medicamentorum, quæ uim purgat oriam habent, de illis nullam faciemus in præsentia mentionem, quoniam de his satis in priori libro egimus. Quæ ergo nobis exponenda reliqua sunt, illa in duplici sunt differentia, alia enim primum affectus primarios respiciunt, alia vero magis excogitata sunt, ut aliqua symptomata: quando illa adeo excreverunt & sequuntur, ut maius negotium facessant quam morbus, reprimant & mitigent, in quibus præcipuum locum tenet dolor, qui præ sequitia sua sæpe cogit medicum destituta omni ratione curandi affectus, incumbere repressioni, & mitigationi doloris: præsertim vero medicamentis illis, quæ torpore uel sapore inducto, hebetant facultatem sentiendi, ut nequeat doloris causam percipere, sed de istis posteriorem instituemus tractationem: priorem vero, de illis quæ primum respiciunt affectus & eorum causas. Quia verò omnes hæc antidoti, siue electuaria uocabulo minus latino uelimus appellare, conficiuntur ex aridis semper ferè medicamentis in puluerem reductis, ac mox ex melle, aut Zaccaro assumptis, & ex ratione artis decoctis, quamuis ex Zacharo hæc medicamenta componi Arabum fuit inuentum, antiquiores. n. non eam copiam Zachari, neque id in tanto usu habuere, sed melle duntaxat in his utebantur: Vnde antiquis medicis unicus erat tantum modus conficiendi antidotos: nempe in teneriori forma simili illis quæ eclegmata quasi delictus dicas, a Græcis dicuntur. Arabes autem, qui Zachari usum in his componendis medicamentis introducere, duas etiam formulas vel modos conficiendi hæc medicamenta excogitarunt, alteram a priori non dissimilem: dum pro melle assumunt pulueres ex aliquo syrupo, ut sermone progrediente exponemus: alteram verò, qua Zacharum ex aqua dissolunt, deinde coquunt, & aliquanto etiam plus coquunt, quàm si syrupus esset conficiendus. nam cum magis fuerit excoctum Zacharum, refrigerens postea conrescit & induratur, sed paulo antequam indurescat placetulas confingunt, aut sicut alii vocant, rotulas, interdum verò quosdam quasi morsus, seplasiarii morsellas nuncupant. medicamenta autem

in hunc modum conformata vulgo confectiões appellant, nam
vulgares dulciaria quæ in usu sunt in bellarijs in splendidioribus cō
uiujs confecta uel confectiões vocant ex Zaccharo composita: sed
& hoc antequam negotium inagis particularim tractemus, iuuenes
animaduertant, qui tyrones adhuc sunt, quod quotæ cuique li-
bræ mellis vel Zacchari, addunt binas puluerum uncias, quamuis an-
tiquioribus temporibus, ut est communis medicorum opinio, so-
liti essent trinas uncias puluerum libræ Zacchari vel mellis iniicere
ut quadruplum esset Zaccharum vel mel ad pulueres, nostris autem
temporibus, sexuplum est. hoc autem introductum est, ut minus in-
grata essent medicamenta assumentibus, quamuis habeant postea
vires minores. nostra siquidem hac tempestate magis indulgemus
delicatioꝝ moribus hominum, quæ prisci faciebant. & hac etiã
de causa conueniunt sunt medici rationem conficiendarum harum
quas confectiões vulgo appellamus. Sed & hoc addamus, quod
cum vniuersa ferè vis horum medicamentorum deriuetur ab ari-
dis medicamenti, ex quibus fiunt pulueres, & eorum maxima pars
uim potius exiccandi habeat: ideo id genus medicamentorum, qua-
tenus ad primas qualitates pertinet, potius desiccant quàm home-
stant. In alia autem contrarietate, alia calefaciunt, alia refrigerant:
Vnde in siccioribus affectibus, quantum ad id spectat, nō est admo-
dum utilis eorum usus, nisi aliquid aliud adiunctum sit, quod aliã
haberet indicationem maioris momenti, ut esset laxitas, uel imbe-
cillitas, uel frigus, uel calor alicuius visceris, longeque magis in-
staret robur quod horum usu esset addendum illi particulæ, quàm
desiccationem, cui alia ratione possemus deinde occurrere, nec il-
lud præterea amittendum, cuius non semel in prioribus capitibus
meminimus, nempe quod cum mel sit aliquanto calidius Zaccharo,
& magis etiam aliquanto defruet, & detergat: ideo medicamenta
ex melle confecta aliquanto in his habent vires maiores vbi calefa-
ciendum sit, uel attenuandum, uel digerendum, uel detergendum.
Non solum autem hoc medicamentorum genere utimur propter
corrigendas imtemperaturas: præcipue uero humiditas, aut frigidas
aut calidas: sed propter multa alia cōmoda. aliquando enim ut astring-
gendo & colligendo laxiorem particularum substantiam illis robur
addamus, & interdum ut reprimamus influentes humores, ad hoc
autē opus ea præsertim idonea sunt, quæ constant illis simplicibus,
quæ astringentis facultatis non sint expertia, aliquando vero, ut
crassos

crassos lentosque humores attenuemus & digeramus: siqui sint in Ventriculo, aut intestinis, aut in aliis communibus uis atque ita subinde obstructions aperiamus, cui muneri opportuna sunt, quæ medicamentis calidis & tenuis substantiæ confecta sunt: Vnde sæpissime hæc eadē uim etiā status discutiendi, dissipandi; retinent; sed magis particulatim agamus, & sumamus exordiū à facilioribus, & illis quæ potius aliquam refrigerandi facultatē habent, & ita ad temperatiora progredientes, ad calidiora tandē peruenimus. quia verò duo medicamenta histēporibus sunt in frequentissimo usu: alterum quidē, quod maxime cōmodū est in calidioribus affectibus naturalium viscerū præsertim verò ventriculi & iocinoris, quamuis nec parum utile esse possit cordi intemperie calida laboranti & hoc diatrion santalon in præsentia a plerisque solet nuncupari, quamuis etiā triasantali vulgo dicatur, accepta nuncupatione, a triplici santalorū genere. Vnde maiori ex parte cōficitur. Alterū uero, quod affectibus gutturis faucium asperæ arteriæ, & harū partium asperitatibus maxime conducit, atque a tragacantha: quod simplex præcipuū ferē est in hac confectiōe, nomen sortitum est, diatraga canthū enim dicitur. sed de priori primū, mox de hoc etiā instituemus sermonē. Accipit itaque primū triū generū santalorū nēpe alborū rubeorum & luteorum, itemque rosarum aridarum Zacchari singulorum dragmas sex, rhabarbari, spodij, succi radices dulcis, seminis portulacæ, singulorū dragmas. iij. s. amyli, gummi arabici, tragacanthæ, seminum melonis, cucumeris, melonis indi, anguriæ vulgo dictæ, cucurbitæ, scariolæ singulorū dragmas tres, canphorę scropulos duos. His autem commixtis & tritis duplex deinde est modus confectiōis, primus quidē quē veteres magis consuevere, & a Nicolao a quo accipere omnes ferē posteriores describitur. ille enim omnia medicamenta esse assumenda ex syrupo rosaceo ea copia, quæ possit esse satis ad dandam illi formam eclegmatis vel ut aiunt, electuarii: Nunc tamen passim in solidiori compage factis placentulis vel rotulis hanc confectiōem parant. accipiunt enim Zaccharum, atque aqua macerante præsertim verò rosacea donec. diluatur dissoluaturque, postea in vase consueto, quo coqui solent. id genus medicamenta decoquunt quantum satis sit. postremo additis pulueribus probe commiscent, & facta probē commistiōne effundunt atque effingunt rotulas seu placentulas, est verò hæc forma magis in usu, quia illa magis grata est egrotantibus, nec

enim ita uidetur spectantibus habere medicamentosam effigiem, & assumentibus gustu etiam gustu est. Maxime verò, ut diximus, affectibus calidioribus iocinoris ventriculique & cordis, quibus præ laxitate substantiæ accidit imbecillitas. vtile etiam est medicamentum istis visceribus, & præterea capiti dolentibus, præsertim verò, vbi ab iliosa materia pependit dolor, habent enim vim refrigerandi non exiguam. nam fantali, rosæ ad secundum refrigerantium ordinem accedunt. quamuis non defuerint iuniores, qui in dubium reuocauerint an fantali refrigerent nec ne: quia tamen alij quicunque auctores eorum notitiam habuere, (nam Græcis antiquioribus hoc genus medicamenti videtur fuisse ignotum) in hanc sententiam descendere eos frigidis facultate esse, & quicunque eis usi sunt tanquam refrigerantibus usi sunt. præterea verò, ut Auic. in suo libello de viribus cordis testatus est, aliquam astringentem habet, qua laxa viscera colligere & roborare possunt, præter id, quod ut ait idem Auic. cui & alij Arabes subscribunt, spirant odorem quasi aromaticum, quo spiritus omnes imprimis reficiuntur, & roborantur. Vnde roborata omni ferè ratione membra, non facile de fluentes excrementosos humores: præsertim vero biliosos admittunt: in hoc etiam adiuuat rhabarbarum, quod præter vim roborandi præcipue verò uentriculum & iecur, quam habet astringendo, tenui etiam sua substantia & calida potest, siquid iam defluerit, partim digerere, partim quoquomodo inferius ad intestina ducendo: ea qua præditum est facultate leuiter aluum soluendi, deriuare influentes biliosos humores. sed semen portulacæ refrigerat & ipsum sicut portulaca cum aliqua astringente: unde omnes affirmant, portulacam plurimum prodesse posse æstuanti ventriculo, & aliis visceribus, semina vero illa quæ maiora frigida, a nostris medicis appellantur, quod refrigerent, omnibus inconfesso est. Sed & ipsa cum soleant ad vias urinæ fluentes humores mouere, aliquam etiam rationem deriuandi habent. At verò quia biliosus humor præter caliditatem, potest sua acrimonia uehementiores in visceribus excitare dolores, pungendo mordendoque, & quasi exasperare: ideo iure merito ille, qui, istius confectio nis primus auctor extitit, huic incommodo prospiciens, prioribus medicamentis addidit amyllum, succum radices dulcis, gummi,

traga-

tragacanthum, quorum facultas ea est ut appianare & demulcere possint omnem asperitatem, & omnem acrimoniam obtundere, hebetareque & morsum demulcere. cāphora verò & refrigerat, & spiritibus familiaris est. quę autem vis sit Zaccharo nempe leniendi detergendique: in qualitatibus verò actiuis ferè ad temperiē uergens præter id, quod bonum & gratum saporem gustui conciliat, omnibus ferè notū est. Quid autē p̄terea habere possit; si ex syrupo rosaceo, assumpti sint pulueres, & in modum electuarij deducti, facile sponte sua ille percipere poterit, qui ea quod rosaceo syrupo superius literis tradita sunt, in memoriam reuocauerit. Sed ad diatragacanthum conuertamus sermonem nostrum, quod item à Nicolao propositum & descriptum habemus, & his temporibus in frequētissimo v̄lu est, atq; ubique apud seplasiarios paratū reperi ri p̄ōt. & quāuis si spectare uellemus ad modū, quo hoc medicamēto vti solemus, & debemus, & ad eius officiū, magis pertinere fortasse alicui videretur ad seriem eorum medicamētorum, quę eclegmata, à Græcis, ab Arabibus verò & iunioribus nostris: qui eos sequuti sunt, lothi dicuntur. quod medicamentorum genus in affectibus præcipue membrorum, quę respirationi famulantur in v̄lu est: maxime enim possunt dum paulatim frequenterque delinquantur: facilius siquidem, dum paulatim & iugiter per gulam ferūtus delincta, aliquid ad asperam arteriam quasi absortum transfluit, ac ita ad pulmones & thoracem defertur, nam alioquin: quando confertim in ventriculum confluunt, in veloci illo transitu, nihil, quod insigne sit, ad internas thoracis partes permeare potest. quod si de inde morandū postea tantisper est, donec medicamentum per venas digestum pertingat ad affectum in thorace locum, adeo longa est via, p̄r quam illi transeundum est, vt interim ita transmutetur in itinere ab ipsis particulis, quod non multas vires possit seruare cum eo perucnerit. Vnde quamuis conficiatur medicamentum hoc de quo sermonem in præsentia instituimus forma & compage solidiori, & duriori perinde, vt alia medicamenta quę vulgo confectiōnes dici solent, non tamen ita manditur, & deuoratur vt illa: sed diutius in ore uel sub lingua detinetur, donec à saliuā molitum liquefeat, paulatimque quasi delinctum defluat, ut eclegmata. Nos tamen secuti potius formam & substantiæ modum in hunc ordinem illum retulimus: eius uero compositio in hunc modum se habet. • Accipit tragacanthæ uncias duas, gummi uncia

& præterea duas dragmas, amyli semunciam, radicis dulcis dragmas duas, seminum melopeponū, cucumeris, cucurbitæ singulorū autem dragmas duas, penidiarum unc. iij. camphoræ semicrupulum, syrupi violacei, quantum uideatur esse satis. superuacaneus autem labor esset si in exponenda hac huius medicamenti confectione, velim singulatin omnia simplicia quibus constat exponere cum de his omnibus sit superius habitus sermo, qui si in præsentia in memoriam reuocetur, facile percipi poterit, uires eas illius esse, ut possit refrigerare, leuigare exasperatas particulas; præsertim vero fauces, guttur, alperam arteriam, præterea etiam fluētium destillationum callidarum ac acritum acrimoniam reprimere, temperare, & delinire. utilis ergo præcipue, & in destillatione istius generis & tussi ab ea excitata, & quatenus ad hoc medicamentum pertinent hæc satis esse poterunt: Postea de eo, quod diocodium, quia ex papaueris capitibus conficiatur, a græcis dictum, est, quod nomen ab Arabibus, & Latinis quoque est receptum, pauca quædam verba faciamus. Est autem frigidius medicamentum priori ex tragacantho, & in quo ut maior est uis refrigerandi, ita, & sistendi subinde fluentes destillationes, & illas incrassandi, non est autem una eius forma vel confectionis modus, neque quatenus ad ea ex quibus conficitur, neque si ad modum substantiæ, uel compagis, ad quam dum id conficiunt redigitur respiciamus, nam antiqui qui dem præsertim verò Gal. illud simplicissimum plerumque conficere solebat in hunc modum, ut maceratis capitibus papaueris, quæ mediocris sint magnitudinis, & neque omnino uiridia & recentia, neque omnino arida, nā in aridis succus prorsus ferè deficcatus, & absumptus est: In uiridibus verò, ut 7. de com. med. secundū loc. docuit Gale. aqueus humor nimius, vires medicamenti languidiores reddit. maceranda autem sunt capita hæc numero decem, in sextario aquæ pluuiæ, uel fontanæ, hoc est in libris duabus, & semisse alterius per diem naturalem integram, moxque coquenda, & nonnulli quidem præscribunt cocturæ modum ex partibus aquæ per coctionem absumendi, nam alii ad tertiam, aquæ, quibus subscribit Mel. coquenda esse aiunt, alii plus minus ut. Gal. tamen eatenus esse coquenda ait, donec tenera, & flacida euadant, mox verò colanda & exprimendus est eorum succus uniuersus, utpote in quo sit uniuersa vis, quam requirimus. mox addito melle, aut sapa, ad eam mēsuram, ut decoctum horum capitum ad mel, uel ad sapam duplum sit,

fit, iterum coquitur, ad mellis uel syrupi consistentiam proinde ut syrupi coquuntur. hoc autē modo confectum medicamentum ali purum diacodion, ut Mes, appellant, alii simplicissimum, cuius facultas eximia est ad sistendas præcipites destillationes omnes, uim enim non modicam habet incrassandi, & refrigerandi, ut nemo nō nouit, cui natura eorum ex quibus conficitur nota sit. Quis uerō usus utilis est inter initia: siue tenuis & calida fuerit destillatio, seu frigida & crassior & si quispiam dicat, cum refrigeret & incrasset destillantem materiam, quomodo potest esse utilis eius usus, in frigida & crassa materia: dicinius, quod fluxiones præcipites & quæ conferim fluunt, non possunt esse admodum crassæ, nam crassæ succi non multum fluxiles & nobiles esse possunt, sed mox in loco in quem defluunt crassescunt, uel digestis tenuioribus illorum partibus uel alia ratione, & præterea lentescunt, & hoc spectantes præstantissimi medici: præsertim uero Gal. duplicem excogitarunt confectionis rationem, nempe quia aliquando ex melle: interdum ex sapa conficiunt: quādo fluxio frigidior & crassior est, ex melle cōponunt, quod calidius aliquanto est, & uim detergen di, ut alias sæpius diximus, & attenuandi habet, unde per facultatem caput pa paueris potest fluxionem intercipere: ex melle autem, defluxam iā materiam, maxime autem ad pulmones & thoracē, ubi mox crasse scit & lentescit, attenuando & digerendo parare ad facilem excretionem; in calidiori uerō tenuiori que destillatione, utilior est, si ex sapa cōficiatur, quippe quæ, neque calida ut mel sit, neque attenuet. sed & id aduertendum, quod si ea dumtaxat quæ hætenus exposita sunt in cōsiderationem admittantur, uideatur potius medicamentum hoc ad ordinem syruporum pertinere: Verum quia & alio modo in præsentia à seplasiarijs paratur, & in usum medicamentorum venit, nempe quod ex Zaccharo fieri solet est eo adeo excocto, ut concrelescens in placentulas, uel, ut aiunt, rotulas constringantur: per inde, ut alia medicamenta, quæ confectiones passim dicuntur, ob ideo eius tractationem in hunc locum distulimus, nam zaccharo, pro sapa uel melle utuntur, atque in hunc modum confectum medicamentum, facultate inter primum quod & melle conficitur medium est, & illud quod ex sapa, qua zaccharū minus attenuat & de terg it, quā mēl, magis autem quam sapa. Vnde propterea in præsentia eius ex zaccharo confecti usus est frequentiorū, cū neque in tenui, & calida, neque in frigida, & crassa adeo possit ledere ut aliæ

duar compositiones. sed in utrisque possit esse utilis, quamuis non ita efficax, in frigida ut prima, neque in tenuiori ut altera. præterea verò gustui hæc tertia gravior & suavior. cum verò propter vitia thoracis & pulmonum hoc medicamento utimur, eo ut diatrageantho & aliis id genus medicamentis utimur, nempe ut in ore diutius detentum & liquecens paulatim deglutiatur, ut delinctus vel eclegmata. Consuevere autem antiquiores medici, ut eodem se primo de comp. med. secundum loc. testatur Gal. huic medicamentum id additis melle vel sapa coquendo absoluunt, alia iniicere unde fiat efficax ad reprimendum sanguinem sputo vel vomitu reiectum ex aperta vel fracta vel erosa vena in spiritalibus partibus, vel etiam aliis visceribus. cuius additionis & Mes. meminit, iniiciunt autem astringentia, ut sunt acacia, hypocistis, crocus, alii præterea & thus & mirram. quidam, ut Mes. balauſtia, rubiam, & medicamentum quod ramich appellant Arabes. iniiciunt autem singulæ libræ huius medicamenti, horum singulorum, ut ait Mes. dragmam possemus. autem præsertim ubi ab acri & calida fluxione ortum habuisset sanguinis reiectio, nos armeniam bolum, vel lemniam terram, vel hæmatitæ lapidem, vel id genus multo alia iniicere. sed de hoc satis superque egimus. transeamus ad alias confectioes, quæ licet in aliquod frigus inclinent a temperamento tamè parum recedunt, primùmque ad illam, quæ a rosis nuncupatur. dicitur autem diarodō, cuius duplex reperitur descriptio: altera a Mes. litteris tradita: quæ cōmunē appellat. alia uero a Nicolao, quæ in Abbatis cuiusdam gratiam fuit cōposita, a quo & cognomen est sortita, vulgo. n. diarodō abbatis dicitur. & licet aliqui & illa cōmuni interdum utantur: altera tñ magis vulgata est, & in maiori vsu. quæ differunt, quod prior aliquāto videtur frigidior, abbatis verò, tēperatior, quamuis non sit insignis inter ipsas differentia: constat autem prior cōmunis ex dragmis xxx. foliorum rosarum aridarum, trocisco rum verò diarodon, quorum cōpositio superius exposita fuit, trociscorum itē ex spodio: præterea & radicis dulcis singulorum dragmis quatuor, Gariophilorum, galie moschatæ trium, santalorum, singulorum uero dragmis tribus. spodij, croci, mastices, ligni aloes: singulorum dragmis duabus. Asari, spicæ idē, maceris cardamomi. s. portulacæ lactucæ, scariolæ, cucumeris, cucurbitæ, Melonis, citruli, margaritarum, Alſehen gesnich ozimum interpretantur, rasuræ eboris, dragacathi, gummi arabici singulorum dragma, camphoræ sexquidragma,

ma, moschi vero, semis scrupulo: materia confectionis est syrupus, qui fit ex aqua rosacea & zaccharo: unde patet quod Mes. conficiebat in fornâ & compage antidoti, uel, ut nunc aiunt, electuarii, sicuti & suum Nicolaus, cuius compositio in hunc modum se habet, ut accipiantur santalorum alborum, rubeorumque, singulorum uerò dragmæ binæ, ac semis, tragacanthi, gummi Arabici, spodii, singulorum. ʒ. ij. Asari, spicæ, mastiches, cardamomi, croci, ligni aloes, cariophylorum, galigæ moschata, anisorum, fœniculi, cinamomi, succi liquiritiæ, rhabarbari. Sem. basiliconis, berberis, scariolæ, portulacæ, maluæ, lactucæ, papaueris albi, cotoneorum, citrulli, mello nis, cucumeris, cucurbitæ, singulorum scrupulum, margaritarum, olis ex corde cerui semis scrupulum. Zachari candidi, foliorum rosarum singulorum vnciam, & præterea dragmas tres. materia uerò qua assumenda & commiscenda sunt omnia itidem in hac confectione est syrupus ex zaccharo & aqua rosacea; ut ad formam uel compagem antidoti deducatur. His tamen temporibus syrupo ulterius excocto confingunt placentulas, uel rotulas, aut etiam morsus, uel, ut uulgo loqui seplasiarii solent, morsellas. Quamuis autem nunc in frequentiori usu sit diarodon, quod abbatibus appellant, quia tamen uiribus & natura utrunque proximum est: ideo de utroque una & eadem tractatione, & ea quidem breui sermonem habebimus, si ea omnia simplicia, quæ in his duobus medicamentis accipiantur, primum seorsim examinauerimus, ac eadē mox simul mutuoque conferamus, facile percipiemus, ea quæ refrigerant copia & numero alia vincere, quamuis non multo interuallo, & propterea uniuersum medicamentum refrigerabit quidem, ut tamen non insignis admodum sequatur inde refrigeratio sed modesta: cum uerò ex diuersis simplicibus constet & illis natura, & facultate differentibus: ipsum quoque non simplices: sed potius multiplices vires, quibus laborantibus visceribus præsidio esse potest, retinebit. nam ex multis calidis constat, quæ tenuis substantiæ & tenuium partium sunt: quæque illi facultatem impartiri possunt attenuandi, digerendi crassos succos, desiccandi excrementitium humorem, qui laxando languida reddit viscera: præterea uerò aperiendi eorum obstructions, multa et insunt quæ cum uim satis insignē hēant, cūciendi lotia, earōne possunt educere reliquias uiciosorum humorū: si quæ iam inclinantis morbis reliqua sint. sunt quoque multa astringentia

Victoris Trincauelij

gentia, quæ possunt astringendo & colligendo laxiorum & languidorum viscerum substantiam, illis robur addere: præterea verò, cū nullam habeat ingratam qualitatem, non odorem, non saporem, nō quidpiam aliud quod fastidium possit assumentibus asserre: maxime commodum medicamentum est conualescentibus: præsertim fastiditis iam à præcedentibus medicamentis tam purgātibus, quā alterius generis, quæ ingrata admodum sunt: vnde vtile est ad finiēdas reliquias morborum, præsertim calidorum: cum possit, siquid relictum sit intemperaturæ calidæ in visceribus tanquam fomentū quoddam præcedentis morbi: illud paulatim tollere, reliquias obstructionum auferre, roborare languidiora viscera, præsertim verò ventriculū, & iecur: quamuis & capiti non sit futurum inatile & cordi, cum multa recipiat, quæ illi commoda sunt, quæque eius spiritus quoquo modo fouere possunt. nolumus autem omnia simplicia singulatim exponere ne nimis longi in hac tractatione simus: maxime cum de illorum pluribus abundè antea egerimus: reliquorum verò vires facultatesque lucidè à Gal. Dioscor. & aliis fuerint explanatæ: modus verò eo vtendi idem omnino est, qui & aliorum id genus antidotorum. nempe vt inani & ieiuno ventriculo accipiatur ita, ut ante ingestum cibum possint à natura deduci in actū. Alias antidotos exponendas alterius naturæ, & temperaturæ, nempe calidæ aggrediamur, & sicut priores maxime opportune sunt ad tollendas calidas intemperaturas, commodèque sunt in calidioribus affectibus, calidisque temporibus & regionibus: ita hæc contra valent ad corrigenda vitia quæ ortum habuere à frigida intemperatura. in frigidis tempestatibus. calefaciunt enim attenuant et digerunt reliquias frigidi & pituitosi excrementi: præsertim verò ventriculo & reliquis visceribus insidentis, & flatus insigniter discutiunt, nam & multis aromatibus constant, & aliis præterea medicamentis, quæ caliditatem habent fundatam in parium tenuitate. Sed eorum etiam pleraque multa recipiunt, quæ astrictio ne nequaquam carent, & proinde possunt colligendo laxiora & languidiora viscera, illis robur impartiri. incipiemus autem ab temperatiori in hoc ordine, quod aromaticum rosaceum nuncupauit Mesue, nuncupatione deducta tum à rosis, quarum aliorum comparatione insignem copiam accipit, tum vero à multis aromatibus et quibus conficitur. nisi quis dicat ab aromatico odore quem spirat, esse in hunc modum uocatum: sed quomodocunque se res habeat parum,

parum refert. ex multis descriptionibus quas Mes. retulit, ea solum in usu est, quam ipse in Gabrielem auctorem refert: constat uero his. accipit aridarum rosarum drag. xv. radice dulcis dra. vij. agallochi siue ut nostri loquuntur, ligni Aloes, santalorum citri norum, singulorum drag. iij. cinamomi electi, drag. v. maceris, Garryophilorum singulorum drag. ii. s. gummi Arabici, dragacanthi singulorum drag. ij. & 3. ij. nucis molchatę, cardamomi, galangę singulorum drag. j. spicę 3. ij. moschi 3. i. anbrę, 3. ij. materia uero qua hæc omnia in puluerem redacta post concoctionem in formã antidoti vel electuarii, assumuntur, sunt syrupus roseus, & qui ex corticibus citri conficitur pari nempe copia: quamuis in frequentiori usu in præsentia sit, ut ad solidiorem formam redactum in placentulas vel rotulas confingatur in hoc sanè istius medicamenti cõpositione: quàmuis rosarum sit præ cæteris maior copia, tamen præcipuum simplex, & id quod quasi ut iuniores dicere solēt, basis est, cinamomum, rosę uero ea copia accipiuntur, ut medicamentorum aliorum: præsertim aromatum insignis calor temperetur, scopus siquidem auctoris erat medicamentum conficere, quod à temperie non multo recederet interuallo. numerus autem & copia aromatu, & eorundem vis aliorum comparatione maior quæ calore & partium tenuitate possunt rarefaciendo laxare substantiam viscerum, quàmuis eorum nonnulla alicuius astringtionis non sint expertia, ea tamen satis modica est, & propterea rosę & santali præter id, quod aliorum caliditatem temperant, astringtionem etiam addunt, qua potest etiam robur particulis conciliari, sicuti radix dulcis satis copiosa additur, quę potest exasperatas particulas ab exsiccantibus insigniter & astringentibus medicamentis mitigare & delinire, acrimoniamque; si qua sit calidorum medicamentorum, demulcere, cui auxilio esse potest gummi & tragacanthum, præcipuam tamen vim ut diximus à cinamomo habet, quod ut 8. de comp. med. secundum loc. testatur Gal. cum calidum sit in tertio calefacientium ordine: sit etiam tenuissimarum partium, potest aperire obstructions: si quę in ventre sint, crassos quoque & lentos humores visceribus hærentes attenuare & extergere, præterea uero, cum eam facultatem habeat, ut uitiatos humores corrigat, ac transmutet uitiatas qualitates in id quod secundum naturam se habet: præsertim uero putrefactiones humorum emendat, & uitia non modo seorsum aliorum quę, uerum & uenenosis qualitatibus resistit, quod & reliqua aromata,

Victoris Trincavellij

aron sta, quæ à cinamomo, vt ibidem ait Gal. non plurimum dissidentis naturæ sunt, non parum iuuant. Merito itaque videtur Mef. hoc medicamentum tot laudibus extulisse: nempe quòd ventriculū, ac viscera nimio humore madida & deficientia roboret, & firmat. cum possit serosos humores in eis absortos rescicare, crassos, & lentos attenuare, & detergere, flatūs ea extendentes discutere, languescētes natiūm calorem fouere, & putredinem in eisdem corrigere. est autem præsertim in conualescentibus valde vtile medicamentum, ad viscera frigidiora & laxiora ex diuturnis morbis reddita, & reliquias vitiosorum humorum tollendas aut corrigendas: Describit mox idem Mef. & alia medicamenta, quæ itidem aromatica nuncupat, vt moschatum, caryophylatum, nardinum, quæ, quia in nullo vsu sunt nostris temporibus: ideo in illis nō immorabimur. Non parum autem calidiora medicamenta sunt quæ dycymimon, quæque diagalanga dicuntur, vt pote quæ ex omnibus constant, quæ calida sint insigniter, nullumque simplex admittant, vnde possit horum calor remitti temperariue. cōficitur autem diacyminō ex his: nempe ex cumini prius macerati ex aceto ac postea exiccati dragma. Zingiberis verò cinamomique singulorum dragmis quatuor, garyophilorum, ligni Aloes, maceris, singulorum drag. ij. s. galangæ, piperis longi, cardamomi: singulorum drag. ij. moschi ꝑj. conficitur autem medicamentum ex præscriptione Mesue ex despumato melle ea copia, quæ satis sit. conficiebat enim & redigebat ad formam & compagē antidoti, seu vt Arabes dicūt, electuarii. his tamen temporibus plerique ex zaccharo medicamentū hoc perinde vt ea etiam quæ hæctenus à nobis exposita sunt, parāt confictis ex eo placentulis vel rotulis eadem nempe ratione. inanis autem labor esset: si singillatim simplicia vellemus examinare expositis eorum facultatibus, cum ea omnibus sanè perspicua sint. Sed omnia satis erit in uniuersum complecti. cummino enim excepto, quod calidum in tertio ordine & partium admodum tenuium, quarum tenuitati addit ex aceto maceratio, siccum etiam insigniter est, quodque ad attenuandos & discutandos flatūs crassiores & contumaces validum est medicamentū, reliqua omnia in genere aromatum quæ & calida insigniter sunt & tenuium partium, vnde vnusquisque vel non admodum etiam in hac arte instructus poterit indicare medicamentum hoc efficax non parum esse ad superandas & corrigendas frigidiores ventriculi

culi & aliorum viscerum maiores intempercturas: exiccandosque
 serofos humores absortos in substantia viscerum, eosque omnino
 absorbendos & sub inde madorem viscerum vnde languida & laxa
 fiut tollendum ad attenuandos detergendosque crassos & lentos
 herentes visceribus humores, flatusque crassos & contumaces di-
 scutiendos, vnde & non parum concoctioni fauere poterit. Neque
 præterea ab hoc & aliud medicamentum, quod ex galanga vel dia-
 galanga vulgo nuncupatur, viribus diuersum est, quodque acci-
 pit galangæ, & ligni Aloes singulorum drag. vj. garyophylorum,
 maceris, cardamomi maioris, singulorum dragm. ij. zingi-
 eris, piperis tum longi, tum albi, cinamomi drag. j. s. cala-
 menti aridi, menthæ item aridæ, ligustici, spicæ, seminum
 fœniculi, caros, anisi: singulorum dragmam, calami odo-
 rati scsq. dragmam, zachari albi drag. x. conficitur ex melle de-
 spumato ea copia quæ sit satis. Sed in præsentia ex hoc etiam me-
 dicamento mutato melle in zacharum rotulas vel placentulas con-
 ficiunt; sicuti & ex priori: cum quo si conferatur, non est omnino
 æque calidum vt illud. nam si aliud non esset dragm. decem zaccha-
 ri cum aliis medicamentis permistæ præter mel vel zacharum quod
 tanquam materia est qua fit medicamentum ex aqua concoquen-
 dum, aliquantulum potest aliorum calorem remittere, cum ipsam
 in calore parum admodum mediam teinperiem excedat, & vt alia
 præteream, quæ vtrique cõmunia sunt, & ualdè calida minime sunt,
 vt macer si Gal. credimus, & lignum Aloes, calamus aromaticus
 non multum calefacit. magis hoc ipsum medicamentum præterea
 aliquanto astringit, nã spica & menta maceri addito & reliquis, quæ
 vtrique medicamento communia sunt quæque astringendi faculta-
 te non carent, aliquanto hoc altero astringentius redit. cum verò
 omnia quibus conficitur tenui consistant substantia tenuioribusque
 partibus: ideo perinde hoc sicut & alterum licet aliquanto mi-
 nuse calefaciat, extenuat tamen & detergit crassos & lentos
 succos, eosque ad vrinæ vias facile deducere potest: præte-
 rea vero serosam humiditatem, qua uentriculus & iecur re-
 liquaque viscera madida & laxa languescunt, desiccare, acil-
 lis astringendo aliquod robur addere, flatulentum etiam, &
 crassum spiritum omnia viscera infestantem dissipare, con-
 coctionem illorum à frigore & laxitate factam imbecillio-
 rem adiuuare, sed & muliebres menses valide satis ciere. Vnde

his

his temporibus in frequenti vſu vel obſtetricibus etiam eſt in pueris, quæ à ſtatu vel vitioſis halitibus ab vtero ob modice fluentia puerperia male habent, & interdum ſtrâgulâtur. prodeſſe quoque non parum eadem ratione ſolet hyſtericis mulieribus, quæ ex vtero pariter ob ſuppreſſos uenſes ſtrangulantur. Sed de his ſatis, ad alia accedamus. Conſimilis ferè naturæ & facultatis eſt medicamentum, quod diambra Meſue & reliqui poſteriores appellarunt, quod & ipſum vniuerſum ferè ex aromatibus conſectum eſt; accipit enim cinamomi, doronici, Garyophilorum, maceris, nucis moſcathæ, folii, galangæ, ſingulorum drag. iiii. ſpicæ, cardamomi maioris, & minoris, zingiberis, ſingulorum drag. i. ſ. ſantalorum luteorum, ligni aloes, pipetis longi, ſingulorum drag. ij. ambræ aureum. j. moſchi drag. ſ. conſcitur ex ſyrupo roſaceo & aqua roſacea. Aliquantisper minus calidum, mea quidâ ſententia, eſt ambebus prioribus, nam & ſantali & ſyrupus roſaccus & aqua roſacea poſſunt nonnihil aliorum ſimplicium calorē remiſſiorem reddere. Sed minus etiam aliquanto poterit menſes muliebres ciere, & vrinam. nâ calamentum cyminumq; potentia ſunt medicamenta ad euocanda menſtrua & lotia, quæ in diagalanga adiuuant, ſemina aniſi, ſcæniculi, & caros. Sed ob eximium præterea odorem moſchi & ambræ, quæ copioſa accipiuntur in hoc medicamento multę mulieres, quę hyſtericis ſtrangulatibus obnoxie ſunt, non facile illud ferre poſſunt. mouetur liquidem ſtatim vterus ab inſigni odore ſurſum, & ſæpe eas ſtrangulat. nam odore prius percipitur & quali momento quàm reliqua deuorata in ventriculo ad actum deducta conferre poſſint, alioquin autē eas omnes laudes meretur medicamentum, quas illi Meſ. tribuit, tam cordi, capiti, ventriculo & reliquis viſceribus: ſi ob frigidiorem intemperiem langueant, præſidio eſſe poſteſt, ſi quæ à craſſis, frigidis quę vaporibus vel alioquin vitioſis offendantur, aut à reliquiis craſſorum & frigidorum humorum pituitoſorum vel melancholicorum infeſtentur, atque ita illis digeſtis, poteſt ad hillaritatem vel lætitiā conferre: præter id, quod ſuaui & grato odore fouet & dilatat ſpiritus omnes. Dubitaret tamen quiſpiam fortasſe propterea quod inter laudes omnium ferè harū antidotum & hæc recenſetur, nempe quod caput firment & roborent: cum tamen ex aromatibus maxima ex parte conſciantur, quæ hac ratione in aphoriſmis damnantur, quod capiti granitatem afferunt. Mihi Meſ. in capite de dolore capitis frigidus optime ſenſiſſe videtur.

videtur, & probe rem hanc tenuisse. sententiam enim Hipp. esse limitandam ait duabus conditionibus, atque ita intelligendam, quod aromatum usus immodicus, ac dum corpus plenum est excrementis nocet & caput grauat, utpote quia & ipsa calidiore suo uapore sursum lata possint caput implere, & præterea aliis etiam excrementis digestis & rarefactis in vaporosam substantiam occasione sunt cur subinde in caput ferantur. sed modestus horum usus: præsertim ex inanito, p̄bè prius corpore, roborare cerebrū pōt: correcta nimirū eius frigida: si qua adsit intemperies, & digestis vitiosis uaporibus & humorum reliquiis quibus occupabatur. Omnium vero horum medicamentorum antiquissimum & ab antiquioribus medicis, præsertim verò à Gal. laudatum est id, quod diatrion pepereon, eo quod ex tribus piperū gñibus conficiatur maiori ex parte; dicitur id autem 4. de tnen. san. conficere docuit Gal. quem alii quidem posteriores imitari uoluerunt, non tamen exquisitè, quia longe fuit simplicior Galeni compositio. alii verò plura addidere prout unicuique visum est magis expedire. nam & Gal. interdum illud simplicius parabat paucioribus sanè simplicibus acceptis, interdum pluribus simplicissimum conficiebat, acceptis trium piperum singulorum sanè dragmis quinquaginta, anisi autem, thymiq; singulorum dragmas viij. illis mox cōmixtis & tritis, aliquando addebat, & zingiberis dragmas item octo, & hoc minus simplex dicebat, & adhuc minus, quando aliorum pondus præter pipera duplicabatur, & singulorum illorum acciperentur drag. xvj. Arabes autem plura addere, uariato etiam aliquatenus priorum pondere, nam Mesita cōficit, ut accipiantur trium piperum: singulorum drag. v. zingiberis, anisi, thymi: singulorum drag. ij. spicæ, amomi singulorum drag. j. casia. s. sileris, asari, enulæ aridæ singulorum drag. s. conficit autem ex despumato melle. Nicolaus verò adhuc plura addit, ego tamen uti soleo hoc medicamento ex præscripto Gal. nam neque uideo cur tot additis sit opus: cum ita simplicius possit uentriculo cruditatibus laboranti succurrere, pituitosos crassos lentosque succos extenuare, detergere, eorumque concoctionem & digestionem iuuare, flatusque uentriculo & uentri uniuerso molestos dissipare, uiscera quæque uniuersa refrigerata calefacere, unde & hac etiam de causa acida eruētibus utile est medicamentum: si quis uero cuperet & hoc percipere, quænam esset istius medicamenti differentia, quando simplicius in usum uenit: nempe citra zingiber, & quādo

do illo addito, tum ex aliis locis, tum præterea ex lib. de simp. med. facul. id percipiat. nam cum medicamentum hoc ex simplicibus omnibus confectum sit; quæ insigniter calida sunt, ea tamen adeo tenui substantia constant & partibus tenuibus, ut neque ob id multum possint impressionem facere & valide calefacere: præsertim verò loca quæ remotiora sunt, cito. n. digeruntur partes illæ in quibus fundatur vis calefaciendi. unde si ad refrigeratum ventriculum, aut ad illum in quo collecta sit materia, quæ præ lentore & crassitie non sit admodum digestionem & attenuationem contumax, satis erit simplicius illud. Item etiam si cauendum sit, ne iecur alioquin calidum à medicamento magis excalefiat, nam calor ante dissolvitur, quam ad remotiores partes pertingere possit: sed si maiori & diuturniori egeamus impressione & calefactione, zingiber addemus. cum enim id sit non omnino partium ita tenuium, ut ibi exposuit Gal. sed aliquanto crassiorum, possunt illæ diutius seruatæ calore, quæ tamen non æque cito ut piper statim ab initio ostendunt, in causa esse, ut magis imprimatur medicamento calor & ad remotiora interim loca pertingere. at hoc longe etiam magis, si duplicetur pondus eorum simplicium quæ piperibus addita sunt. Sed neque prætermittendum est, cuius item Gal. 4. de tuen. san. meminit, & non parum facit ad præsens institutum, quod circa usum medicamentorum versatur, nempe qui modus conficiendi medicamenta non parum momenti ad uariandam rationem virium & operationum illorum, & ut alia prætereamus hoc duntaxat exponemus, quod ad contritionem & tusionem aridorum simplicium pertinet. quæ antequam ex melle vel alia materia assumantur, conteri & in puluerem redigi solent. nam interdum minutissime trita & tenui cribro excussa accipiuntur, interdum verò crassius illud fit & in crassiora frustra. primus terendi modus congruentior est illis medicamentis, quæ operæ precium est ut in tenuiores uenas: sicut uenę iocinoris sunt, & in remotiora loca, & tandem in habitum uniuersi corporis digerantur: quemadmodum maxime sequens medicamentum, quod diacalamentum nuncupatur, requirit, ut paulopost sumus dicturi. Diatrion pipereon autem aliquando quidem melius habebit: si lenius & crassius fuerit contritum, sicuti quando propter affectum proprium uentriculi, & primarum venarum illi atinentium illud conficimus, & cauendum putamus, ne illius vis ulterius ad iecur usque pertingat, nam crassiores partes, cum non possint facile penetrare

netrare

netrare in penitioribus locis diutius uentriculi immorantes, magis illum afficiat. quod si præterea cuperemus, ut esset commune medicamentum, & alijs quoque uisceribus utile, in tenuiorem puluerem essent conterenda simplicia ea medicamenta, ob id neque mihi probaretur alioquin quorundam sententia qui in vniuersum pronuntiarunt, semper medicamentum hoc esse conficiendum simplicibus crassiori modo, non autem exquisitè contusis. quibus Auic. 5. can. fauere visus est, quia ab hac sententia videtur Gal. 4. de san. tuen. dissentire, qui modum exponens, quo conficiendum sit medicamentum hoc præcipit, omnia simul tundenda esse ac per tenue cribrum transmittenda. Triplex autem modus esse potest usus istius medicamenti, nam & ex melle despumato, ut reliqua quæ ab Arabibus & nostris iunioribus electuaria dicuntur, & ex saccharo confectis placentulis vel rotulis. præterea vero possumus solis uti pulueribus inspersis ferculis, ut aromata nunc passim inspergi solent, aut illis ex aliquo liquore epotis, neque enim ingrati odoris aut gustus est præter acrem saporem, qui aromatum est proprius. Hæc autem itidem à Gal. de diaspolitico antiquitus appellato medicamento eodem 4. & 6. de tuen. san. litteris tradita sunt. de quo etiam postquam eius incidit mentio, pauca quædam dicemus cum facultatibus plurimum simile sit huic nuper exposito, & alijs etiam prioribus: si simplicia, quæ in eius confectioe accipiuntur recte fuerint examinata. constat enim ex quatuor simplicibus, quæ omnia calida & partium tenuium sunt, præsertim verò cuminum, quod in hoc etiam medicamento prius in aceto ut in diacymino diximus, macerandum est. piper etiam, quod aut longum, aut album accipiendum esse Gal. voluit, quamuis iuniores tantum longi meminerint, & rutæ folia, quæ accipienda esse consulit, neque omnino arida, neque viridia, nam arida nimis calida & acrida euadunt, viridia vero, excrementitiam quandam humiditatem habent, quæ flatuum discussione impedi-mento nonnihil est. nitrum præterea, quod quamuis non eam in partibus tenuitatem habeat, quam tria priora, habent tamen maiorem vim dissecandi ac extergendi crassos & lentos succos uentriculo & intestinis hærentes: unde non parum iuuat alui deiectiones: quo deinde fit, ut Gal. consuluerit medicamentum hoc dupliciter confici, nepe aliquando ut nitrū pari cum alijs potere iniiciatur, tunc præsertim utile futurum, cum alius fuerit astrictior nec probe deiciat

excitabitur enim a nitro copiosiori in quo est vis absterforia facis insignis, aliquando verò, vt nitri dimidium pondus aliorum apponatur, cuius vilior usus futurus est, quando fluidior aluus fuerit. In vniuersum autem medicamentum uim habet estenuandi pituitam crassam & lentam ventriculo & intestinis herentem, crassiorē statim discutiendi, dissipandique, aluum etiam moleste citandi, unde utile admodum medicamentum erit ad tollendos dolores a flatu in uentriculo & inferiori uentre cōcitatos: maxime vero senibus congruens erit, quod & tutum & facile est, id quod modus utendi quem præscribit Gal. potest ostendere: nā & ex melle ut antidoti reliquæ, cōfici potest, & ex zaccharo in placentulis vt reliquæ, quæ cōfectiones vulgo dicuntur. potest etiā puluis ita citra zaccharum uel mel, tãquā inspersile medicamentū seruari ferculis inspergendum. nam utile fore medicamentū dixit Gal. siue in cibis immittū fuerit assumptū, siue ante cibū, siue a cibo, nihil. n. habet quod possit concoquentē uentriculū interturbare & impedire. Antequā aut ad aliā rationē antidoterū sermonē conuertamus, pauca quædā prius & de diacalamentho dicamus, quod & ipsum, non modo ad morbos depellendos utile censetur, sicut & illæ de quibus hætenus habitus est sermo, verum & ad tuendam sanitatem: Vnde & eius longā sanæ mentionem, sicut & dediatrion pipercon & diospoli in non 4. de tuen. san. facit. & quamuis in cōmuni usu in præsentia sit ut medicamentū a nostris pharmacopolis cōficiatur, vt Mes. describit, & ea descriptio nō nihil in simplicibus a Gal. descriptione uaria sit: nā ille zingiberis duplicis calamenti nēpe fluuiatilis, quod & mentastrum dicitur & montani, quod absolute calamentū a Græcis, a Latinis verò nepita dicebatur. Gal. tamen istius tantum meminit. maior tamen est diuersitas in pondere simplicium. nam Gal. duos tantum ordines describit. in primo sunt calaminthū. petroselinum, siliū vel fefeli, pulegium, quorum singulorum accipiuntur drag. xij. in altero autē semen apij, & cacumina thymi, quorum utrorūq; accipiuntur drag. ij. his adduntur lybistici drag. xvi. piperis autem drag. xxx. viij. quæ omnia exquisitè tusa & tenui excussa cribro assumenda sunt melle probe despumato. quia tamen Mes. proficitur se Gal. in huius medicamenti cōfectione sequi: ideo cōficiendū putarem potius vt præscripsit Gal. neque tamen multum referre existimo, siue hoc, siue illo paretur modo. Porro medicamentum insigniter calefacit, crassosque quosunque humores

Cap. 6.

secare

secare & attenuare potest, digerereque flatus crassos & difficiles circa naturalia membra concitatos dissipare, ventriculo crudiori & reliquis uisceribus & intemperie frigidiori infirmioribus succurre re, si quod aliud medicamentum, hoc autem præcipuum & eximiū habet, ut præ aliis faciat ad digestionem & penetrationem alimenti in omnes partes & uniuersum corporis habitum. Neque tamen propterea quod tot laudibus illum auctores ferè omnes extollant, putandum uile fore: si eo promiscue & incaute fuerimus usi. utpote si inter initia morborum quando corpus & præsertim viscera & primæ uenæ scatent undique crudis crassisque excrementis, nam cum validum sit medicamentum, poterit ea excrementa ab eius uiliquata digerere in angustas uenas, & tandem in habitum uniuersi corporis: Vnde aut excitantur, aut maiores & difficiliores fient obstructions. plerumque ergo post commode expurgandum corpus, aptus & congruus erit eius usus. In his autem medicamentis, unde speramus facilem distributionem digestionemque in uenas & habitum corporis, consuluit Gal. ut exquisitius tundantur, & tenuiori cribro excutiantur, cuius præsertim in expositione istius medicamenti meminit. Mes. vero ait, quod eius usus, non modo interius assumpti & deuorati, quo modo hactenus explanauimus, sit futurus uilis: verum & si exterius dorso præsertim spinæ, illinatur, vel in modum cataplasmatum apponatur, maximopere enim potest febrium frigora rigoresue tollere, aut mitigare. est & alia antidotus diacalamentis quam Nicolaus descripsit, quam legere potestis tum apud Nicolaum Myrepsi Græcum, tum apud eundem Latinum. Sed in his satis uersati sumus, & tempus iam opportunum esset, ut ad aliud antidotum genus accederemus: nisi quis dicat nos prætermisisse celebratissimā antidotum, quæ in languescentibus uisceribus quando contracto malo habitu instat iam timor aquæ inter cutem, ea uerò est, quæ cyphoides a Græcis: ut a Gal. Andromacho & aliis his posterioribus nuncupata: a iunioribus autem nostris, electuarium de uino vel de passulis. sed cum adeo fuerit examinata & explanata eius confectio à Gal. 8. de comp. med. secundum loc. diligenter & exquisitè, putauimus nos nullum operæ precium facturos: si illis eisdem iterum a nobis, & forsitan ineptius repetitis, tempus conteremus, neque etiam alioquin multum erimus in examinandis & exponendis duabus illis antidotis, quæ plurimum fiunt; plurimumque celebrantur ab Arabibus medicis:

præsertim in curando malo habitu ac subinde aqua intercutem, præsertim verò cum hi affectus sequuntur ualidas & inueteratas induratasque obstructions. nam cum eorum præcipua causa sit infirmitas uirium: præsertim verò, concoctricis uiscerum & maxime iocinoris, quæ aliquando solam causam habet intemperaturam absque alio affectu particulatim, & quamuis omnes intemperaturæ possint vires istius uisceris deiicere: hydro-
pis tamen frigida intemperatura proxima causa est. nam quamuis interdum etiam sequatur febres ardentes, id tamen fit quando ab immodico calore extraneo dissoluitur vis calidi natui: vnde illo postea deferuescente succedit frigida intemperatura. aliquando autem præter intemperaturam ad sunt etiam alii affectus intemperiem fontes præsertim frigidi, vt obstructions a crassis humoribus, scirrhis, & id genus aliis morbis. quamuis autem summo pere laudentur in malo habitu & hydrope cyphoides & hæc aliæ: nempe dialacca, & diacurcuma: si tamen recte res examinetur, quamuis omnes possint esse viles in omni differentia hydro-
pis, utpote quia omnes & intemperiem frigidam possint remittere, & tandem tollere, præterea vero, & attenuare crassos humores & obstructions aperire, accommodatior tamen erit cyphoides, vt 8. de comp. secundum loc. insinuare videtur Gal. quando sola erit intemperatura & inter initia morbi. efficaciora autem & ualentiora medicamenta erunt dialacca & diacurcuma in validis & induratis obstructionibus, nam ex illis conficiuntur, quæ vires maiores habent extenuandi extergendique & secandi crassos humores: præterea vero status discutiendi, & lotia ciendi, quod & maximum est in ratione curandi hydropem: cum non inodo causam aquæ intercutem respiciat, sed & ipsum iam factum morbum. nam cum in hoc affectu intumeat & venter repletus, aut vento, aut seroso humore, plerumque vero utroque, cum raro altera hydro-
pis differentia sine altera consistat: nempe timpanitis & ascitis, discussio status, & serosi humoris vacuatio per urinam: non modo in his, verum in anasarca ubi crudus humor madida caro occupans habitum corporis tumet, videtur ferè totius rei summam continere. quas autem hæc antidoti facultates habeant, potest vnusquisque facile percipere, qui & eorū q̄ superius explanata fuisse memor, legerit compositionē harū antidotū. Diacurcuma. n. à Mef. ita describitur. accipit spicē, mirrhē, cassiā, croci, schenātī, costi, cinamomi singulorū par pōdus, fit

fit aut confectio ex melle despumato. Dialacca autem accipit laccæ lotę quam plerique credunt esse carcamuni gręcorum, rhabarbari sing. drag. iij. spicę, mastichę, seminum apij, schœnanthii, absinthii, succi eupatorii, aneos, favinę, amigdalorum amararum, costi, myrihę, rubię tir. fiorum, seminum scniculi, anisi, asari, aristolochię, gentianę, croci cinamomi, hyssopi, summitatũ scœnanti, bdelii; singulorum sexquidragmam, piperis, Zingiberis dragmam, cętera teruntur, myrrha & bdellium ex vino dissoluuntur, omnia ex despumato melle assumuntur: nemo autem non potest videre hanc antidotum vires habere maiores quã diacurcuma in aperiendo, sciendisque tum lotio, tum vel maxime muliebribus mensibus: Vnde quãdo ex illis suppressis ortum habuisset malus habitus vel aqua intercutę, optimum esset: si quod aliud medicamentum. his ego expositis: si quod aliud fuit prætermissum, quod ad hoc genus asserere posse videretur, id ad normam eorum quę sæpius a nobis superius fuere explanata reuocatum, facile percipi & iudicari poterit. prætermissa autem a nobis de industria sunt duo medicamenta uel antidoti, quę a Nicolao & describuntur, & plurimum laudantur ad cienda loria & atterendos lapillos præsertim verò renum, nam quãuis multa fuerint ab antiquioribus recentioribusq; medicis literis tradita medicamenta, quę aperte pollicentur posse infringere calculos in vesica. Ego tamen, neque uidi, neque audiui quenquam qui medicamentorum ope fuerit curatus & liber euaserit a lapide uesicę, & si qui curati sunt, opera chyrurgi & per sectionem fuere curati. lapilli autem renum quotidie & per has antidotos, & per alia medicamenta, tum simplicia, tum composita infringuntur & excernuntur. viiles præterea sunt duę hęc antidoti ad renales dolores, siue a calculo fuerint concitati, siue a mucoris & crassis excrementis in renibus impactis, siue a crassiori flatu. uocantur autem medicamenta, alterum ab auctore, vel ab illo in cuius gratiam & commodum fuit excogitatum: Iustinum nempe a Iustino Imperatore, lithon tripon proprie: alterum verò ab affectu, utpote quod lapillos possit atterere: non lithotripõ barbara uoce appellatum. conficitur verò utrumque ex illis simplicibus, quę omnia calida sunt & partium tenuium quęque uim habent exsenuandi, dissecandi, crassos humores, & subinde lotia potenter proritandi. nolimus autẽ laborẽ assumere et omnia particulatim ad examen reuocare, cum nemo sit, qui recte attenderit illis quę a nobis fuere examina-

ta, & velit simplicium naturam quorum non meminimus ex Gal. & aliis qui de medicinali materia scripsere, inquirere, non possit facile inire rationem istius examinis. Vnde hoc solum animaduerso ad nostrum institutum redibimus: nempe quod medicamenta hæc valida admodum sunt, quibus si utamur, dum corpus plenum & excrementosum fuerit, materias impetu quodam maiori exagitât, & confertim ad vias urinæ & renes impellunt. Vnde sæpe & maiorē difficultatem vrinandi atterunt repletis nimirum partibus illis, magisque infarctis, sicque maius malū efficiunt, quàm quod leuēt dolores. hocque imprimis mandandum memoriæ, quod magis præstat inchoare ab inanitione corporis, & incipere a facilioribus antequam hæc fortiora tentemus. Sed iam de medicamentis seu antidotis soporiferis agamus.

De narcoticis distis medicamentis, quæ & anodyna appellantur. Cap. 9.

DE his autem hoc primum exponamus, quod medicamēta quæ soporifera sunt, anodyna, hoc est, dolorem leuantia quoque nominantur, improprie quidem ita dicuntur, quia proprie non tollunt dolorem, nam cum dolor sit vitiata sensus actio, cuius uniuersa ratio vt Gal. ex Hipp. in 1. de natura humana & in lib. de ele. docuit in duobus consistat: nempe in repentina & confertim facta transmutatione alicuius particulæ quæ sit prædita sensu per qualitates primas, aut in soluta cōtinuitate: requiruntur ergo duo hæc ad dolorem: aliqua transmutatio instrumenti subito & simul facta & integritas facultatis sentientis. hæc verò medicamenta non leuant dolorem, quia obstant quominus fiat transmutatio illa, & corruptio instrumenti, sed impediūt ne ea trāsmutatio percipiatur à particula sentiēte: & hoc quia ledūt ipsam facultatem, quæ vi medicamentorum horum reddiunt torpida, & quasi extincta ab illorum immodico frigore, non ergo causam doloris auferunt, sed sensum doloris adimunt, & id quidem primum, nam aliquando, etiam possunt ex accidenti causam doloris remittere: si ea esset calida intemperies: Vnde proprie narcotica quasi torporem inducunt istius in odi medicamenta a græcis nuncupantur: quare neque etiam, vt Gal. sæpe testatus est, hæc proprie curatio dici potest,

test, quo deinde fit, ut medici antiqui omnes, quicunque celebres
 fuere: præsertim vero Gal. tum 2. tum 4. & 7. de comp. med. secun-
 dum loc. præterea verò & sæpius alibi in hanc sententiam deue-
 nerint, omnino fugiendum esse horum medicamentorum usum qua-
 tenus per nos fieri potest, neque ad ea confugiendum, nisi a magna
 cogamur necessitate: cogimur verò quando adeo sæuit dolor, ut
 nequaquam amplius ferri posse sine evidenti periculo putemus;
 propterea quia, aut consuulsionem aut uirium casum timeamus, aut
 etiam si nimis importuna & perpetua uigilia urgeat. nam capto
 somno, & interim resumptis uiribus, facilius possumus mox & nos
 & Natura pugnare cum causis doloris. simplicia autem medicamē-
 ta, quibus tanquam soporiferis uti medici solent, præcipua sunt
 opium, radices mandragoræ, semina alterci, vel ut Græci & Arabes
 vocant, hyoscyami, & semen cicuræ. nam semen albi papaueris, & si
 somno conciliando sit, adeo tamen familiare est medicamentum,
 ut neque inter narcotica medicamenta fere sit recensendum. priora
 verò eam vim habent, ut eis simplicibus & solis, aut nunquam, aut
 rarissime audeamus uti. componuntur enim cum aliis, atque ita tu-
 tior & salubrior fit eius usus. Duæ autem sunt occasiones præci-
 pue, quæ Nos, ut locis nuper citatis docuit Gal. ad eorum usum ad-
 ducunt, & duos scopos, ubi illis usuri sumus, spectandos offerunt.
 plerumque siquidem illis utimur in uehementibus doloribus, pri-
 mum, ut aliquam quietem afferamus, qua vires aliquo modo re-
 fectæ facilius, deinde molestiam illam ferre possint. Deinde verò
 in uehementi tussi, quæ alioquin aut nimias & ualde importunas
 uigilias affert, aut aliquem pulmonum, vel aliarum in thorace
 partiū morbum foueat, & augeat, eiusque curationem impediat.
 ut in reiectione uel sputo sanguinis, & ulceribus in illis locis,
 doloribus verò, quo pacto remedio sint, nuper exposuimus:
 tussim etiam, tum hac eadem ratione, nam cum non excitetur
 tussis, nisi ex aliqua molestia illata instrumentis respirationis, a
 qua earum partium facultas expultrix incitatur ad expulsionem
 rei noxiæ, ea quæ soporifera sunt, torpido reddito illarum partium
 sensu, occasione sunt, ut molestia percipi nequeat: tum præterea
 aliquando immo sequenter, & aliqua ex parte obfistendo causæ,
 quippe quia tussis difficiles ortum habent a destillationibus & sæ-
 pe acrioribus & tenuibus, quarum impetus hæc medicamenta re-
 primunt, & sæpe interceptiunt, partim quia refrigerant & incrassant,

Victoris Trincauellij

atque ita sistunt, partim verò, quia frigidis & soporiferis medicamentis immisceri solent, vt doceamur 7. & 9. de comp. med. secundum locos, alia contrariæ facultatis: nempe calida & sicca, & tenuium partium, & id quidem propter multiplicem utilitatem, primum vt corrigatur noxa, quæ solet soporiferorum medicamentorum usum sequi, deinde ut uis illorum ad remotiones & intimas & profundas dolentis loci partes adducatur, ad quas frigida pertingere nequirent, vt pote quæ stipando, transitum sibi præcludant. præterea verò siccando & digerendo possunt fluentes humores digerere & absumere, & cum horum quæ immiscentur plura insuper, & urinam ciere possint, poterunt etiam aliquam saltem eorum excrementorum partem auersam à spiritalibus membris conuertere ad vias urinæ, sed & flatus discutere, & crassas materias attenuare. Et hoc etiam ratione fit, vt cum has soporiferas antidotos ab vehementes dolores exhibemus, interdum non solum symptomati consulimus, verum & causæ, quando dolor causam habet materiam crassam, quæ in flatum crassum & difficilem uertitur. Ex his autem in hunc modum expositis & illud depromptum est, quod hos Gal. eodem 9. docuit, cum exponeret confectiorem philonij antidoti, cognitu ap- prime necessariam: nempe in his medicamentis componendis seuisper, tres scopos præ oculis esse habendos, nempe primum, vt stupor sensui obducatur, quod officium ad ea simplicia pertinet, quæ ea facultate prædita sunt, quorumque paulo ante meminimus, deinde quia illa naturæ particularum & earum calori nativo maxime sunt aduersaria, procurandum est quominus aliquod insigne detrimentum in læsa particula remaneat. tertio, vt si fieri possit, ita paremus, vt non modo symptoma tollant, aut remittant, sed etiam affectui, qui symptomatis doloris ue in causa est, si non omnino, aliqua saltem ex parte consulamus. Sed his & illud ex eodem Galeno addendum uidetur, quod licet semper ad hos scopos dirigenda sit in uniuersum ratio compositionis horum medicamentorum, non tamen semper æqualiter omnes spectandi sunt: immo diuersimode pro modo earum occasionum, quæ nos ad usum horum medicamentorum impellit. Nam ubi vehemens & intolerabilis dolor urget, maiori ope soporiferorum medicamentorum egemus, utpote in doloribus colicis: Vbi & opportuniore illos, quæ maiorem uim habent.

stuporem

stuporem adducendi: vbi verò, aut facilior est dolor, aut potius insis est importunior, non ita vehemētibus stupefacientibus est opus, & magis erit utilis commistio aromatum, aut comunium seminum calidorum & spirantium gratum odorem: vnde in priora illa horū medicamentorum, quæ valēntiora sunt, differentiæ compositiones illę continentur; quæ colicæ nuncupantur propriæ, alię vero, potius tussiculares à priscis medicis, ut testatur Gal. dicebantur, in quibus & aromatum & seminum habentium facultatē ciendi lotiā maior copia accipiebatur: quòd si quis certius percipere cupiat, legat 7. & 9. libros de comp. med. secundum loc. & medicamenta ibi descripta probe perpendat. nobis enim in præsentia non tantum oculi superest, qui iam ad finem istius libri properamus, & quia medicis iunioribus scribimus, qui erudiri circa vsum & cōpositionem medicamentorum cupiunt, ideo in his tantum versantur, quibus vbiq; ferè vtuntur medici, quarum aliquorum tātum meminero, quæ magis sunt vlitata. antiquissimum itaque medicamentum eorum omnium quorum extat memoria. est Philonium, quod a Philone medico patria Tharsensi, ut testatur Galen. nuncupationem habuit, nē pe ab auctore vel inuentore primo, confectioem aut monumentis literarum postea Gal. prodidit. cumq; inter colicā medicamenta, & primam sanè recensuit, quæ etiam est omnibus aliis quæ à posterioribus: præsertim verò Arabib. descriptæ sunt, simplicior. Accipit autem, croci drag. v. pyretri, euphorbii, spicæ singulorū dragmam, piperis albi, hyoscyami singulorum drag. xx. opii drag. x. conficitur postea ex despumato melle, in quo medicamento: si recte examinetur, optime, ut ibidem explanauit Gal. ratio trium illorum scoporum habita est. nam soporiferorum medicamentorum: nempe opii & hyoscyami insignem aliorum comparatione copiam accipit, ut possit quantumlibet pertinacem dolorem obtundere, castoreum verò, piper, euphorbium & pyretrum eam uim habent, ut de trahant: si quid noxæ ex stupefactoriis medicamentis sit derelictū. in particulis ad quas peruenit vis eorum, ut præterea & faciliorem frigidis medicamentis aditum possint parare, spica & crocus vna cum istis eisdem primariæ affectioni, quantum in ipsis est, consulere possunt, nam hæc duo insignem uim concoctoriam omnium prauorum excrementorum habent. priora vero, quæ calida & partium tenuium sunt, eadem attenuare digerere & flatus crassiores discutere valent. efficax ergo medicamentum

lex rectatamen methodo confectum, vnde & merito inter colicā,
quæ maiorem vim requirunt collatum est, & si Gale. credimus, ut
primum fuit, ita ferè, & aliorum quasi basis & norma, nam poste-
riores, hoc aliquantisper immutato, vel secundum pondus simpli-
cium, vel aliis additis, vel èt detractis, alias compositiones confece-
re, quod ab antiquis & græcis prius, longe etiam magis deinde à
posterioribus Arabibusque factum est. hoc autem facile percipiet,
qui legerit Mesuem, Auic. & reliquos Arabas vbi de his agunt: ecce
enim statim Mesue, post nuper expositum philonium aliud descri-
bit vt Hamec solitus erat conficere, in quo prætermisiss pyretro,
euforbio, & spica, addebat nigellā, castorium, ami, cyminum, baccas
lauri, calamentum, margaritas, & cortices radices mandragoræ, &
omnium par pondus accipiebat, quæ si existimentur probæ, facile
vnusquisque percipere poterit, hoc medicamentum longe minùs
soporiferum esse priori vnde cū præscribit quātū semel possit tuto
accipi, liberalior est in hoc quam in priori, nā istius ait, quod drag-
mæ duæ possunt excedi: cuni tamen prioris solum concedat quan-
tum possit magnitudine cicer, aut fabam æquare: unde antiqui hoc
quidem in iussicularibus medicamentis potuissent: primum verò
in colicis. idem uerò Mes. in capite de sanguinis spūto aliud philo-
nium descripsit, quod & persicum appellauit, in quo nihil de pri-
mò detraxit, neque illorum simplicium pondus inmutauit: sed ad-
didit opio par pondus terræ lemnis, croco uero par pondus lapidis
hemacitis. quæ quidem, vt sæpe ante exposuimus, vim eximiam ha-
bent reprimendi & sistendi sanguinem; uerum cum terrena quadā
& crassa substantia consent, cui non est facilis transitus ad penitio-
res, & intimiores particulas, ut nos monuit Gale. nisi ducantur ab
aliquibus quæ tenuis sint substantiæ, & tenuitate partium secum du-
cant aliorum crassiorum medicamentorum facultates: ideo primæ
Philonis tharsensis, confectio castorii, daronici, zedoariæque sin-
gulorum nempe dragmam adiecit, & hæc quidem philonii compo-
sitio in multo vsu fuit, atque etiam est: præsertim vero censetur uti-
lis & efficax in his qui sanguinem expunt, quæ si recte extime-
tur collatis simul simplicibus, unde conficitur, aliquanto minorem
vim soporiferam habet, quam prima illa Philonis, ut pote quæ opiū
iusquam un pari pondere cum illa accipiat: plura verò alia simpli-
cia tum calefacientia, tum uerò refrigerantia & astringentia
accipit, unde eorum duorum ad reliqua proportio aliquan-

to minor est quàm in primo : est autem magis potens ad inducendum saporem, quàm illud Hamec. vnde dragma est id quod ad summum tuto dari potest. est ergo quasi medium hoc inter primum & alterum. quamvis primo propinquius sit: est præterea & quartum, quod ex Auic. 3. canonum depromptum est, quodque ipse Romanum nuncupavit, & est quasi medium inter hoc quod persicum appellari à Mef. diximus, & illud primum Philonis, nam præter terram lemniam, lapidem hematitem & succinum, ea omnia insunt, quæ & in persico. consuevere aut hætenus medici, in sputo sanguinis persico uti: in aliis vero occasionibus hoc Romano. Sed de Philonii compositione hæc satis sint. Ad alias istius generis confectio- nes accedamus. post itaque Philonii expeditam examinationem, tres alias antidotos in examen deducemus, quæ omnes adhuc in aliquo usu sunt: licet in maiori fuerint prioribus temporibus, & primum eam, quæ ab Arabibus: præcipue verò à Mefue à quo etiam est desumpta, examinemus quæ zazeneia nomine fortasse Arabico dicitur: est autem medicamentum quatenus ad facultatem soporem inducendi satis facile & modestum, nam conficitur ex duodecim simplicibus pari pōdere acceptis & ex melle despumato assumptis, nempe castoreo, myrrha, opio, pipere, pipere longo, calbano, costo, cinamomo, phu, meu, dauco, assaro & croco, in quibus solum opium vim habet soporiferam, reliqua verò omnia facultatem calefactoriam, attenuatoriam, digestoriamque, sunt siquidem tenuiū par tiū: vnde & status dissipare pnt, & ualide ad vrinarias vias attenuatos humores crassos deducere: unde in doloribus mēbrorū naturalium cōcitatū à frigida crassāq; aut statulenta materia cōmōdū erit medicamētū, ut pote quod & dolorē lenire possit & causę ēēt affectūque primariō consulere: & cum multa imo reliqua omnia frigida & soporifica qualitati aduersentur, obstarē etiam poterunt, quo minus noxa aliqua in internis vtilceribus relinquatur. Miror autem quo modo istius Mef. ad auenū dari posse dixerit, & Philonii Hamec ad duos aureos, cum tamē hęc illa potius sit infirmior. Duæ vero reliquæ à Nicolao sunt descriptę: altera quidem requies magna ab illo dicitur, altera triphera magna. Sed de requie priorē sermonem, instituamus, quæ & facilior est, & non ita propter dolores uehementes sedandos confecta est: sicut ad conciliandum somnum, in illis morbis, in quibus à uaporibus, tum calidis tum sicis nimis inopuna est uigilia, ut in febribus tertianis & quartanis

Victoris Trincauellij

nis, atq; et in acutis, & adeo facile & lene medicamentum est ut id nutrices audeant lactentib; infantib; cū noctu vigiles & illis importuni sunt, exhibere. quod tamen laudare nequaquam possum si temere & incaute id fiat. conficitur autem in hunc modum: acceptis rosarum, item & uolarum dragmis tribus, opii verò, seminumq; hyoscyami, papaueris albi, & corticum mandragoræ: præterea seminum scariolæ, portulacæ, lactucæ, psilii, nucis myricæ vel moschatæ, cinamomi, zacchari, singulorum scrupulis duobus & granis quinque: in his autem præter cinamomum, quod & ipsum aliquid habet: licet calidum sit, quod possit somnum incitare, & moscatam impræsentia appellatam nucem, quæ duo ad correctionem sopori ferorum medicamentorum accepta fuere: præsertim vero opii & mandragoræ, omnia refrigerant & acrimoniam excrementorum quæ somnum abigunt, demulcēt: unde in crassa materia, & in flatu lento dolore, nihil continet hoc medicamentum, præter illa duo, quod possit tertium scopum superius expositum ex Gale. respicere. respiceret aut si à calidiorib; & acriorib; succis dolor occasione habere: triphera verò magna contra se habet, est enim medicamentum, quod præsertim frigidioribus affectibus opportunum est, & quia duplex potest esse eius confectio. nam quandoque cum opio fit, quandoq; et sine eo. cum sit addito opio, tunc & si speremus collaturâ hanc antidotum etiam primario affectui, cum præter opium & hyoscyamum & mandragoram cætera possint tollere frigidam intemperiem, crassos humores extenuare, flatus dissipare, per locia vacuare: præcipuus tamen scopus est, intolerabili dolori, stupidiōri sensu reddito occurrere. cum verò citra opium hoc medicamento sumus usuri, nulla doloris ratione habita, affectui præsertim curando operam nauare volumus. ex his autem constat. accipimus opii drag. ij. & grana xv. cinamomi, garyophyllorum, spicæ, galangæ, zedoariæ, zingiberis, costi, styracis, calami aromatici, calamenti, cyperi, iridis, peucedani, acori, mandragoræ, spicæ celticæ, rosarum, piperis, anisi, apii, petroselinii macedonici, fœniculi, dauci, hyoscyami, seminis citri; singulorum dragmam. conficitur ex melle. Medicamentum celebre est, ut etiam mulierculis sit notum, ut pote quæ non consulto etiam medico, ipsum à seplasiariis sæpe petant. in affectibus enim uteri maxime, si ex suppressis menstruis purgationibus ortum habeant, plurimum ualet: quippe cum magnam vim habeat ad ciendos menses: nec mō deuoratu, sed etiam confectio

confecta glande ex eo vel solo, vel additis præterea aliis pertinentibus ad eundem scopum, vt ladano, galia moschata, & id genus aliis medicamentis, atque supposita, inducæque in membra genitalia muliebria. Et ego hoc modo sæpe nec inutiliter sum vsus, & alios vti præterea vidi. Est & aliud medicamentum, quod & si quatenus ad modum & formam confectiois pertinet, non uideatur ad hoc caput pertinere: pertinet tamen: si ad eius facultatem, & materiam respiciamus. id verò passim in vsu est sub nomine pillularum ex cynoglossa. & quamuis duæ reperiantur confectioes, quæ ex cynoglossa fiunt, altera quæ alio nomine à Mcl. à quo describuntur appellatur. ipse enim pilulas ad omnes morbos catarrhi, nunc autem sunt in multo vsu & appellatur pilulæ ex cynoglossa, altera autem à Nicolao describitur, & pilulas ipse ex cynoglossa vocat. Sed nos priorem quæ in maiori vsu est, paucis in examen reuocemus. ex his autem conficitur ex myrrhæ puræ drag. vj. thuris drag. v. opii, hyoscyami singulorum drag. iij. croci sesquidragma, radicem cynoglossæ drag. iij. s. ex his omnibus tritis & commistis fiunt pilulæ, quæ si recte extimentur sunt validæ ad inducendum soporem, & possunt valenter sistere præcipitem destillationem. nos autem, licet dicat Mcl. posse sumi à semidragma, vsque ad dragmam, rarissime supra vnam pilulam, quæ scrupulum pædet exhibere solemus, sed iam caput hoc ad calcem producamus, & alterum quo sumus huic secundo libro finem imposituri, aggrediamur.

De eclegmatibus, quæ Arabes loch nocare solent. Cap. 10.

Postremo hoc capite, vt tandem alteri libro coronidem imponamus, de his medicamentis sumus verba facturi, quæ passim Arabico vocabulo loch vel lochati appellat. Græci verò eclegma, quod delinctus latine significare videtur à delingendo sanè, nam vt superius non semel fuit expositum, in affectibus membrorum respirationi inferuentium, medicamenta, quæ ad deliniendas asperitates ab aliqua intemperie, vel à materia destillante ad eas partes, uel ab aliquo tumore, uel tuberculo earum partium excitatas, maxime profunt; & magis paulatim delingendo, & ut iuniores dicere solent labendo sumatur, quæ si cōfertim bibantur, uel deuorentur: unde aucupatione à mō & rōne, qua sumuntur sortita sunt. His aut duntaxat ferè faucibus gutture & particulis quæ thorace cōtinètur male affectis vtuntur medici. Horum ergo medicamentorum in uniuersum duplex

Victoris Trincauellij

duplex est differentia, nam quædam eorum solent parari, & ita parata ad usum & commoditatem medicorum seruari, alia verò tunc parantur, quando visum fuerit me dico iubenti opportunum futurum eorum usum. de his ergo primum agemus, & de compositis precipue. nam sæpe, ut antea exposui, & syrupis in hunc modum uti sole-mus. incipiemus autem ab eo quod vulgarissimum est & nulli non notum, nostri vulgo saponeam vocant à quadam sanè cum sapone quando nodum concretum induruit, similitudine. nam tenerum quidem est albumque cum quodam lentore. cum autem conficiendum est, accipiunt aquam violaceam, quæ ex floribus uio-larum: non autem ex foliis herbæ, ut quidam faciunt, destillauerit, & eam, quanta ad dissoluendum zaccharum possit esse satis: indunt verò zaccharum illud albis-simum quod per trinam coctionem fuerit de fecatum & depuratum. nam id aptius est ad hoc medicamentum colore & sapore suauius & gratius reddendum. coquunt autem, ut syrupi coquuntur. postea addunt amy-lum, nonnulli vero & aliquid olei amigdalini dulcis indunt, & semper miscendo medicamentum dum coquitur spata exagitant, quo ad congruam compagem deuenerit: postea impositum in aliquod vas vitreum, aut etiam argenteum, seruant; quod solet cochleari sumi, & in ore teneri, donec lique-scens paulatim defluat ac defendat, n. edicamentum hoc aliquantulum potius ad frigidum inclinat, consistentia aliquantisper est emplasticum, mollit autem & lenit, unde confectio hæc ad molien-das & deliniendas exasperatas particulas quæ sunt respirationis instrumenta, medicamentum commodum est: præsertim fauces & asperam arteriam, & subinde pulmones: quare tussientibus destil-lationem calidam & acrem utilis est. præterea vero ob intemperiem calidam & siccum: immo etiam frigidam. nam prope temperamen-tum est in calore & frigore. zaccharum enim præsertim vero album & probe purgatum leis est & temperati cuiusdam caloris, si cut & amigdalinum oleum. amy-lum verò ad leue frigus inclinat. præter emplasticam autem molitoriamque facultatem, habet aliqd etiam absterfionis ex zaccharo. vnde accommodatum est medica-mentum ad excreationem facilem reddendam, cum leniat & mol-liat, & aliquanto detergat. pleuriticis uero est in usus nisi quodd, cum non modo sit medicamentum, verum & alat, cauendum aliquan-do erit, ne dum facile sputum reddere procuramus, plus alamus quàm requirat ratio uictus tenuioris, qui in morbis acutis maxime con-

gruens est. neque enim res est gustui in grata, nisi illorum qui suapte natura res dulces fastidiant. Solent præterea, & alia fieri medicamenta easdem ferè vires habentia, aliquanti sper tamen uaria pro diuersa eorum natura ex quibus conficiuntur communis sanè eorum omnium materia tum zaccharum, quod vulgo candidum, uel candum uocant, tum uero, quæ penidix dicuntur, partim tragacanthum, item & diacodion, quod fit in placentulis seu rotulis, & uiolaceum zaccharum, & quæ nunc conferua uiolarum dicitur. quorum unum uel plura conferunt, atque ex aliquo syrupo diluunt, & illum eligūt, quem putant accommodatiorem scopo, quē medicus sibi proposuit. nam si delinire, in crassare, & refrigerare uoluerit syrupo uiolaceo, aut illo, qui ex zingibis fit: Quod si præterea & destillationem sistere, somnum quē conciliare, opportunus erit, qui ex papauere nomen habuit. At si materia excreanda crassa & lēta fuerit egens attenuatione & deterfione, aptus erit qui ex radice dulci fit vulgo quæ de liquiritia dicitur. ualētior erit ille ex hyssopo, uerum & aliquanto etiam calidior: unde si sine caliditate detergere cuperemus, non erit ineptum medicamentum mel uiolaceum. sed & illa quæ misceri & conteri solere diximus, itidem eligēda erunt pro eā ratione, quam exigere uidebitur propositus scopus. non erit autem difficilis eorum electio cognita ipsorum natura. Sed ab aliquibus & hoc parari solēt quod facile paratu est, lenitque & mollit exasperatas illas partes. accipitur autem ex nucleis pinearum contulis succus seu lac, interdum etiam ex amigdalibus, & his zacchari candidi: præsertim uiolacei quantum possit ex eo succo dissolui, mox coquitur lento igne donec spissescat. Quæ hæcenus exposita sunt, non seruantur parata sed cum eis fuerit opus conficiuntur. Multa autem etiam apud apothecarios parata seruantur, quæ in præsentia sumus explanaturi. incipiemus uero ab illo quod vulgo appellant loch de pino, quod quæ præcipue ex nucleis pinearum confici solet. eius uero descriptio hoc modo se habet. accipiuntur dragmæ xxx. nucleorum pinearum, amigdalarū uero dulcium, auellandarum assatarum, tragacanthæ, gummi Arabici, radices dulcis, succi eiusdem, amyli, capillorum ueneris, radicis iridis singulorū dragm. iiij. pulpæ palmularum, drag. xxxv. amigdalarum amararum drag. iij. mellis ex passulis, zacchari albisimi, butyri recentis singulorum dragm. iiij. mellis quantum satis sit, omnibus deinde cōtulis & mistis fit eclegma. Hæc itaque istius

medicamenti confectio, si recte eam perpendere uolumus, optima est ad parandas materias crassas & difficiles ad excretionem quæ in membris respirationi inferuentibus continentur, atque ibi tussim difficilem concitant, & spirandi difficultatem. nam in illa ratio omnium eorum scoporum habita est, quos maxime in his affectibus harum partium spectandos esse docuit Gal. nam aliqua continet, quæ vim habent detergendi extenuandique & dissecandi crassa & lenta excrementa, & expulsionem renitentia, alia verò multa quæ molliunt, applanant & leuigant uias, per quas materiæ excrementitiæ sunt expellendæ. est vero præterea medicamentum, mode sit calidum, quod maxime necessarium in his est. ostendemus autem rem hæc ita se habere si simplicia ex quibus confectum est in considerationem reuocauerimus & illis accommodare voluerimus, quæ à Gal. tum in lib. de facul. simp. med. tum uero in libris de eorund. cōpositione litteris tradita sunt: Septimo, n. de comp. med. secundū locos ea recensens quæ uim habent applanandi & deliniendi internas in thorace & pulmonibus uias, ut facilis deinde fiat excreatio & excretio superuacuum humorum in illis contentorum, atque in suos ordines redigens, in primum ordinem tragacanthem digessit, & gummi Arabicum, amyli, & nucleos nucis pineæ, in alterum uerò, butyrum, glycirizam, seu radicem dulcem, uel eius succum, aut decoctum, & dulces amigdalas, & pulpam palmularum: sed & mel quod passularum appellat in eūdem ordinem referrem, quāuis ex melle quod passularum decocto addunt, aliquid exterforiæ, & attenuatoriæ facultatis habeat. sed attenuant quidem atque detergunt reliqua fere omnia, ut perinde ad expurgandas uias & loca respirationi deferuentia: cum à crassis & lentis succis obsidentur, nō parum commoda sint, nam & auellane assatæ, ut insinuare Gal. uidetur 7. de simplicib. medic. facult. uim attenuandi sibi comparant, tenuiores enim partes ex assatione redduntur, sed & adiantum uel capillus ueneris uim habet crassos & lentos humores attenuandi; mel uerò, amigdala amara, & iridis radix maiorem uim attenuandi, detergendi, & siccandi habent. quare potest hoc medicamentum facile id quod pollicetur, præstare: nempe opem diuturna tussi laborantibus ferre: si tamen illa à crassis & lentis succis habeat fomentum. Hoc uero eclegmate uel delinctu, calidius & ualentius est ad attenuandos, detergendos, facilesque ad excretionem reddendos crassos lentosque

lentosque & præterea crassos succos in thorace detentos, vt calidius, ita ut efficacius est medicamentum illud, quod iuniores Mes. sequuti loch sanum & expertum nuncupant, & in præsentia est in frequenti vsu, vnde ad difficilem tussem diuturnamque, item & ad raucedinem tollendam existimatur esse commodum valde & efficax medicamentum. præsertim vbi nulla, aut non vehemens adfuerit febris, conficitur vero in hunc modum, vt accipiatur cinamomi, hyssopi, radicis dulcis: singulorum semuncia, zingipharum, seu, vt nunc dicunt, iuiubarum, myxarum, seu, vt Arabes aiunt, sebesten: singulorum fructus triginta, passularum exacinarum, caricarum pinguium, palmularum seu dactylorum item pinguium: singulorum uncia binx, fœni græci dragmæ quinque, adianti, seu capillorum veneris, pugilus, feminum anisorum, fœniculi, radicis iridis, calamenti, seminis lini: singulorum dragmæ quatuor. omnia vero simul in libris quatuor aquæ ad medietatem coquantur. cui decocto mox addendæ sunt duæ penidiarum appellatarum libræ, & ad crassitudinem mellis iterû decoquatur, & additis nucleorum pinearum mundorum, amigdalarum item dulcium mundatarum: præterea radicis dulcis, traganthæ, gûm arabici, amyli singulorum dragmæ tres, iridis, dragmæ duæ, postea omnibus simul mixtis fiat medicamenti agitatio dum albescat. In hoc medicamēto, præter ea quæ cum priori communia habet, sunt zingipha, quæ tum refrigerant, tum leuigant, vt temperare possint aliquantum calorem medicamentorum calidiorum, sunt & myxa seu sebesten, quæ lento suo humore applanare omnia exasperata & etiam temperare delinireque acrimoniam & exasperationem acriorum & calidiorum simplicium. carices verò pingues ipsæ quoque uim habent emolliendi: possunt vero potenter attenuare & desiccare lentos, & crassos succos & subinde detergere præter illa quæ exposita paulo ante fuere, cinamomum, hyssopum, calamentum, semina anisi, fœniculi, & non nihil etiam semen fœni græci. Vnde Galenus primo de ali. facul. ait, medicamentum ex eo & melle confectû etiâ utile ad diuturnos thoracis affectus, qui sine febre fuerint. Tertiò vero loco de illo eclegmate uel loch agamus, quod & quàm maxime utile est, & nulli fortasse secundum ad extirpandos hos eosdem, quorum nunc meminimus, thoracis affectus.

Q conficitur

Victoris Trincauellij

conficitur uero ex scylla, & summis laudibus, a priscis omnibus præsertim verò à Gal. pluribus in locis extollitur. potest verò non vno tantum, sed multiplici modo parari medicamentum hoc, sicut multiplici modo antiquiores medici aliquando parauere. nam interdum est succo eius addito melle vt cocto usque quo ad compagem eclegmatis perueniat, quo pacto docuit Mef. conficere: sed longe ante illum vt Gal. 9. de compositione medicamentorum secundum locos testatus est, Antonius Musa, qui ex scilla cruda voluit succum exprimi. interdum vero ex vniuersa scilla, sed ea cocta, assata nempe vel elixa, & ea postea ex melle cocta: coquere autē illā medicos consueuisse ait Gal. 8. de simp. med. facul. vt de uehementia iurium aliquid detrahatur, modum quo assatur idem Gal. 9. de compositione medicamentorum secundum locos docuit: idem præterea & Dioscorides scripsit. sed Mef. illius quidem medicamenti, quod ex solo eius succo conficitur meminit: eius verò quod ex scilla assata sola fit addito melle, non ineminit. Sed illi hyssopum, marubium, irinque & myrrham addit. Hoc tamen non est prætereundum ut siccis pedibus, cum non indignū scitu sit: nempe quod antiqui medici uario modo componere medicamentum ex succo scillæ soliti sunt. aliquando enim vt & Mef. instituit, qui accipit expressum succum ex scilla cruda, & addito melle quantum satis fore videatur decoquit donec consistentiam eclegmatis sibi comparet, quæ confectionis ratio a Gal. desumpta est 7. de compositione medicamentorum secundum locos. neque tamen aliquem turbet qui ex scilla cruda succum censuerint antiqui præsertim Asclepiades, cum Dioscorides scillam crudam humano corpori non parum noxiam esse pronuntiarit propter uehementiam virium eius de qua per decoctionem nonnihil detrahatur, cum postea ex melle exquisitè coquatur. Alio autem modo Gal. in eo libello quo consulit puero comitiali morbo laboranti docuit succum extrahi ex scilla, quasi per destillationem: non quidem igne usus: sed diuisam scillam in plura exigua frustra atque in uas iniecta, quo mel solet deferri & seruari, clausoque eius osculo ac probe pelle aliqua contexto & deligato, canicularibus diebus soli exponi uolebat, & sæpius verti, vt undique pariter incalescat. sit tamen locus ubi vas collocatur in meridiem versus, & a boreali plaga auersus. destillatur enim ut solaris calor liquor ex scilla, qui collectus mel

li optimo immiscetur, atque ita conficitur medicamentum. sed & ex reliquis frustulis eiusdem scyllæ: quæ ita cocta reperiuntur, ac si essent elixa exquisite, tuis & leuigatis atque ex optimo melle dissolutis utile medicamentum parari potest. Præterea vero interdum scilla luto inuoluta, vel, ut nunc solent, in triticea massa sub antracibus accensis uel in clybano ubi coquitur panis assatur, deinde conteritur & ex melle conficitur medicamentum, ut 9. de compositione medicamentorum secundum locos, docuit Gal. & Dioscorides, & simplicior est isthæc componendi ratio, cui alii alia addunt sicuti quisque apud Mes. & Gal. 9. de compositione medicamentorum secundum locos legere potest. quomodoque autem paratur: cum scilla uim uehementem habeat propter partium tenuitatem, secandi: citra tamen insignem calorem, semper fiet medicamentum ortopnoicis asthmaticis, qui a crassis & lentis excrementis male habent, ut tum alibi tum 7. de compositione medicamentorum docet Gal. quam maxime salutare. Sed & de eclegmate uel loch, quod ex pulmone vulpis rescicato, & ex arte parato conficitur, paucula quædam dicamus. nam & ipsum in frequenti usu est nostris his temporibus: eius uero compositionem, à Mesue nostri medici describere, quamuis id in Galenum auctorem ipse referat: id tamen apud Galenum, nunquam memini me legisse: eius uero confectio in hunc modum se habet, accipiuntur pulmonis vulpis sicci, succi liquiritiæ, capillorum veneris, seminis feniculi, singulorum dragmæ quatuor. conficitur autem postea medicamentum ex zaccharo cocto ex aqua. Medicamentum hoc, ut & Mesue testis est, roborare pulmones potest, & attenuare detergereque materias crassiores in illis contentas, atque humiditates superuacaneas desiccare. nam Vulpinus pulmo affinitate & proprietate naturæ pulmonibus robur addit, & siccit, capillus veneris attenuat quidem crassiores succos, eosque ad excreationem parat, sed altitictionis alicuius particeps unde roborare potest pulmones languidiore factos. addit uero Mesue, quod medici sæpe rob myrti addunt, hoc est succum baccarum myrti ad ignem inspissatum, nempe ut astringendo maius robur visceri impertiatur: quo loco id aduertendum, quod quamuis alia etiam sint medicamenta paria myrto in astringendo, Myrtus tamen in hoc officio affecti-

bus thoracis & pulmonum accommodatio caratione videtur, qua substantiam habet diuersæ non simplicis naturæ, utpote quæ situr secundo de alim. fac. tradit Galenus saporis mixti ex austero & dulci, dulce vero thoraci & pulmonibus maxime commodum & familiare est. Potest ergo medicamentum hoc perquam utile esse asthmaticis, suppuratis vel empyicis & phthisicis uel tabescentibus ex ulcere contracto in pulmonibus, cum pectus pulmonesque possit attenuando & detergeri do mundum ac rassa lentæque materia, atque a pure, & deinde exiccando consumere malas eas materias, & adiuuare ulceris consolidationem, non est autem insigniter calefaciens. Quia autem & id medicamentum, quod ex brassicæ succo conficitur ab Arabibus autem et iunioribus loch ex carlibus solet nuncupari, in frequenti usu est: ideo nec ipsum silentio inuoluendum. conficitur vero hoc pacto. accipiuntur succi ex foliis brassicæ expressi, libræ quinque quæ decoquantur igne lento semper spumam auferendo ad consumptionem librarum trium: , mox illi iniicitur mellis libra, & tantundem sapæ, ac ulterius ad crassitudinem eclegmatis decoquitur, & quamuis ad tustim humidam laudetur, & id iure optimo, nam brassica uim habet attenuandi, detergendi, exiccandi cum aliquo, ut in libro de salubri uictu inuere uidetur Galenus, calore præterea cum non sit alicuius astrictiōis expers, habet etiam vim roborandi, addito autem melle, additur etiam attenuandi & detergendi facultati. a sapæ vero habet ut possit mollire leuigareque & applanare uias in pulmonibus: Vnde quamuis non ita habeat vires validas hoc medicamentum, ut præcedentia, non tamen spernendum utique videtur, cum & partes respirationi inserviētes astringendo possit roborare, detergendo & extenuando expurgare: præterea vero desiccando superuacuas materias in eis absumere, & quia inde etiam habet, ut possit agglutinare & sanare ulcera, ut 7. de facul. simpl. med. testatur Gal. uel etiam maligna, & asthmaticis utile erit, & phthisicis uel tabidis exulcere, præterea tussi laboriosæ & difficili, nec non & asperitati arteriæ asperæ, & raucedini uocis, quæ occasionem habent ex multo humore irrorante & exasperante uias spiritus. Sed cum de his quaremus ad præsens institutum

titum poterat esse satis hætenus egerimus, opportunum iam san-
 erit, ut ad ea istius generis medicamenta exponenda accedamus,
 quæ accommodatiora sunt affectibus harum partium, qui à ca-
 lidioribus & tenuioribus excrementis vel destillationibus suum
 habent ortum: erunt autem circa tria, primum ergo agamus
 de eo quod à Mesue diapapauer dictum est, cuius hæc est
 confectio, ut accipiantur seminum papaveris albi dragm. xxv.
 amigdalorum dulcium. decorticatarum, nucleorum pinearum,
 gummi Arabici, tragacanthæ succi, radiceis dulcis, singulorum
 dragm. x. amyli dragm. iij. seminum portulacæ, lactucæ, cotoneo-
 rum malorum, singulorum dragm. iij. croci dragm. j. penidia-
 rum dragm. iij. syrapi uerò qui conficitur ex capitibus utriusque
 papaveris, nigri inquam & albi, atque ex violis & semine la-
 tucæ quantum satis sit ad medicamenti confectioem. Non
 erimus autem longiores in expositione particulatim omnium
 simplicium ex quibus hoc eclegma coagmentatum est, cum nul-
 lum eorum sit de quo non sit sermo. aliquis habet, nam ne-
 mo est, qui modò uel parum sit uersatus in lectione eorum,
 librorum qui ad medicinalem materiam pertinet, non faci-
 le percipiat medicamentum hoc ea facultate esse præditum, ut re-
 frigerare possit incrassareque destillantes ad pulmones & thora-
 cem calidos acresque & tenues succos, & subinde etiam reprimere
 sistere uel fluxiones, & eas maturare. præterea uerò vias &
 meatus in partibus inspirationi inseruientibus delinire, & quasi
 applanare. papaueris enim semina lactucæque & portulacæ refrige-
 rant non parum, & ea etiam ratione crassiores desuantes humores
 reddunt. tragacantha uero gummi & amyllum applasant deliniunt,
 & quoquo modo, cum sint emplasticæ facultatis, incrassant. ad quod non
 nihil etiam mucoso suo lentore faciunt semina malorum cotoneo-
 rum & portulacæ de nucleis pinearum & amigdalæ nihil est quod
 in præsentia dicam, cum superius de illis, quantum potest esse satis,
 fuerit actum. unde omnibus affectibus in thorace ortis, qui occasio-
 nem habent à calida intemperatura, uel ab acris & tenuioribus
 humoribus, ut sunt tussis, asperitudines, & pleuritides, & alii alio-
 quin dolores, accommodatum est medicamentum. potest præ-
 terea esse utile febricitantibus: præsertim uerò tertianariis
 & illis qui febre ardente laborant: nam & sitientibus illis præsidio esse
 potest, & afflictis à nimia uigilia, & adinquare acris & tenuioris bilis.

concoctionem, & eius seruitutem retundere. Deinde vero & illius elegmatis quoque aliquam mentionem faciamus, quod à Mes. sub hac inscriptione literis traditum est, loch. horum con-
ferens hecticis & consumptis phthisicis, est enim alibi in usu
frequenti, cuius autem descriptio in hunc modum se habet. Accipit
seminum papaveris albi, spodii, seminum lini torrefactorum,
croci, amigdalorum dulcium: singulorum drag. iij. amyli, traga-
canthæ, gummi seminum cotoneorum malorum, cucumeris, gra-
norum nasturcii coctorum, amigdalorum amararum, fabarum
singulorum sexquidragmam, penidiarum dragi. lx. penidis ex
aqua dilutis dissolutisque prius addantur reliqua & coquantur.
Vires istius medicamenti partim quidem lenes & molles reddunt
pulmones & particulas ad illos attinentes, quod commune est, ut
diximus, omnibus medicamentis quæ affectibus harum partium
curandis accomodata sunt. hoc vero præstant amigdalæ dulces, tra-
gacantha, gummi, amylium, semina malorum cotoneorum, & peni-
dis, quæ item una cum seminibus papaveris, cucumeris, tum em-
plastica vi, tum etiam refrigerando possunt reprimere acrimoniam
destillationum a quibus vicerari plerumque pulmones possunt.
partim autem potest detergendo ulcus, si adsit, mundum red-
dere, quod in curandis viceribus maximam vim habet, præ-
sertim verò si id citra morsum fiat. citra morsum autem, ut
7. de medicamentorum compositione secundum locos, scripsit
Gal. detergit semen lini tostum, & fabas frenas & amaræ etiam
amigdalæ. Vnde neque mihi eorum sententia probatur, qui expo-
nunt nasturcium coctum, hoc est, probe maturum, quia potius exi-
stimaueram quod sicut medici in his affectibus semen lini tosto
uti solent, quia ut ex Gal. diximus, sine mordicatione detergit:
ita puto Mes. voluisse nastureii semen coqui, utpote quia nimis
acre sit: per cocturam enim detrahitur acrimonia. Postremo autem
multa adsunt, quæ desiccare possunt, ut spodium, semen nasturcii,
amigdalæ amaræ, item & faba, de qua protulit Gal. 7. de simp. med.
fac. quod innoxie exiccat 3. autem meth. quod carnem procreat, vl-
cera vero præsertim exiccatione curantur: non iniuria ergo a Mes.
laudatur hoc medicamentum tanquam utile & salutare phthisici,
vel tabidis & in vniuersum tuscentibus. utpote quod facilem ef-
ficiat excreationem materię in thorace contentę, & subinde plu-
rimum faciat ad mundas ab excrementis reddendas partes inspira-
tioni

ioni interuenientes, & est medicamentum satis temperatum, non calidum, non immodice exiccans. Multis etiam in locis frequens est vsus ptelegmatis vel, vt Serap. istius medicamenti author loquitur, loch ex lini semine. conficitur enim ex semine lini affato quidem si sit, ut ille instituit conficiendum, & vt antiquiores medicis lini semine in his medicamentis, vti solebant, quod ex Gal. 7. de comp. med. secundum loc. facile percipi potest, quamuis, seplatrium multi id ex istius non affati farina conficiant: accepta ergo farina seminis affati & addito melle quantum videatur esse satis, & illis simul mistis conficitur medicamentum, de quo nihil est vt plura dicamus, cum paulo ante de semine lini satis dixerimus: nempe quod citra macerationem detegat. Vnde non inuile est medicamentum, ad extergenda, crassa excrementa viscida obdientia vias in thorace & pulmonibus. Postremo aliqua etiam menrio facienda illius ptelegmatis vel loch, quod & ipsum in frequenti vsu esse solebat & ab amigdalibus nomen sortitus est. eius confectio hoc modo se habet: accipiuntur amigdarum dulcium, item & amararum, seminis lini affati, nucleorum pinearum, seminum anisi, tragacanthæ, gummi, radices dulcis, & eius succi: singulorum sepsidragma, zaccchari, penidiarum singulorum dragmæ liij. deinde ex melle & succo feniculi prius tamen probe coctis & despumatis, aliisque adiectis conficiatur medicamentum ex arte quod: si recte conficerentur ea ex quibus conficitur, ualet ad asperitates partium respirationi famulancium quando id a siccitate prouenerit. quamuis non parum etiam possit esse utile ad facilem reddendam excretionem crassarum materiarum: si quæ sint in pulmonibus & thorace interceptæ. nam dulces amigdalæ, pinearum nucleis, tragacanthæ, gummi, radix dulcis, & eius succus, præterea & penidiæ molliunt, & delinuntque & superius humiditas eas partes reddunt lini verò semen affatum citra morsum detergit, detergit verò & mel, non nihil & zacccharum, & aliquantulum etiam amigdalæ amaræ, quæ præterea vna cum succo feniculi crassa excrementa extenuare possunt, sicut & semem anisi: Quatenus vero ad primas qualitates pertinet medicamentum est temperati cuiuspiam caloris, quod ad applanandas asperitates viarum respirationis, & ad attenuandas extergendasque crassas, & lentas materias occupant instrumenta respirationis non parum sit utile: præsertim vero quando affectus nondum fuerit inueteratus & pertinax. Por-

ro me nequaquam latet longe plura istius generis medicamenta
 descripta in libris tam recentiorum quam antiquorum reperiri,
 quæ possent huic nostro instituto accomodari. Verum quia hæc
 quæ hæcenus sunt exposita satis esse posse censuimus, utpote quæ
 sint in frequentiori usu, præter id quod his perceptis ac diligenter
 animaduersis, alia ferè omnia recte considerata atque cum istis col-
 lata facile poterunt indicari. Quare iam opportunum esse videtur
 ut receptui anamus, & perducto hoc altero libro ad calcem, nos
 accingamus & paremus ad tertium conscribendum, in quo de illis
 medicamentis quæ exterius solent administrari agere instituimus.
 Nisi quod & hoc etiam non est antequam finem huic libro impona-
 mus, sub silentio prætereundum, quod ni fallor, non modo utile,
 verum, & necessarium cognitu illis est, qui diligentem operam
 pharmaceuticæ parti artis medicinæ manare voluerint. illud vero
 est, quod perinde in medicamentis, ut & in affectibus, non est vna &
 impartibilis ratio. immo ampla & spaciola. est enim inter eorum su-
 premum terminum & infimum magnum satis intervallum, vel ut
 iuniores dicunt latitudo. quæ quàmvis certis quibusdam finibus
 claudatur & terminetur, media tamen non ita definita. immo, ut
 sepe testatus est Gale: adeo multiplicia sunt, ut nullo numero
 definito claudi possit. Vnde cum in hoc magnum sit momentum,
 nempe ut vires medicamenti accomodentur & aptentur ipsi mor-
 bo, quod & Hippocrates insinuare voluisse visus est, cum dixit ex-
 tremæ remedia esse opportuna, & quod quanto ab externis mor-
 bus recesserit, tanto etiam remedia: si ab extremis recesserint, erunt
 opportuniore: quod & si Hippocrates id sequenti aphorismo par-
 ticularim de ratione victus explanauerit, docuit tamen Gal. hoc in-
 more habuisse Hippocratem, ut quando plura erunt eandem rati-
 onem habentia, illi satis erat: si vnum illorum particularim expo-
 suisset, cetera verò addenda, & eadē mensura mensuranda reliquit.
 At verò neq; postea fieri poterat, ut medici ita innumera medi-
 camenta quibus tam multiplicibus affectuum differentijs posset sa-
 tis fieri in promptu & parata haberent: Vnde coacti sunt eam inro-
 rationem, ut aliquibus, & illis diuersarum: immo & inter se aduer-
 sarium virium confectis & paratis, ex varia illorum, quando opor-
 tunum videtur, miscella, multiplicem suppellestem medicamen-
 torum sibi parant. mixtis sane, interdum mutuo simplicibus, non
 quam simplicibus cum compositis, quandoque & compositis cum
 compositis

compositis, atque hoc pacto per rationabilem coniecturam mixtu-
ram variantes apta & accommodata medicamenta affectibus sibi cō-
parāt. et hoc quidem, & in vniuersum in omnibus conspici potest,
& particulatim in eclegmatibus seu loch. Sed hic consistamus &
immenſas gratias deo agamus, cuius benigno afſatu & fauore fi-
nem huic libro impoſuimus.

Finis ſecundi Libri.



TRINCAVELLI

PHILOSOPHI ET MEDICI

VENETI

De compositione ac usu medicamentorum,

LIBER TERTIVS.

Proœmium Cap. I.

IN his nostris explicationibus, quas instituimus de compositione, & usu illorum medicamentorum quæ medici in curandis affectibus, quibus humanum corpus exercetur, in frequentissimo usu nunc habet partim Andromachum & Heram antiquos, & illustres medicos, partim vero Galenum imitati sumus. illi enim universam medicamentorum compositorum sylvam bipartiti, duo volumina confecerunt, quorum altero ea medicamenta complexi sunt, quæ interiori assumi solent: Altero autem illa quæ exteriori adhibentur, in eundem sanctum modum, & nos universam hæc tractationem in duas secimus partes, & priorem, primæ, & altero libro; quantum per nos clarius & exquisitius potuit, exposuimus. quia enim universa eorum ratio quæ ad eam partem attinere videbatur; tandem potest in duos scopos referri: præsertim vero, ubi vitiosa & excrementosa materia ad est, quæ morbum foueat & augeat: nempe ut illis excrementis detractis corpus expurgetur ad commodiorem & faciliorem vacationem, tum corpus, tum excrementa parentur, ac vires particularum roborentur, ea propter omnia, quæ ad hæc duo officia spectant duobus prioribus comentariis comprehendimus: in præsentem vero libro alteram comprehendimus. Et quia hoc etiam argumentum multiplex est, & uarium: ideo in digerendis disponendisque eius partibus, Galenum quantum poterimus imitabimur, qui universam

munē earū naturā spectat nulli loco, nulli particulæ, ita priuatim ac commodari possint, quin & aliis attribuantur: & propterea curationis ratio, & methodus, quæ ab istis indicationibus constituenda est generalis dicitur, vel penes genera accepta. Quæ verò à compositis particulis priuatim depromuntur, & à peculiari & propria earum natura à locis accipi dicuntur, & medicamenta, quæ componuntur ex collatione & comparatione cum his priuatis indicationibus & scopis, iuxta locorum naturam composita esse dici possunt, atque localia medicamenta, vel remedia à medicis appellari solent. Et quemadmodum simplicia membra, quæ & communia à nobis nuncupata sunt, natura priora sunt, & indicationes quoque ab illis desumptæ; & scopi qui has sequuntur communiores & generaliores sunt ita priorem etiam sermonem de eorum medicamentorum usu & compositione instituemus, quæ ad has indicationes spectant: postea vero de illis quæ referuntur ad naturam certæ alicuius & de finitæ particulæ, ut sunt, cerebrum, oculi, nares, aures, lingua, vel os, pulmones, cor, iecur, lien, ventriculus, intestina, renes, vesica, uterus, manus, brachia, & id genus alia. Sed quia vniuersa primorū membrorum ratio & natura, tum in recta consistit temperie, tum verò in vnitæte, vel cōtinuitate: ideo necesse est, ut omnes affectus, vel morbi: quibus hæ simpliciores partes tentari primum possunt, aut in vitiatam temperiem tanquam in proprium genus referantur, aut in solutam vnitætem cōtinuitatemivè. cum enim morbus nihil aliud sit, quam quidam recessus à naturali statu ipsius particulæ, vel, quod tamen tantundem valet, recessus à sanitate, inde sanè conficitur, ut sit necesse in eisdem generibus morbos consistere: in quibus sanitas, vel naturalis corporis constitutio. Semper siquidem opposita in idem genus referuntur, & eadem semper est oppositorū disciplina. His tamen omnibus hoc prætereā addimus, quod quamuis in his commentariis sumus professi, nos esse eum ordinem sequuturos, quem ostendebat ea indicatio, quam nobis ratio affectus partis primū. afferebat: non est tamen ita id accipiendum, ut velimus perinde esse spectandam hanc indicationem in compositione, & usu horum medicamentorum, quæ in considerationem revocanda sunt: ac si altera quam nobis natura affectus demonstrat, esset omnino prætercunda. immo nec esse semper est, ut hæc illam præcedat, & sit quasi primum idæum fundamentum in conficiendis atque

Victoris Trincauellij

in vsum deducendis congruentibus medicamentis. vnde vt ratio vniuersa curationis variatur, partim ob diuersam naturam ipsius affectus, partim vero pp diuersam naturam, corporis, vel partis affectæ, ita etiam ab his duobus vniuersa ferè ratio tam compositio nis, quam vsus medicamentorum omnino est petenda: quare vt apte & concinne possimus cõmunem & generalem methodum propriis, & priuatis accommodare præceptis, & à communibus, & vniuersis indicationibus ad priuatas particulatim descẽdere; oportet prima indicationum genera partiendo differentias omnes, usque ad vltimas inuestigare. Sed cũ indicatio sequatur naturã rei indicantis, omnis indicationum differentia à differentibus rebus ortum habet; quæ vim aliquam indicandi habeat. Aggrediamur ergo negotium. omnis intemperatura, vt aliàs etiam exposuimus, aut simplex est, in qua nimirum excessus duntaxat est in vna primarum qualitatũ cõtrarietate, aut composita, in qua excessus est in vtraque contrarietate. præterea verò, vel is excessus nullum ab aliquo humore, vel materia fomentum habet: ita vt quatenus ad illum atinet, sit citra omnem materiam. vel habet præsentẽ materiam à qua seruatũ & fouetur, neque tamen erimus longiores in illis differentiis tam simplicibus, quàm compositis particulatim exponendis; cum nullus sit medicus adeo ignarus, qui non nouerit, quatuor esse simplices, & quatuor compositas intemperaturas, quatenus ad rationem qualitatũ pertinet, quòd que si ad rationem materiæ respiciamus, tot sunt intemperaturæ, quot etiam materiæ, vel humores à quibus illæ suum fomentum habent. Sed hoc considerandum est, in quo maius videtur esse momentum: nempe quòd duplex est modus earum intemperatarum, quæ ortum & fomentũ habet à materia præsentẽ. nam vt 2. lib. comment. in primum epid. docuit Gale. aliquando humor per vasa alicuius particulæ fluens alluit, & quoquomodo perfundens circumstantes partes, easq; transmutans per suas qualitates, vitiatas illarum naturali temperatura, actiones inde provenientes lædit; & istius generis propriæ sunt morbi illi, qui in intemperiem cum materia referuntur aliquando autem à præcipiti & confestim facta fluxione humorum decumbentium in aliquam partem: primum replentur vasa maiora eo pertinentia & intumescunt. mox vero eadem fluxio & in minora impellitur; quæ itidem repleta distenduntur. demum præ multitudine materiæ, & distentione vasorum pars aliqua, & illa quidem non exigua

exigua quasi expressa excidens extra vasa, replet inania spacia circumstantia, quæ nimirum intercedunt inter vasa, & alias partes, vt sunt muscoli; & aliæ vicinæ partes. replet & angustos meatus ipsarum particularum penè ab ipsis absorpta, & ibi infarcta in tumore particulam attollit: & quamuis interdum non ita præceps & confertim defluat humor: sed potius paulatim, vt in crassis succis sæpius euenire solet, nihilo secius tñ cū implentes infarciuntur, tandē fit eadē quasi expressio, & repletio vicinarū partiū, & hoc patet vt docent medici: imprimis verò Gal. multis in locis, fiunt omnes differentiæ tumorum in quos attolluntur particulæ præter suę naturæ rationem. Sed neque hoc silentio inuoluendum est, qui sicuti simplicibus his particulis nihil prius, & intimius attinet, quàm suum naturale temperamentum: ita etiam quicumque morbi primum his ipsis attribuuntur, paulo post ferè necessitate quadam comitem habent intemperiem loci morbosī, quod facile probatū est. si quod enim est morbi genus, in quo sententia hæc anceps videri possit, illud est, quod in soluta continuitate consistit. præsertim, si ab externa occasione fiat, ut à gladio, vel simili aliqua re: si quis autem recte animaduertat, & rerum naturam velit considerare, facile percipiet necesse esse, vt statim aliqua intemperies sequatur. nam præter id, quod locus fit inbecillior (alioquin enim non duplex esset excrementum, quod medicum cogit in curandis vlceribus vtī semper quidem medicamentis exiccantibus: sæpe verò, & detergētibus,) vix fieri potest, quin aliqua excrementitia materia à partibus integris & valentibus affluat ad locum affectum & inbecillū, quæ immutare potest naturale illius partis temperamentum. huic etiam accedit quod neque ita fieri proba potest concoctio alimentī proprii à loco vlcerato: quin augeatur semper excrementitia quædam & superuacanea humiditas, quæ impedimento est vlceri, quo minus consolidari possit: nisi locus desiccetur. tumores verò præter naturam proprie & primum in genere morborum sunt, qui in intemperie consistunt, quæ cum materia est; unde & medicamenta omnia, quibus in curanda soluta vnitatem vtīmur, vel in curandis tumoribus, quæcunque illa sint, siue composita, siue simplicia, primum per suam temperiem agunt, & transmutant illam partem, cui adhibentur, calefaciendo, aut refrigerando, aut desiccando, aut humectando: deinde vero per secundas, vel tertias qualitates, nempe astringendo, vel laxando, concoquendo, detergendo, at id ge-

nus alia præstando. & proinde, cum in omni horum medicamento
rum ratione & vfu oporteat primum particulatim meminisse sui
temperamenti, per quod agere & transmutare possunt morbosam
partem, atque scopos exponere, quod spectare sit necesse, quando
ipsa componimus, & compolitis vtimur: ideo non seor-
sim tractationem de illis medicamentis instituemus, quibus
vti oporteat in curanda, & emendanda vitiosa intemperie contra-
cta in aliqua parte ex interna externave occasione. Sed statim ser-
monem aggrediemur, qui versabitur circa rationem medicamen-
torum, quæ solita sunt venire in vsum in curandis duobus morbo-
rum generibus, nimirum tum illis, qui ad unitatem solutam perti-
nent, tum verò illis, qui ad diuersas differentias tumorum præter
naturam. Sumpto tamen initio à ratione curandorum vlcерum
& vulnerum.

*De ratione compositionis & usus eorum medicamentorum quibus me-
dici uti solent in curanda vnitatis soluta: Cap. 2.*

Solutæ vnitatis, si rem recte iudicare voluerimus, duæ sunt pri-
mæ differentię, nam aliquando partes diuise, ita dehiscunt & mu-
tuo separantur, vt earum solutio sensibus cõprehendatur, sicuti qñ
à re incidēte, vel cõtēdēte, vel distēdēte, vel detergente, & eroden-
te, vel vrente, vel mordente partes dilacerantur separanturq;: ali-
quando verò, & si vnitatis omnino soluat, non est tamen ea solu-
tio talis, vt partium diuisio oculis, vel aliquo sensu percipi, & di-
scerni possit, sed cogitatione potius rationeq; deprehenditur.
Nam hoc constituto, quòd causa doloris sit vnitatis solutio: & pro-
xima eius causa, vt credimus sensisse Gale. atque ita rem se habere
putamus, quicquid voluerit Auerrois, necesse est, quòd in quacun-
que parte dolor excitatur, in ea sit vnitatis solutio: at tamen sæpi-
sime dolores etiam vehementissimos in aliqua particula concita-
tos animaduertimus, in qua nullam diuisionem notare possu-
mus quæ adeo insignis sit, vt sensu aliquo percipi possit. de hac au-
tem solutione continui non agemus in hac tractatione primum &
per se, neque de medicamentis, quæ illi remedio esse possunt: nisi
quatenus interdum solent dolores vehementes vulnערum, aut vlce-
rum esse comites, qui rationem curationis, aut omnino, aut aliqua
ex parte ad se conuertunt. Sed de medicamentis illis præcipue ser-
monem

monem instituamus, quibus vsi medici, vlcera, & vulnera & alias consimiles in simplicibus & similiaribus membris concitatas affectiones curare consuevere. Hoc autem istorum affectuum genus multiplices & varias habet differentias, quæ omnes variam viam rationemque curationis, pro varia ratione & natura harum differentiarum ostendunt, & subinde variam quoque & differentem rationem medicamentorum requirunt. porro autem diuersitas, & distinctio istarum differentiarum occasionem habet, aut ab ipso affecto membro, aut à natura affectus in se, & secundum propriam suâque naturam considerati aut ab aliis, vel symptomatibus, vel affectionibus, quæ cum soluta continuitate iungantur. Sed de prima diuisione differentiarum, quæ depromendæ sunt à varia natura affectus membri prius agamus: sicuti igitur diuersa sunt, & dissimilis naturæ membra simplicia, quibus infligi possunt vulnera, ita & morbi, qui alioquin in seipsis considerati similes dici mererentur: ita diuersi, & differentes habentur, ut etiam diuersa nomina sortiti sunt, & differentem curationem desiderent. Quod enim differentia nomina habeant morbi, qui in solutam vnitatem tanquam in proprium genus referuntur, ostendere medici antiqui serè omnes, sed præsertim Gal. tum alibi, tum vel maxime in libro de differentiis morborum, qui dixit vulnera quidem & vlcera solutam continuitatem in carne significant, græce vero *τρυφή*, vel *ἡλυσ* & id si ex incisione fiat continui solutio: quamquam qua ab externis fit causis Hipp. ex *πύρε* appellat. nam si disrumpatur caro alia ratione, *πύρε* potius, vel *τρυφή* ut idem 3. & 6. meth. tradidit, nuncupatur: at in nervis facta ex incisione continui solutio, nomen proprium non habet, neque Græce, neque Latine, sed eisdem nominibus, in his abutimur, quibus & in carne. nam ulcera & vulnera nervorum itidem appellamus. immo & eodem nomine significamus solutam continuitatem in nervis concitatum non ex incisione, quo & in carne nuncupamus: quamvis deinde habeant quoddam magis peculiare nomen nervi, quo significatur quædam differentia cuiusdam solutionis unitatis particularitatis: nempe quando ex distentione diuelluntur, & dilacerantur fibræ, illæ ex quibus præsertim contextus est musculus: nempe *ῥήξη*, quasi diuulsionem dicas. Sed hoc idem nomen ad venas & arterias transferimus, quando similem affectus rationem patiuntur. cum vero os solutionem continui pati-

Cap. 11.
lib. 1.

Galenus 3.
pror. com.
3 vi.

Cap. 1.
Cap. 1.

R tur

pus humanum consideratū in uniuersum, & non dum per aliquas limitationes particulatim determinatum. Alterum vero iudicium medico necessarium est, ut medicamentum refertur ad usum. uersatur autem id iudicium circa hoc, ut cognita natura, & facultatibus compositi medicamenti, iudicet in quo morbo, quo tempore, quibus in locis, quibus corporibus illo possit apte & salubriter uſi. ex collatione ergo medicamentorum particulatim ad ipsos usus fit hoc alterū iudiciū. Vnde primū illud fieri debet examinatis prius seorsim singulatimque simplicibus omnibus, ex quibus conficiendū aut confectum est medicamentum: deinde uero illis omnibus mutuo inter se collatis. quemadmodum enim in cōpositis naturalibus ex mixtura proximorum elementorū, ex quibus conflatur mixtum, emergunt, & resultant uires, & facultates illius mixti: ita in compositis medicamentis ex mixtione & quasi confusione simplicium, unde conficiuntur, existunt & quasi emergunt omnes uires, quæ possunt quoquomodo illi composito medicamento iure attribui. Quare maxime rationi est consentaneum, illum optime indicaturum ali quod compositum medicamentū, qui prius nouerit particulatim ea oīa ex quib. cōfectū, aut cōficiendū est, probeque rōne inire ac multo cōferre illa sciuerit ex quib. medicamēti cōpositio cōstat. Alterū autē qđ circa usum uersatur, illud est, qđ perfectū medicū demonstrat. nā & si primū etiā sit illi summe necessarium: nisi tamen & hoc alterū accedat, nihil ferē primū proderit, hoc alterū. n. tū medicū omnino tū cognitionē, peritiāque medicamentorū absoluit: primo nanque iudicio innixi nōdū possumus, ut Gal. sæpe testatus est: pſertim uero in lib. de comp. med. secūdū loc. pronunciare, nū medicamētū bonū, vel malū sit, recte cōpositū, aut secus, quandoquidē id cognoscemus, ubi primo præterea fuerit additū, & hoc alterū. istius uero omnis ratio petenda erit ab ipsis scopis, quos nobis offerunt indicationes, quæ uniuersam medendi methodū constituunt, & regūt. cōsideratis ergo & recte perpēlis omnibus illis rebus, tam naturalibus quā etiā illis, quæ præter naturā rei accidentales, uim aliquā indicādi habent, recte fieri hoc iudiciū poterit. Vim autē indicandi habent, quatenus ad res naturales pertinet, propria & naturalis corporis temperatura, ad quā ætas, regio, uita institutū, & consuetudo refertur: deinde uero particulatim natura & tēperatura malę affectę particulæ. In rebus uerō, quæ sunt præter naturā, in nobis, uim propriā indicandi habent præsertim affectus, deinde causa: Interdū ta-

quidam, vel inanis locus, qui aut cruore, aut aere repletur. Si ergo restituenda est illi particulæ unitas, & integritas, necesse est ut partes, quæ diductæ dehiscant, adducantur, & mutuo hærentes, primum agglutinentur, mox et concrecant coalescantque. agglutinentur autem ope sanguinis, qui tum in osculis exilium uenarum, tum etiam in angustis meatibus recipit carnis continetur. ille enim officio feri glutinis fungitur. coalescunt autem ope ra natiui caloris, qui eas etiam particulas sanguinis in substantiam & naturam veræ carnis conuertit. perinde ut alimentum in substantiam rei, quæ alitur conuertere quotidie solet. in quo quidem negotio ad medicum solum pertinet, aut administrantem illi chyrurgum labia, vel diductas vulneris partes in vnum adducere, cum id natura: Si vulnus aliquantisper insignis sit, ex se nequaquam præstare possit: mox vero procurare, ut adducta, quoad mutuo coaluerint, coniuncta permaneant: id autem medicus non quidem medicamentis facere potest. sed potius manu sua: & fasciis vinculisque, tum etiam futura, aut fibulis, neque in his opus est medicamentis quantum ad hoc munus pertinet: nisi si quando paniculis glutinoso aliquo medicamento imbutis utimur, & illis utrinque vulneratis partibus agglutinat, atque assutis aliquibus uinculis, quibus tanquam instrumentis, ut suturam fugiamus, adducimus labia, vel latera uulneris: quod in facie præsertim fieri consuevit. hæc itaque solus medicus conferre potest. sola autem natura eos humores, quibus medijs agglutinantur, & postea simul coalescunt vulneratæ partes, tanquam aptam, & congruentem materiam potest subministrare: medicus vero, aut nihil, aut parum: præterea vero & concretio & coalitus ille, non nisi opera naturæ sit, & caloris natiui, qui aut ipsamet natura est, aut eius proximum instrumentum. Medicus tamen tanquam eius adiutor, & minister illam in hoc opere potest iuuare, & id duplici ratione: primum ea administrans remedia, quibus siccescens modice materia ea, qua media agglutinantur coalescuntque partes citius negotium absoluit, & validius tenaciusque hærent: nam neque fieri potest, quia per solutam particulæ unitatem, ea reddita imbeciliori, non semper aliqua excrementitia humiditas subcreseat quæ remoretur, aut impediat coalitum unionemque partium: quæ propter huius rei utilis est exiccatio. hac ergo ratione primum potest medicus suis medicamentis utilem operam naturæ præstare: Deinde uero quando uulneri ali-

quod superuenit symptoma, quod impedimento sit, quo minus possit medicus disiunctas, & separatas partes adducere, & coniungere, & natura nequit ea molliri, quæ ad halitum & unitatem faciunt, & subinde neque etiam eius minister medicus. Vnde prius ad medici officium pertinebit suis instrumentis procurare, ut symptomata, quæ curationi impedimento sunt, remoueantur: sæpe vero vulneribus inter initia possunt accidere, ac impedire curationem profusio sanguinis: præsertim vero, si venæ aliquæ, vel arteriæ insignis alicuius magnitudinis sint recisæ, & potissimū in profundioribus, & latentibus partibus vulnerati loci: deinde dolor aliquis non contemnendus: tertio vero (& hoc maiora vulnere & profundiora solet sequi) cum incisio magna & profunda fuerit, quamuis suauis vulnus fasciisque & uinculis quantum ars admittit, astringatur, nequeunt tamē ita exacte adduci latera vulneris, ut undique & ex omni parte mutuo sibi hæreant & iungantur: sed semper necesse est relinqui: saltem in fundo, aliquem hiatus & locum vacuum, in quo nunquam poterit fieri agglutinatio & coalescentia: Vnde in his erit necesse, ut carne regenerata locus repleatur, quo partes deinde uniantur, & continentes fiant. possunt & alia superuenire symptomata, quæ in causa postea erunt, cur vulnus in vlcus transeat, ut intemperaturæ, & id genus alia: Sed de his postea suo loco particularim agendum erit: in præsentia autem de illis instituimus tractationem, quæ propriè vulnera à nostris dicuntur *τραύματα* vero à græcis, interdū *ἡμῆτε*, hoc est, cruenta ulcera: & de simplicioribus primum: simpliciora vero illa appellamus, ut Gal. 3. meth. & aliis etiam præcedentibus libris appellauit, quæ nullum aliud adiunctum symptoma habent, nullam aliam circumstantiam præter ipsum vulnus. de compositione ergo & usu eorum medicamentorum agemus in hoc capite, quæ faciunt ad curandum vulnus in quantum vulnus est: nulla nimirum habitatione alterius rei, quæ cum eo coniungi possit: & priuatam aliquam indicationem habere: Et quia ratio componendorum medicamentorum ad hunc usum præsertim referenda est in rationali medicina: vsus vero ad propositum scopum: Ideo imprimis in uestigandum proponamus, quis sit is scopus, quem spectet vulnerarius medicus vulnera curaturus, & si ille non sit vnus tantum, sed plures, qui tandem illi sint. cum vero Gal. secundo meth. fuse & clare rem hanc explanauerit, summam vero & per capita in secundo de compositione medicamentorum

rum secundum genera, & in cōmentariis librorū Hippo. de fracturis, ab eo vniuersam hanc rationem petemus. duo ergo imprimis esse utilia his vulneribus agglutinandis & ad unionem perducēdis docuit ibi Gal. nēpe exiccationē & astrictiōē, neutrā tñ insignē & multam. Quōd utilis & necessaria sit exiccatio, nuper hoc capite probauimus: quod tamen omnibus, tam vlceribus, quam vulneribus commune est: omnia enim ea desiccatione egent. Sed & astrictio utilis est, vt pote quæ partes cogat simulque colligat: præter id quod agglutinationem ualidiorem reddit non multa tamen in his exiccatione opus est, quia humorē cui accepta referenda est agglutinatio, nimis siccādo, aut assumeret aut ineptū ad agglutinationē redderet: Sed & astrictione modica opus est: nā quæ ualenter astringunt vt sepe testatus est Galenus, valide etiā exsiccant, sed & valide colligēdo particulas in causa, sunt cur, si quis humor in earum meatibus sit contentus, qui utilis esset naturæ ad huiusmodi negotium, ab his ad alias exprimitur, & impellatur. utilis est ergo modesta astrictio, quanta nimirum satis sit ad colligendam & roborandam particulam, atque ad firmādam agglutinationem. præterea uero ad illam tuendam, ne ab alijs integris superuacuas humiditates recipiat, quæ incarnationi, ut ita dicam, sint impedimento: Si quis autem ulterius progressus petat magis particulatim, & distincte rem hanc diffiniri, ac quærat quatenus id genus medicamēta, quæ huic officio sint congruentia, exiccantia esse oporteat: Dicemus nullam posse istius diffinitam, & statutam mensuram describi, neque aliquem determinatum ordinem assignari, quia pro diuersa ratione temperaturę corporis, aut uulneratę partis, item pro ratione ætatis, sexus, artis, uel institutionis uitę, rationis, uictus, & aliorum omnium, quæ modum & rationem temperaturę corporis solent immutare, mutatur etiam ratio & modus uel mensura medicamenti. nam si ita est, ut probauit Gal. sepius, præsertim uero 3. meth. cui & Auicenna 4. fen. 4. subscripsit, quōd eo medicamento in horum uulnrum curatione uti oporteat, quod cum loco uulnerato collatum, uim habeat exsiccandi, & tanquam axioma à philosophis accipitur. quod inter ea quæ equalia sunt, & secundum qualitates paria, non potest esse actio, necesse est, ut si siccanda sit particula, uel ad maiorem siccitatem perducenda, medicamentum facultatem habeat magis desiccantem, quam sit siccitas, quæ tunc in desiccando membro reperitur. unde temperaturę, & sexus, & ætates, & reliqua id ge-

nus, quæ sicciora sunt, in vulneribus curandis, desiderabunt ea
 medicamenta, quæ maiorem vim exiccandi habeant, & quæ humi-
 diora, minus exiccantia requirent. At verò quia neque etiam oportet
 insigniter excedentem esse eam exsiccationem, sed respectu cor-
 poris modestam & modicam: maiorem tamen, ut Gal. 3. & 4. meth.
 affirmat, quam illa sit, qua est opus in vulnere, ubi caro delit & ea
 sit generanda, sicut maior requiritur in adducenda cicatrice vulne-
 ri, quam in eo agglutinando: Vnde quantum ad hæc pertinebit, tri-
 plex erit ordo exiccantium medicamentorum, quæ sint apta curatio-
 nibus vulnerum, quatenus vulnere, nam omnino eorum vniuer-
 sa curatio exsiccatione absolvitur, & quæ carnem in vulneribus
 gignere apta sunt, in primo sunt ordine, quæ ea possunt agglu-
 tinare, secundum occupant ordinem, vel ut nunc loqui solent
 medici, gradum: quæ verò cicatricem inducere, tertium. Nisi
 quod alia ratio est istius distinctionis vel partitionis istorum ordi-
 num in his medicamentis obleruandorum, quando ad curanda vul-
 nerata referuntur, & alia quando in ea medicinae parte in qua de
 facultatibus simplicium medicamentorum in vniuersum, & gene-
 rali ratione agitur: quia ibi de illis & eorum distinctione com-
 muni quadam ratione sermo est institutus: nempe quatenus re-
 feruntur ad corpus temperatum. illud enim est veluti commu-
 nis mensura ad quam primum referenda sunt omnia communia
 theoremata ad medicum spectantia. Hoc vero loco ordines hos re-
 ferendos censemus, non ad temperatum corpus: Sed ad illud
 quod curandum est: nempe ut cum est in vulnere generanda caro,
 illis utamur medicamentis, quæ in exiccando, collata ad natu-
 ralem siccitatem illius corporis, quod vulnus accepit, illam per
 vnum ordinem excedant: si sit tentanda agglutinatio, per al-
 terum: Si sit inducenda cicatrix, per tertium quo deinde sit,
 ut eadem medicamenta possint generare carnem in vno, quæ
 in alio non poterunt. Semper enim sicciora corpora siccio-
 ribus in omnibus his officijs indigebunt medicamentis: humi-
 diora vero, minus desiccantibus. Quibus & hoc addendum pu-
 tamus, quod non modica ratio & ipsius diuersitatis habenda est,
 quæ in vulneribus solet plerumque conspici. nam vulnera exigua
 leuioribus & facilioribus medicamentis possunt curari, maiora ve-
 ro non ita: immo valentioribus est in illis opus. Sunt enim
 quædam vultuscula, quæ nature sponte sine ulla medici ope ag-
 gluti-

glutinantur, alia facillime leuique medicamento, sicuti interdum solo albo ouijalia verò maiora uix efficacioribus & maioribus consoldari, & curari possunt, unde Gal. 2. de comp. med. secundum generis istius rei memor, cum de barbaris medicamentis esset sermo, & multas eorum compositiones exposuisset: descripturus illas, quibus ille imprimis utebatur, duas proponit circa calcem illius libri, quarum primam accommodandum esse ait magnis: alteram verò, minoribus vulncribus. Sed iam particulatim agamus de ipsis medicamentis: satis uamque circa generalia theorematum sumus euagati. Hoc accepto tanquam constituto, quod scopus sit in his omnibus medicamentis huius officio futuris idoneis, manifesta uel conspicua respectu exiccandi corporis exiccatio, non tamen ea uehemens & multa, sed tanta ut possit cito, nempe antea quam materia illa, qua agglutinandæ erant partes in pus uertatur, sicetur quantum oportet, absumpta si quo sit excrementitia humiditas interrim in ulcere genita, nam cito pus succrescit, secundo enim ferè uel tertio, uel ut Galenus tertio libro commentariorum in libro de fracturis testatur, ad summum quarto die. Si ergo de his medicamentis, nobis dicendum est, quæ his scopis accommodari possunt, illud imprimis aduertendum quod in his aliqua simplicia sunt: aliqua uero composita: simplicia quidem ex propria sua ratione id habent, ut agglutinare uel incarnare, ut etiam uocabulo iuniorum utamur, ualeant: unde medici illis solis citra aliorum medicamentorum compositionem & mixturam interdum utantur, ut in progressu sermonis à Galen. petitis exemplis. ostendemus composita uero medicamenta, quæ ad hos usus confecta à medicis fuere, quamuis vires suas à simplicibus, unde constantur sint sortita, multa tamen sæpe in illis accipiuntur, quæ particulatim & quantum ad suam naturam priuatim pertinet; non modo his scopis non possunt aptari, ut potius illis sint aduersissima: sed aliorum mixtione ita miscescunt, ut idonea & utilia reddantur, & ideo quamuis in compositis antiquiorum uel iuniorum medicorum aliqua reperiemus scripta, simplicia non statim eo etiam accipienda sunt tanquam ui prædita agglutinandi: in medicamentis ergo agglutinantibus, quæ simplicia sunt, primum & leuissimum illud est, cuius mentio facta est à Galen. xi. de simplicibus medicamentorum fac. nempe album

Victoris Trincauelij

album vel candidum oui : nisi quis forte dubitet, quia hoc videtur alienum ab initiis, uel fundamentis positis. nam si quæ agglutinant magis siccant, quam quæ carnem gignunt, adeo lenis siccitatis est oui album; sicut Galibi affirmare videtur: ut uix reperiās medicamentū idoneū generandæ carni: qđ minus siccare possit: præterea quamuis repellendi facultatē habeat, id tñ habet, non quia sit astringionis particeps, quæ tamen erat secunda conditio harum medicinarum: sed tum refrigeratione, tum verò emplasticæ & glutinosæ substantiæ. Ad has dubitationes in hunc modum respondere possumus, quod in humidioribus corporibus potest agglutinare, quia satis est quòd tantum deficcet, ut ad naturālē siccitatem corpus adducatur. nuper enim diximus, mensuram siccitatis in his non esse accipiendam ex natura ipsius medicamenti per se, & in respectu corporis temperati: sed ex collatione cum corpore vel parte uulnerata. Vnde multa medicamenta corpus vnum nimis exiccabunt, quæ alterum aut nihil, aut parum: immo etiam vlcus humidius reddēt. ad id verò, quod de astringitione oppositū est; primum nolumus contendere, an album oui sit alicuius astringionis particeps; nā Auic. 2. Cano. ubi de ouis agit, uidetur aliquam astringionem albo attribuere, apud Gal. uerò hoc non memini me legisse: sed dicerem quòd quamuis per se quidem non astringat, idem tamen officium præstat, ac si leuiculam haberet astringionem, ut possimus affirmare, quod quasi per accidens astringit: nam refrigerando & partes quoquomodo subinde constipando & densando colligit, atque tum hac eadem ratione repellit, tum vero glutinosa & quasi emplastica sua substantia, impletis nempe angustis & in conspicuis meatibus, tam carnis quam uenularum, in causa est cur arceatur & reprimatur fluxio humorum à uenis maioribus ad minores & peculiare uenulas, atque ut prohibeatur inflammatio, ut præteream nunc, quod tamen non est omnino prætereundum, quod & dolorem sedat, & sanguinem fluentem ex uulnere hac ferè eadem ratione sistit. Hæc de oui albo Gal. præsertim 4. de comp. med. secundum loc. ubi de oculorum morbis agit, nos docuit. Præterea & uinum quod medium sit ut 2. ad Glauc. ait Gál. inter dulce & astringens ut communi quadam ratione omnibus uulneribus & ulceribus utile est: ita agglutinandis ipsis non inutile erit medicamentū: quamuis nigrum uinum magnis uulneribus magis sit opportunum. Sed anteqnam ulterius progrediamur erit aduertendū, quòd plurima

plurima medicamenta simplicia describemus: tum ex aliis, tum uel maxime ex Gal. quæ si fuerint recte perpenſa, & cum his, quæ de iſſis deſcripta reliquit Gal. collata, facile percipere poterimus, id quam maxime uerum eſſe, quod paulo antea dicebamus, non eſſe exquisitè unam rationem eorum omnium, medicamentorum, quæ ad conglutinanda recentia vulnera medicis poſſunt in uſum uenire: utpote quoniam ea diuerſam rationem habeant collata cum diuerſis corporibus, aut cum diuerſis vulneribus. Cum enim, ut paulo antea dictum eſt, vniuerſa conglutinandi ratio primum quidem in modeſta deſiccatione conſiſtat, deinde uero in leui aliqua aſtrictione: abſterſio autem potius aduerſaria eſt unde & ſi aliquando aliqua medicamenta ſimplicia, aut etiam compoſita, quæ uſilia ad hanc concretionem, uel conditum vulnerum cenſentur ab auctoribus, uidebuntur non eſſe expertia alicuius detergentis facultatis: tamen ſi rectè illa fuerint conſiderata adeo modica viſ illa detergenti erit, & alioquin ab aliis ita ſuperata, ut exiguas admodum vires poſſit habere. aliæ uerò qualitates, quæ à peripatheticis actiue dicuntur, per ſe quidem quatenus ad agglutinationem pertinet, nihil faciunt. unde inter hæc multa calida ſunt, non pauca autem frigida: ſed omnia deſiccantia & aliquantiſper aſtringentia. & ſi res hæc fuerit diligētius examinata, ad maiora vulnera maiori exiccatione erit opus, minori uerò ad minora: item minorem deſiccationem requirunt corpora molliora, & humidiora: maiorem uerò, duriora & ſolidiora. unde quotieſcunque Gal. in libris de facul. ſimp. medi. ſermo eſt de illis medicamentis, quæ ſecundum ordinem deſiccantium excedunt atque inſignis ſunt aſtrictionis, non proſert ita absolute, conglutinare vulnera: ſed addit, quod uel magna, uel maxima vulnera conglutinant, aut quòd in duris corporibus, de aliquibus uero ait, quòd uulnera magna conglutinant, ulcera uero maligna & antiqua curant. Sed illa quæ mediocria, uel parua vulnera conglutinando poſſunt ſanare, itemque in corporibus mediis, aut etiam teneris, ut ea quæ ſunt in ſecundo ordine, uel etiam infra, nullam aliam determinationem addit: ſed ait eatenus exiccare & aſtringere, ut conglutinare poſſint uulnera. addimus uero, uel infra ſecundum ordinē, quia ſi rectè aduertamus Gal. 6. de facul. ſimp. med. inſinuare uideatur quòd ea, quæ media, uel teneriora corpora uulnerata poſſunt conglutinare, non conſequē in ſiccitate progreſſa ſunt, ut ad finem uſque ſecundi ordinis perueniant, ſed uel in medio illo, uel infra
etiam

etiam consistunt, quod exemplo bituminis, picis, & resinæ ostendit: sed insuper & hoc aduertendum est, quod folia, germina, fructusque plantarum dum viridia sunt, semper terè partem quandā habeat humidam & aqueam; quæ, cum arescunt, euanescit, & propterea plantarum partes hæ: si vim suapte natura exiccandi, & astringendi habent, maiorem illam habent, quando aridæ sunt: quā quando virides: & ideo multa horum glutinare ait cum uiridia sunt: Galenus ergo inter ea, quæ mediocria vulnera agglutinare possunt recenset rubi folia, item piceæ & thædæ, & polygoni, polii polyneumonis mala austera, & acida, salicis folia, pira domestica, bretanica, myriophyllon, peristereon. quercus folia viridia, & tenera, item & vlini, & brasicæ, & centaurinum maius. præterea verò & caseus recens tritus, caro cochlearum trita, & sarcocola. vulneribus accommodata etiam est Aloe: sed quia in tertio ordine est, dixit Gal. quod utilis est, cum subigitur aqua, ut eius facultas desiccatoria & astringentia, ex aqua temperetur, quod nobis potest tanquam præceptum esse, quo doceamus. quod si interdum desint medicamenta, quæ nobis idonea propterea videantur, quia facultates maiores habeat, quam nobis possit esse ex usu, si ea parentur ex aliqua alia re, quæ remittere & detrahare de uiribus possint, fieri poterunt nostro officio idonea. Maiora verò vlcera, & in siccioribus corporibus conglutinant narcissi radix, cauda equina, scordium, pira siluestria, & austera, folia, & germina corni, stæbe, isatis, pix arida, bitumē, & resina, & amurca. quæ omnia, si corpora sicca & dura fuerint, conglutinare possunt. alioquin enim contendunt, ut 6. de simplicib. medic. facul. dixit Gal. potius & irritant, si mollia & tenera fuerint.

De compositis medicamentis, quibus commode uti possumus in conglutinandis uulneribus. Cap. 4.

Compositorum medicamentorum, eorum inquam, quæ ad præsens institutum attinent, duplex videtur esse ratio. nam quædā parata seruari solent, uel apud sepulchros, uel apud medicos; & præsertim in ciuitatibus, aut ubique aut plerisque in locis, & hæc, tum propterea, quia medicis propter eximias, & multas eorum uires, longa experientia probatas in frequenti usu sunt: tum uerò quia propter operam & diligentiam, quam requirunt dum conficiuntur

tur neque breui tempore, neque semper, & vbiq; parari possunt
vnde parantur idoneis temporibus, & maximè cōmoditati solent
esse. præsertim in itineribus, in exercitu, in nauibus. peritus. n. medi-
cus ope duorū vel totū medicamentorū poterit diuersissimis affe-
ctibus in diuersissimis naturis, & temperaturis corporum consule-
re. nam si aliquod compos. tum illi paratum adsit quod validas vi-
res habeat, quarum robur & acrimoniam non multi ferre possunt,
ille, altero aut infirmiori facultate prædito, aut etiam contraria, im-
mixto, & id secundum variam & diuersam rationem mixturæ varia
& diuersa facile conficiet medicamenta, quibus poterit accommo-
date, vt sæpe Gale. docuit, vt in diuersis corporum naturis, & di-
uersis etiam, tam vulnerum, quam vlcerum differentiis: ut quam-
uis duo tantum sint medicamenta actū, potestate tamen illi sint fu-
tura quam plurima: ex multiplici ergo vsu eorum parata seruantur,
& talia plerunque ea sunt, quæ in maiori existimatione semper fue-
re apud plures medicos antiquos & iuniores. aliqua etiam ita para-
ta seruantur, licet non in multiplicem vsū veniant, sed in vnum
duntaxat, quia ad illum vsū præ aliis omnibus ferè sunt præstan-
tiora, atque omnia penè talia, quæ ita vbiq; solent parata inueniri,
efficacissima solent esse, vt non nisi in difficilioribus affectibus,
& durioribus corporibus soleant administrari. Alia verò, non ita
seruantur: sed solum cum illis voluerimus vti, parantur, tum quia,
neque alioquin integra possent seruari, tum etiam quia & materia
vnde conficienda sunt, & modus ratioq; compositionis nobis sem-
per in promptu est, vt inter facile parabilia medicamenta possint
recenseri. Et quia horum ratio faciliior, & magis in promptu est: iō
de his primum verba faciemus, vt tamen neque omnia expona-
mus, quæ in hunc ordinem redigi possent, nam nimii in illis enarra-
dis essemus, cum ferè innumera sint. sed aliquibus expositis, relin-
quemus occasionem iuuenib; s; ut istis vsi tanquam exemplis: ip-
si deinde, vbi illis vsu euenerit: aliorū simili modo cōponēdorū ra-
tionem ineant. & cum facilima ferè inuentu sint oua, quorum al-
bum tanquam accommodatum huic negotio laudauimus, sed cuius-
simum illud & admodum imbecillum ad conglutinationem vulne-
rum diximus, quo tamē frequentissime, & in omnibus ferè adhuc
recentibus, & à quibus effluit sanguis, vtimur ad sanguinē sistēdum
& supprimēdū: si voluerimus ipsum reddere valētius, & efficacius,
addeamus aliquid, qđ siccantius & astringentius sit, & illud erit eli-
gendum

aptius, quo verò maior copia Aloes addita fuerit albumini, eò ualentius erit medicamentum & difficilioribus conglutinatu vulneribus accommodatius. & eadem ratione possunt fieri varix mixturæ suprascriptorum simplicium, & in diuersis ordinibus, pro ut illa magis erunt medico in promptu. quas si vellemus singulatim exponere, nunquam finem esset hæc tractatio habitura: vnde hic consistemus, præsertim cum in explanandis medicamentis illis, quæ in communi vsu sunt & parata reperiuntur, hoc ipsum quod nunc de clarabamus fiet apertius. Sed quia eorum compositionis duplex est modus: alia enim cōficiuntur ex simplicibus quæ teri & in puluerem redigi possunt nullo addito quo possint assumi & in vnam formam, aut emplastri, aut cerati, aut linimenti alicuius coire, sed ita puluerulenta seruantur, & ab antiquis arida medicamenta nuncupabatur, ut quisque ex lectione Gal. imprimis, mox verò Aetii, & Pauli percipere potest. à iunioribus & Arabibus pulueres dicuntur, quarum differens vis postea significabatur, additis facultatibus, vel pollicitationibus, quas eiusmodi medicamēta pollicerētur. Vnde hos pulueres constrictius, ut pote quia ad stringendum, & sistendum fluentem sanguinem valeant, alios verò incarnatiuos, sic enim ipsi eos appellant, quos commodos esse putant ad conglutinanda, vel ut ipsi loquuntur, ad incarnanda recentia vulnera. Alia verò ad cōpagem cerati, vel emplastri, seu ut vulgo dicere solent, vnguenti tandem deducuntur additis aut oleo, aut resina, aut cera, vel alio glutinoso medicamento, quo cætera assumpta possint venire ad compagem cerati vel emplastri, vel vnguenti. Non est autem eadem ratio duplicis istius formæ confectionis horum medicamentorum, quatenus ad vsu, & modum ad. ministrationis pertinet. Nam præter eas facultates, quæ particulatim ex estimatione, & mutua collatione eorum simplicium ex quibus componuntur, cognoscendæ sunt, de qua re paulo post loquemur. differunt etiam alia quadam generali ratione, quia arida ex illis solis sunt conficienda, quæ in puluerem trita redigi possunt, ut sunt mineralia omnia, ex ordine vero eorum simplicium, quæ superius fuere relata, sunt Aloe, bitumen, pix arida, thus, mastiche, & lapides quidam & terræ, quorum fit mentio à Galen. in nono de facultatibus simp. med. in emplastris verò ceratisque & linimentis possunt & glutinosa accipi, & pingua, & arida, & quæcunque alia quatenus tamen ad substantiæ modum pertinet: differunt præterea ratione impressionis & ro.

& roboris. nam si ad modum compositionis, & id quod in formam medicamēti referri potest respexerimus, efficacius agere possunt emplastra vel cerata & linimenta, quam arida medicamenta: quia hæc cum neque sint aspergenda, antequam sit confutum vulnus, neque intra labra vulneris. nam vt omnes testantur, impedit conglutinationē q̄cquid intercipitur inter ea, & ad profundiores partes pertingere nequeunt, cum magis terrea substantia consent, quæ non potest ita ad tria penetrare vt 3. meth. docuit Gale. sine ope alicuius humoris, vel liquoris, qui illam ducat. cui sententiæ & Auic. subscripsit: vnde etiam ambo pronuntiauerunt concordēs, quod arida medicamenta, & si commode se habeant ad conglutinanda minora vulnera, quæ in altum non sint adacta, maioribus tamen agglutinandis inepta sunt. Sed & hoc sub silentio non est prætereundum: immo quam maxime animaduertendum, quod non parum facit ad rationem compositionis, & subinde etiam vsus: nempe quod in his medicamentis parandis, quæ uentum sunt in vsum curandis maioribus & profundioribus vulneribus & ulceribus, quæ sinus non habent in quos indendum sit medicamentum, hæc imprimis procuranda: primum, vt ea quæ in puluerem conteruntur, præsertim si terrea consent substantia, quanto magis potest. fiant tenuis substantiæ & tenuiorum partium: id verò bifariam fieri potest: nimirum si diligentissime trita & leuigata fuerint: item si contritio & leuigatio fiat ex aliquo humore, qui partium tenuitatem illis impartiri possit, vt est acetum, & illud, quod acrius erit, ita erit in causa maioris tenuitatis. item & vinum præsertim tenue, interdum & aqua. Sed si leuigatio estat e sub sole fiat, illud est præstantius. nonnulli multa horum adurunt, vt lapides & metalla, quæ tenuitatem sanè maiorem sibi comparant: sed ab igne præterea, & acrimoniam adipiscuntur. verum deinde illam: si probe lauentur, facile deponunt. quod in nono de simp. med. fac. & in libris de cōp. med. secundum genera, & in libris meth. sæpe docuit Gal. & exemplo nobis calx esse potest. Deinde verò hæc eadē de cā, nempe vt facilius in profundiores partes penetrare eiusmodi medicamenta possint, medici hoc excogitarunt, vt in illis medicamentis in horum vulnerum vsum paratis aliqua inderentur, quæ aliquantulum maiorem astrictiōem haberent, non ea sanè ratione, quia sit opus maiori astrictiōe ad conglutinationem per se; sed ob aliam utilitatem, quæ inde quasi per accidens consequitur, cuiusque me-
minit

minit Gal. in de comp. med. per genera & de simpliciu med. facul.
 ea verò est, quòd uis astringens coniuncta cum illis, quæ partium
 tenuitate constant, facilem transitu præstant. illa enim lequens qua
 si à tergo, similis est impellenti, & compellenti ea ad interiora pro
 rumpere. hoc autè re ipsa ostendemus particulatim: cū emplastra vel
 unguenta describemus: Primum. n. de aridis medicamentis agemus,
 q̄ inspersibilia vel inspergibilia appellabāt prisci medici: iuniores ve
 ro pulueres. in principe autem loco de eo verba aliqua faciemus,
 cuius Gal. meminit, cū alibi, tum vero quinto meth. quamuis non tā
 quā medicamenti, quod fuerit confectum propter conglutinanda
 vulnera: Sed potius propter sistendum, & intercipiendum immo
 dicum profluvium sanguinis è vulnere manantis præsertim: ratio
 tamen & experientia illi attestatur, q̄ & vulnera conglutinare possit
 cum ex leporinis villis, & oui albo apponitur vulnere. cum compo
 natur ex aloe, & thure tritis: & inter fortia medicamenta maiorum
 vulnerum conglutinatoria connumerata est aloe: & multam eius mē
 tionem fieri videbimus in descriptionibus emplastrorum, huic usui
 appositorum: nisi quis fortasse dicat, nunc sermo est de aridis me
 dicamentis, quorum ferè inutile esse usum in profundis vulneribus
 dixit Gal. dicimus quod vis aloes lenitur, & remittitur mistura thu
 ris, quod & si aliquantulū astrictionē habeat, eā tamen pusillā ad
 modum habet, & maiorem longe vim habet mollientem digerentem
 temque & præterea concoquentem: Sed longe etiam magis lenietur:
 Si ex pilis leporis, & oui candido fuerit administratū: Sed in
 ferius, vbi de medicamentis, quibus restringendus est sanguis erit
 agendum, ex actius de eo agemus. Ad alia transeamus in præsentia.
 pulvis aut, cuius ab omnibus fere iuniorib. medicis vulnerariis fit
 mētio, immo, & à prioribus et nēpe Arabibus, ad conglutināda recē
 tia vulnera, & pulvis ruber qui incarnans vulnera ab illis nūcupa
 tur accipit thuris dragmas duas, sanguinis draconis dragmā. Albu
 casis his, & viue calcis tres addidit dragmas. quod cur fecerit mihi
 non satis constat, cum illa non modo mordeat, verum urat & cru
 stas genere: Vnde mihi magis probantur illi, qui uel armenicę bo
 li, uel santalorū tantundem addidēre. nam omnia hæc desiccant qui
 dē, non tū supra id, quod uidetur desiderare agglutinādū vulnus,
 & omnia etiā sunt alicuius astrictionis nō expertia, immo. & eorū
 aliqua ut thus, aliquid emplastici habēt, & fortasse et sanguis draco
 nis, thus uerò præterea aliqd cōcoctorij, qđ utile pōt esse ad dolores

Cap. 44.

S si qui

si qui sint, mitigandos leniendosque. Sed hæc omnia etiam vtilia esse possunt ad reprimendas, aut etiam arcendas inflammationes: eam præterea facultatem habet, vt possit sanguinem ex vulnere fluentem sistere. in hoc tamen efficacior fortasse est prior puluis, quem ex sententia Gal. paulo ante descripsimus: sicuti fortasse nec minorem vim habet agglutinandi præsertim ex aloe copiosa quam accipit. Sed de hac altera agamus, cum additur aut bolus armena, aut santali, additur etiã maior, tum astrictio tum exiccatio. Vnde & robur additur siue conglutinare, siue sanguinem fluentem reprimere velimus: Sed quomocunque sit, fortasse in minoribus vulneribus & corporibus non admodum duris, hæc facit aliquid: in durioribus autem, ni fallor, prior Gal. efficacior erit. Quidam ex recentioribus & tertium ad hæc eadem laudauere plurimum, qui ex longe pluribus conficitur. accipit enim boli armenę, terrę lemniz, vel sigillatę, singulorum dragmas sex, thuris, mastiches, sarcocollę, singulorum dragmas duas & semissem. myrrhę, aloes, singulorum sexquidragmam. Tragacanthę, sanguinis draconis, singulorum dragmam. farinę hordei, fabarum singulorũ dragmam. ex omnibus optime tritis fiat tenuissimus puluis. Hic nimis frigidus est. Nam thus, myrrha, mastiche, & aloe calida aliquantisper sunt, sed maiorem etiam vim, tum siccandi, tum astringendi habet. Nam præter tragacantham & farinas astringunt omnia. desiccant vero omnia, & aliqua satis insigniter, vt Bolus armena, terra lemnia, myrrha, aloe. nonnulla etiam prædita sunt facultate concoctoria, qua mitigare dolores possunt, & emplasticam quandam substantiam habent, vt thus, mastiches, sarcocolla, tragachantha. myrrha vero aliqui ut concoctorio vtuntur medicamento, sed & aloe aliquid habet emplastici. quia vero amaritudo in partibus tenuis substantię consistit, cuius aloes, & mirra, sunt participes, ideo alijs intritę & immixtę, possunt adiuuare ad penetrationem, & ductum facultatis aliorum ad profundiores partes: Vnde puluis sic poterit maiora quam prior ulcera conglutinare, & in durioribus & siccioribus corporibus & cõcoquere: si quid habeat concoctione opus, & magis mollires, & sanguinem sistere. Adhęc nonnulli & istius meminere, cuius compositio hæc est. accipit myrrhę dragmas tres, aloes quatuor, thuris duas. calidus vero puluis est, prioribus magis calefaciens, desiccans, & astringens: si quis uoluerit simplicia bene extimare, vnde commodum fortasse erit medicamentum, non in iniitiis, dum reprimen-

primendum est sanguinis profluuium, neque dum adhuc timemus futuram inflammationem: sed potius ubi confirmanda & stabilior reddenda erit conglutinatio, vel cum ea videtur contrumax. Conficiunt alii uaria diuersaque medicamenta arida adhuc eundem scopum parata, tum ex herbis aridis, tum vero ex alijs. Nam quidam & lapidem corallium: alios vidi margaritis uti: alios addere electrum; vel succinum: alios aliud. sed cognita natura simplicium, & ea collata cum proposito scopo, & cum natura etiam corporis male affecti, confici plura medicamenta apta & vtilia postea poterunt: & de his satis longum habuimus sermonem. quare non erit ab re, si hic consistamus, & ad aliam medicamentorum formam conuertamus orationem.

De gratis uel emplastris, uel unguentis unguo dictis, quibus tum antiqui tum iuniores usi sunt in conglutinandis uulneribus, & de ratione usus eorum quæ hactenus fuisse exposita. Cap. 5

Medicamentis, quibus agglutinanda essent recentia vulnera uarijs utebantur Antiqui, varijs etiam vtuntur iuniores. quam uis antiqui uisi sunt in hac re diligentiores fuisse in his distinctionibus, & limitationibus: iuniores uero pinguiori aliquantisper minerva sua exposuisse diuersitatis. autem in medicamentis conficiendis, & eligendis rationem uniuersam, tum ab ipso affectu: tum uero à corpore affecto ut paulo etiam ante exposuimus, petendam censuerunt: quatenus inquam maiora ualentioribus minora imbecillioribus medicamentis erant curanda: Item robustiora siccioraque & densiora corpora fortiora & acriora requirunt, & ferunt medicamenta: leniora uero & leniora, tenera, quæ uel ob naturalem temperiem, uel ob etatem, uel ob sexum, uel ob ætatem, & uitæ instituta talia sunt unde Gal. semper ubi de hoc negotio est institutus sermo, diuersam prescribit emplastrorum materiam: Unde medicamenta prioribus corporibus, uel uulneribus accommodata & apta conficienda sunt: diuersam item eorum, quæ ulterius: paruit. n. quæ admodum non sint profunda, itaque mollioribus, maxime ait accommodata esse, quæ ex lythargyro, uel ex spuma argenti cocta & ex oleo, hoc est, aceto & oleo parantur: de horum autem compositio- nis, & usus ratione primo libro de comp. med. per genera abunde differuit. & alijs subinde de quibus & nos propter iuuenes hic non nulla maioris distinctionis gratia dicemus: itaque Antiqui medici emplastra ex lythargyro tripliciter parato conficere soliti sunt,

Cap. 5.

quæ, ut differentem habent modum & rationem apparatus, & cocturæ, ita & differentes vires consequuntur. Primū. n. coquunt lythargyrum ex hydreleo, hoc est ex aqua & oleo pariinter se ponderemque tam aqua, & oleo, quam etiā lythargyro. Verum hoc monet nos Gal. quod quotiescunque id genus medicamenta ex cocto lythargyro conficiuntur, quam magis coctus erit lythargyrus, eō maiorem deliccedi, & meliorem formam compagemque habebit, glutinosius siquidem emplastrum erit & magis tenax. Nam eō peruenit: nempe, ut glutinosior & tenacior euadat, si optime susus liquefcat. quod illi per probam cocturam accidit, & quo ex maiori liquoris copia coquitur, eō etiā magis & melius funditur: contra vero, nisi exquisitè fundatur liquefcatque, ferè friabile & tenacitatis expers fit emplastrum. nequit autē in modico liquore exacte coqui fundique: Vnde, ut ait Gal. si duplus lythargyri sit uterque humor: aqua nimirum & oleum, adeo tenax & glutinosus erit medicamentum, sicut si ex resina, vel cera esset confectum. quatenus vero ad vires eius pertinet, vim repulsiuam resiccatioriāque; quāuis non insignem, habebit: & id non quod, quod sicut iterum superius declarauimus, astringentis sit facultatis per se, aut exiccat: sed potius ratione qua vium refrigerantem consecutum est ratione aquæ, cui neque oleum: si recens sit, resistit. frigus ergo cutem & subiectam carnem contrahit, & cogit. quod eo argumento ostendit, quia rugosam facit particulam spongia, cum frigida aqua madida illi apponitur & comprimendo, vel contrahendo substantiam partis, non modo repellit quod influit, verum & exprimens: si quid in ea humoris continetur, ad alias vicinas expellit. quo deinde fit, ut per accidens siccior euadat particula. quomodocunque autem delicceatur locus vulneratus: siue id primarie fiat, siue ex accidenti, sequatur, commoditatem omnino ulceribus, & vlceribus affert. leuissimum autē est hoc medicamentum, & solis tenellis pueris & mulierculis, & id genus alijs sanandis aptum, & ulceribus vulneribusque curandis, quæ parum ultra cutem peruenere. Altera vero confectio emplastri ex eadem argenti spuma fit, cum coquitur donec liquefcat ex oxelgeo, hoc est, oleo cum aceto commixto. & quantum ad rationem confectiois pertinet, non ita facile spuma argenti funditur, & citò cocta ex hydrelæo, sicut ex oxelæo, quāuis & ex hydrelæo et eadem fundatur: præsertim si inter initia antequam ad ignem coqui incipiat tria illa, oleum, aqua, & spuma argenti simul in mortario probe commisceantur. & quantum ad hoc attinet, non esset opus ad eliquationem lythargyri ita copioso

copioso liquore: quia tamen, quo ex eo copiosiori coquitur: redditur fortius & magis siccans. proinde si duplum sit vtriusque pondus aceti sane & olei ad spumam argenti, erit medicamentum mediocriter exiccans. quod si plus etiam quam duplum vtriusque pondus accipiat, ut si ex binis libris & semisse vtriusque libra coquatur lythargyri, erit adhuc fortius, & siccantius medicamentum, & fortius adhuc erit, si oleum fuerit vetus. Vnde ex priori symmetria compositum medicamentum satis congruens erit conglutinandis recentibus vulneribus mediocribus: præsertim vero in corporibus non valde duris. nam alioquin alter, & tertius confectionis modus eò progressus est, ut possit & difficilia vlcera fistulosaque curare & sinus, tam magnos, quam paruos, cum insignem vim exiccandi & citra morsum habeat. Tertia autem confectio eodem modo fit, sed ex cænelco, hoc est, ex vino & oleo: Sed vino optimo & antiquo, & interdum ex eo quod sit particeps adstringentis facultatis, et quia tunc euadit, ut ibidem tradidit Gal. simile medicamentum illi, quod palmeū, vel diapalma, vel ex chalcite appellauit Gal. de quo postea sumus sermonem suo loco habituri: idco de hoc in præsentia non faciamus plura verba. Sed ad sermonem de Barbaris appellatis medicamentis transibimus, quæ præ alijs vim agglutinandi vulnera & ulcera habere antiqui medici, & cū eis Galenus credidere, & è multis duo tamen in examen deducemus: quibus in primis Galenus se uī solitū testatur in fine libri secundi de cōp. med. per gen. quorū alterum simpliciorē habet cōponendi rationē. Vnde & cōmodū minoribus uulneribus esse ait: alterū multipliciorē, quantum ad materiā eorū ex quibus conficitur, cōponendi rationē habet: quod & maioribus uulneribus conglutinandis aptius est. Nā quāuis ibi & plura alia referantur Barbarā à uarijs auctoribus composita: nobis tū satis erit istorū examem. quod si cū alijs fuerit collatū, erit etiam illorum explanatio. Primum uero de maiore agemus, utpote quod multis in locis in usum chyrgis uenire cōperit. Componitur autē in hunc modum. accipiunt piscis libras quatuor, cærx lib. tres & uncias quatuor, piceæ lib. duas & uncias decē. bituminis lib. duas, olei uncias nouem, lythargyri, cerusæ, æruginis, singulorū sesquiunciam, thuris uncias tres, aluminis liquidi dragmas sex. sisilis, uncias duas, opopanax, squamæ grise, chalbanī singulorū dragmas sex, aloes, opii, myrrhæ, singulorū dragmas duas, terebinthinæ librā, succi mādragoræ dragmastres, aceti libras duas, & semissē. Hoc est er-

Victoris Trincauellij

go Barbarū Gal. emplastrū, in quo conficiendo ille non vnū & simplicem scopum habuit, sed plures, quos primum exponemus. Nā ex illis facilis esse poterit eorum omnium expositio, quæ ad istius medicamenti cōpositionē sunt assumpta: Cum ergo ad hoc præcipue id genus medicamenta sint composita, vt opportuna sint ad conglutinanda recentia vulnera, vel etiam magna, quamuis deinde ratione multiplicis rerum mixturæ euadant etiam vtilia ad multa officia. Primum ea referenda sunt ad primos & generales scopos in conglutinandis vulneribus spectandos; nempe vt modeste desiccant, & aliquantisper etiam astringant, neque tamen vim detergendi habeant, quatenus saltem pertinet ad conglutinandi munus, verum tñ istis & hoc addendū, quod quæ maiora ulcera cōglutinatura sunt, magis siccantia, esse oportet & magis etiā astringentia: cum rationi sit cōsentaneum, maiorem humiditatis copiam & gigni, & influere ad maiora vulnera quā ad minora, vnde & vulneratæ partes laxiores etiam redduntur: Sed & plerūque maiora minoribus periculo superuenturæ inflammationis magis exposita sunt, quæ per astringentia repellitur, obnoxia etiam magis sunt doloribus, quibus insuper prospiciendum est: sed raro etiam, vt & superius monuimus, in magnis, & profundis vulneribus, ita aptari labora possunt, vt penitus usque profundum committantur & vniatur: immo semper in aliqua parte deducta sunt, & locus cauus, & inanis manet, qui alioquin nequit ad vnionem peruenire: nisi caro noua gignatur repletura spatium illud: quo fit, vt in his sit opus aliqua carnis generatione: ad quam generandam utilis est & aliqua absterfio: Sed in his præterea ferè fieri nequit, quia aliqua humiditas confluerit, quæ aliqua concoctione egeat: & cum iam profundum sit vulnus, & necesse sit, ut usque in profundum exiccetur superuacua humiditas: quare opus etiam est illis medicamentis, quæ tum tenuitate partium, tum aliqua item caliditate possint humorem e profundo attrahere exicareque. Hi ergo sunt scopi omnes, quibus regēda & administranda est vniuersa istius compositionis ratio: Sed particularim omnia extinemus. Imprimis nihil præter oleum & ceram hic accipitur, quod non exiccet, neque enim sit olei veteris mentio, & si mutuo omnia conferantur ad secundum ordinem desiccantium, vel paulo ultra accedet medicamentū: Nā ærugo & æris squama fortasse vltra tertium ordinem ascēdit: sicut & alumen & aloe ad tertium saltem. Pix vero, picca resina

&c

& chalbanum, & opopanax bitumen & myrrha ad secundum ferè ordinem pertinent: & terebinthina ferè his est similis: quibus omnibus acetum, dum eò alia liquefunt, vel coquuntur, vel in leuorè teruntur, maiorem exiccandi uim addit: quare vniuersa istius medicamenti temperies erit ferè inter secundum & tertium ordinem. In caliditate etiam ad secundum. Nam licet opopanax, chalbanum, bitumen, ad tertium ordinem in calore referantur, ærugo vero & squama præsertim crudæ & non lotæ parum a quarto absint, pix vero, picea, thus & myrrha terebinthinaque circa secundum & alumen parū ultra: tñ spuma argenti, quæ in aliquod potius frigus vergit: aloes aut in primo est, aut paululum ab eo recedit, cerusa etiam, quæ frigida circa secundum est, opium vero & mādāgoræ succus, quæ in quarto ordine refrigerantium sunt, quibus & acetum addendum, quod & ipsum refrigerat, quod & adiuuat oleum, quod cum nondum inueterascit, aut temperatum medicamentum, aut modice calidum est, ut & ipsum faciat ad remittendum & temperandum calorem eorum, quæ insigniter calida sunt: Vnde omnibus recte perpenſis censerem esse quidem refrigerandum in secundum ordinem, eorum quæ calefaciunt versus tamen finem eius prope tertium. Astrictionem habent: modicam quid em thus, & terebinthina & bitumen, maiorem aloes, & cerusa: longe vero maiorem alumen scissile & rotundum, quæ si cum alijs conterantur, facile poterimus iudicare adesse quidem astrictionem; sed solum quanta sit satis conglutinandis vulneribus & repellendis unā cum aceto humoribus si qui essent ad fluxionem parati. vim vero è profundo attrahendi habent pix, bitumen, terebinthina, chalbanum, opopanax, quæ & ipsa in profundum penetrare ob partium tenuitatem, & vim aliorum eo perducere possunt, nec minorem uim ad profundiores partes se intromit tēdi habet ærugo, nec ea squama caret: quæ maiorē habeat ærugo. Hæc oīa vero acetum mirifice adiuuat, at deterforiā facultatem suis modestam habent terebinthina, myrrha, pix, aloesque. insignem vero ærugo & squama, quæ tamen dum ab alijs mollientibus, præsertim verò ab oleo & cera, aliquantum uero a thure & a lythargyro, præterea uero & ab astringentibus reprimitur, adeo mitescit ut nequeat impedire vulnere cōglutinationem. multa uero sunt quæ uini etiā concoctoriam habent, ut thus, terebinthina, pix, chalbane, opopanax, bitumen: Vnde & hac ratione, ut sæpe docuit nos Gal. in libris de compos. med. per gen. idonea sunt sedandis.

doloribus, quæ propria & vera ratio est, qua dolores sedari solent. quia tamen interdum illi adeo urgent, ut sit necesse ad ea minus admovere, quæ stuporem particulis afferunt. proinde ne ex hac parte etiam decisset laboranti, addidit opij dragmas duas, & mandragoræ succi dragmas tres, quæ tamen, si cum alijs recte conferantur, adeo pauci momenti sunt, & ita aliorum mixtura correctæ, ut neque possint noxam aliquam afferre: sed potius prodesse: quamuis autem præsertim tanquam conglutinans laudetur, non solum tamen huic rei commodum est: sed potest & utile esse carni in ulceribus generandæ, & cicatrici etiam interdum inducendæ. Nam pro diuersa ratione tum corporis, tum etiam vulnerum, vel vlcærum, diuersa possunt huiusmodi composita medicamenta moliri. Sed ad aliud Barbarum minus & simplicius in præsentia transeamus, quod minoribus vulneribus esse magis accommodatû dixit Gal. illudq; in hunc modum descripû reliquit. Picis, cæ, resine picæ, resinæ frictæ, bituminis: singulorum autem horum libram accipe, spumæ argenti dragmas decem, cerusæ, æruginis singulorum dragmas quinque, opopanax dragmas tres, olei, æstate uncias sex: hyeme vero uncias nouem, sicca in mortario acri aceto leuiganda sunt, reliqua vero his affundenda: in hac confectioe cum desint thus, myrrha, calbæne & terebinthina, minor erit vis digerens, & concoquens, quam in superioribus: minor etiam vis ex profundo attrahendi. quamuis enim resina fricta aliquantum, & ipsa attractoria vim habeat, vincitur tamen a terebinthina: minor etiam est in hoc emplastro vis alstringens, utpote in quo desideretur aloë, & utrunque alumen. nec tanta est etiam in eo deterforia facultas, quia non accipit, neque terebinthinam, neque myrrham, neque aloë: præsertim vero cum squamam non admittat. quatenus verò ad vim deliccandi pertinet: eam etiam minorem habet, sicut & minoris alstrictionis est particeps. crederem vero aliquantum etiam minus (quamuis neque multa in illis sit differentia) calefacere, quam prior compositio. Vnde merito Gale. priorem barbari confectioem accommodatam esse dixit maioribus vulneribus. hanc vero posteriorem, minoribus: utpote, quæ sit minus potēs. Quare his nostris temporibus introducta est in usum à multis medicis prior & maior, non autem altera. nam priori facile est de virib. detrahære, addita cera & oleo, ut sæpe Gal. docuit, vel illâ commiscendo cum aliomedicamento debiliore, ut esset id quod basilicò appellât. Juniores vero & ipsi quibusdâ medicamentis ad agglutinanda recē-

tia uulnera consuequere uiri, & non inepte. conficiunt autem ex illis aridis medicamentis, quæ in principe ipsius capitis parte fuere examinata: assumunt enim eos pulueres, uel ex liquore tenuiori albuminis oui secundum eam compagem & formam emplastri, quæ commodè possit, aut stupeis puluillis excipi, aut paniculis. interdum uerò ex cerato confecto ex oleo præsertim rosaceo, uel communi, uel eo quod completum uulgo appellant, pro ut præsens occasio indicare uideatur esse opus maiori concoctione, ut quando dolor esset mitigandus, aut maiori refrigeratione & strictione repulsionisque, ut quando instantem inflammationem timeremus. Quandoque uerò pulueres ex terebinthina excipiunt, & unguentum, ut ipsi dicunt, conficere solent. & sæpe terebinthina lota utuntur. quæ enim lauatur, minus mordet, & minus calefacit, & maiorem uim concoctoriam habet, atque magis item digerit, aliquantulum etiam detergit, & siccantius fit medicamentum, quando pulueres ex terebinthina assumuntur: in præsentia tamen parum referre putarem: si quando terebinthinæ sit mentio: uera accipiat terebinthina, quæ terebinthi resina est, uel laricea, quæ & ipsa uulgo terebinthina dicitur: quia duæ hæc resinæ adeo facultatibus proximæ sunt, ut altera pro altera in his medicamentis quatenus ad rationem compositionis, & præsentis instituti pertinet, hæc mihi uidentur posse esse satis. Reliquum autem est, ut aliqua etiam exponamus: breuiter tamen, quæ ad rectam usus rationem attinent. Quia uero primum quod sequitur ipsum uulnus, est sanguinis effusio, quæ nisi prius intercipiatur frustra erit quidpiam aliorum tentare. unde primum ratio habenda fluentis sanguinis, atque in hunc modum res tractanda: nimirum ante alia omnia respiciendum est ipsum uulnus, & considerandum, num insignis sit aliquius magnitudinis, an potius paruum. quia si paruum sit, cum ab eo sanguis in multa copia minime effundi possit, nisi forte contingat recisam esse aliquam maiorem uenam, uel arteriam ex illis præsertim, quæ usque ad extimas & subcutaneas partes deferri solent. quod tamen raro admodum contingere solet, paruo etiam negotio supprimitur; de sanguinis autem immodico profluvio ex incisa uena, uel arteria opportuniore loco agemus. sin autem insigne fuerit uulnus, primum considerandum erit

erit copiosus ne sanguis effluerit, vel secus: quia si copiosus effluisse videatur, procurandum, ut quanto citius potest supprimatur, ne vires ex nimio eius fluore fatiscant: Quod si videatur non fuisse factum pro ratione vulneris multum profluuium, non statim conandum est, ut intercipiatur fluxus: nam ut 3. meth. docuit Gale. ex sententia Hippo. quam plurimam vtilitatem affert vulneratis corporibus: cum moderata copia sanguinis effluere permittitur: quia præter id, quod sæpe supplet vicem misionis sanguinis ex secta vena, quæ fere necessaria est in maioribus vulneribus, ad reprimendas fluxiones humorum ad vulneratum locum, & arcendas inflammationes: præsertim si reuulsoria fuerit euacuatio: maximo enim prædico est ad euitandos dolores, fluxiones, & subinde inflammationes. Cum enim sponte naturæ confluant humores ad locum affectum ex vniuerso ferè corpore in magnis vulneribus: si reprimatur per modica instrumenta sanguis statim ab accepto vulnere; ita ut nequeat effluere, retentus, dum continenter eò confluat, non modo qui in vicinis, sed & qui in remotioribus etiam partibus continetur, ibi infarctus distendens partes circum vicinas, dolorem excitat, & in tumorem illas attollit, & tandè in inflammationem. Quod si copiosus sanguis per vulnus effusus inaniatur, illa euacuatio redundat tandem in vniuersum corpus: vnde sicut præcipua causa cur facile humores in aliquem locum confluant, est, aut copia, aut vitium humoris, ita corporis euacuatio præcipua causa est, cur non concitentur fluxiones in affecto corpore. Cum verò iam statutum fuerit sanguinem esse suppressendum, tunc considerandum est, an vulnus ex eo genere sit, quod mereatur, ut per agglutinationem curetur, vel ne. Quia si tale sit, primum oportet labra, vel latera adducere, & simul committere, vel vinculis, & ligaturis, vel sutura, & antequam id fiat, aduertendum, an in grumos concretus sanguis in vulnere contentus sit, nam ipsum detergere oporteret, quia grumi sanguinis omnem conglutinationem impediunt, & tandem putrescentes in pus vertuntur: detergere autem solebant Antiqui concretum sanguinem spongia madefacta vino præsertim nigro & astringente; postea suendum est vulnus, nam ita ferè necesse est, cū vulnus aliquantisper profundum est, si labra sint apte committenda: præter id, quod commodius de inde post futuram medicamentam, quæ inter initia adhibenda sunt, accommodari possunt, quam si fascia & puluillis triangularibus deligetur vulnus. fascia autè à duobus

Com. 6.

bus principiis circumducta vulnus deligandum est, quæ tunc præcipue potest commodè aptari, quando vulnus secundum membri longitudinem fuerit inflatum. alioquin enim, vt Gal. primo libro de his, quæ in medica officina monuit, si per transuersum adactum fuerit, potius sutura erit accommodata, præterquam si effectus opus capita musculorum vel tendines apprehendere: quia partes hæc omnino in assuendo vitandæ sunt. verum neque hoc præmittendū in præsentia videtur, quod summe necessarium est: nempe quòd ante administrationem medicamentorum, quæ congruentia vulnere sunt. postquam vel per futuram, vel deligaturam commissura vulnere labra, si ob eius profunditatem. remanet aliquis in fundo sinus, vel cauitas, cum interdum nequeat fieri exacta commissio vsque ad profundas vulneris partes, tunc magis siccantibus, & ex profundior trahentibus medicamentis erit opus, vt ichor, vel pus, quæ necesse est ibi congeri, exiccetur: & præterea si ea videatur horum copia futura, vt per medicamenta desiccari & absumi quantum res ipsa ostenderet omnino nequiret, procurandum est, vt facile exitum habeat, nempe in ea parte, quæ ad effluxum commodior futura est, loco relicto aperto: & qui deinde impositis linamentis, vel vt iuniores loqui solent, tentis aliquo apto medicamēto delibutis, apertus etiam seruetur ita, vt sæpe si sinus relinquatur amplius, sit necesse hac eadem de causa per incisionem moliri in inferiori eius parte foramen ad facilem exitum puris: & id quando particula vulnerata eo modo, & in eo situ collocari nequit, quo facile possit pus effluere. inter initia tamen, dum vulnus non dum pus, vel humorē copiosum gignit, quæ fortem habeant indicationem: fortem enim indicationem habent hæc, cum copiosa retineatur, quia vulneratas partes interiores erodunt, & dolores vehementes concitant, & vt idem Gal. 3. metho. exposuit, inflammationes adducunt. inter initia ergo quia adhuc sanguis effluit, magis idoneus erit medicamentorum vsus, quæ non maiorem vim habent reprimendi, & sistendi sanguinem quam conglutinandi commissura labra vulneris, vt ea arida sunt, quorum antea facta est mentio, quales sunt pulueres, qui à iunioribus constrictiui dicti sunt ex albo oui assumpti, addito roseo oleo vno, aut altero. postea verò transcendendum est ad illos, quos incarnatiuos, vel agglutinantes appellant; mox si valentiori medicamento opus esse videatur, ad emplastræ barbara erit accedendum. neque enim putarem omnino tutum esse eorum vsus ab initio, dum

Cap. 4.

Victoris Trincauellij

dum adhuc in motu sunt humores, & maxime vrget indicatio ar-
cendæ inflammationis. calida namque sunt, & vim attrahendi à pro-
fundis etiam partibus habēt: vnde cum vulnus recens omnino est,
neque abest suspicio fluxionis humorum, facile concitari potest in-
flammatio. Sed iam tempus nos à præfenti vulnere tractatione
reuocare videtur; vt ad vlcera sermonem conuertamus: Nam & si
ad rationem curandorum vulnere pertinere fortasse videretur,
vt de illis symptomatibus aliqua verba faceremus, quæ plerunque
solent vulneribus accidere, vt immodica sanguinis effusio, & vhe-
mens dolor: attamen quia ea solent sæpe & vlcera concomitari, &
eisdem ferè præfidiis in vtrisque solemus his occurrere: ideo non
sulto distulimus horum sermonem ad tractationem de vlceribus.
Hic ergo consistamus quatenus ad rationem vulnere pertinet:
nisi quis fortasse putaret magis rationi consentaneum esse; vt post
institutum sermonem de vlnerebus secundum quod vulnera proprie
dicuntur, quæ in carne fiunt, subnecteretur tractatio de illis quæ
ad vulnera neruorum curanda pertinent: Quia tamen neruorum
vulnera, aut rarissime, aut nunquam curantur, simplici ea curandi
ratione, quæ vulneri debetur, quatenus vlnus est: uel ut iuniores
nostri loqui solebant, per primam intentionem: ideo consultius no-
bis uisum est, ut post tractationem ulcerum illa differatur.

De differentijs ulcerum. Cap. 6.

VLcera appellamus in præfentia, quæ per solam agglutinationē;
uel ut nostri iuniores loqui solent, per primam intentionem
curari nequeunt: quia saltem in ipsis sit opus carnis generatione,
quamuis alioquin nihil aliud habeant, quod ad vlnus propria sua
ratione non pertineat. nam ratio curandi ea ulcera, quæ adeo mun-
da & simplicia sunt, ut sola conglutinatione, uel secundum modū
quo iuniores loqui solent, sola incarnatione curari possunt, illa e-
dem omnino est, qua curantur vlnera. De medicamentorum ergo
compositione, quæ his ulceribus curandis idonea sunt, atque de ap-
to & accommodato eorum usu nunc agemus. uerum quia, ut alias
diximus, unaqueque methodus pertinens ad curationem affectuū,
primum quidem diuersa euadit ratione diuersitatis naturæ ipso-
rum affectuum. non est autem una naturæ ratio in ipsis ulceribus: sed
multiplex & diuersa: ideo ut quæ ad institutum nostrum attinere
omnino

omnino videntur exactius explanentur, necesse est prius inquirere omnes differentias vlcum ad vltimas vsque cum distinctas indicationes & proprias vnaquæque earum ex privata sua natura habeat, quæ suos etiam scopos nobis ostendunt, ad quos referenda est vniuersa, vt superius etiam fuerat expositum, compositionis & vsus ratio. vlcus ergo, cum secundum suam propriam rationem significat solutam & diuisam partium vnitatem, aut omnino simplex est, aut non simplex: simplex appellatur: sicuti & Gal. 3. meth. appellauit, in quo non sit nisi partium diuisio; quibus nihil aliud deest, nisi unitas continuas vè. Nam si aliquid illis præterea desit, vt pote si recisa sit aliqua cutis, vel carnis, vel ossis particula: iam non est sola, & simplex unitatis solutio: sed defectus, vel amissio illius particulæ, præter partium separationem. vnde neque erit simplex indicatio, vel simplex scopus, quia oportet regenerare amissam particulam, & vnire dispersas partes. vlcus ergo non simplex illud est, cui aliquid præterea adiunctum est, præter partium separationem. quæ uerò illi adiunguntur, aut proxime accedunt ad naturam propriam vlcus, in quantum vlcus est, aut ab eo remotiora sunt. Nam si vlcus propriè & per se est, continui solutio: continuum uerò, cū soluitur per eam diuisionem terminatur. & continuum cum terminatur, statim suboritur figura. Nam mathematici definiunt figuram, quod est, quæ termino, vel terminis clauditur. vnde magis propriæ vlcus differentie erunt illæ, quæ ab ipsa vlcus figura erunt accipiendæ. quem admodum dicimus, quod vlcera alia plana sunt, alia concaua: alia rotunda, alia longa, vel angularia. Quæ uerò differentie ab his sumuntur, quæ remotiora sunt à propria natura vlcus, alia sunt tanquam symptomata illi accidentia: alia uerò sunt affectus, qui cum vlcere coniunguntur, & habent omnino suam essentiam à natura vlcus ut vlcus est aliena. symptomata quoque, aut talia sunt, ut ferè per se vlcus & propriæ eius naturæ, si non omnino, aliqua saltem ex parte consequantur: aut ex diuturnitate, uel ex malae curationis ratione, uel ex externa aliqua occasione illi accidunt. symptomata quoque, si non omnino, aliqua saltem ex parte, imo uerò ex magna parte vlcus quasi per se sequuntur, sunt illa à quibus vlcus, aut sordidum dicitur, aut uirulentum, uel humidum. loquamur autem in præsentia, ut uulgo nunc chyrurgi loquuntur. quo uerò istæ differentie à symptomatibus sint depromptæ, quæ magna ex parte sequuntur propriæ vlcus naturæ, facile percipimus: si in memoriâ reuocare uoluimus, ea quæ à Gal. 3. meth. fuisse exposita. nempe quod in conco-

ctione,

Aph. 51.

tione, quam natura in particulis nostri corporis quotidie molitur, necesse est duplex generari excrementum, alterum tenuius, & aqueę ferè consistentiæ. Quod. *ἵκω* græce dicitur, à priscis autem latinis sanies proprie: iuniores verò virus illud vulgo appellant. t. & hoc sanè excrementum, nisi ex alimenti copia plurimum redundet in halitum digestus per eam vacuationem, quæ sensibus inconspicua est excernitur: sed ubi nimia fuerit affluentia alimenti: per eam etiam excernitur vacuationem, quæ sensibus est conspicua, ut per sudorẽ. unde extat ea Hippo. 4. apho. sententia, quod sudor in somno citra manifestam aliam causam excitatus, argumentio est, quod corpus, vel nimio vitur cibo, vel vacuatione eget. conspicua itidem fit, quã do calor nativus imbecillior factus nequit digerere in halitum hoc excrementum, vel etiam si ex motione corporis exalciat, & an tequam digeratur in halitum, per sudorem excernitur: unde quia vlcera pars ægrotat, & ea ratione languidior est, in vlcibus semper eiusmodi ichorosum excrementum congeritur, quod vlcus humidius reddit, atque inde fit, quod omne vlcus desiccationem, ut curetur, desiderat alterum verò excrementum crassius est, & magis ad naturam terream vergit: quod per cutem extimam excretum & cõrescens illi hæret, donec abluatur, & detergatur. & id est sordes illa, quæ manifesto conspicitur circa cutem eorum, qui negligẽtiores, & sordidiores sunt circa curam sui corporis. hoc itidem excrementum congeritur in vlcere, & sordidum illud reddit, græce autem *ἵκω*, latinè sordes appellatur: & præterea in causa est, cur vlcibus curandis ea medicamenta opportuna sint, quæ non sint deterforiæ facultatis expertia. His tamen addendum est, quod quã do istius generis excrementa congeruntur in ipsis vlcibus: eatenus tamen, ut non excedant rationem ipsius vlcis qualitate, vel copia, non faciunt diuersas in vlcere differentias, propterea quia hæc concomitantur ipsum vlcus per se & quatenus vlcus: unde neque mutant communem rationem vlcis ut vlcus. verum quando supra rationem vlcis excreuerint: id illis accidit quod & aliis symptomatibus. nempe quod si plurimum excreuant, tunc exuta ratione symptomatis, induunt rationem causæ, atque subinde incipiunt propriam habere indicationem, atque ita constituunt diuersas ulcerum differentias. nam ubi refertum est vlcus tenuiori excremento, humidum, vel saniosum, vel virulentum à medicis nuncupatur: Sed si alterum crassius nimis excreuerit *ἵκω*, græci, sordidum

latini

latini appellant. Symptomata vñ, quæ magis aliena sunt à natura viceris, & citra quorū complexū pōt vlcus consistere, sunt sicut cum dicimus aliquod vlcus callosum, vel ostracosum, vt aiunt græci, ali quod aut dolorosum. Differentiæ verò ulcerū quarum meminerūt antiqui medici, & ab alijs affectibus accipiuntur, qui cum ulcere, si mul complicati consistunt, si velimus exquisitè loqui, non sunt proprie ulcerum differentiæ; vt pote quoniam hi affectus per se etiam, & citra vlcus, ut Gal. docet, consistere possunt, & habent propriam curationem. sed sequamur in præsentia communem & inueteratam consuetudinem, & eas tanquam ulceris differētijs accipiamus. eius modi ergo affectus, à quorū complexu cum ulcere depromimus has differentijs quasi ulcerum sint, aut proprii & primarii sunt ipsius ulceratæ partis, aut non sunt eius primarii; sed potius per consensum aliunde male habet ulcerata particula. à proprio affectu particula accipiuntur differentiæ, vlcus, quæ maligna proprie antiquis dicta sunt. nam quando, vt ait Gal. 1. & 4. de comp. med. secundum gen. habitus illius partis in quæ contractum est vlcus adeo vitiatum est, ut alimentum, vel etiam optimum illi particulæ distributum à natura, corrumpat in malos & vitiosos humores, atque de inde ex hac causa redditur difficilis curatio, tunc proprie antiqui maligna, diuturna, inueterata vel græce *κακὰ* appellabant. Horū verò non est una tantum ratio, sed multiplex & diuersa. nam aut ea sola est corruptio humorum, in quos alimentum degenerat, quæ possint consolidationi esse impedimento, & cicatrici inducendæ, & ea ulcera, quæ in hunc modum se habent, absolute cacoethe, vel maligna ulcera appellantur, aut tanta est corruptio, ut vitiosi illi humores non solum inepti sint carnis generationi, & cicatrici cōtrahendæ, verum & eam consequuti sint, acrimoniam, ut abradant & erodant, subiectas & circumstantes ulceri partes, & eiusmodi ulcera *φάγες* à græcis, & phagedæna exedētia à latinis: à iunioribus verò corrosiua nuncupantur. Aliquando præterea vitiosi humores in causa sunt, ut putredo ulceratam particulam apprehendat, & quia, ut trita est sententia, quod à putrido tangitur, putrefit: ideo non modo vlcus ipsum putredo corripit, verum ad vicinas illi partes serpens eas quasi depascitur. & proinde à græcis id genus ulcera *ὥσπερ ὁ ὄφις* quod de pasci significat: à latinis verò depascentia ulcera nominantur. & hæc intercedit, ut docuit Gal. 6. de compo. med. secundum gen. inter hanc, & priorem differētiā, quod

quod in hac est putredo & ratione eius serpens, & depascens est ulcus. solet autem quantum ad ipsam pertinere, plerumque excitare febrem. est iomena vero, vel phagedena, non solent comitem habere febrem. exedunt verò & subiectas vlceri partes & vicinas, atque ab herpete hac ratione differunt, quòd herpes exedit itidem vicinas partes: verum cutaneas duntaxat, non autem subiectas & profundas: phagedena verò cum ad summam & extremam malignitatem deuenirent, solebant à priscis medicis chironia à Chirone centauro, qui horum vlcerum curandorum peritissimus erat: item & telephia à Telepho heroe, quia simili vlcere coniecto à sanguittis Herculis diu fuit misere cruciatus. solent autem eiusmodi phagedene, coniunctum habere circumstantium partium tumore cum inflammatione. vlcera verò quæ non tantum difficilia euadunt propter proprium aliquem affectum, quantum propter consensum cum aliqua male affecta particula, aut cum vniuerso corpore à quibus influunt vitiosi succi, qui naturæ impedimento sunt, quo minus ad consolidationem possint producere, à Galeno *in uariis*, hoc est, defluxioni obnoxia dicuntur: & ut ille 1. & 4. de comp. med. secundum gen. docuit: quamuis & aliæ vlcerum differentia ægre admodum cicatricem admittant & consolidentur: Hæc tamen vlcera, quæ difficultatis occasionem aliunde habent propriæ à græcis *αὐτὰ* hoc est ægre cicatricem admittentia dicuntur. & id quia aliæ quæ ab alijs affectibus, vel symptomatibus, quorum complexu redditur vlcus malignum, suas habent priuatas nuncupationes: Hæ ergo sunt, vel omnes vel pleræque vlcerum differentia, quarum facta est mentio ab antiquis. & quamuis alii etiam affectus possint consequi vlcera, vel cum illis coniungi, ut sunt intemperaturæ, inflammaciones, erysipelata, œdemata, carnis excrescencia, cõtusio & dolores, & id genus alia, nolimus tamen ab his sumere differentiarum vlcerum rationes, quia hæc longe remotiora sunt à natura vlceris & propriam priuatamque curationem desiderant: vnde opportunum forsitan esset; ut aliò orationem conuertamus: nempe ad exponendos scopos, vnde depromenda est vniuersa ratio compositionis, vsusque medicamentorum, quorum ope curanda sunt vlcera: nisi quod fortasse præstiterit magis adhuc particulatim tractare eas differentias, quas diximus magis proprias esse vlcerum, quia vlcera sunt. dicebamus enim vlcus omne aut æquale esse, aut cauum. in vlcere plano, uel æquali nihil deest nisi cutis aut cicatrix. cauum au-

tem, aut solum cauam, aut cum sinu est, hoc cauernosum vlcus recentiores dicunt, quod quidem est veluti canalis quidam effossus in carne. sinus autem tum præsertim appellatur cum amplum habet internum spacium. Quod si angustū fuerit & oblongū, fistula, vel fistulosum vlcus appellari solet. His vero & illud addamus antequam huic capiti finem imponamus, quod nos Gal. in lib. de totius morbi tempo. docuit. nimirū quòd & vlcera sua habent tēpora, quæ rationem concoctionis eorum excrementorum sequuntur: quæ solent in vlcereb. generari & congeri. cum enim tenuis ab vlcere & aqueæ ferè substantiæ crudusque emanat ichor seu sanies principium est: cum verò incipit crassescere, & minori copia effluere, est incrementum. consistit vero morbus, cum iam pus apparet bonum: in inclinatione autem pus, paucum quidem est, sed crassius & albidius. circa hæc satis sumus euagari. Vnde ad ea redeamus, quæ ad nostrum institutum pertinent.

De ratione compositionis & vsus medicamentorum, quibus curandum est vlcus concauum. Cap. 7.

AB vlcere cauo sumimus initium, prætermisſa ratione curationis vlcis omnino simplicis, quia, vt paulo ante diximus, eadem est eius & vulneris curatio: itidem etiam de vlcere equali & plano, cum sola egeat cicatrice, satis erit actum cum exposuerimus quibus auxilijs, vel medicamētis sit inducenda cicatrix. Incipiemus ergo à ratione compositionis, & vsus medicamentorum, quæ apta videntur ad curanda vulnera caua, si tamen citra sinum & cuniculum aliquem sint, & citra fistulam, quæque citra complexum alterius, alioquin differentiæ præter defectum carnis, quæ sit generanda, vt cauitate repleta, ad planitiem & æqualitatem deducatur antequam consolidescat. prima ergo indicatio in hoc vlcere est carnis aggeneratio, quod quidem opus est solius naturæ, non autem medici: nisi quatenus ipse potest naturam iuuare, vt expeditius & citra vllum impedimentum hoc ipsum præstare possit: hoc ergo tantum à medico desiderat & expectat natura, vt ea omnia remoueat, & de medio tollat, quæ illi sunt, vel esse possunt impedimento. & vt præteream alia quæ externa sunt, quemadmodum praua victus ratio, incommodus membri situs, & quæcunque id genus alia, quæ ad communia potius & generalia præ-

T cepta

Aph. 51.

cepta pertinerent. de illis tantum in præsentia sermonem habebimus, quæ omnibus vlceribus propria & quasi familiaria sunt, quæque primos scopos quæ à medico spectandi sunt, nobis demonstrant, hæc vero sunt: duplex illud excrementum, quod in omni vlcere: nempe tenue, & ichorosum, quod virus appellatur à recentioribus: Et crassius alterum, quod sordes, hæc quidem naturæ impedi-mento sunt, quo minus possit vlceri carnem, probam saltem aggenerare. ad officium ergo medici pertinebit procurare vt remoueat-ur duplex hoc excrementum. detrahitur autem sordes per ea me-dicamenta, quæ deterforiam vim habet: ichor vero, per ea quæ exic-cant: Duo ergo in vlcere quocunque primum insurgunt scopi: nempe exiccandum & detergendum esse. verum quia plerumque humidius & tenuius excrementum copiosius esse solet in simplici-bus vlceribus: præterquam in illis, quæ sordida proprie appellan-tur: Ideo primus scopus in vlcere est exiccatio, alter vero deterfio. Facto autem æquali & plano vlcere, insurgit indicatio inducendæ cicatricis. Sed de hoc postea. Redeamus ad priores scopos, nempe siccandum mox & detergendum esse: Verum quia neque satis est nouisse in vniuersum siccandum, aut detergendum esse: sed & quatenus siccandum, & detergendum est cognoscere oportet, quia nimia exiccatio vtilem etiam materiam aggenerandæ carnis absumeret. Ita & nimia extersio, non solum sordem deter-geret, verum & nouam tenellamque iam genitâ carnem detrahe-ret. quia tamen de hoc superius etiam verba fecimus, ideo breuius in præsentia rem absoluemus. Diximus autem superius in vlcere, quod neque sordidum, neque humidum sit supra quam requirat cõmunis illa ratio vlceris caui, quatenus vlcus est: non est opus mul-ta desiccatione: Sed ea satis est quæ modice excedat naturalem sic-citatem illius partis, in qua vlcus est: nempe vt per vnum ordinem, vel vt a recentioribus dici solet, per vnum gradum, & id quidem nõ per relationem ad medium inter fines humanæ temperaturæ: sed facta collatione cum naturali temperie vlceratæ partis, & proinde id quod, cū sermo erat de vulneribus expositū fuit, hoc est loco in memoria reuocandū: nempe quod non idē modus exiccatiū in om-nibus corporibus, vel particulis utilis & aptus est ad generandam carnē, quia quæ sicciora sunt suapte natura egent medicamētis ma-gis desiccantibus, quæ vero minus sicca, minus: Nec minor ratio ha-benda est particularum, quam vniuersi corporis. nā sicuti humana corpora

corpora plurimū natura & temperatura differunt: ita & partes ex quibus illud coagmentatum est inter se natura & temperatura non parum differunt. aliz enim sicciore, aliz humidiores sunt. & sicut temperamentum corporis vniuersi natura siccius medicamenta exigit magis & exsiccantia, & humidius minus siccantia: ita pars corporis, quæ ad alias relata magis sicca est. præ alijs requirit magis exsiccantia medicamēta, & quæ humidior, minus exsiccantia: Vnde si temperatura vniuersi corporis, cū natura & tēperatura vlceratę partis in siccitate cōspirent, magis siccantia, ut 3. meth. docet Gal. postulat medicamenta. si uero mutuo dissentiant in temperatura: nēpe quia alterum à mediocritate per siccitatem, alterum per humiditatem labatur a medio: Si par utrinque sit recessus, moderate exsiccantia, qualia maxime requireret corpus temperatum essent apta & apposita medicamenta. Sed si impar sit recessus, ita & medicamenti vis a mediocritate ad illud extremum declinet, in quod magis inclināt recessus. Non ergo mirandum erit, si in recensendis medicamentis accommodatis ad generandam carnem in ulceribus, multa & diuersa, tā simplicia, quā cōposita proponemus, quæ tamē nō sunt in eodē ordine, uel gradu: Sed potius in ualde diuersis. Inter sarcotica ergo medicamēta, hoc est, ea quæ apta sunt ad generandā carnē in ulceribus, sunt, thus, quod tamen imbecillū est medicamētū, terebinthina, laricea rhelina, pix utraque liquida, & arida, colophonina, aloë, myrrha, fuligines etiā harū earūdē rerū: præterea & ex cōposito etiā fuligo, immo & ex butyro, quāuis hę leniores sint, caries itē, lignorū plerimū uero ex ulmo, farina ēt sēnigraci & hordei fabarūq; ubi nō est opus multa desiccatione utilis esse potest. His uero ualentiora sunt, aristolochia, iris, farina erui, eadēnia, pompholyx, ulmi folia, plumbum ustum & lotum anemone, multa etiam alia in medium proferri possent, quæ in his recenseri possunt: ne tamen iusto longiores simus, hæc in præsentia satis sint; reliqua unusquisq; ex libris tum Gal. de simp. med. facultū uero Dioscor. poterit describere. trāseamus ergo ad expositionē cōpositorū, tū corū, q̄ pulueres a recētiore, arida uero medicamēta ab antiquis dicūtur, quā ēt aliorū, quæ emplastra, uel cerata, uel ut iuniores loqui solent, vnguēta dicūtur, & primū ea exponamus, quæ leuiora sunt, & possunt replere caua vlcera carne, ubi nullus alioquin sit cōplexus alterius rei diuersam habētis indicationē ab vlcere. Primū ergo est id, quod iuniores rhelīnū, uel rhelīnatū vnguētū appellāt, facile medicamē-

Victoris Trincauellij

tum & corporibus non admodum duris accommodatum, vlceribusque non admodum contumacibus, aliquantisper enim calefacit & attrahit, quantum quippe sit satis ad attrahendam vtilem materiam & idoneam ad generandam carnem, modeste etiam desiccatur, & habet aliquam detergendi facultatem. & insuper aliquid habet, quod ad concoctionem facit: si concoctione vlceri sit opus, quæ nunquam non utilis est, cum præter alia faciat etiam ad leniendos dolores. accipit autem rhésinæ pini, terebinthinæ, ceræ citrinæ, olei communis boni: singulorum partes æquales. conficitur primum oleo, rhésina, & cera ad ignem simul dissolutis & colliuatis, mox additur terebinthina. uim exiccantem quidem habet, sed eam debilem. nam quamuis rhésinæ secundum ordinem fortasse non excedant, remittitur tamen eorum facultas exiccandi mixtura pari olei, & ceræ. sed & detergendi uim hæc habent, præcipue terebinthina: nec non & digerendi, sed illam etiam modicam, eadem etiam ratione: aliquid cōcoctorij, præterea, ut sæpe diximus, habet, & ex terebinthina non nihil astringentis: Vnde eiusmodi medicamentum, in primo ferme ordine erit, aptum mollioribus corporibus, & ulceribus in carne subortis. Nō procul ab hoc facultate, & uiribus est unguetum, quod aureum, tum Mesue, tum uero iuniores appellant, cuius confectio accipit, ceræ nouę uncias sex: olei libras duas & semissem, terebinthinæ uncias duas, rhésinæ pini, colophonix: singulorū sesqui uncia, thuris, mastiches singulorū uncia, croci dragmā. eliquata cera ex oleo, iniiciatur terebinthina, postremo colophonia, & thus; primū probe tusa, deinde simul mista refrigerascente medicamēto inspersa iniiciantur. postremo addito etiam croco omnia probe cōmiscantur. Si hoc medicamentū cū priori conferamus, erit eo aliquanto magis siccans, priori. n. additur Colophonia, & mastiche, & thus, quę omnia siccant. præterea uero maiorē etiā uim concoquendi habet ex thure, & croco, magis etiam astringit, unde illo in super magis roborare poterit particulam affectam, & repellere: Si aliquis sit timor, ne ad ulcus humores confluant. Quibus omnibus bene estimatis, facile erit iudicatu, qd hoc medicamentū maiorib. & difficilioribus ulceribus erit magis idoneū, cū magis desiccet. aliquāto ēt inagis digerat & cōcoquat, roboret & repellat. Tertiū uero, quod & in maiori usu est, à Mesue & alijs Arabibus & iunioribus medicis Basilicon appellatur, quasi regium, uel regale dicas. Cuius

descriptio

descriptio duplex est: de eo autem loquor, quod Basilicon magnū appellant. & differunt duæ descriptiones simplicium pondere & proportionē, non autem numero, vel natura. Prima enim accipit ceræ albæ, rhēsinæ pini, sepi-vaccini, picis, terebinthinæ, thuris, mirrhæ, singulorum vnciam, olei quantum satis est. Alia vero descriptio, impares accipit eorum simplicium ex quibus conficitur partes, nam acceptis primum ceræ vnciis sex, picis vero tribus, singulorum aliorum addit sesquiunciam. Prior quidē descriptio in omnibus erit potentior, nēpe in exiccādo digerēdoq; & abstergendo, atq; in extrahēdo ex pfundo. Nā cū omniū sit par pōdus in prima: in alterā vero, ceræ sit duplū pōdus ad picē, & quadruplū ad alia, necesse est, vt aliorū omniū vis longe magis in secunda obtundatur, quā in prima. Prima ergo valentior erit altera. Vnde & difficilioribus & maioribus vlceribus curandis erit accōmodatior, ambe tñ prioribus maiorē vim siccandi detergēdiq; habēt, & è profundo extrahendi ob picem & mirram satis copiosam. magis etiā molliorē possunt ob vaccinū adipē. in concoctoria autem facultate nō multā est differentia. Nā quamuis in aureo insit crocus, non tamen copiosus inest. in hoc autē thuris plus accipitur. Laudatur vero hoc medicamentum præsertim in nervorū vlceribus: Sed de hoc tamen suo loco sermone habituri sumus. Sed quia omnia, quorū hæcemus meminimus, medicamenta, quamuis desiccēt satis modeste: & aliquantisper etiam detergant, sunt tamen & calida, & uim, vt dicebamus, attrahendi habent, quæ conditiones aliquādo in vlceribus: præsertim vero in eorum initiis suspectæ sunt, si maiorā sint vlcera & profundiora: Si etiam corpus sit immundum, aut etiam plenum, nimirum ne interdum inde inflammatio adducatur ad vlcus. Vnde Gal. 3. metho. protulit hanc sententiam: nempe quod quamuis interdū calida loci intēperies medicamētorū ad refrigerantiū usum adigat, non tamen opportunus admodum est vsus hyosciāmī, aut mandragoræ, quamuis desiccando possent vlceri accommodari, quia nimis refrigerant, & eadem etiā ratione rhēsinā, pix, & bitumen, quamuis modice quidem desiccant, nonnunquam tamen sunt medicamenta non admodum vlceribus commoda, utpote quia eximius est in ipsis calor: qui remittendus est: situto illis uti uelimus miscella aliquorum refrigerantium. à qua præterea sententia neque locus primo de compo. med. securum gen. descriptus uidetur esse alienus: ubi ait Gal. quod vlcera

Cap. 8.

Cap. 12.

Victoris Trincauellij

inter initia requirunt medicamenta quę repellant . ne suboriatur inflammatio: vbi vero tuti ab inflammatione simus, opus relaxantibus erit, vt si quid inclusum sit, exhalare possit: immo etiam si aliqua sit contracta inflammatio, nõ tamen magna, vt citius soluatur, adhuc utilis est laxantium vsus. At vero repleto iam vlcere, & reddito equali, cum iam opportuna esse incipiunt, quę cicatricem inducunt, ad astringentia redeundum . Vnde non erit etiam alienum à nostro instituto, si & de medicamentis egerimus, quę desiccant & refrigerant cum aliqua etiam alstrictione, vt interdum illis solis, interdum vero commixtis cum alijs calefacientibus pro rei exigentia & opportunitate vti medici possint . Incipiemus vero à moderatioribus et facilioribus, primumque ab illis quę priscis etiam temporibus erant in vsu: primum ergo describamus illud quod Mesue & Iuniores unguentum triapharmacum appellauerunt: alij vero vnguentum ex lythargyro, quod ita descripsere Mesue & iuniores, accipiat lythargiri exactisuncæ triti & leuigati pars vna; cui superfundatur nunc olei, nunc aceti, atque eatenus conterantur simul, donec ad compagem & consistentiam emplastri vel vnguenti deuenierint. quod quidem medicamentum: si in hunc modum parabitur, moderate quidem desiccabit. quamuis enim acetum, præsertim acre, vim maiorem desiccandi lythargyro impertiatur: præterea & refrigerandi: oleũ tñ, quod pari ferme portione immiscendum est, efficit, vt neque multum desiccare possit. magis tamen siccatur, & refrigeratur, quam quando ex solo oleo & lythargyro, vt superius diximus; fit medicamentum. acquirat etiam ex multa illa contritione & leuigatione partium tenuitatem: sed magis ex aceto vnde & aliquanto detergere potest. ex eodem præterea habet, quod refrigerando repellere possit influentes ad vlcus superuacuos humores: verum non est validum admodum medicamentum: si hoc modo paratur: immo quod teneris & mollibus corporibus aptum, non autem plurimum siccis, & maioribus profundioribusq; vlceribus. Validius autẽ erit, si eo modo paratur, ut in altera descriptione docuit Mesue: quem modum ferẽ ex Gal. 1. de comp. med. secundum gen. transcripsit. conficitur uero non solum per triturationem & myxturam: uerum & per decoctionem in hunc modũ. accepta selibra lythargyri optime contriti, aceti uero acris, & cui nihil aque fuerit immixtum, tantundem: illis infundatur & olei ueteris libra, omnia deinde facili non uiolenta coctura ad consistentiam

sistentiam, quæ manus non inquinat, ducantur. emplastrum hoc, ita
 enim eiusmodi medicamēta appellabat Gal. magis priori desiccata.
 & minus refrigerata: & id duplici ratione. primum quia uetus oleū
 magis siccatur, & magis etiam calcfacit: deinde verò, quia dum coqui-
 tur medicamentum, efficitur ratione ignis minus refrigerans, &
 quia humiditas digeritur, ideo fit magis desiccans, ut ibidem do-
 cuit Gal. qui & hoc addidit, quod semper quò magis coquūtur eius-
 modi medicamenta, eò sunt siccantiora: quapropter & difficiliori-
 bus maioribusque vlceribus erit accommodatum medicamentum:
 Sed hoc non est prætermittendum, quod tanquam rem multi mo-
 menti eodem loco docuit: nempe quòd licet hanc nos mensuram
 præscripserimus huic medicamento, non est tamen putandum eam
 esse ita statam & firmam seruandam, ut non sit eorum ratio pro va-
 rijs occasionibus immutanda. Nam possumus interdum oleo uti nò
 vetèri, sed còmuniter: tunc id nosse oportet, quod in desiccandò
 infirmius erit medicamentum, & facilius vlceribus idoneum:
 interdum verò liquidorum simplicium maiorem copiam, inter-
 dum minorem infundere possumus. nam interdum par pondus
 omnium accipitur, atque ita deinde coquitur: nimirum ut singulo-
 rù triū accipiat libra, nò nunquā duplū, tū olei, tum aceti ad ly-
 thargyrū accipitur. potest & triplū accipi: ut tñ illud nouerimus,
 quò quo liquores maiori copia ad lythargyrum effunduntur, eò et, ut
 ad consistentiam congruentem istiusmodi medicamenti adducan-
 tur, magis coquēda sunt. & quò magis coquūtur, eò, quātū ad for-
 mā medicamēti pertinet, sit magis tenax & glutinosum, & particu-
 lar facilius hærēns: quatenus ad colorē, sit magis nigrum & splen-
 dens perinde, ut bitumen, vnde nonnulli in quibus est Auicenna, il-
 lud vnguentum nigrum appellarunt. Quo vero ad vires attinet, sit
 magis desiccans, & maiorem tenuitatem partium sibi comparat, &
 proinde eò etiam accommodatius medicamentum erit curandis ul-
 ceribus, cum sinu & profundioribus, iuniores dicerent cauernosis:
 interdum & fistulosis. Sed postquā de his medicamentis, quo-
 rum basis est lythargyrus impresentia tractatio est instituta, deter-
 tia etiam compositionis ratione agamus, qua cōficitur emplastrum
 quod Gal. ex lythargyro & œnleo, sicut prius ex lythargyro & oxe-
 leo solitus est nominare: propterea quia alterum ex aceto & oleo,
 alterum ex lythargyro vino & oleo paratur: De hoc vero non est
 cur multa dicamus, quoniam paratur sicut illud quod ex oxeleo

conficitur:& hoc quoque maiores vires ex maiori concoctione sibi comparat, sicut & alterum, & eadem potest esse diuersitas, si oleum vetus, vel nouum accipiat. item quod longiori coctura opus est, quod copiosiora, tum vinum tum oleum coniiciuntur: item si loco aprico sub solaribus radiis sit coctum adeo, vt quandoque per totam diem canicularibus temporibus Gal. coxerit, euaseritque præstantissimum medicamentum. quo deinde vsus difficilima & cauernosa vlcera carne primo repleuerit conglutinaueritque, & tãdẽ ad cicatricem deduxerit, non minus quam si vsus esset suo illo ab ipso ita decantato unguento vel emplastro, quod diachalciteos, vel diapalma appellabatur. Verum in confectione istius ex lythargyro, hoc reliquum est, vt moneamus, esse accipiendum vinum clarum album & tenue, vt erat antiquitus Falernum, nam ita & magis desiccans erit, & magis digerens. sed vt magis roboretur particula, & magis repellatur influxus superuacaneorum humorum, oportet, vt præterea sit alicuius astrictionis particeps. Sed præterea & de medicamentis illis agamus, quæ a iunioribus composita sunt, & in præsentia in vsu frequenti habentur: primumque de eo quod passim unguentum ex plumbo dicitur: accipit autem plumbi vlti, lythargyri, singulorum vncias duas, cerusæ, stibii, hoc est antimonii, singulorum vnciam, olei rosari quantum satis sit. aliqui tamen ceræ vncias duas, & semissem adiiciunt, olei vero rosacei & terebinthinæ singulorum vncias quatuor. componunt autem prius liquefacta ex oleo cera, deinde addita & commixta terebinthina, postea istis ab igne detractis, metallica exacte trita, & in puluerem reducta, iniiciuntur & probe miscentur: Medicamentum hoc desiccans est, & satis insigniter, & præterea alicuius astrictionis est particeps, refrigeratque: quamuis magis refrigeret cum sit citra terebinthinam; reliqua enim omnia præter hanc refrigerant, non magis autem astringit, neque magis digerit, aut detergit, quia terebinthina vim habet & detergendi, & digerendi & non est astrictionis experta. plumbum vero & si suapte natura frigidum sit & humidum, tamen dum comburitur fit exiccans medicamentum & mixtæ naturæ: ex igne enim acquirit tenues quasdam & calidas partes, per quas & digerere aliquantisper potest, & non nihil detergere, nisi lauetur; per lotionem enim ab eo detrahatur quicquid calidi sibi comparauerat sicut & calx: remanet autem frigidum & desiccans. deponit præterea & omnem morsum, vt & oculis euadat idoneum & commodum medicamentum.

camentum. Sed omnino retinet ex igne aliquam partium tenuitatem. Antimonium verò, quod ab antiquis auctoribus dicebatur stimmi, vel stibium, & ipsum frigida est, non tamen insignis temperatura. Auicenna enim refrigerare ait in primo ordine: desiccare verò, in secundo: sed non exiguam vim habet astringendi cum illotum est. nam si lauetur non parum exoluitur hæc eius facultas, sed adeo, ut prope accedat, sicuti docuit Gal. quarto de compositione medicamentorum secundum locos, ad eorum medicamentorum ordinem, quæ mordacitatis sunt expertia. cerusa vero & ipsa modice refrigerat. non nihil etiam astringit: sed exiccat quoque: si Auicennæ credimus, in secundo ordine, emplasticum tamen est medicamentum. in vniuersum ergo medicamentum desiccans est sine ullo morfu, quod præterea potest repellere influentes ad vlcus superuacaneos humores, tum ratione astrictionis, tum verò emplasticæ facultatis. quare poterit caua vlcera carne replere, & non modo ad æqualitatem, verum ad cicatricem etiam producere. Possemus autem & plurima alia medicamenta describere, quæ non parum viderentur præsentī instituto facere, ea tamen in præsentia omitimus, ne iusto longiores videamur, vel potius in sequentes tractationes differimus, ut pote; quia cum ea sint valida medicamenta, & ut Græci dicunt *καλὴ χρῆσις* hoc est multiplicis vsus, potius ad vlcera difficilia vel maligna curanda idonea sunt, quàm ad hæc simpliciora de quibus in hoc loco sermo à nobis est institutus; quamuis possint interdum ita parari, ut & his simplicioribus curandis possint accommodari. & ne idem sæpius repetendo nimium temporis conteramus; vniuersam horum rationem ad magis opportunum locum reseruabimus: conuertamus ergo iam sermonem nostrum ad medicamenta apta curandis vlceribus, quæ cum complexu alterius rei, siue affectus illa sit, siue aliud quidpiam, quod impedimento sit, quominus ulcus curari possit, nisi illud remoueatur, & primum agemus de ulcere, quod *δυσεικτόν* à Græcis appellatur: quasi dicas ægre recipiens curationem.

Cap. 4.

*De curatione & simplicibus medicamentis, quæ tum ad ea vlcera pertinent à Græcis *δυσεικτόν* proprie dicta, tum quæ ad maligna adhibentur, id est *καλὴ* appellata* Cap. 8.

SI memoria ea tenemus, quæ superius fuere exposita, nempe quod ægre admittentia cicatricem ab antiquis, ut testatus est Galenus,

Victoris Trincauellij

lenus proprie ita absoluta nuncupatione, nullaque addita alia adiectione, illa dicebantur, quæ nullum in se uitium alioquin haberent proprium, quod esset impedimento inducendæ cicatrici: sed uniuersam istius incommodi rationem habent à consensu cum aliqua alia particula, uel cum uniuerso corpore, vnde vlceri influunt superuacui & vitiosi succi, qui impediunt, quod minus possit contrahi cicatrix; addit tamen Gale. 6. aphorismorum, quod interdum hæc difficultas accidit, non tantum ex fluxione, quæ ab aliis partibus sit, sed potius ex aliquo vitio contracto in osse subiecto vlcerata carni: nam ab eo virus quoddam effluens obstat cicatrici inducendæ, uel etiam si quando inducatur, in causa subinde est, cur iterum erodatur ob eius acrimoniam. Cum ergo in hoc vlceroso statu ut ad primam & propriam causam veniam sint complicati affectus, quorum alterum in causa est cur nequeat alterum curari: nulli dubium esse potest, quod primum intendendus est animus, si medicorum omnium præcepta sequi velimus, ad affectum illum, vnde ortum & occasionem habet ea difficultas, & quia à fluxione pèdet uniuersa occasio: primum ergo occurrendum fluxioni, & aut sistenda, aut auertenda à loco affecta. sistetur autem præcipue: si aut uniuerso corpori, aut particula à qua occasionem habuit fluxio, probe consulamus, vacuatione, aut per missionem sanguinis, aut per purgantia medicamenta: deinde per remotionem causæ illius, ex qua, aut multus, aut vitiosus humor, qui destuebat, generabatur: sed hæc non sunt in hoc loco: nisi summatim tractanda, quia non pertinent ad primum hoc nostrum institutum: ergo ut breui in unum complectar omnia, auertitur fluxio partim p topica remedia, quæ ulceri adhibentur; partim uerò per reuulsionem primum, mox & per derivationem. reuulsio quidem fit, dum trahuntur fluentes succi procul & ad contrariam partem, quæ fieri potest, uel cum uacuatione, ut per sectam uenam, uel incisas cucurbitulas, uel per hirudines. item per purgationem per aluum inferiorem, uel uomitum. citra conspicuam autem uacuationem, fit per frictiones, per cucurbitulas absque incisione: per uincula dolorifica, interdum & per lotiones. Deriuatio uerò fit quando his eisdem instrumentis fit attractio ad uicinam aliquam partem: atque hæc breuiter & per transennam atigisse sufficiat. topicorum uero seu localium remedium duplex est ratio, alia enim procul à loco affecto apponuntur, quæ parte transeunt humores defluentes ad locum, & hæc uulgo emplastra,

plastra, uel unguenta defensiva dici solent, ut pote quæ obstant & defendant transitum humorum ad ipsum locum, defendunt autem quia stipant particulam cui apponuntur, & illam quasi constringendo & densando claudunt meatus per quos feruntur humores. Alia uero ulceri apponuntur, & apposita duplicem uim habent: primam quidem, ut ingruentes humores repellant à se ad alias partes. deinde, ut receptos iam: si omnino nequeunt aliò exprimere, exiccando, vel digerendo absumant. Scopi uero à quibus pendet uniuersa ratio compositionis horum medicamentorum hi sunt, nempe priorum, quæ recentiores defensiva vocant, ut ea agant, quæ paulo ante diximus astringendo & refrigerando. astrictio itaque & refrigeratio erunt compositionis illorum scopi. ex medicamentis ergo erit eorum compositio, quæ vim refrigerandi, & astringendi habeant: sed cum his etiam ponamus, quæ vim habent emplasticam: in aliis uero, quæ ulceri sunt apponenda, scopi iidem erunt astrictio, refrigeratio & exiccatio, & ea etiam maior, quam in aliis ulceribus, de quibus hactenus egimus, cum non solum sit opus exiccare humiditatem, quæ ulceris ratione subrepsit: sed etiam præterea, quæ influxit. Primum autem de prioribus sermonem habeamus. Hæc itaque loco opportuno apposita, partim astringendo meatus, per quos patet aditus ad ulceratam partem, partim ab emplasticis: si medicamenta aliqua istius naturæ indantur, illis repletis; partim etiam red dit humoribus, qui fluxuri sunt, ui refrigerantium crassioribus, difficiliorem transitum ad vlcus præstant. locus autem accommodatus his unguentis apponendis, in cruribus quidem, aut brachiis, est supra vlcus per sex, aut septem, aut octo digitos: quia plerunque ex superioribus partibus succi in his ulceribus solent defluere. in aliis locis aut circum circa sunt apponenda medicamenta id genus, vel ad locum illum, per quem medicus rationabili aliqua coniectura iudicat fieri defluxum noxiæ materiæ. Materiam uero aptam compositioni horum medicamentorum, in uniuersum quidem, nuper exposuimus. nempe quia omnia refrigerantia, astringentiaque, nec non & emplastica huic negotio sunt imprimis apta, in quibus si de simplicibus loquamur, sunt multi succi & aquæ: sicuti succus plantaginis, solani, polygoni, semper uiui, lenticulæ in paludibus nascentis, umbilici ueneris, uux acerbæ, portulacæ, cucurbitæ, cucumeris, imo & malorum præsertim eorum, quæ acida, vel austera sunt, & pirorum, & aliorum fructuum acerborum. iidem & harum earundem

earundem rerum aquæ, & præterea rosacea aqua, item & acetum non valde acre & omphacium, album oui. præterea & multa arida medicamenta intrita, qualia sunt bolus armena, terra lemnia, lapis coralius, lapis hæmatites, sanguis draconis, folia rosarum arida, cytini mali punici, malicorium, balauftia, & id genus alia multa: inter olea autem huic officio idonea sunt rosaceum: præsertim omphacinum, item & myrteum, malinum quoque, hoc est, quod fit ex malo cotoneo: Possunt autem duo, vel plura horum mutuo mixta componi, vt exempli causa: Si acceperimus rosaceam aquam, & illi acetum addiderimus, vt si partem vnā aceti, & duas aquæ acceperimus, & si duorum ouorum etiam album iniecerimus, & omnia simul conquassata commiscuerimus, erit accommodatum medicamentum, neque deterius euadet medicamentum: si addatur etiam tantundem olei rosacei, præsertim omphacini, aut alterius olei ex his quorum nuper meminimus, si etiam succum solani, plantaginis quæ accipiamus, & addito aceto illis vtamur: item si confusa portulaca, & illi addito succo vuz acerbæ, mox vtriusque succum expresserimus acetumq; addiderimus, vel citra etiam acetum, optimum, & maxime opportunum erit medicamentum. possunt interdum administrari medicamenta istius generis in hunc modum: nempe vt aliquo ex supra numeratis oleis illiniamus locum aptum huic officio; postea aridum aliquem puluerem inspergamus: sicuti si acceperimus arida rosarum folia, bolum armenam, draconis sanguinē, & omnia probe trita redigamus in puluerem: postea inspergendum; quod si addamus aut cytinus, aut malicorium, aut quidpiam aliud astringens, valentius erit medicamentum: sed si post hos insperfos pulueres lineum aliquem panniculum perfundamus, aut aqua rosacea & aceto, vel aqua etiam communi frigida immixto aceto commodius res se habebit, & melius etiam, si panniculus sæpe, dum siccescit, malefiat eadem aqua: pharmacopæi autem solent compositum medicamentum seruare ad hos vsus, quod vulgo vnguentum defensionum vocant, cuius hæc est confectio. Accipit boli armenæ semunciam, sanguinis draconis, terræ lemnia singulorum sesquidragmam, olei rosacei sesquiunciam, myrtini semunciam, ceræ albæ sex dragmas. Dissoluta cera ex oleis, postquam aliquantisper ab igne remota refrigerata fuerint, illis arida medicamenta optime contrita & leuigata iniiciuntur, & cum exacte mixta fuerint, infundantur in aquam rosaceam, vel acetum rosaceū, vel utrūque

que, non remouetur autem hoc medicamentum nisi alternis diebus. & hætenus quidem de hoc medicamentorum genere. Alia vero quæ vlceri imponuntur. vt diximus, oportet, vt vim desiccandi habeât & repellendi, vt tamen neque etiam deterforiæ facultatis sint omnino expertia: quantum verò ad desiccandirationem pertinet, & si vtrunque medicamentorū genus, quibus curanda sunt vlceræ quæ difficulter curâtur, & ægre cicatricē admittunt: nēpe & id quod idoneum est illis quæ ægre ad cicatricem deduci possunt, nõdum tamen maligna sunt, & illud quod apte administratur vlceribus quæ maligna sunt, insignem vim desiccatoriam requirunt, maiori tamē desiccatione opus est, vt maligna cōmode curari possint quam vt ea quæ solū *δυσκίνητα* dici consuevere. verum tamen præterea & id aduertēdum est in vtroque horū vlcerum genere: nimirum vt procuremus, quantum fieri pōt, vt citra morsum fiant hæc omnia, quæ requirit proba eorum curatio, quod tamen non est admodū facile. Nā vt I. de comp. med. secūdū gen. docuit Gal. astringētia facili, solēt vlceræ exasperare. præterea verò cū in his quæ nõdum maligna sunt, difficultas à fluxione occasionem vniuersam hēat, si cui ad repellendum est opus astringentibus: ita propter eū humorem qui influxit & iā receptus est in vlcerata parte necessaria sunt, quæ digerāt & è profundo attrahāt; vix aut fieri pōt, vt id genus medicamenta non sint acria, & proinde etiam non excitent dolorem: Quo deinde fit, vt facile superueniat inflāmatio, quæ in eā est, vt vlcus exedatur, & augeatur, & hæc eadē incommoda longe magis insunt malignis vlceribus. Quare huc tendit oīs industria medici, vt eā medicamētōrū materiā deligat, quæ citra morsū desiccet: Et quæ horū particulatim nequit vna rō vnusque definitus modus p̄scribi, quia neq; oīa corpora, neq; oēs in eodē corpore partes ab eisdem equaliter solēt morderi, & propterea ē difficile admodū est statim prima die assequi scopū exquisitè in vsu medicamētōrū: imo plerūque necesse est sæpius mutare rōnem medicamēti, additis nimirū illis, quæ aut obtūdāt, aut exacuent vires. obseruata nēpe impressione & mutatione, quæ in vlcere vi medicamēti facta est: cū medicamētū detrahitur: nā interdū, licet medicamētū ualide tū astringat tū detergat, & desicret, nõ uidebitur tamen morderè, quæ copia humoris, & sordis, quæ vlceri obducta est, remittūt acrimoniā & morfum medicamēti alioquin acris & mordacis, paulo aut post, ubi fuerit ulcus siccius, & magis mūdū ope illius medicamēti redditū, nõ potcrit

Cap. I.

poterit amplius illud ferre, sed erit necesse mutare in aliud, eiusdem quidem facultatis. in vniuersum verò tanto imbecillioris, vt minime mordeat, dummodo neque adeo etiam sit imbecillum, vt nequeat vlcus desiccare, neque quantum opus est detergere & mundum efficere. vnde non modo vtile sane erit, verum & necessarium; vt medicus, qui recte uoluerit & appositè vti medicamenti, sæpe cum id quod vlceri adhibuerat detractus est, post detractio nem considerare copiam, tum sordis, tum humoris, quæ tam vlceri, quam detracto medicamento insident, vt deinde hæc conferat cū illis quæ ante illius medicamenti appositionem diligenter obseruauerat: ex eorum siquidem collatione facile percipiet vires, & opus illius medicamenti. præterea verò an expediat virib. illius ad dere, quatenus ad desiccationem, vel deterfionem attinet. Sed neque minoris momenti est præceptum illud quod nobis à Gal. 4. de compo. medi. secundum gen. traditum est: oportere medicū particulatim sibi cognitionem omnium simplicium medicamentorū comparare: particulatim inquam, quia non est illi satis cognouisse medicamentorum vires & facultates in vniuersum: sed eorum ordines, & gradus oportet perspectos habere, quæ illi in hos vsus venire possunt. ita enim fiet, vt facilius, siue illis simplicibus vti voluerit, siue compositis, & ad affectus starum & conditionem, atque ad corporis & particulæ naturam ea referens, ad propositum scopū proxime accedat: Nos ergo in præsentia doctrinam & instituta Gale. sequentes primum simplicia medicamenta, quæ in his desiccandis & detergendis vlceribus, non omnia quidem, sed quæ sunt vsitatiora exponemus: deinde vero & de compositis agemus. incipimus aut à metallicis medicamentis: nempe ab his, quæ in mineris un metallum effodiuntur solent reperiri. Cadmia ergo prima in examinem veniat, quæ quidem vim desiccandi habet, & cam modestam & citra morsum, præsertim ea quæ in mineris reperitur. nam si inde vel eiecta, vel èt aliqua rōne deuoluta, vel in aliquo torrente, vel alioquin in præterlabente aqua diu iacuerit, vitatur eius facultas, & de vi desiccandi detrahitur: siccantior aut efficitur: si ex acri aceto, vel vino giluo pellucido & tenui aliquantulum astringente, quale antiquitus erat salernum, fuerit lota. nunc putarem non futurum ineptum vinum ex Peloponesso Venetias delatum, quod uulgo ro maniam uocant, & quodcunque aliud simile, si ex his inquam per statem pluribus subinde diebus in sole teneretur. chalcitis vero longe

longe hac magis desiccet, quocunque modo illa utatur medicus, siue usta, siue clota. Sed cum citra exustionem in usum uenit, acerrimum & ualentissimum medicamentum est, adeo ut crustas perinde excitet, ut ignis, cum uero uinitur, mitescit eius acris & mordax uis, ita ut facile à solidioribus & duris corporibus ferri possit. Sed & minus desiccet, quam cruda & quæ ignem non sit experta. cum uerò & post ustionem eluitur, mitior adhuc fit, & cuiuscunque morsus ferè expers: minus tamen quam illota desiccet, ut mollioribus etiam corporibus possit esse utile medicamentum. ad id genus uero pertinent chalcanthum, quod à Latinis sutorium atramentum appellatur, soryque & mysy: nisi quòd chalcanthum aliis omnibus magis siccat, magisque astringit. huic succedit chalcitis, postea mysy. deinde sory. unde sory his crassius est, atque in omnibus imbecillius. mysy uero chalcantho & chalcithide minus siccat, minusque uir & minus mordax est, in his tamen omnibus eadè ferè ratio est cum uruntur, & cum lauantur. per ustionem. n. primò, mox & longe magis per loturam domatur, & retunditur morsus omnium metallicorum: quauis desiccatoria uis & ipsa remittatur. remittitur præterea & astrictio: non tamen omnino aboletur. sed quod & dyphruges antiquitus appellatur, in his medicamentis recenset Gale. quæ optima sunt ad ulcera curanda, quæ ob copiam influentis humoris, ægrè admodum cicatricem admittunt: ut pote quoniam valenter quidem desiccet, neque tamen valde mordax est, & præterea insignem habeat vim astringendi, quamuis non tantam, quantam habent chalcitis & chalcanthum, antequam urantur. ærugo uero chalcithidi par medicamentum est, quantum ad robur & morsum pertinet: si usta conferatur cum usta chalcitide, & utraque etiam conferantur mutuo, quando nondum ignem expertæ sunt. quippe quæ fortissima sunt medicamenta, ut pote quæ perinde, ut ignis carnem urunt, & crustas concitant. mutuo tamen alioquin hac ratione differunt, quòd ærugo valenter detergit, cuiuscunque uerò astrictionis expers est. cuius tamen particeps est chalcitis una cum aliis, quæ illi cognata genere sunt. Alumen etiam satis abunde siccat, quia tamen ualenter admodum astringit, non est eius admodum frequens usus in curandis ulceribus, eius inquam solius & citra aliorum mixturam: sicut aliquando reliquis utebantur in ulceribus antiqui solis aridisque inspersis. præterea uero ab hoc usu non sunt aliena: imo quam maxime utilia, hæc quæ & ipsa inter mineralia recensentur: æris nē
pe, &

pe, & ferri squama, & recrementum plumbi, & plumbum, omnia siquidem vsta satis siccant, nihil tamen, aut parum admodum mordet. in hoc autem squama æris ab aliis differt, quod abstergendi facultate prædita est. sed & chrysocola appellata quam vulgo & aurifices & seplasiarii Arabico vocabulo boracem appellant, in his medicamentis, quæ inter minei alia, vel metallica connumerantur, poni solet, desiccatur enim satis, neque multum mordet: Ex aliis etiã simplicium medicamentorum differentiis multa possunt depromi nostro huic instituto facientia, quorum eodem quarto de compositione medic. fit mentio, quia aut sine vlllo morfu, aut sine multo saltem vim habent non modicam desiccandi, ut ichthiocola, sarcocola, sed etiã lapis specularis, cum cõburitur. itemq; vstum vitrum. sed & buccinæ, ostrearũ, & reliquorum id genus testæ combustæ citra vllum morsum non ingenerosè desiccant. non modo ergo his medicamentis possumus in emplastris, vel vt nunc loquimur, in vnguents vt: verum & ita aridis, & in puluerẽ redactis atque, vlceribus, tum malignis, tum verò ægre contrahentibus cicatricem inspersis: ex herbis quoque plantisq; non pauca colligere possemus: sed non nulla tantum proponemus, collecta tum ex Gale. tum verò ex Dioscoride: relinquentes deinde laborem auditoribus ex eorundem lectione: alia etiam huic negotio opportuna inde desumpta, huic loco addendi: & vt præterea in præsentia fructum ægyptiæ spinæ, qui exiccat quidem, sed non minus astringit, vt pote qui his locis incognitus sit, galla, quæ omphacitis, hoc est, immatura dicitur, exiccat & non parum astringit, item malicorium, & rhus, sed & multæ tum herbæ, tum radices, quas 4. de compositione. Gal. recenset, non parum exiccant & astringunt, vt Aristolochiæ radix, iridisq; item & acori, panacis, chameleontis nigri, cyperi, dracunculusq; & gladiolus insigniter desiccant, sed generosius etiam centaurium, polyum. terris etiam aliquibus ad exiccandum utebantur antiqui, quorum alia magis, alia minus exiccabat. ampelitis enim magis, cretias autem minus, sed & lemnia sphragis, vel sigillata terra, & armenabulus non ingenerosè desiccant. lemnia tamen astrictiõnis non est experta, & citra morsum hæc agūt. possem cum his ponere lapidem hæmatitem & xistum & corallium & alia multa ex libris de medica. simp. facul. & Dioscoride decerpta. itaque 6. de facul. simpli. medic. Gal. ad curanda maligna vlcera plurimum valere ait, si cicercum melle adhibeatur, itidem & lupi-

& lupinorū decoctum: præterea vero isatim mirifice quibuscun-
que malignis vlceribus resistere dixit, quamuis etiam putrida, vel
exedentia sint: Sed quia interdum non potest ita sola ferri à qui-
busdā corporibus, vtpote quoniam validum sit admodum medi-
camentū, docuit etiam qua ratione mitigari eius vehementia pos-
sit, quatenus facilius feratur. nempe sitritis eius foliis panis immi-
sceatur, hordeieue aut tritici farina, vel polenta. septimo autem
eiusdē operis libro dicit etiam decoctum albarum violarum esse
utile: si cerato misceatur, vlceribus, quæ ægre cicatricē admittunt,
malignis vero, præter centaureę minoris folia, arida & trita, cuius
& superius meminimus. brasia, & eius succus vtilia sunt medica-
mēta, itē & hederæ folia viridia ex vino cocta. Dioscorides vero p-
cipue folia hederæ nigræ laudat, cortex et radicū caparorū à Gal.
& à Dioscoride factō ex eo cataplasmate laudib. multis effert, nec
nō & papaueris corniculati folia & flores sordidis malignisq; vlceri-
bus vtilia sūt. nā eā detergēdi vī habēt, vt nisi posteaq; mūdū factū
fuerit vlcus, ab eis desistas, carnē purā liquare valcat. at vero, po-
lium aridum inspersum: præfertim vero illud quod minus est, cu-
rare maligna ulcera tradidit, polium vero quod heracleum nuncu-
patur, non modo hoc præstare posse ait: verum & ossa nudata carne
cōtegere. sed & peucedani radicē vlcerib. malignis easdē vires ha-
bere testat, ut purgare possit ulcera, implereq; & ad cicatricē. pdu-
cere. imo & ossiū squamas abscedere facit. sed & scordium aridum
illis utile esse ait, & corticem radicis solani, quod maniacum appel-
latur. 9. vero de simpl. med. fac. vbi de chrysocola agit, factitiæ cu-
iusdam meminit, quæ in mineris nequaquam effoditur. Sed arte
conficitur ex urina pueri, quæ in æreo mortario confecta ex rubro
ere, quod sanè tenerius & mollius est, pistillo item æneo circundu-
cta eatenus atteritur, donec quasi derafo, vel potius dissoluto ex
parte ære, vrina ad mellis crassitudinem deueniat, idque fiet facili-
us: si in sole, vel in calido loco fiat: euadit autem medicamentū ma-
lignis, & contumaciis summe vtile, vtpote quod multum siccet,
neque tamen multum mordeat: potest autem in usum uenire & so-
lum citra aliorum complexum, & cum aliis etiam oportunis medi-
camentis commixtum. Dioscorides vero glandes laudat cum sali-
ta axungia, folia item urticæ: si ex ipsis adiecto sale, fiat cataplasma.
Sed de simplicibus quæ his scopis attinent, satis mihi hæc esse posse
videntur.

Victoris Trincauellij

De compositione & usu eorum medicamentorum, quæ eisdem ulceribus contumacibus & malignis curandis idonea sunt: Cap. 9.

Cap. 3.

Sed tandem de compositis medicamentis, quibus in curandis contumacibus ulceribus, possumus cum utilitate & prospero successu uti, sermonē instituiamus, quāuis. n. si quis recte & ex arte nouerit simplicibus medicamentis uti in his ulceribus, quæ propter influxionem ægre ad cicatricē duci possunt, & proinde diuturna fiunt, atque in illis quæ vitiosa temperatura ulceratæ partis maligna iam euasere, illi interdum sola simplicia possint esse satis: tamen ut Gal. 5. de comp. med. secundum loc. tractatur interdū mixturæ simplicium utiliores sunt, quam sit simplicis usus: præsertim cum non sit & que facile aptare simplex medicamentū opportunitati, quā requirit, ut rō effectus, ut uero, natura corporis & particule, & tēporis & reliquorum, quæ cum his eandem habent rationem: sicut facile est compositum medicamentum accommodare variata ex arte simplicium symmetria: & proinde de medicamentis etiam compositis, quæ partim antiquis, partim etiam iunioribus medicis solita sunt venire in usum ad curanda id genus ulcera, agemus. hoc tanquam fundamento præcipue iacto, quod in his præcipuus scopus sit, ut insigniter deficiant, & quantum fieri potest citra morsum: deinde uero quia nunquam ferē est, quin in his ulceribus, non aliqua etiā succrescat sordes, necessaria est aliqua deterfio: Tertio, quod iamē propriū potius est ulceribus contumacibus propter fluxionē super uacaneorum humorum, quam illis quæ maligna iam sunt, quamuis ab illis non sit alienum, nempe quod præterea opus illis est aliqua astrictione, ut fluxio auertatur repellaturque. Nam quando etiam maligna facta sunt, nequit fieri, quin ex imbecillitate contracta in ulcerata parte, ex vitiatas eius habitu & temperatura, a uicinis saltem partibus non confluant excrementa: Ideo neque inutilis est ipsi aliqua astrictio. Vnde ex his tanquam correlarium quoddā deduxit Gal. 4. de comp. med. secundum gen. quod istiusmodi ulceribus nihil perinde aduersariū est, sicut quæ, oleosi generis, quæque maltacodea ab Hippo. dicuntur, quasi mollientia dicas, in quib. præcipue oleū est: præsertim quod uetus nō sit, atque adeo et adipēs omnes: præsertim uero suilla, utpote quæ præ alijs molliat, & laxet: minus autē exiccet: deinde uero & rhesinæ, utpote quæ licet deficiant, molliunt tamen & laxant: tertio uero cæra, nam & ipsa molli-

Cap. 1.

Quod

Quod si quis opponat, quod plurima Gal. medicamenta refert, quæ accipiunt rhæsinas, alia quæ adipēs, nonnulla ēt, quæ oleum, & aliqua quæ ceram, Dicam, quod hæc accipiuntur, vel propterea quia necessaria sunt, ut medicamentum formam sibi comparet emplastri, aut cerati, vel unguenti, vel ut vires aliorum medicamentorum valide, & maiores, quàm requirat ratio medicamenti relati ad proprium scopum, cōtēperentur, & mitigentur, & ad certum modum deducantur: sæpe enim, ut eodē de cōp. secundū gen. docuit Gal. sit compositum medicamentū ex aliquibus simplicibus, quorum quodlibet per se non modo ineptū est: sed etiam aduersariū ipso affectui curando: dum tamen postea recte & apposite miscentur, ex eis optimum & maxime accommodatū illi scopo conflatur medicamentū: Sed particulatim rē hāc tractemus, ut ēt exemplis res apertior & clarius euadat. primumque agemus de medicamento cuius auctor fuit Gal. idque quā plurimis refert laudibus, atque illis tēporib. in plurimo vſu p̄p maximā eius utilitatē i varijs vlcerū differētijs fuisse testat, diuersis aut nūcupationib. ab eo fuit appellatū. nā & phenicinū emplastrū vocabat interdū, quasi palmeū latine dicas: interdū vero, diachalciteos, quatenus quidem tum ex chalcite, quasi ex præcipuis medicamentis, tum vero ex ramo & segmentis palmæ arboris conficiebatur: nunc etiam a nostris chirurgis introductū est in vſum, & vulgo diapalma dicit̄. cōficitur vero ex oleo veteri, ueteriq; adipe axungiae, argenti spuma, & chalcitide, quorum ut ait Gal. symmetria est hæc. acceptis libris duabus vetusti adipis, tribus autem olei veteris, totidemque argenti spumæ, chalcitidis vero tritæ & leuigatę, vncijs quatuor: Modus vero conficiendi est, ut adipis optime prius mundati & percolati, exenptis nempe membranis libræ duę mortario indantur, moxque chalcitis inspergatur, atque oleū infundatur, illisque trita argenti spuma addita, omnia cō probe commisceantur, quo ad exquisitē in vrū coierint. postea translata in cacabum coquantur: hoc tñ in coquēdo obseruato, ut ramo palmæ, dū coquitur medicamentū, utamur tanquā instrumento ad cōmiscendū conficiendūque id emplastrū, loco quidē spathe appellatę, qua in consimilibus medicamentis parandis vti solemus: sit aut ramus viridis, a quo recisi circūquaque ramuli, & minutim incisi, subindeque cōtusi in medicamentū, non statim ut feruere incipit, coniiciendi sunt, ne consumatur eorū succus, vnde astringendi & repellēdi vim medicamentum contrahit. Sed cum aliquanto bullierit: ramus autem

crasfior, dū eo circumducitur medicamentū, & ipſæ ei impertitur ſuum ſuccū & eādē facultatē, & proinde cū pars ea qua ducitur me-
dicamētū videtur arida vi ignis facta, abſcindēda eſt, vt illi altera
quæ adhuc viridis & humens eſt ſuccedat; ac ita dū coquitur medi-
camētū, ſubinde fiat. erit autem ſatis coctū, vbi ad id deuenerit, vt
amplius non coinquinet. Eſt aut medicamentū, quod quidē inſigni-
ter deſiccare pōt, nihil enim eſt quod non exiccet. nā argenti ſpu-
ma minus alijs exiccat, & quātū ad ipſam pertinet modicā his vlce-
ribus ſua illa infirma ſiccandi facultate impertit: accipitur tamen
potius, vt ſit tāquā materia apta ad cōfectionem emplatri, vt pote
quæ per cocturā ex oleo liqueſcat. oleū vero vetus & itidē adeps,
licet molliendi aliquam uim habeant & laxandi; attamen quia præ-
terea vim digerendi non imbecillam habent, digeſtis ſuperuaca-
neis humoribus non parum faciunt ad deſiccationem iſtorum vl-
cerum, quæ inſignem exquirunt deſiccationem, ac ea propter ve-
tera accipiuntur. chalcitis uero cum cruda & citra uſtionem acci-
piatur, & ipſa his vlceribus ſumme, quantum ad eius naturam pro-
priam attinet, aduerſaria eſt: vt & adeps oleumque. Nā hæc quia la-
xant & molliunt, illa quia erodit & vrit, vt etiam cruſtas excitet:
mixta tamen, adeo vt unque miteſcit, & in quandam inter hæc duo
extrema mediā naturā temperantur, vt inde optimum & accōmo-
datiſimū fiat medicamētū. Nā ab adipe & oleo morſus & acrimo-
nia chalcitis obtunditur & miteſcit, neq; tñ propterea impeditur
exiccatio. à chalcitide uero, q̄ vi habet nō modicā aſtringēdi, exic-
cādiq; reprimitur & tēperat facultas molliēdi & laxādi, q̄ in oleo
& adipe eo nomine vlceribus obefſe poterāt, quā & palmę ſuccus
adiuuat, & ex his medicamēto additur vis repellēdi, ex qua cōſe-
quit̄, vt poſſit inſuētes humores arcere: & ſubinde ut cōmodū ſit,
qñ timēda eſt futura inſlāmatio, uel ēt qñ iā incepiſ; habet præterea
à chalcitide aliquid, qđ ſordes detergere, & mūdū ulcus reddere
poſſit. optimū ergo medicamētū erit ad omnia vlcera alioſque affe-
ctus, quæ curatu difficileſ ſunt ob fluxionē, ex qua reumatici affe-
ctus ac ſi deſluxorios dicas, à priſcis ſoliti ſūt appellari. cū uero ma-
iora ſunt effecta vlcera, & oīno cōtumacia, & ad cōtrahēdā cicatri-
cē per quā difficileſia, fortius medicamētū requirūt, fortius aut iſtud
euadet, ſi quatuor chalcitidis vncijs aliq̄ duę addant̄ vt ſint ſex. nā &
magis deſicabit maiorēque vim repellendi habebit, & detergendi.
& ſicuti hoc pacto fortius ſit medicamentum: ita & remittit præ-
terea

terea facile potest: si emplastrum ex aliquo aceto dissoluatur; atque adeo, ut facile possit euadere præstans medicamentum ad agglutinanda vlcera, vel vulnera, quæ per agglutinationem curari desiderant; imo cum per tale olei mixturam pro diuersa ratione & portione olei additi poterit accommodari omnibus id genus ulceribus vulneribusque omnibus temperaturis & ætatibus: quatenus aut valentius, aut mitius per hunc modum fiet: imo interdum fit magis digerens, interdum magis repellens & astringens ratione diuersitatis olei, quod emplastrum dissoluitur: si enim ex oleo ueteri, aut cicino, aut alio simili dissoluatur, magis digerens erit, & magis accommodatum inclinantibus inflammationibus & fluxionibus. sin autem oleo rosaceo omphacino, aut melino, aut myrtino, aut alio astringenti; magis repulsorium erit, & magis opportunum incipientibus, & in crescentibus fluxionibus inflammationibusque. Sed si dissoluatur oleo dulci & communi, non ueteri, in hæc mediocritatem serua-bit, & magis anodinum hoc est doloris mitigatorium erit: sed de eo satis loquuti sumus: unde tempus opportunum erit, ut ad alia transeamus, nam si quis plura audire voluerit, adeat Galenum primo de comp. med. secundum genera. & quia circa medicamenta à Gal. de scripta uersamur in præsentia, qui testatus est similem fere facultatem habere emplastrum, quod fit ex spuma argenti & ænoleo, parata & trita; ac subinde leuigata & cocta: hoc est ex uino antiquo & astringenti & oleo, donec liquata spuma ut superius diximus argenti, ad compagem emplastri deuenierit: de hoc quoque non nulla uerba faciamus; sed de cōfectionis ratione non est, cur multa dicamus, cum idem sit modus, qui & cum fit ex hydreleo, vel oxeleo, de quibus superius multa uerba fecimus. Sed hoc considerandum est, quod quia vlcera de quibus in præsentia agimus, quæque dyssepulota, vel maligna dicuntur, ægent medicamento generose exiccante, dum tamen id citra morsum fiat. citra morsum quidem omnino hæc siccant, ex quibus conficitur emplastrum: non habent tamen insignem vim exiccandi, nisi partim à uino à quo item & vim astringendi & repellendi sibi comparat, partim uero ex ipsa coctura. nam quo diutius coquitur, eo etiam siccantius sit medicamentum, longiori uero opus est decoctione ut ad formam emplastri deducatur; quando maior effunditur copia, tum uini, tum olei: unde ut pares vires palmeo emplastro, & hoc de quo agimus assequeretur Gal. solebat per quindecim subinde dies semper uinum

Cap. 2.

& oleum sicut absumebatur uti ignis, affundendo coquere, idque præsertim in sole, ita enim & generose exiccans medicamentum reddebatur, & non parum est astringens & repellens. quare pinde efficax & ad eadem fere utile euadebat, immo, & eodem modo administrandum, nam si ad pura vulnera conglutinanda erat usus, illud oxelco liquabatur: interdum etiam ad repellendas inflammationes ex astringentibus oleis: illis vero inclinantibus, ex digerentibus, ut antiquo, vel cicino: nisi quod hoc præterea considerandum est, quod quatenus pertinet ad eam vim, quo sordes ex ulceribus est detergenda, & vlcus mundum reddendum, hoc palmeo longe infirmius est. nam si aliquid in isto est, quod possit detergere, est vinum, quod voluit eligi Gal. tenue & partium tenuium, vis enim deterforia ortum habet a partium tenuitate, quæ si cum aliqua astrictione sit coniuncta, fortius agit, cum astrictio cogat partes illas tenues demergi in profundum, nequit tamen vinum æquari in hoc chalcitidi; Vnde si vlcus sordidum ita esset, ut requireret insignem aliquam purgationem, id valentius præstaret palmeum, vel ex chalcitide emplastrum. Quia vero sunt multi ex nostris iunioribus, qui summopere laudant medicamentum ab Auicenna quarta fen. quarta can. descriptum; ubi de ulceribus ægre admittentibus cicatricem malignisque agit: ideo de illo & nos pauca dicemus: nempe de facultatibus eius. Componitur autem in hunc modum. Accipit cadmix, chrysocollæ, aluminis, singulorum drag. viii. æruginis rasæ, quæ viride æris à iunioribus nuncupatur, utrumque autem assumi ipse voluit, & eam quæ deraditur, & illam quæ sponte decidit ab ære: singularum autem ipsarum vstarum drag. i. gummi cupressi drag. iiii. ceræ, olei rosacei, vel myrtini singularum quantum satis sit. Medicamentum, si diligenter æstimeretur examinereturque, generose quidem desiccatur, & parum abest, quin sit morsus expers, moderate etiam detergit & astringit. Nam ut a desiccatione incipiam, nihil est ferè in eo quod non satis generose exiccat, cadmia enim, ut cætera omnia metallica medicamenta non parum desiccant, de chrysocolla vero itidem Gal. 9. de simpl. med. fac. ait illam esse præditam digerente & desiccante facultate; desiccatur præterea generose & alumine, quæuis crassiorum alioquin partium sit, quæ tria sunt præcipua medicamenta, & quasi, ut iuniores loqui solent, basis medicamenti: sed ærugo potenter

potēter siccāt, siccāt & cupressi resina vel Gūmi, detergit vero cad-
mia, vt ait Gal. mediocriter, potētius autē chryfocola, vtpote, quæ
etiam carnē eliquet, & alumen detergendi facultatem nullā habet,
ergo vero eam maxime insignem, vtpote quæ vrat & crustas con-
citet: nec modo sordem, verum etiā carnē liquat & erodit: Sed cum
vltā viraque accipiat in medicamento, non parum de ui & acrimonia
per vstionē detrahitur, quemadmodū etiā superius ex sen-
tētia Gal. præsertim. 4. de comp. med. per genera exposuimus: alio-
rum comparatione non multa copia eius accipitur: Si. n. cum illis
singulatim comparatur, illa ad singulorū aliorū metallicorum me-
dicamentorum quartā partē accedit. sed si ad vniuersam medica-
mentorū omniū aridorū misturā, est quintadecima tantum pars cū
& flos & uiride æris singula pendant dragmam: vniuersa vero mi-
stura ad dragmas triginta accedat, vnde tanquā alia adiuuantia po-
tius apponuntur, quā ut præcipua in medicamento sint, longe autē
minus detergit medicamentū, quia omnia quidē præter oleū & ce-
ram siccant, & pleraque generose: alumen uero non modo non de-
tergit: uerū potius reprimat deterforiā aliorū medicamentorū uim
astringēdo. reprimat præterea & cupressi resina, tū astringēdo, tū
etiam quia resinæ omnes aliquid mollientis habent, ex alumine ve-
ro, & ea resina, præterea ex rosaceo mirtinove oleo id assequitur
medicamentum vt astringat repellatque: quamuis quodcunque
oleum fuerit, quod accipietur, efficiet ut in caliditate magis tem-
peratum reddatur: sicuti autem minor est vis detergendi, quam
desiccandi: ita minor astringendi, quam detergendi. insigni-
ter ergo exiccat, modeste detergit, modice astringit: nempe quan-
tum possit satisfacere ad repellendos: si qui influant ad nleratam
particulam, uitiosi succi. quare erit optimum medicamentum ad
dysepulota & maligna ulcera: si modo id quoque habuerit, ut
citra morsum, aut saltem citra insignem morsum, adeo ut ulcus mi-
nime irritetur, quod neque in illo etiam desideratur. Nam cad-
mia modice admodum mordet. sicuti modice detergit. chryfocol-
la uero & si ualenter detergat, non tamen ut 9. de simp. med. fac.
tradidit Gal. insignem habet morsum, sicuti & flos æris & argo
non potest plurimum mordere, tum quia modica copia eorum
medicamento iniicitur: tum uero quòd cum uruntur, mitescant
non parum: cui & id addamus, quòd cera oleum & resina, &
ipsa non parum reprimunt horum medicamentorum acrium mor-

dacem qualitatem : nisi quod & magis particulatim de cera & oleo sermo habendus est, quia neque Auicenna neque iuniores pondus, vel mensuram olei, vel cære præscribere; & id mea quidem, sententia, quia medicamentum hoc potest valentius & infirmius additis pluribus, vel paucioribus oleo & cera fieri, atque ita omnibus corporibus accommodari: nempe tam duris & robustis, quam teneris & mollibus, quia quo plus aridorum medicamentorum cerato, hoc est mixturæ olei & cære additum fuerit, fortius erit medicamentum: quo minus autem, infirmius & mitius: sed nos quoquomodo istius rei determinationem & definitionem a Gal. 2. de compo. medic. per gen. vbi de viridibus vnguentis sermonem habet, sane petemus, qui confecto cerato ex rhesina & cera, illi secundum variam proportionem æruginem, quæ nullam sit experta vitionem, interdum acrius & magis detergens medicamentum conficit, interdum leuius & mitius: nam ad robusta & dura corpora curanda octauam partem æruginis cerato indere docet, ut sit tribus cerati vncijs, tres æruginis iniiciantur dragmæ: Si vero duodecima, nimirum, ut dragmæ duæ æruginis tribus cerati vncijs assumantur, mollibus corporibus poterit esse aptum medicamentum. Sed si decima pars apponatur, ut si viginti dragmis cerati duæ addantur æruginis, medium erit inter duo priora medicamentum. Sed hoc, quod longe ex mitiori materia constat quam sit viua ærugo, longe maiorem copiam poterit aridorum medicamentorum vtiliter admittere, cum cerato commiscendorum: cum etiam ex oleo magis quam ex rhesina mitescere possint acria medicamenta. Vnde si aridorum octauam ad ceratum portionem addiderimus modestum & ferè cuiuscunque mordacis qualitatis expers & mediis corporibus erit idoneum: Si decimam illud & tenera corpora facile poterunt ferre: sicuti dura & sicca, sextam, vel septimam confectio. Quauis Gal. 4. de cõp. med. secundum gen. referens confectioem cuiusdam medicamenti, quod tanquam valentissimum ab eo indicatum est, constat autem ex squama æris & ærugine accepta earum singulorum vncia & illis assumptis ex semilibra cære emollita ex sesquiuncia laricæ resinæ, ait, quod quando cera tripla ad metallicam accipitur, valentissimum quidem medicamentum est, quod poterit esse accommodatum vlceribus valde malignis: sed si quadrupla accipiat, ceram, moderatum erit, & aptum curationi eorum vlcerrum, quæ non admodum sint maligna, moderatius adhuc futurum: si quia culpa

culpa & idoneum vlceribus, quæ ægre quidē cicatricē contrahunt, nondum tamen maligna sunt. Possemus & alia innumera ferè medicamenta, quæ ab hoc loco non essent aliena, referre. Sed nimis excresceret is liber. & hæc iuuenibus mediocriter in arte medica eruditis satis esse possunt. Nam his tanquam exemplis usi, & reuocatis in memoriam illis, quæ in prioribus capitibus in vniuersum sunt exposita facile & ipsi quæcunque in præsentia esse in vsu diuersis, quib. occurrerint, chyrurgis viderint, examinare poterint & iudicare. Nam ferè innumera sunt medicamenta, quibus in affectibus solent vti diuersimode, pro diuersa ratione eius qui vititur paratis. Tum igitur hac de causa, tum etiam quia multa inferius erit necesse describere examinareque medicamenta, quæ licet difficilioribus & malignioribus, quam hæc sint, de quibus nunc agimus, sint magis accommodata: possunt tamen & in his vsus cōmode transferri ab eo, qui probe eis uti nouerit, cū possint arte tractata, ut hæctenus non semel ostendimus ex Gal. præceptis mitiora facile reddi. Quare ad alia vlcera accedemus, quæ coniunctas habent certas quasdam circūstantias a quibus certa quædam nomina sortita sunt, ex quib. significat qualis sit ea malignitas, vel quid nā id sit quod cicatricē impediant: & quia illa quæ a iuniorib. viru. lēta dicūtur, quæq; tenui & quasi ichoroso humore madēt: vnde fit, ut ægre ad cicatricē duci possint, possunt ad hoc caput ferè adduci: curantur etenim per ea quæ insigniter exiccant: ideo statim ad ea medicamenta explananda transibimus. quibus vtuntur vulnerarij medici ad curanda vlcera sordida.

*De compositione & usu eorum medicamentorum, quibus sordida
ulcera curanda sunt. Cap. 10.*

Quamvis si rem recte æstimare voluerimus, aut prorsus, aut ferè nullū sit vlcus, quod nō aliquatūlū sit sordidū: quia vt Gal. docuit, & nos superius exposuimus, in oī vlcere duple x generatur excrementū tenue, quod virus à iuniorib. & crassum quod sordes à latinis oībus, verò à græcis passim dicitur. quia tñ in his excrementis procurendis non est omniū vlcerū par ratio. in aliquibus enim tenuioris excrementi lōge maior copia scatet, quæ ēt impedimēto est ne facilis curatio reddat: in alijs uero lōge maior copia sordis, quæ remouatur & ipedit inductionē cicatricis. Quā ergo difficultas curandi vlceris à multa sorde habet occasionē, & eius indicatio alijs oīb. uim habet

habet maiorem hanc nūcupationē vlcus fortis, quod vlcus sordidū nūcupatur. De his ergo medicamentis præsentē sermonē habebimus, quæ apta sunt his vlceribus curandis, quo nempe modo illa ex methodo sint componendā, & ex methodo sint deducenda in vsum. Sed quia prima cuiuscunque methodi fundamentum sumuntur ab ipsa rei natura: ideo non alienum à nostro instituto fuerit, si de generatione cordis primum aliqua dixerimus: postea verò cur copiosa exuperet in vlcere sordes, & supra quam requireret ratio cōmunis vlceris. Nam ita postea facilius poterimus, non modo genitum sordem detergendo detrahere: verum & obsistere, quo minus in tanta copia generetur. sæpius antea retulimus Galeni sententiam, in hac re, quod in omni corpore quantumvis sano ex alimento præter partem illam & maiorem sanē, quæ in substantiam corporis quod alitur, quotidie conuertitur, reliqua semper est aliqua pars, quæ exquirite conuertri in vtilem & alendo corpori idoneam materiam nequit. & quemadmodum substantia cuiuscunque corporis mixti, quod alitur, duplici constat materia, altera quidem humida aquea & fluida, quæ continuitatis partium in causa est, & quæ veluti pabulum est natui caloris: alia verò crassiori & magis terrestri, quæ soliditatem, crassitiem, & consistentiam illi præstat. ita necesse est, ut alimentum quo corpus itidem alendum est, duplici constet substantia illi duabus ex proportionē respondentē, atque ita etiam ut duplex relinquatur excrementum: alterum quod ex ea parte relinquitur, non probe concocta & elaborata, quæ tenuior est & humidior: alterum verò ex crassiori: & quia dum bene valet corpus & probe circa vitum se habet, non in multa copia neque admodum crassa consistētia generantur hæc excrementa, neque ita conspicua eo tempore sunt, cum autem ex aliquo malo affectu vires aliquanto fiunt imbecilliores præsertim concoctrix, maior exuperat & magis conspicua istorum excrementorum copia. Et hæc sanē est ratio cur generetur duplex hoc excrementum. Sed cur in tanta copia, ut iam propriam, & præcipuam indicationis rationem sibi assiscant, mox exponamus. non est autem istius rei vnica & simplex ratio. Nam id potest aut ab externa causa ortum habere, aut ab illa quæ in ipso corpore consistat & causæ quæ in corpore consistunt, aut priuatim in ipso vlcere vniuersam suam occasionem habet, aut in vniuerso corpore, aut in aliquibus male affectis particulis impellētibz sua excrementa ad vlceratam particulam. ex externis quidem causis sordes copiosa

copiosa occasionem habet, quando ex mala curatione, atque ex nõ recte administratis medicamentis id accidit. duplex verò est ratio medicamentorum, quæ vim magnam habent ad plurimam in vlceribus sordem generandam, quæque vires inter se ferè aduersarias habent. Nam ex pinguium, mollicentium humectantiam emplasti-
corumque vsu importuno, plurima succrescit sordes, cum enim horum usu plurimo humore scateat vlcus ille tandem vi caloris locis cõcrescit in sordẽ. ita et contraria quadã ratione ea medicamenta, quæ immodice detergunt, quæque acriora sunt, sordem augent. ea siquidem, vt 4. de compo. med. secundum gen. testatus est Gale. carnem colliquant, quæ deinde ex colliquatione dissoluitur in prauos ichores, qui digestis & dissipatis vi medicamenti partibus, quæcunque consistentia tenuiores erant, circa vlcus concrementes in sordem transeunt. Ex internis verò causis multa gignitur sordes. si aut corpus vniuersum multis vitiosis ve humoribus insigniter scatet, vel aliqua alia male affecta particula multa excrementa ad vlceratum locum, tanquam ad partem imbecilliolem continenter amãdet. aut ex aliquo vitio proprio loci vlcerati, quod in causa est, quod alimentum uel etiã probum, in mala excrementa uertatur. Nã aut ibi quasi computrescit, aut exurit, aut semicrudum relinquitur, propter diuersitatis vitiosę intemperaturę in illo loco cõtractę. Nemo autem est qui non videat, quod fieri nequeat vt unus sit medicamentorum modus, uel natura, quæ accommodanda sit huic affectioni, quæ licet vnum habeat symptoma genere, tamen differentiam capit & diuersas habet differentias: immo etiam inter se aduersarias. vnde quãtum ad ipsam generalem sordis rationem habet sanè unã communem indicationem: nempe omnino detergendum esse vlcus, ut purum reddatur: non tamen mox idem erit modus offerendorũ detergentium. Nam si ex importuno mollicentiam usu succreuerit sordes, exiccantibus & detergentibus erit opus: atque illis ualentioribus: quatenus & magis sordidũ & magis humidũ vlcus euaserit, & sicut paulatim siccius & purius fit, ita et minus detergentibus & minus siccantibus erit utendũ. si tandẽ in naturalẽ statũ nolumus particulã adducere, alioquin, n. in contrarium excessum adducemus: præter id, quod ulcera quò solidiora sunt, eò, ut exposuit Galibidem, facilius acriora & ualentiora detergentia medicamẽta terunt. sordes. n. quasi uallũ tuetur subiectã carnẽ, & acrimoniã medicamenti non parũ retundit. At uero si ex acrimonia, & vehementia

hementia medicamenti eliquata caro in sordem degenerauerit, de
 tergentibus quidem sed leuioribus & mitioribus erit agendum ali-
 lis quidem quæ possint sordem factam auferre, non tamen tantâ
 deinde vim habent, ut carnem dissoluant & colliquant. neque hoc
 prætermittendum est, quod itidem docuit Gal. his argumentis co-
 gnosci sordem habere occasionem à nimia vi medicamenti: nempe
 quod vlcus semper magis concauum fit, quod quæ vlcus labra &
 calidiora & rubentiora fiunt, vt quasi iam initia inflammationis ex-
 citentur. Quod si aliunde, vt ab vniuerso corpore, ob eius plenitu-
 dinem, vel cacochymiam originem habeat copiosa sordes, quate-
 nus ad sordem auferendam pertinet, omnino indicatur detergenti-
 bus esse agendum: sed prius habendam rationem fomenti, quod il-
 la aliunde habet. vnde primum inaniendum, vel expurgandū erit
 vniuersum corpus illis, quæ videatur magis exigi à ratione plenu-
 dinis vel cacochymia: de quibus agere ad hunc locum non videtur
 pertinere: itidem etiam si ab vna, vel pluribus particulis defluerent
 excrementa, tum vacuatione, tum reuulsione interciperi aut auer-
 tere oportet eam fluxionem, atque subinde: si in anandante par-
 ticula esset aliquis affectus, vnde generarentur copiosa illa excre-
 menta, illi occurrendum esset. verū quantum ad localia vlceri appo-
 nenda, non solum, ex detergentibus illa essent conficienda, sed &
 aliqua repellentia essent addenda: præsertim post aliquam corporis
 vacuationem, vt repellantur influentia excrementa. Postremo ve-
 rò: si in ipso vlcere esset vniuersa ratio sordis, vel ob imbecillitatē
 concoctricis facultatis, vel ob calorem putrefacientem, vel exuren-
 tem, vitia hæc prius essent tollenda, de quibus vitiis conferendis
 suo loco sermonem habebimus. In præsentia enim particulatim de
 ratione compositionis eorum medicamentorum agemus, quæ apta
 sunt expurgandis sordidis vlceribus. De quibus hoc primum acci-
 piendum tanquam constitutum, quod quæcunque detergenti fa-
 cultatem habent, ea tenui substantia constare opus est, & tenues
 partes habere. est enim abstergens astringenti, vt docuit Gal. lib. de
 facul. simp. medi. contrarium. astrictio verò vt idem 7. eiusdem ait,
 & alias etiam, sæpe opus est crassæ & terrenæ frigiditatis. vnde cum
 in partium tenuitatem referatur vis abstergens, ideo sicut calida
 aliqua, & frigida etiam aliqua tenui constant substantia; ita neque
 omnia abstergentia calida, neque omnia frigida: sed interdum hæc,
 interdum illa. vnde & amara ferè omnia, quia amaritudo semper in
 tenui

tenui substantia attenuata à colore consistit, aliquid deterforii habent. Sed & dulces succi, quicunque tenues substantia sunt, detergunt ut mel & zaccarū: præterea & quæ aridū sapore referunt: vnde 7. de cōp. med. sec. lo. Gal. ait, quæ medicamēta, quæ sunt succi crassioris de tersione impediunt. multa vero est detergentiū diuersitas. Nā propter id quod aliqua calida sunt, aliqua frigida, nō nulla sine ullo ferè morfu detergant, alia cū modico morfu, quādam cū insigni morfu & dolore. Præterea multiplex est detergentiū ordo: quia aliqua parū admodū, alia mediocriter, alia valide detergunt. Moderatissime detergunt farina hordei, fabarū, cicerū, feni greci, semē lini torrefactū, mulla plurimū di lutta, his aliquāto magis farina erui, & lupinorum, myrrha, cadmia, succus apii, terebinthina, resina, laricea, amara amigdala. sed magis adhuc iris, radix panacis, aristolochia, mulla mediocriter diluta. nā eō magis extergit, quo minus diluta est. ista præterea vincunt in detergendo, spuma nitri, aphronitrum, & nitrum id quod tenuium partium est, ut erat quod bereni carium antiquitus appellabatur. detergit non parum & sal. Quod & astrictionis non est expers: generosissime extergunt: ita ut & carnem eliqueant & urant, ærugo, flos eris, chalcithis, mysi, sandaraca, auripigmentum, atramentum sistorium, quæ & mordacissima sunt, ita ut & crustas excitent: si crudi dis illis hoc est non ustis neque lotis, utamur: sed si vrantur, minus mordacia, atque minus detergentia euadunt. Si autem post exustionem lauentur diligenter, adhuc minorem detergendi facultatem retinent, sed & morsus omnino expertia redduntur. Hæc itaque sunt simplicia, quæ detergentis ulceribus esse usui solent, distincta per suos ordines. nolimus aut longiores esse, in discernēdis calidis à frigidis, quia ferè oībus, qui uel à limine medicinā salutauere, nota sunt, uel si alicui aliqua parū sint nota, nemo est, qui Gale. aut Paul. aut Aetiū, aut Auic. aut Serapionē nō hēat, vñ facillime & citissime possit addiscere. His ergo medicamētis aliqui solis & simplicibus uti solēt medici: præsertim illis quæ mitiora sunt, interdū vero & sæpius tanquā materia ex quibus cōposita cōficiuntur. de quibus paulo post sumus habiuri sermonē, prius etenim hoc, quod nō indignū sciui est, mihi videtur exponendum, de promptum ex Gal. 5. de facul. simplicib. medic. Nam ad præsens institutum non parum facit, illud uero est, quod detergentium duplex est differentia, quæ tamē non distinguuntur nisi ratione maioris, uel minoris. sunt. n. aliqua tantum detergentia, ut poie quæ uim habeant, ut sordem deirahant,

Victoris Trincauellij

hant, siue in cute illa suborietur, siue in vlcere. neque ulterius progreditur eorum vis. Nempe vt præterea possint obstruatos & infarctos meatus expurgare, & ab infarctu & obstructione liberare, & in hoc genere sunt ea quæ partes aliquas, vel qualitatem aliquam nitrosam habent. Sunt & alia, quæ maiores vires habent, vt pote quæ non modo exterius adhibita vim habeant à cute vel vlceribus subcrescentem sordem detergere: verum & interius assumpta, vias & meatus maiores, vt sunt uenæ: præsertim quæ per viscera digestæ sunt, expurgare & extergere, & ab obstructionibus quæ ex crassis & lentis excrementis in eas infarctis concitæ sunt, possunt liberare: sunt autem hæc partim subtiliorum quam priora, & viribus valentiora, & magis *καταρρετικά, καὶ ἐκφρακτικά*, hoc est, expurgantia, & deobstruentia, in quo genere, tum nitrosa, tum amara continentur. Sed & alia inter hæc duo genera, vt ibidem testatur Gal. intercedit differentia, quod ad priora, quæ ita absolute deterfiora soliti sunt præsci medici appellare, adeo nulla adiuncta nitrosæ naturæ astrictione egent, vt ab illa potius impediatur deterfio, & id quia, cum in extimis partibus, vt est cutis, & sub ea etiam caro, meatus sint adeo angusti, vt ab astringente qualitate, cui statim illi occurrunt, prius cōcludantur, quam possint, vt res exposceret, de tergi expurgarique, præter id quod sordem magis inculcant & affigunt ipsi vlceri: at in visceribus meatibus, & viæ ampliores sunt, quales sunt in vasis: & proinde nihil potest astrictio moderata impedire, quo minus partes tenuiores in quibus sita est vniuersa vis aperiendi & extergendi interius penetrare, & suo fungi officio possint, immo præterea & non parum utilis est, tum quia robur visceribus addit, tum etiam quia in causa est, ut etiam incrimius, sicuti sæpius in prioribus libris fuit expositum, se insinuent ac penetrent. Sed iam opportunum erit, vt particulatim ea composita medicamēta describamus, quæ in frequentiori vsu sunt, vt tamen à facilioribus & illis, quæ magis à morfu sunt aliena incipiamus: subinde vero, & ad acriorum & uehementiorum expositionem accedamus, vt pro ratione multitudinis sordis & pro diuersa eius natura in crassitie & contumacia accommodata medicus possit detergentia medicamenta componere, aut deligere: verum quia sordem nonnunquā mundo lintheo, interdum lotionibus detergimus, de his primum aliqua dicenda sunt: lintheum itaque accommodatius erit, si mundum ex lixiuio fuerit factum, nam inde uim maiorem siccandi & detergendi

tergendi comparat; nempe ex lixiuio. medicamentorum autem cō-
 positum detergentium: eorum nempe, quę moderata sunt, quę-
 que ex illis conficiuntur, quę non admodū acria, & mordacia sunt,
 ferē materia est mel aut crudum, aut coctum, & nostris tēporibus
 mel rosaceum colatum. Nam eo frequentissime in lotionibus uti-
 mur, sępe etiam in medicamentis aliis. ea vero differentia est, ut mi-
 nus acre, & minus deterforium sit, quando coquitur, quam quan-
 do crudum & ipsum quidem secundum suam naturam simplicio-
 ris quantum fieri potest temperaturę, & facultatis, ut 7. de fac. sim-
 plicium medicamentorum dixit Gal. deterforia est. unde accom-
 modata admodum abluendis vlceribus, quę detergenda sunt, est
 mulla: sed & oximel deterforium est, ut 13. metho. ait Gal. medica-
 mentum, & citra morsum. verum cō potius utuntur medici, ad ea
 ulcera, quę non modo sordida, uerum & prona in putredinem
 sunt. lauant etiam interdum & vino mulso: verum ut idem 2. ad
 Glau. testatus est, inulsum vinum magis commodum præcipue in
 sinibus abluendis est, cum iam eo adducti sunt, ut incipiamus de ag-
 glutinatione esse solliciti: Mel vero rosaceum, quod à iunioribus no-
 stris sępe accipitur in confectionibus horum medicamentorum, in-
 terdum magis mordere solet, quam mel simplex: præsertim vero
 coctum: & id fortasse quia cum acquirat uim astringendi ab rosis,
 & ex succo ipsarum, non nihil etiam insuper deterforii addatur,
 magis exasperare ulcus potest: præsertim cum non multa adfuerit
 sordes: unde alii potius syrupo rosaceo ex succo rosarum confecto
 pro melle utuntur, cum mel rosaceum nimis mordet: fortiora ue-
 ro lavacra sunt, aqua marina, magis etiam muria: præterea uero &
 lixiuio. ut iam putrescentibus vlceribus cōmode adhiberi pos-
 sint. Sed de his satis pro ratione nostri instituti egimus. De com-
 positis ergo medicamentis agamus. Facile ergo & satis familiare
 medicamentum erit, & præ aliis simplex, quod ex terebinthina, &
 melle uel crudo uel cocto, uel rosaceo cōficiunt in hunc modum:
 accipe terebinthine, mellis rosacci singulorum sesquilibrium, quę
 coquantur, donec simul commisceantur. postea tantum farinę hor-
 deacę addatur, quātum possit esse satis, ut fiat, molle unguentum,
 ut iuniores loquuntur, uel emmotū ut antiqui: nempe ut linamen-
 tis possit excipi, & plerunque satis erunt uncia quatuor, uel circi-
 ter. Sed si uolumus aliquantisper minus mordax efficere: præser-
 tim si sit aliquis calor in ulcere, exquisitē lauanda erit terebinthi-
 na.

Victoris Trincauellij

na. nam ita minus acris & minus calida reddetur; & si à melle rosaceo morderi videbitur vlcus, melle simplici utemur. nam in confectione medicamenti coquitur una cum terebinthina. aliqui & parū croci addunt, ut aliquid præterea concoctorii medicamentum habeat. interdum verò iuniores nostri, ut medicamentum vires detegendi aliquanto maiores habeat, succum apii, sicuti semunciam. alii præterea addunt thuris non nihil. ut crocum in coquendo iuuet: præterea & dragmam sarcocollæ uel etiam myrrhæ tantundem. alii præterea & Aloem, in qua præter vim desiccandi & detergendi, est et vis astringendi. unde roborare possit particulam, & repellere influentes superuacaneos succos. alii uero irin, non nulli præterea & aristolochiam, quidam enim horum plura, alii pauciora priori medicamento addunt, & alii plus terebinthinae indunt, quam mellis, alii par utriusque pondus. Quidam autem & oui luteum, quod quāuis & ipsum concoquat & acrimoniam mitiget, subindeque dolorem, & ita solebat ubique ferè paratum seruari: facile tamen corrumpitur & putrescit. Sed quæ præter illam primam confectionem à medicis adiici solent exquisitè terenda sunt, & in tenuissimum puluerem redigenda, & post colliuationem & commixtionem terebinthinae & mellis addenda, & bene miscenda. hoc tamen est aduertendum, quod etiam paulo superius monuimus: nempe quod his temporibus & his Europæ regionibus in quibus non multam habemus terebinthinae copiam, nostri medici pro illa passim utuntur laricea resina: neque hoc multum refert: nam sæpe Gal in lib. de comp. medic. secundum gen. nos monuit lariceam resinam: si ea bona & clara sit, proximā ita esse ad terebinthinā, ut sine aliqua noxa altera pro altero facile possimus uti, hæc est ergo communis, & ferè vulgaris ratio medicamentorum detergentium sordem succrescentem in ulceribus. Ex metallicis etiam istius generis medicamenta fieri solent, quæ et si vires valentissimas habeant, & eas quæ non imodo sordem, sed & carnem detrahere possint, sicut ea sunt, quæ in postremum ordinem fuere relata, mixtura tamen aliorum adeo miscuitur, ut purgandis commodè etiam ulceribus & ferè citra morsum possint esse utilia. in frequentiori verò usu sunt, flos æris, ærugo squāmæ æris, & æs etiamustum. sed de his quæ æruginem accipiunt in præsentia sermonem habeamus, & præter id quod huic medicamentorum formæ, quorum nuper meminimus, possit aliqua rassa æruginis portio, ut uim maiorem detergendi sibi cōparent, addi: puta si

vnciæ

vnciæ confecti medicamenti injiciatur semidragma æruginis,
 vel duo ſctupuli, vel interdum etiã plus. Viridia tamen emplaſtra
 vel medicamenta, de quibus longum Gal. 2. de compositione me-
 dic. per gen. ſermonẽ habuit, huic officio ſunt præſertim idonea,
 quorũ confectio multiplex eſt. alia enim ſimpliciora ſunt, alia vero
 multipliciorem confectiõnem habent. ſimplicisſimum illud eſt, cu-
 ius ibi exempli cauſa ille meminit, & eius compositio in hunc mo-
 dum ſe habet. cõficietur prius ceratum ex oleo ſimplici, vel roſaceo,
 & cera, illis ſecundum eam ſymmetriam colliquis & mixtis ad
 ignem, vt emmotum, vel molle fiat medicamentum, quantum ſit
 futurum idoneum & aptum noſtro uſui. poſtea illi additur tantũ
 æruginis, quantum nobis oſtendunt indicationes, tum à multitudine
 & pertinacia ſordium, tum à natũra vlceraſi tam corporis quã
 particulæ, quia ſi vlcus magnum ſit, & multam malignamque ſordẽ
 habuerit, acriori erit medicamento opus: leniori vero, ſi parũ &
 non valde ſordidum. Item ſi corpus tenerum & molle fuerit, aut
 particula, quæ vlcus habet, validum medicamentum ſine noxa non
 poterit ferre. Vnde cum iſtius medicamenti vniuerſa ſerẽ vis ſit in
 æruginẽ, ab ea copioſiore, vel pauciore habebit, quod magis, vel
 minus acre ſit, magis vel minus detergat. pro ratione ergo vlceraſi,
 vel corporum Gal. variandam docuit mixturam æruginis ex cera-
 to. In tenerioribus enim & acriori ſenſu præditis corporibus ſatis
 erit, ſi duodecima pars æruginis cerato adiiciatur, vt ſi cerati libræ
 æruginis vncia immiſceatur, ſiccioribus autem & robuſtioribus
 corporibus, medicamentum hoc erit iuſto imbecillius. Vnde illis
 decima parte æruginis cerato addita, ſatis erit: nempe ſi decẽ vnciis
 cerati indatur vncia æruginis, poterit tamẽ interdũ in ſordidiorib.
 vlceraſibus curandis, & ſiccioribus ſolidioribusque corporibus vtili-
 ter octaua æruginis pars cerato commiſceri. eiũdem vero facultatis
 & rationis quatenus ad deterſionem vlceraſum pertinet, ſunt em-
 plaſtra, vel unguenta quæ viridia ab priſcis medicis Galenoque nõ
 cupantur. conficiuntur autem, quæ ſimpliciora ſunt, atque illis vl-
 ceraſibus accommodata, quæ *ἀπὸ πῶτος* hoc eſt aperta, vel ſine circum-
 ſtantiis vllis, quæ peculiarẽ aliquã indicationẽ habeant, præter eas,
 quæ vlceraſi cauõ & ſordido aſeſſe ſolẽt. Quemadmodũ qũ dicimus
 vlcus, vel calloſum, vel putridum, vel eroſum. illis ergo quæ aperi-
 ſtata dicuntur ſimplex viride accõmodum eſt, cõficietur ex reſina cę-
 ra & æruginẽ, & quamvis antiqui diuerſam ſymmetriam cerę &

rhesinæ sequerentur, & in rhesinis etiâ fuerint diuersi. alij enim colophoniam potius accipiebant, alij fructum, alij piceam, quia tamen terebenthina à Gal. alijsque præfertur, & illi proxima est laricea: ideo has & nos tanquam præstantiores laudabimus: sequemur verò rationem Gal. qui rhesinam & ceram pari pondere accipit, & illis simul colliquatis addit æruginis, interdû octauâ interdû decimâ interdû duodecimâ partē, ut cōficiatur medicamētū quod pro diuersa mensura, vel pondere æruginis ad alia duo: nempe ad ceram & rhesinam, possit omnibus corporibus, & omnibus vlc. cerum differentijs accommodari, quæ deterfionem & desiccationem desiderant. Nam si octaua æruginis pars indatur, validissimum euadet medicamentum, idoneum fortissimis & solidissimis corporibus, & valde sordidis vlc. eribus: si autem duodecimâ, tenellis & mollibus, & non valde sordidis vlc. eribus. si autem decimâ, & medium erit medicamentum, & medijs corporibus & vlc. eribus aptum. si autem hoc cum priore conferre velimus, hoc & calidius erit, & magis siccans. Nam ceratum ex oleo & rhesina siccantius est, quàm id quod fit ex oleo & cera propter rhesinam: præterea vero maiorem vim eadem ratione habebit extrahendi superuacuos humores e profundo, & eos etiam digerendi: nonnihil etiam & terebinthina habebit, vt concoquere possit: prius vero si ceratum sit confectum ex rosaceo oleo, magis aptū erit ad arcendas inflammationes, & refrigerandum ex rosaceo. si autem ex communi oleo, maiorem vim molliendi concoquendique & mitigandi dolorem. non multum ab hoc emplastro, quod uiride appellabant antiqui, diuersum illud est, quod a iunioribus quibusdam damascenum appellatur, quod conficitur addita æruginē vnguento rhesinino, aut rhesinato, qđ superius descripsimus, & fit ex rhesina pini, terebinthina, vel laricea paribus portionibus: ipsi tamen modicam æruginem indunt composito illi medicamento. Vnciæ enim scrupulum iniiciunt, quæ erit vigesima quarta pars. Vnde erit quantum ad deterfionem facillimum & imbecillum medicamentum, quod tamen aucto pondere æruginis poterit fieri valentius seruata ratione, quam docti sumus à Gal. vt si adderemus duos scrupulos, vel etiam interdum plus, & hoc medicamentum & calidius prioribus & aliquatō siccantius. simili etiam modo possumus facile varias conficere similium medicamentorum compositiones, quæ viribus quidem quantum ad detergendi rationem &

siccandi

siccandi similes erunt: sed aliquid præterea etiam additum habebunt, ut si eruginem quanta nobis videbitur expedire seruata doctrina quam Gal. nos docuit, addiderimus eo medicamento, vel unguento, quod Basilicon, vel Macedonicum nuncupatur, erit tunc medicamentum magis accommodatum vlceri, in quo labra, vel aliqua pars sit callosa effectu, quæ molliri, atque digeri discuti que desideret. Nam ex vaccino seuo mollire potest: præterea si crudius sit vlcus & concoctione æget, & aliquibus, quæ pus moueant: id enim thus & myrrha præter seuum facere possunt: Hoc tamen officium valentius poterit præstare medicamentum id, quod Apostolorum vel venerate appellauit Auicenna, utpote quod, & ammoniacum, opepanacem, thus, & bdellium præter alia accipiat, quæ mollius digerunt & concoquunt: Vnde quia magis mihi accommodatum videtur fistulosis vlceribus, ubi labra iam obcaluerunt: ideo in aliud caput eius tractationem differemus: sicuti & emplastrum quod Isis ab Antiquis Medicis dictum est: cuius meminit Gal. 5. de compositione medicamentorum per gen. utpote quoniam, licet & sordidis vlceribus possit & soleat accommodari antiquitus & his etiam temporibus. Nam a multis iam deductum in præsentia est in usum: attamen multi vsus est medicamentum, quod longe etiam difficilioribus & maioribus affectibus aptari solet. ideoque in alium locum huius sermonem differemus. satis enim in hac re sumus vagati, ut iam sit oportunius ad aliud caput progredi. nam & si in hoc capite multi etiam unguentum, quod passim ægyptiacum nuncupatur poluerint: nos tamen accommodatiorem locum illi futurum putamus, si ad sequens caput: ubi de putridis vlceribus & gangrenosis agemus, transferatur.

Cap. 1. & 3

De Medicamentis accommodatis vlceribus putredis & gangrenosis. Cap. 11.

QUæcunque vlcera sunt cum alicuius putredinis complexu, siue iam facta sit putredo, quæ apprehenderit non modo pus, quod in eo generat: sed etiam partes & substantiâ vlceratæ particule, siue partem ipsam omnino corruperit, & in ea vitam extinxerit: siue nondum eò malignitatis malum deuenierit: Sed adhuc sensus & vita superstes est, quæ in uia sit ut extinguatur, & omnino extincto calore natiuo pars in

X 2 tescat

tereat, & quantum ad ipsam pertinet in cadauer desinat, illa omnia huic capiti subiciemus. nam licet in putrescentibus particulis multæ reperiri possint differentiæ, illæ tamen non differunt nisi ratione maioris, vel minoris putredinis. Vnde ordines, qui in putrescentibus vlceribus obseruari possunt, hac rōne, vel methodo inuestigari possunt. nēpe quia in vlcere consideramus, aut pus quod ab ipso effluit, vel carnē seu substantiā vlcerae partis, quæ vlceri subiacet. Si pus quidē consideramus: illud eisdem modis se habere reperiemus: sicuti & reliqua excrementa nostri corporis, sed ab illis exempla petamus, quæ magis aperta sunt & omnibus magis conspicua, vt sunt alui deiectiones & lotia. in lotiis itaque interdum summam cruditatem notamus, in quibus nullum ferè vestigium apparet a calore, vel extraneo, vel naturali impressum, vt quando vrina alba est & tenuis calore & substantia sine vlla hypostati, & eam crudam omnino appellamus: interdum vero concocta apparet, vt quando subflaua est mediocri substantia, & in ea subsidet hypostasis alba lenis & æqualis, quæque nullum fædum, & præter eius naturam refert odorem. tertia autem vrinæ differentia est, quæ confusa & turbida est, liuens, & aliquando subuiridis fætidaq; has cotidie differentias urinarū in ægrotantibus obseruamus, quarū prior summam in uenis cruditati ostendit, vt pote, quæ nullam elaborationem indicet excrementosorum humorum, qui sunt in uenis a calore natiui, sed neque corruptionem ab externo & putrefaciente: altera uero exquisitam transmutationem a natiuo calore, quanta poterat in ea materia desiderari, sed tertia demonstrat summam corruptionem & putredinem uictoriamque extranei & putrefacientis caloris. eodem quoque modo aluus interdum cruda deiicit, & aquosa sine ullo penitus fætoze, uel odore: interdum uero diluta quidem & ueluti colliquata excrementa sine ulla naturali compage & fætidissima, ut nullus possit fætorem sine maxima molestia ferre: interdum autem naturales fæces: uidentur mediocriter compactæ, quæ nullam redolent putredinem. Et hæc quidem sunt ueluti extremæ differentiæ horum excrementorum. Nam inter has sunt multæ intermedie: immo ferè innumeræ pro ratione qua magis, uel minus ad naturam primæ, uel alterius, uel tertiæ differentiæ accedunt. possemus & in sputis id ipsum ostendere, sed ad institutū nostrū hæc possunt satis esse. redeamus ergo unde diuertimus, hæc eadem differentiæ in ulceribus: si quis eas diligenter uoluerit obseruare

obseruare, inspici quotidie ferè possunt. aliquando enim effluit pus aquosum & fluens, quod nullam præfert, neque concoctionem, neque putredinem, vt pote quod, neque album, neque lene, neque mediocriter consistens sit, neque vllum putridum, & malum refert odorem. interdum verò consistens quidem est, albumque & lene, vt & colore & consistentia actionem natiui caloris omnino dominantis demonstrat. interdum autem pus quod inde effluit, crassum quidem consistentia est, nullam tamen lenitatem referens: sed potius partium inæqualitatem & asperitatem, vt partim grumulosum sit, partim liquidum & fluens: colore verò liuidum est, vel tuscum, interdum subuiride, aut etiam viride, plurimum autem foetidum, hoc sanè putredinem multam demonstrat, & natiuum calorem extraneo & putredinoso succumbere. Sed putredo hæc ad pus solum pertinet. nondum. n. videmus carnem subiectam vlceri atq; ipsa labra arrepta esse à putredine, quâuis in ipsam sint prona, & nisi illis probe fuerit & opportune consultum, paulo post incident in putredinem, quia quod à putrido tangitur, necesse est vt & ipsum tandè putrescat. Quandoque verò putrefactio ulterius progressa substantiam & labra vel partes vlceratas corripit, quæ & ipsæ corruptæ putrescunt extincta ferè in eis vi naturalis caloris, & interdum quidem omnino extinctus est calor natiuus, vt iam desierit computrefacta pars in cadauer, & tam color quam odor id iam ostendit. Nam liuescit nigrescitque locus ille, aut morticinum vt 7. apho. exposuit Gal. quandam colorem refert, & non solum carnem & uenas arteriasque occupat: verum & subiecta ossa, & affectum hûc sphacelum Græci, siderationem Latini appellauere. quandoq; verò nondum omnino extinctus est calor neq; emortua hætenus est pars: sed in transitu est, & in transmutatione ad interitum. nã paulatim uincitur calor naturalis ab externo, aut strangulatur à multa copia humorum infarcta in ipsa particula: sensus tamen eatenus in ea reliquus est, vt pote quæ doleat si pungatur, aut incidatur: sed incipit iam hebetior fieri, & iam illa in parte coloris flos languescere & liuescere uidetur, & hunc affectum gangrænam Græci nuncupauere, cui aliud nomen, cuius meminerim nullum Latini indidere. Quando autem putredo, uel corruptio nō ibi consistit, sed serpendo corripit subinde uicinas partes, ac eas quasi depascitur, vt à Græcis, depascentia uero ulcera à Latinis dicuntur. Quia uero iniriū curationis istarū malarū affectionū, hunc

Com. 50.

Cap.

Com. 30.

in primis tanq̃ præcipuū scopū spectat, nimirū, pcurare ut cōsistat putrefactio, nec ulterius serpens depascatur, deinde ut putrilagine, quæ iam genita fuerat, detracta, detergatur & mundum reddatur vlcus, tertio verò quemadmodum 2. de comp. medicamento, secundū genera docuit Gal. vt caro proba generetur: postremo vt cicatrix adducatur: & putrefactio quidem sistitur præsertim remotis eius causis: Vnde nonnulla de causis suborientis in vlcere putredinis, antequam ad rationem medicamentorum, quæ his affectibus curandis idonea sunt, exponendum accedamus, & quo breuiorem poterimus sermonē habebimus. Tres ergo sunt causæ quatenus ex Gal. colligere possumus tū ex huius locis, tū vel maxime ex 2. lib. cōmentariorum in 6. epidem. cur putredo vlcera corripiat: prima quidem succorum prauitas, qui vel ad vlcus confluunt, vel etiam ex mala & iustiosa illius temperatura ibi generantur: Vnde Gal. 3. de cau. sympt. gangrenam ex vitiosis succis ortum habere testatus est: ex mala enim eorum natura & qualitate interdum sunt valde ad putrescendū proclives, altera est imbecillitas particulæ atque sibi natiui caloris, a quo nequeunt, neque si qui aliunde influant recte administrari, neque eius alimentum probe confici: facile autem cū inconcocti remanent succi, putrescere solent: & ad imbecillitatem particulæ, & caloris natiui defectū potest tandem referri, quando ex vinculo vel deligatione strictiori in superiori parte vnde desluunt spiritus, facta, etque et qñ ex importuno & immodico vsu medicamentorū refrigerantiū exterius adhibitorum, vt solet curantibus berysipelata accidere: Tertia vero est immensa copia sanguinis confluens ad aliquem locum excitaturā inflammationem. cum enim infusus humor adeo inculcatur, vt diffilaretur, euentari nequeat, strāgulato extinctoq; natiuo calore, inflammatio primū in gāgrenam, mox in sphacelum, & subinde in nomen vel depascens vlcus transit, & est id quod Arabes dicere solent, quod gangrena in ascachilū transit, corrupta enim est vox sphaceli in ascachilū, qui etiam nomen, hoc est depascens vlcus æsthiomenum, secusquam Græci appellāt: Græci enim æsthiomenum herpetem uocant, quod summam cutem ulcerando serpit, quem affectum Arabes fornicam ambulantem appellauere. Sed de his satis. conuertamus iam orationem ad rationem medicamentorum, quæ his curandis vlcerosis affectibus possunt esse opportuna: sed primum in considerationē reuocemus, quæ cum affectiones hæc quæ cum vlceribus complicatæ peculiare præ-

ter vlcus indicationē habeant, & peculiari etiā curatione egent, & cum sint veluti soboles, vt docuit Gal. 3. de sympt. cau. vitioforum humorum, quorū vitium consistit, tum in multitudine, tum in corrupta eorum qualitate à quibus ortum & fomentum habent, ne cesse est, vt qui causas putredinis remoturus est, his in remouendis præcipue incumbat, à quibus illorum ortus & fomentum pendere iudicauerit. Vnde cum omnia istiusmodi vlcera in illis sint, quibus curandis Hippo. in libro de vlc. & Galenus quarto metheororum sanxere, opus esse & corporis vniuersi purgatione, & præterea etiam sanguinis missione, tum ut id fomentum, quod aliunde habet ulcus, subrahatur, tum etiam ut influxus vitioforum humorum ab ulcere auertatur, & alio cōuertatur: Sed in his nolumus lōgiore esse, cum ad nostrum institutum, quod nobis in hoc 3. libro proposuimus, non pertineant. His autem expeditis, quæ ad procurationem vniuersi corporis, uel aliarum partium, si ab eis foueatur ulcerosa affectio, agendum erit, ut sæpe monuere medici quicumque istius artis periti sunt, attendendum quippe erit loco ipso affecto: & quia cum is in putrefactionem procliuis est, semper ferè primum vitium in humoribus in illo contentis contractū est. Nā illi ratione humiditatis, quæ ut in prouerbio ferè est, mater putrefactionis est, putrescere solent. ideo secundo loco cōsultare, ut & vitio si humores, qui ibi præsentē aliquā cōcepere putredinē, detrahantur: ne eorū contagio reliqua putrescant, & præterea uero quia maxima in nostris corporibus causa putrescendi est, prohibita diffusio & transpiratio: id est ut euacuato loco à vitioso sanguine una cum aliis excrementosis succis, liberior & expeditior fiat euaporatio & transpiratio, incisionibus, uel scarificationibus pluribus inflictis particulæ ulceratæ, permittatur sanguinis, uel etiam copiosus effluere. mox aut omni rōne & studio delicatiori dāda est opera, quod quidem officium præsertim nostro instituto attinet, quia id ope medicamentorum præstari solet. Itaque post curā vniuersi corporis, & per plures incisiones euacuatum locum affectum ab infectis putredine excrementis, desiccationi vniuersa opera dāda est: quia ut uincēs humiditas putrefactionē tuitat, ita siccitas eā fugat & reuocet: Vnde Hippo. in lib. de ulce. cui Gal. quarto meth. astipulat, ait, quod siccū sano uicinius est: humidū uero nō sano. primū ergo lauāda ē ulcerata pars, quæ scalpello incisa fuit, vt putrilagines abluant. illis autem lotionibus lauanda quæ propter loturam & deterfionem loci

cōferant etiam arcendo putrefactionem:& cum sicuti Gal. sit. ii. de facultatibus simp. med. optimum medicamentum sit sal, utpote quod,& superuacua humiditatem absumat, & substantiam, quæ semper dissoluta & laxa est in putrescentibus rebus cōtrahat: ideo in his uti solent aqua salsa, & marina quidem: si ea sit in promptu: sin minus, adiecto sale eam saltam efficiunt, muria etiam: siue c salitis carnibus siue ex piscibus fuerit desumpta: sed ad hoc officium aceto uti possumus sale immixto, aut etiam lixiuio, cui si & oximel addamus, cum utilitate id fiet, vel si lupini incoquerentur aptum etiam erit medicamentum: ut tamen in his eligendis prudens sit medicus, semperque ea conferat tum morbo primum: nempe ut cum maior fuerit, maioremque conceperit putredinem, ea adhibeat, quæ magis desiccant maioremque uim habeant. minoribus vero utatur, cum minor erit affectio. Deinde vero ad intemperaturam ipsius vlceris. nam si in eo insignis videatur calor, illa sunt eligenda quæ minus calefaciant, quia vel illa minus, ex se calefaciant, vel illis aliquid incoquatur, quo temperetur calor: ut si lixiuio, vel aquæ salæ incoquantur folia plantaginis, aut faba, aut addatur oximel, vel acetosus sytupus, quæ ut temperant: ita & reprimunt putrefactionem. tertio vero respiciendus est sensus, qui in vlcerosa parte est. præsertim vero antequam corruptio ab humoribus in substantiam vlceratæ partis transeat, & incipiat iā gangrena suboriri, quia tum iam sensus sit obscurior & obtusior. ubi ergo sensus acris viget in loco affecto, mordacioribus medicamentis parcendum, ne fluxionem & inflammationem præ dolore inuitet. Primus ergo putridi vlceris scopus erit procurare ne vlceribus putredo progressa corrumpat labra, vel fundum vlceris, & gangrenam adducat. & quia plerunque istiusmodi vlcera ex multo calore, & multa humiditate sunt affecta, hæc enim putredinis proxima principia sunt: ideo illis omni studio erit occurrendum & agendum refrigere tantis, & insigniter desiccantibus: Vnde si linamēta demersa in eximolite, immo & oximel in ^{ut} vultur in vlcus, & deinde linamentis contegatur, vlcus vniuersum, erit admodum accommodatum medicamentum. hoc tamen semper accepto tanquam fundamento curationis præcipuo, ut quotiescunque constiterit vlcus ab vniuerso corpore, vel particulatim ab aliqua parte foueri, semper curatio illorum præcedat, & procuratio, ut subtrahatur fomentum illud. sed sunt etiam multa alia medicamenta tam simplicia quam composita

composita huic muneri apta, nempe quæ aspersa, vel iniecta in vl-
cus, illo rescato repellere corruptionem possunt, ea tamen vt fa-
cultatibus sunt diuersa ita pro varia affectione vlceris eligenda.
Nam oximel quidem exiccar, et potius refrigerat quam calefaciat:
Sed præterea habet etiam non exiguam detergendi facultatem. Me-
sue vero aloen ad arcendam putredinem ab vlcerebus summopere
laudat, & quamuis Gal. quinto Meth. dixerit aloen imbecillum es-
se medicamentum ad adducendam cicatricem in vlcerebus penis:
præsertim si ea sint humidiora: hoc tamen non tollit, quia à putre-
factione tueri non possit vlcera in illam propensa: laudat autem
imprimis: si cum myrrha misceatur. omnes vero aloen præcipue
vtilem esse in vlcerebus ani & pudendorum: Sed potentius ait
Gal. est anethum vltum vlcere inpersum, & cucurbita exiccata &
ysta itidemque inpersa. præsertim vero putridis vlcerebus com-
modam esse sabinam, & cupressi folia ait Gal. 6. de simpl. medica-
mentorum fac. ut & maligniorem diuturnioremque putredinem
superare possit. præterea & isatidis tam sylvestre, quam satium
genus, & utraque anagallis, & cortex radice maniaci folani, hype-
ricum aridum inpersum, ite & chamæpithys. Nono vero libro impri-
mis terram lemniam comendat: si acerrimo aceto dissoluatur & illi
natur vlcere quando tetrum odorem redolet, & prætumidum est
fordinumque: alioquin vero, aut vino, aut oximellite, aut posca, aut
mulsa, aut vino dulci, aut sapa, aut mulso vino, & id pro vlcere ma-
iori, vel minori prauitate. vrinæ etiam humanæ, ut 11. eiusdem ope-
ris libro ait idem Gal. non desunt in hac re suæ laudes. Dioscori-
des vero amaras amigdalas tritas & ex melle vlcere illitas pluri-
mum prodesse ait. Ex his ea eligi poterunt, quæ magis apta vide-
buntur, tum ratione maioris vel minoris imminentis putredinis pu-
tredinis, tum vero maioris, aut minoris humiditatis ipsius vlcere,
tum etiam habita ratione calidioris, aut frigidioris temperaturæ
ipsius vlcere partæ. Composita autem medicamenta, quæ
apta & idonea his vlcerebus curandis esse possunt, alia arida
sunt, quæ in puluerem redacta vlcere inpersuntur, alia in mo-
dum cataplasmatum conficiuntur. alia vero ab antiquis emplastra
dici solita sunt, ab Arabibus & nostris iunioribus unguenta
dicuntur. Agemus autem primum de cataplasmatibus quæ
uim habent, ut affectam partem à putredine tueantur. Ho-
rum ergo materiæ, ex quibus plerumque conficiuntur, sunt fa-
rinæ

Victoris Trincauellij

rinæ hordei fabarum , erui : Sed & lupinorum , & lolij , priores tamen in maiori sunt vsu.coquuntur autem in cataplasma , aliquando ex oximelite , aliquando ex syrupo acetoso interdum ex aqua maris,quandoque ex posca,non nunquã ex lixiuio.& id pro ratione,qua esse opus maiori,vel minori calefactione , maiori minorive desiccatione videtur.nam lixiuium & aqua falsa magis calefaciunt, & magis desiccant, & omnino vim maiorem habent: oximel vero, minus calefacit & aliquanto minus siccatur: sed eo minus etiam syrupus acetosus,minus etiam posca. aliqui verò lixiuio,vel aquæ maris acetum addunt,vt magis siccetur,& in profundum facilius se insinuent.solent autem interdum farinæ pari pondere accipi,quandoq; impari,& id pro arbitrio medici & eius iudicio. copia verò liquoris unũ cõficiendũ est cataplasma,relinquitur peritiæ coquenti. Quatenus verò ad vsum horum cataplasmatum vel emplastrorum pertinet;interdum solis illis vtuntur medici absque alio vnguento vel emplastro indito ipsi vlceri, vt pote quæ possint quantum satis sit,præter id quod à putrefactione tuentur,desiccare. detergunt etiam: præsertim si ex oximellite,aut aqua falsa,vel lixiuio sint confecta.interdum verò, atque id quando fordidius est vlcus: illi indunt aliud medicamentum,quod magis detergat, filamentis laceri lintei exceptum,vel linamentis:qualia sunt multa,tum valentiora,tum leniora pro opportunitate & indicatione vlceris. multorum meminimus superiori capite, quæ vim detergendi habent, vt sunt viridia emplastra,vel vnguenta,cuiusmodi illud est quod litem diximus à Græcis appellari,& quod à iunioribus damascenum: præterea isis epigoni,& vnguentum apostolorum:aut illud quod ex charta combusta ab Auicenna literis traditum est. his verò valentiora sunt,aridum medicamentum à Galeno descriptum,quod & ipsum ex combusta charta nomen habet. præsertim autem vbi iam vlcus putrescere incipiat, in vsu sunt ad hoc officium troscisci Andronis,& vnguentum Aegyptiacum dictum,& alia multa, de quibus paulo post sumus sermonem habituri.confecto ergo aliquo horum medicamentorum vlcere, super id apponunt emplastrum ex his farinis confectum,quo non modo vlcus:uerum & partes circumstantes vlceri per aliquod spatium conteguntur: sed iã opportunũ erit, vt ad rationem medicamentorum transeamus, quibus apte utimur in curandis putridis ulceribus, quando non modo pus putridum est: uerum & caro putrescere incipit,& gan-
grenæ

grena particeps est, in quibus generales scopii iidem sunt: Nemp
 putredinem reprimendam & cohibendam, ne ulterius augeatur &
 serpat, & quod putruit iam detrahendum & detergendum, ne uici-
 nas partes inficiat. mox caro generanda, ut planum redditum ulcus
 post modum ad cicatricem deducatur: sed quia morbus maior fa-
 ctus est, & difficilior, maioribus etiam illi erit auxiliis & remediis
 opus. unde cum agendum imprimis sit incisionibus & scalpellatio-
 nibus, illis erit opus maioribus & profundioribus, quo maior fue-
 rit putredo, & magis in altum se insinuauerit, atque ut sanguis co-
 piosior effluat, erit permittendum, tum ut qui iam uicium contra-
 xit excernatur, & probus illi succedat, tum ut inanita particula affe-
 sta, melior & expeditior diffusio & perspiratio fiat. Hoc tamē sem-
 per animaduerso, ut corpus uniuersum minime scatens sit uitioso
 succo, qui malum fouere possit. Nam illud prius cauere oportebit
 reuulsionibus per sectionem uenæ & purgationes, ut ex Hipp.
 & Gal. superius non semel monuimus. Sed quatenus ad topica re-
 media pertinet, post incisiones & congruentem sanguinis effusio-
 nem per scalpellationem, lauandum erit ulcus, ut paulo antea dice-
 bamus. Statimque ad ualentia medicamenta erit accedendum. in
 his enim maioribus morbis, ubi periculum est imminens maioris
 alicuius ruinae, non est, ut Gal. 5. metho. docuit, incipiendum à le-
 uioribus. Sed ratio etiam sua habenda maioris uel minoris putredi-
 nis, & magis, uel minus serpentis. ad hoc uerò munus imprimis ac-
 commodati sunt pastilli Andronis, quorum nuper est facta mentio.
 ita autem à Gal. 5. de compositione medicamentorum per gen. de-
 scribuntur. Cyrinorum accipiantur drag. x. Gallæ drag. viii. myr-
 rhæ, aristolochiæ: singulorum drag. iij. atramēti sutorij, uel, ut Græ-
 ci appellant, chalcæthi, aluminis scissilis, myrsos singulorum drag.
 ij. passo excipiuntur, & in pastillos uel trociscos rediguntur. medi-
 camentum est, ut etiam 7. meth. animaduertit Gal. insigniter astrin-
 gens. astringunt enim generose galla: præsertim quæ omphacitis,
 hoc est, immatura appellatur à medicis antiquis, & qua imprimis
 utebantur, citinique, præterea & atramentum sutorium, myrsos at-
 que alumen: sed ualide etiam deficcant. nihil enim accipiunt, quod
 non insignem uim deficcandi habeat passo excepto, unde & robora-
 re possunt particulam, & repellere: si qua influunt excrementa,
 & humiditatem, unde ortum & fomentum habet putredo, absune-

Cap. 5.

Cap. 3.

re:

re: optimum ergo est medicamentum, quod tamen, neque plurimum mordet, & eius multa & frequens mentio fit à Græcis Arabibusque & Latinis auctoribus, & illis possumus in puluerem redactis tanquam inspersili medicamento vti. potest etiam interdum ex melle exceptum deduci ad formam emplastri, vel mollis vnguenti. Si arido vtantur, vlceri erit inspergendum, superaddito deinde aut emplastro ex farinis paulo antea descripto, aut si suspecta esset inflammatio, aliquo altero medicamento apto ad arcendas inflammationes Gal. suo vteretur phæ nicino, vel diapalma, ut nunc appellant. possemus tamen, & eo quod ex cerusa, aut ex thutia à nostris dicta vel ex minio. Quod si uideatur medico vti illo diluto ex melle, nihilo erit imbecillius medicamentum. Nam ut idem Gal. restatur secundo de compositione medicamentorum per genere. augeat potius & intendit id genus medicamenta, mel quā remittat. Longe vero fortius medicamentum est, quod ex charta combusta dicitur descriptum quinto de compositione medicamentorum secundum genera. quod hi crederemus: quia in plurimo vsu erat antiquis & in præsentia eius etiam à iunioribus fit mentio, cuius vero confectio ita se habet squammæ, æris, gallæ, myrrhæ, singulorum drag. viii. sandarachæ, non illius quam Arabes, & iuniores ita vocant, sed mineralis; vel metallicæ, quæ & ipsa est auri pigmenti species; illa quæ rubicundior est, arsenici, elaterii singulorum drag. iij. thuris, atramenti sutorii singulorum drag. iij. chartæ combustæ, quantum satis sit ad contrahendum colorem. fortissimum sanè medicamentum, & de quo dici merito possit, quod nomas, hoc est, depascentia vlceris refrenare & sistere possit, vt quod crustas quasi exurens possit excitare, neque hoc puto fuisse id, quo cum resolutus erat Gal. ulcera in pene, ut ipse testatur est, meth. nisi quis forte dicat, quod eo non utebatur ita solo & arido, sed diluto ex oleo rosaceo; sicut etiā in vlceribus intestinorum ex oleo rosaceo infundebat. nā ita potest ea ratione dilui, ut mite medicamentum fiat: sed ipse istius mixturæ ibi nullam mentionem facit; & fortasse quidem quoddam vbi ipse in aliis libris medicamenti, diacharta meminit, illud intelligit, quod primum sub nomine diacharta ex libro Asclepiadis descriptum refertur: à Galeno in eodem. 7. de comp. medic. secundum genera, eius autem confectio in hunc modum se habet. chartæ combustæ, plumbi combusti, æris combusti & eloti, arsenici, squammæ stomomatis singulorum pars una sulfuris uiui pars media, tritis uti oportet, ex melle

melle, uel rosaceo, ubi paret, quòd licet insigniter, & hoc siccet, minus tamen astringit, & minus acre mordensque erit, acrius aliis est arsenicum, deest tamen sandaracha, & atramentum futorium. plumbū uero ustum, uel nihil, uel parū mordet. & etiam ustū, cū lauatur, magnanī morsus & acrimoniæ partem deponit. longe etiam minorem morsum esset habiturum medicamētum: si cætera quoque metallica, quæ lauari solent, lauarentur. Sed ad alia medicamenta transeamus minus acria, uel fortia, quæ quidem arida non conficiuntur, sed ad emplastri uel unguenti formam deducuntur. & ad ea præsertim unguenta, quæ his temporibus ad curanda putrida ulcera, & reprimendam depascētem putredinem nostris medicis sunt in frequentiori usu: ut sunt unguenta ægyptia ab Arabibus dicta, quorum conficiendorum duplex est modus: alter quem Mesue, in suo appellato antidotario retulit, cuius symmetria in hunc modum se habet: accipe æruginis drag. v. mellis dragm. xiiij. aceti drag. vij. alter uero ab Auicenna tertia fen. quarti libri, componitur in hunc modum, ut accipiamus æruginis, mellis, aluminis singulorum autem par pondus; coquantur autem hæc unguenta donec gilua fiāt. hæc est enim natura æruginis, ut cum cruda accipitur in medicamentis, ea uiridia efficit: sed si coquatur parum, inde fiunt medicamenta lutei coloris: ulterius uero cocta, gilua, uel fulua colore reddit medicamenta. Hæc autem mineralia medicamenta, ut Gal. de comp. medic. secundum genera ait, quo magis coquantur, eo etiam magis siccant, non tamen magis mordent: uerum forte etiam minus. differt uero hæc compositio à priori Mes. quòd ualentior & fortior in desiccando & crustas excitando: Nam æruginis, quæ cæteris acrius & ualentius est medicamentū, tertia totius confectionis pars est, in priori uero uix quinta. Præterea uero hæc magis astringens est, ex alumine, unde præter maiorem desiccationem additam, magis etiam potest particulam roborare, & partes uicinas à putredine defendere, & confluentes humores repellere: & hæc mihi sane satis esse uidentur, quatenus ad ea pertinent, quæ faciunt ad curanda putrida & depascentia ulcera. agamus ergo de erodentibus.

De erodentium ulcerum, quæ exedentia à Latinis, phagedena à Græcis dicuntur, & ipsa inter maligna connumerata, medicamen-

tis. Cap. 12.

VLcera quęcunque serpentina uicinas circumstantesque partes corripunt, aut id agunt ob putredinem in uitata parte subortam,

subiectam, quæ semper contiguas partes inficit, nisi cito illi occurramus, & id genus vlcera ad præcedens caput attinent: vt pote quæ depascuntia, vel ^{ut} dicantur, sed quæ citra putredinem serpunt, erodentia, vel corrosiua, vt iuniores appellant, à græcis verò phagedenæ dicuntur. hæc ab acris, & ab abradente, & tandem erodente humore fiunt. qui si prætenuis sit, non ad profundiores partes pertingit, sed suauitatem tantam cutem exedens vlcerat: herpesq; à Græcis dicitur, à Latinis vero præsertim à Celso ignis facer videtur fuisse appellatus, quo tamen nomine alii herysi-pelas appellant: sin autem crassissimus sit humor, qui exedit, perinde, vt est exusta & feruens atrabilis: inde generantur cancri vlcerati, vel cancrofa vlcera, inter hos in tenuitate & crassitie locum medium, vt 14. meth. docet Gal. tenet phagedena. quippe quæ ex medioeriter crasso acriq; humore ortum habet, & proinde præter cutem erodit etiam subiectas partes. hic vero acris & vitiosus humor, necesse est vt alibi generetur ex malo aliquo alterius partis affectu: & postea ad vlcus impulsu illi negotium facessat. & quamuis non negemus, quòd interdum non possit ex aliqua in affecta parte vitiosa intemperie, ne mpe calida & sicca, gigni aeris materia, quæ exulceret & erodat: plerunque tamen, vt ibidem voluisse insinuare visus est Gale. aliunde generatum impellitur ad vlcus. Ex quibus in hunc modum consideratis non est difficile deinde indicationes depromere, quibus methodus constituenda est, qua curanda sint istius generis vlcera. Nam cum semper indicatio à causa: nisi aliquid præceps aliunde periculum obstat: alias omnes antecedat indicationes: si acris & erodens humor aliunde quàm in vlcerato loco sui ortus occasionem habeat, nitendum erit, vt occasio causaq; cur generatur prius tollatur: moxq; vt id quod genitum est in corpore, aut per purgationem, aut per sanguinis missionem detrahatur, & id vt magis expedire visum fuerit, consultis prius viribus ætate & natura vitiosi humoris. Nā in herpete, ubi tenuis & biliosus acrisq; humor omnium malorum auctor est, sæpius magis utilis erit purgatio: in aliis ubi humor crassior erit, & vel crassior & exustus sanguis, vel bilis cum sanguine, vel bilis cum pituita præsertim, salua, vel quicumque humor non fuerit multum secretus à natura sanguinis, non erit inutile uenam secare, & ea ratione, ut cum uacuatione sit reuulsio: sed hæc potius à rei affinitate, & connexionem ducti hoc loco exposuimus, quam quòd præsentī instituto attineant, quo acturi

acturi eramus de medicamentis. Tranſeamus ergo ad aliam partem quæ ipſum vlcus proxime ſpectat. in vlcere ergo duplex poteſt eſſe vitium, quia, vel vniuerſum illi negotium facceſſit vitioſus humor aliunde eò confluens, qui præter id, quod ſua acrimonia ſubiectam carnem abradit & exedit: corrumpit etiam & probos, qui à natura ad alendâ eam particulam amandantur. ite pôt & vniuerſum vitium eſſe in ulcerata particula, quæ ex aliqua mala contracta intemperatura corrumpit & vitiat alimentû, uel etiâ bonû, quo erat alenda. interdû etiam vtrunque malû ſimul conſpirat: præcipue uero in diuturnis morbis, ubi ab inſluentibus vitioſis humoribus tranſmutatur tandem & conuertitur ulceratus locus ſecundum propriam temperiem in vitioſam & malam: ſed qua ratione malo huic occurrendum ſit quatenus ad fomentum illud & occaſionem illam pertinet, quam aliunde habet: quatenus ſpectare poterat ad præſentem locum, oſtendimus; agamus ergo de ratione medicamentorum, quibus curari poteſt particularim locus qui affectus eſt: cum fieri nequeat, ut nos quarto methæorum docuit Gal. quod ulcus ſanetur, niſi prius ſanetur particula in qua contractum eſt ulcus. in his autem duo imprimis conſideranda ſunt, nempe intemperies in quam tranſmutata eſt ea pars, & quia cum diuturnior ſit, nequit eſſe ſine vitioſa materia præſente, à quo fouetur illa intepéries: quare ſtatim duæ exoriuntur indicationes: prima, ut tollatur intemperies vitioſa, reſtituaturque naturalis & proba: poſtea vt vacuentur vitioſi ſucci congeſti in parte vlcerata, aut abſumâtur. Quibus peractis reliqua deinde eſt curatio vlceris caui, quam ſuperius expoſui muſ: ſed quia dum præſens ibi vitioſa eſt materia abſorta in ea parte, vel etiam in vicinis venis congeſta; nunquam omnino poterit in temperatura remoueri: ideo ab hoc ſcopo, vel ab hoc capite erit auſpicandum: nempe vt vitioſus humor detrahatur, quo detracto facilior deinde erit temperaturæ tranſmutatio: humor uerò vitioſus bifariam vacuari poteſt. Nam aut per illam vacuationem, quæ conſpicua eſt & ſenſibus manifeſta, aut per exiccationem digeſtionem diſcuſſionemque priorem uacuationem moliri docuit Hippocr. in li. de ulceribus, cui ſubſcripſit Gal. quarto methæorum per inciſiones multas ſcalpello inſectas: non ſolum ulceri, ſed vicinis & circumſtantibus partibus, in quibus congeſtus eſt vitiatuſ ſanguis, qui malignitatem vlceris fouet: ſcarificationem iuniores dicunt, è quibus illatis inciſionibus, permittendus eſt ſanguis, uel copioſus efluere

Cap. 5.

effluere. Sed & hoc ad institutum de medicamentorum ratione nõ
pertinet; ideo ad alterum vacationis modum, qui per medicamẽ
ta fit accedamus. Consideranda ergo imprimis erit vlceris, tam ma
gnitudo, quam etiam malignitas, vt apta medicamenta eligamus cõ
ponamusque. nimitum enim ad difficilia & permaligna vlcera su
peranda validis fortissimisque medicamentis opus omnino est, qa
ex vsu leniorum & faciliorem augetur potius & malignius eua
dit vlcus. Contra etiam vlcera mitiora & minora, nequeunt curari
acrioribus & fortioribus medicamentis, vt potius augeantur &
exacerbentur. Cum ergo vlcus & quantitate & malitia mediocre
fuerit, præter omnem rationem fuerit statim curationem acribus
& vehementibus aggredi medicamentis: sed mediocribus & quan
tum fieri potest expertibus mordacitatis, strenue tamen exiccanti
bus & potius refrigerantibus. cum enim erosio fiat, vt diximus, ab
acri & calido succo, & præsertim à calidiori & sicca intemperie ge
nito, ad consumptionem vitiosi illius succi necessaria est exiccatio.
ad delendã vero calidam intemperiem, opus est refrigeratione. &
quamuis siccitas sit quasi lima, vt aiunt, caloris, plus tamen potest
tum refrigeratio, tum etiam absumptio vitiosi illius succi qui lon
ge etiam magis siccabat & calefaciebat, quam id genus medicamen
ta faciant. Medicamenta vero, quæ huic officio apta sunt; sunt aut
arida, hoc est, pulueres, vel emplastra, vnguentave, & arida, aut sim
plicia, aut composita. simplicia multa esse possunt: imprimis vero
metallica, quæ sint lota & exquisite trita: sicuti præsertim pompho
lix, pro qua thutia vtuntur in præsentia, quæ fortasse caduiz illa dif
ferentia est, quam botritim appellant & factitia est. Sed & plumbũ
vstum & lotum: præterea stibium, bolus etiam armena, & terra lem
nia seu sigillata, & lapis hamatites, & myrobalanorum puluis. qui
dam & cariem lignorum, laudant, cum quibus consentire visi sunt
Gale. & Dioscori. quidam & satis apposite ex multis horum confici
unt aridum medicamentum: vt exempli causa, accipiunt spumẽ ar
genti, quæ si sit lota & trita exquisite ex aceto in sole, vel ex vino, ut
superius exposuimus, longe utilius medicamentum erit, stibii, uel
antimonii, lapidis hematitis, myrobalanorum citrinorum, boli ar
menæ, singulorum partes duas, æris etiam vlli, & probe loti. quod
si & ipsum eodem modo lauetur, melius erit partem unam; miscen
da sunt omnia, & in tenuissimum puluerem redigenda, quo replen
dum erit ulcus illi, quæ mox si imponatur, penicilli, uel ut Græci vo
cant

erant splenia, quæ sint imbuta aliquo vnguento refrigerante, & exsic-
cante, qualia sunt quæ aut ex plumbo vſto, aut ex ſandice, quod de
minio appellant, aut ex thutia, qua nunc pro pompholige vtiuntur,
aut id quod ex ſucco ſolani, aut quod vnguentum album dici ſo-
let, aut etiam illud quod ex calce ſæpius elota ſit, de quibus ſuo
etiam loco agemus. Ex his quidem maligna vlceris natura. ſupera-
ri poterit, & eroſio reprimi præſertim ſi mediocris fuerit mali-
gnitas, quia quandoque adeo malignum erit vlcus, vt eiufmodi
medicamenta ſpernat omnino: quod duplici de cauſa euenire po-
teſt. Nam aut quia a prauis ſuccis, quo reſertum eſt corpus, ſoue-
tur, aut quia caro vlcerata & partiũ vicinarũ adeo corrupta eſt, & ma-
lũ vitũ cõtrahit, vt & alimẽtũ quẽadmodũ dicebamus, corrumpãt in
prauũ & malignum ſuccum, & partes alioquin ſanę, quæ prope vl-
cus ſunt, ab vlceratis & viciatis per quoddam veluti contagium ma-
le afficiuntur & corrumpantur. Vnde ſi difficultas curationis occa-
ſionem habeat à fomento quod habet aliunde: illi occurrendum
erit, per purgationem, aut per miſſionem ſanguinis, vt & paulo an-
te monuimus. Sin autem id ortum habeat a magno vitio in parte
affecta, tunc præſtantisſimũ remedium, & aptiſſimũ ad emen-
dandum omne vitium, roborandamque particulam, & corrigendã
illius partis intẽperiem eſſet, candẽti ferro locũ inurere, quod
quidem remediũ magis aſpectu horridum eſt, quam re ipſa. quod
ſi quis aut propter ægrotantis timorem, aut propter ætatem, aut
quia in parte aliqua ſit vlcus, quæ non facile ex toto poſſit hoc re-
medium ſufferre, mendicamenti negotium cõſciendum erit, quæ
ſimilem ſerẽ vim habeant, vt pote, quæ & cruſtam adducere ſolent,
& viciatam carnem exedere: Sicut ea quæ ſiunt ex atramento ſuto-
rio, aut ex calce viuã, aut aqua vrente, aut eo vnguento, quod ægy-
ptiacum vulgo appellatur. Sed in præſentia in multo vſu eſt puluis
ruber, quem præcipitatum nuncupant, & reſertur in Ioannem de
Vico celebrem chyrurgam his paulo ante actis temporibus, de
quibus ſuo loco dicemus: poſtmodum vero cruſta remota, de qua
etiam remouenda loco opportuno ſermonem habebimus, Vlcus
curandum erit quo modo diximus curanda eſſe vlcera, quæ caua
ſunt: nempe vt caro aggeneretur, donec planum & æquale fiat,
mox vero ad cicatricem deducatur.

De sinu & fistula, nel de medicamentis, quibus hæc curāda sunt. Cap. 13.

Sinus est quasi genus fistulam continens tanquam speciem, nam fistula ut Gal. in libello de tumo. preter nat. docuit; aliud nō est nisi sinus oblongus, & angustus: imo ut ille idē 2. prognost. testatur est, à sua figura, hoc etiam nomen sortitum est: iuniorum enim fistulam, quæ musicū instrumentū est oblongū angustū & excavatum, vnde similis est generatio in vniuersum sinuū & fistularū. sinus autē sunt quasi cuniculi in carne, vel similibus corporibus excavati. Vnde semper in sinu os, quod in cute est minus & strictius est, quā fundus & cōcavitas vlcēis, & sunt sinus; ut ille idē eodē de tumo. preter. nat. libro exposuit; quando pus rū cutē exoriat, tum vero in causa est cur superiores partes & contingentes à subiectis, & contentis abscedant; quæ ubi abscessere & mutuo distant, cum redire ad pristinum statum, & simul coire iterum nequeunt, sinus iam factus est; qui nisi cito curatio apta adhibeatur, callum contrahit: Iuniores vero dicerent fieri ostrachosum, atque subinde induratur, ut mox non facile curationem admittat. solet autem sinus plerūque ex abscessibus fieri: Vnde omnes tumores præter naturā, cum in abscessum desinunt, rupto & aperto abscessu, & excreta materia, quæ in eo continebatur, iam, ut ait Gal. 2. lib. commentariorum de his, quæ in medica officina non amplius abscessus est, sed sinus erit appellandus. fiunt tamen sinus interdum ob contusiones magnas, ut nonnulli iuniores dixere, neque id inepte. Nam cum sit necesse ut monuit Hippo. omne contusum tandem putrescere & in pus verti: in magnis contusionibus, sicuti factis ex globulis eiectis ut bellicorum tormentorum, quæ sclopetos vulgo appellant: facile contusi circumquaque, vel etiam altioribus partibus, fiunt sinus. Sinus autem aut rectus est, aut obliquus, quī quidem talis pro partis in qua vlcus excitatum longitudine dicitur: quia si rectē per longitudinem fuerit proterius, rectus erit appellandus: sed si in latus quoquomodo declinet, erit, ut ibidem testatur Gal. obliquus. rectus vero sinus, aut declivis est: declinem autem appellamus, quando fundus superior est, & os inferius: sicuti quando contraschabet, & os superius est, ac cliuem nuncupare possumus. Hæ igitur sunt differentie sinuum. Eorum vero duplex est curationis ratio. Nam aut integre & vere curantur: vera autem & absoluta curatio ea est, quando

Cōm. 17.

quando partes, quæ mutuo abscessere & auulsæ sunt, iterum conuenientes simul agglutinantur, & ita ad unitatem redeunt, ut nulum inter eas spacium relinquatur: sed yndique ad pristinam continuitatem reuertuntur. Altera vero ficta quædam, ut Galen lib. de tumoribus præter nat. insinuat, curatio est, quam palliatam iuniores appellarent. Nam neque inter se diductæ & dispersitæ partes agglutinatæ uniuntur: imo cavitas aliqua in eis reliqua est: verum tamen contracto callo, ita deinde a medicamentis & ratione victus exsiccantur, ut integra videatur curatio: Nam nisi intercedat aliquod in ratione victus peccatû, & alioquin corpus sanum & mûdum sit, poterit sinus ita contractus diutissime seruari, ut sanus appareat: Verû si ex aliqua occasione, iterum fiat aliqua inutilis & superuacantæ materiæ congestio, inde repleto loco illo imbecilliori facto, iterum fit abscessus, & nisi integra fiat curatio, poterit ad eundem statum sæpius redire, atque etiam semper facilis & frequentius, quia sinus, qui semper reliquus est aptus sanè est ut facillime repleatur, cum iam sit facta facilis via fluxionibus. immo abscessus isti citra dolorem excitantur propter callum sinui obductum: sicuti postea facile etiam cum colligitur materia, effluit: cum sinus sit apertum. Sed si fiat agglutinatio partium & concretio, & mox iterum in eundem locum confluentem materia fiat abscessus: necesse est, ut cum disrumpitur, dolor concitetur. Hos vero præsertim agemus de ratione eorum medicamentorû, quibus vera perfici curatio possit. Prius tamen pro nouitijs medicis hoc videtur explanandum, cuius Gal. 3. lib. cõmentariorû i sextû epidem. mentinit, pertinens ad fistulas, nempe quod nõ nõquã cû fistulæ inueterascunt, quod sæpe in ano contingit, natura illis assuescit, & illis tanquã emissario quodã perinde vititur, atque mariscis, ad corpus expurgandû & excernendã varia, quæ quotidie in corpore gignuntur excrementa. Vnde nõ est omnino, ut ille docet tutû, curare has fistulas, sicuti neque mariscas: nisi huic periculo & recta victus ratione occurramus, & corporis purgatione uacuationeue, per aliqua intervalla repetita, vel saltè exercitatione: Sed propius ad institutû nostrû accedamus, quod proxime ratione & usum medicamentorû respicit. Porro ut & Gal. sæpius in libris de cõp. med. testatus est, eadẽ est methodus, quæ nobis curationis, & quæ cõpositionis & usus medicamentorû ratione demonstrat. ideo nobis primû videtur aliqua ponenda fundamenta, quibus ea omnia, quæ dicenda sunt, innitantur. Primûque aliqua in memoriã

C6m. 37
38. & 39.

reuocanda sunt, quæ prius fuerant exposita: nepe, quæ tã in vulnerib. quã vlceribus curãdis prima, & princeps est natura, ad medici vero officiũ pertinet procurare, vt ea remoueat, quæ possunt naturæ esse impedimẽto quo minus suo fungatur officio. & quãuis multa huiusmodi sint impedimẽta, vt in priorib. capitib. explanauimus, quorũ aliqua morbi sunt, aliqua causæ, aliqua symptomata, & aliqua, aut semper, aut frequentissime concomitatur & scd ex propria sinus ratione, alia vero raro, & quasi ex externa & aliena occasione. de primis nos tantũ sermone in instituamus. hæc vero tria præsertim sunt. Nã & duplex illud excrementũ, alterũ tenue & serosum, alterum vero crassum, quod sordem appellari diximus, quæq; dẽ & si sint omnibus vlceribus cõmunia, tã in sinibus ea lõge cõpiosiora, habita ratione magnitudinis, gignuntur, quam in alijs vlceribus, quæ citra sinũ sunt. præterea vero & callus, qui raro in fistulis & sinibus: cum diuturni fiunt, non contrahitur: & quãuis alia quoq; sinibus, & fistulis possint accidere, quæ possunt impedimẽto esse eorũ curationi, quia tamen hæc familiariora & frequentiora sunt, horũ tantũ meminimus, vtpote quæ præsentī huic instituto magis atineant. Quoniã autem omnia vlcera, vt sæpius restati sumus, curantur imprimis exiccatione; deinde vero & deterfione: & hæc nõ ita facile in sinibus præstari possunt: ideo etiam longior & difficilior est eorũ curatio: Vnde in hoc præsertim consistit ratio curãdi citius & facilius sinus, vt procuremus primũ quo pacto ea, q̃ in illis quotidie gignũtur excrementa prõpte, & facile inde possint effluere. Nã ita prõptius, & facilius desiccari & detergi poterũt: deinde cũ sit opus vii medicamẽtis ad eorũ desiccationẽ & deterfionẽ, & nõ sit perinde facile vt medicamẽta opportuna pertingãt ad oēs partes vlcis, cũ tñ oēs ope eorũ egeãt, vt siccent, i sinuosis, ut in apertis vlcerib. hac ẽt ex parte desiderat industriã medici, q̃ aliã quã ineat rõnẽ qua possint medicamẽta ita parari, ut in uniuersũ sinũ possint se insinuare. maxime vero oĩum callus, si iã fuerit obduretus, ipe impedimẽto ẽ, quo minus cõglutinari & cõsolidari sinus possit. circa hæc itaq; p̃sertim uertit negotiũ medici curãdis istiusmodi vlcerib. & quatenus ad desiccationẽ & deterfionẽ p̃tinet, nihil ita ad faciliẽ, & citã, tũ desiccationẽ, tũ deterfionẽ sinus facere p̃ot, q̃ p̃curatio, ut nõ detineat pus qđ i eo gignit: sed facile effluat. Nenio. n. nõ uidet quã egre exiccari possit & mūdus reddi locus in quo nequit pus, ut generatur, ita etiam effluere. facile autẽ in sinibus illis effluit,

effluit, qui decliues sunt, hoc est, in quibus os deorsum spectat: fundus uero superior est. unde periti in edici maxime nituntur, quando sinus non hoc modo se habet; ita parare, ut in eum modum se habeat: nempe in eo situ collocata particula, ut os ulcers deorsum uergat: si tamen ita potest sine multo incommodo collocari. quod si id ratione naturę illius particulę fieri nequeat, ferro si locus admittat, id facere nituntur: nimirum perforato sinu in ea eius parte, quę magis de cliuis sit, & ex aqua sit puri facilius exitus. Et quia quandoque neque hoc licet. obstat. n. cōpositio & natura particulę cōmeti sunt, preterea medici ligaturis & puluillis molliri expulsionē puris, nepe fascia deligātes partē vlceratā incipiētes deligationē paulo sub ipso si nu appposito puluillo, quo cōprimatur fundus sinus, & facta deligatura astrictiori ad fundū, ascendēdo uero semper aliquantū remittendo astrictionē uersus os sinus, ut superius ad exitū exprimatur & quasi elidatur pus: exireq; cogatur. Quia uero sepe neque hęc cōmenta & quasi machinamēta sunt satis, sed & uiribus medicamētorum ad abluendas detergendasque sordes, & ad exiccandum superuacuum humorem idoneis opus est: quod prefertim ad nostrum pręsens institutum spectat: ideo huc uniuersum nostrum seruiōnē conuertamus, propositis semper duobus illis scopis, qui in curandis omnibus ferē ulceribus, ut sepe diximus, spectandi sunt. nempe sordium deterfio, & superuacui humoris exiccatio. remotis. n. his quę naturę impedimento erant, cętera omnia natura sponte sua molitur. at uero cum medicamenta, quę hęc pręstitura sunt, non possint suo munere fungi: nisi fuerint inmissa in sinum, & immitti nequeunt: nisi liquida & fluida sint: docti ab ipsa re medici in curandis sinibus, id genus medicamentis, quę humida & fluentia sint, utpote quę uel per ꝑneam fistulā, uel per aliud instrumentum simile illi, quo clysteres iniici solent immitti possunt, talia uero sunt, quę aquea sunt consistentia, ut est aqua mulsā, uinum mulsū, lixiuium, aqua marina, muria, decocta multa, quę à iunioribus lotiones appellantur, aut emplastra, uel ut cum iunioribus et loquamur, ungūta, quę ^{gręcis} hoc est humida à Gręcis dicuntur, quippe, quę tenera sint, & quę aliquo aut oleo aut liquore diluta, fluere possint, prius autem de priori medicamentorū genere sermonē instituamus. cū itaq; sinus recēs ē, ex paulo anterrupto abscessu excitatus, maxime

Com. 8.

vt facile agglutinari possint. detergit enim sordes, quæ ob stare poterunt. vbi vero iam ceperit sinus esse aptus ad agglutinationē, vtilius erit vinum modo solū citra mel, modo multum iidē infusum, quippe quod accōnodatus agglutinationi sit, quam mulla: præsertim si inter absterum, vt ibi ait Gal. fuerit & dulce: mulla vero vtilior est ad sordes ichoresque abluendos & detergendos. quæ id tēperamentum habet, vt potui non sit iniucunda. consuevere autem multi ex iunioribus in colluendis his sinibus vti aqua hordeacea ad dito melle rosaceo. in vtroque enim deterfio cum exiccatione est, præter id quod etiam refrigerant, quod maxime opportunum est, quando calida adest in loco intemperatura, aut sint aliquæ inflammationis reliquæ. aliqui vero decocto iridis, aut aristolochiæ, aut vtriusque ad abluendum sinum vtuntur: Sed hæc potius idonea sunt, quando iam carnis generationi, vt repleatur sinus, vel agglutinationi opera danda est. cum ergo recens est sinus, neq; hætenus sibi aliquam comparauit malignitatem, mundus his aut similibus erit reddendus, quo reddito purgato & mundo, agendum postea medicamentis, quæ tum carnem aggenerare tum vero lœtera sinul agglutinare possit. Quod si sinus interius malignitatem conquisierit, aut putredinem, aut erosionem: Vnde etiam diuturnus euaserit fortioribus & acrioribus ad superandum elus malitiam erit opus, & quantum ad lotiones pertinet Gal. 2. lib. artis cur. ad Glaucō. præsertim laudat lixiuium, quo vtendum, tam diu esse voluit, donec tota sordes fuerit exiccata. Auicennæ vero, quem multi præterea alij sequuntur, præter lixiuium probatur, & aqua marina, & aqua aluminosa, quæ præterquam quod desiccant & detergunt, fluxiones etiam ab affecto loco repellūt. Sed si quasi putredinosum sit vlcus à quo humor cruentus & fœtidus effundatur. Actius oximel alijs omnibus præfert. At vero interdum: immo sæpius non solis lotionibus possunt mundi sinus reddi, simulque carne repleri, aut agglutinari, & tandem ad cicatricem duci: verum necessarius est præterea & aliorum medicamentorum, vel aridorum, vel in formam vnguentorum, vel emplastrorum compositorum vsus. illis autem bitariam uti solemus in id genus ulceribus curandis. Nā aut in ipsum sinum, uel fistulam iniicimus, aut linteolo paniculoue medicamentum extendentes exterius adhibemus. Priorem aut sermonē de illis instituemus, quæ interius in sinum iniicimus. hæc ergo pro vario statu & natura ulcerosi sinus uarianda sunt. Nam

si sinus

si sinus nō cōtraxit aliquā malignam naturam neque callum, neque sordem malam & crassam copiosiorēque, quam ratio eius requireret, quæ sinibus solent accidere aliquando ob uniuersum corpus male affectum, utpote quod prauis succis scateat. interdum uero ob medici imperitiā, qui non recta ratione primum tractauerit, abscessum, deinde uero & sinum uel ob mollitiē metumue agrotantis, qui non permiserit medicum opportuno tempore aperire & rescindere abscessum, neque postea congruentia medicamenta admittere & ferre noluerit: si itaque eō nōdū deuenierit, sed simplicior sit, ea illi medicamenta erunt apta quantū ad facultates pertinet, quæ idonea sunt ad modice implendum sinum carne, atq; mox agglutinandū: sed quo ad consistentiā, quæ ita fluida & inollia sint, ut aut per fistulam aut per instrumentum quod sit ex suilla uesica al ligata fistulæ, perinde, ut illud est, quo pueris clysteres solent imponi. at uero quia emplastra, uel unguenta, quorum sit tam ab antiquis quā iunioribus medicis mentio, tanquā eorū, quæ idonea sint ad carnem in ulceribus generandam, uel ad agglutinandam etiam, crassioris sunt consistentiæ; quā ut possint his instrumētis iniici in sinum; ut in hos usus uenire possint, necesse est, ut liquecant, & diluātur aliquo oleo, uel liquore alio: dū aut cōmiscētur cū his, uires remissiores retinēt, & ibecilliores, tā siccādi, quā detergēdi, unde in curandis sinuosis ulcerib. necessaria sunt lōge acriora unguenta & emplastra, quā ea quæ sarcotica, uel agglutinatoria superius fue re appellata: qualia sunt cōmūnia emplastra. quæ uiridia ab antiquis dicebātur, & quorū superius est sua ēt facta mētio. Sed ea sunt sumēda, quæ sola & nō cōmixta & oleo diluta nullo modo ferri ab egrotāte prę acrimonia possent, cuiusmodi erat emplastrū Macherionis, cuius meminit Gal. 2. de cōp. per gen. quod in pręsentia in nullo est usu, & illud ēt quod priscis tēporibus maxime celebrabatur ab omnibus ferē medicis, & Isis appellabatur. In hoc ordine etiam est quod ab Auicenna unguentū apostolorū dicitur. fuit autem posterioribus in maximo usu, & ni fallor, aliquārisper minus acre est & ualidum quam isis. parumque diuersum ab illo quod cerascos, uel crasco appellat Mesue: Sed de his paulo post magis particulatim agemus. Nostri uero iuniores medici, in sinibus curandis: præsertim uero illis, qui sordidiores & humidiores atq; ēt difficiliore sunt, utuntur eo quod ægyptiacū appellatur, de quo superius uerba fecimus: diluunt autem aliquo liquore, qui & ipse sit ea fā-

cultate præditum, quæ apta sit scopo, qui nobis in curando, vel mûdando sinu sit utilis. plerumque vero decocta conficiunt ex aristolochia, vel iride, vel centauryo, aliquando vero mûlfa, aut uino: pro ut magis expedire visum fuerit, atque infundunt in sinû, & adeo sceleriter eo vtuntur, vt eo solo non modo vlcus à sorde depurent: verû & agglutinent, & ad cicatricem perducant: maxime vero vbi vlcus plurimo humore scateat. & multa in ano vlcera hac ratione curata vidi: Sed hic vnum mihi videtur animaduersione dignum, cuius meminît Gal. 2. lib. artis cur. ad Glauco. quod interdum sinus proxime sub cute est, adeo vt sæpe sola cute, & illa admodû tenui vt similis ferè videatur trita & lacera vesti, vnde & a Græcis medicis rhacodis dicebatur. solet autem talis euadere præsertim quando abscessus non fuerit opportuno tempore per sectionem apertus, & id aut propter imperitiam medici curantis, aut timorem ipsius ægroti, qui incisionem pati non audet: Vnde postea cutis à pure contento & erodente semper magis attenuatur. & non modo in abscessu antequam aperiatur, pus erodit carnem, cui hæret: verum & in corrupto & in linum conuerso, cum pus detinetur, nec facile effluit: Vnde hac etiam ratione obstat generationi carnis & agglutinationi. Itaque agglutinatio & carnis aggeneratio in his sinibus, qui adeo tenui & lacera cuti conteguntur, per quam difficilis est. & peritum medicum requirit: eius autem curandi ratio, altera quidem promptior & facilior, breuiorq; est: nempe si forcipe aut cultello secundum longitudinem vlcis, tota ea cutis incidatur, atque ita opertum vlcus aperiatur, nâ facillime pus effluit, & vlcus accommodatis medicamentis siccari, & detergi potest, & subinde carne repleti, & ad cicatricem deduci. Commodius præterea medicamenta possunt adhiberi, quamuis malignum, & madens sit multo humore, & quidam ignito & candenti ferreo instrumento eam incisionem solent moliri. Altera autem longior & difficilior est, quàm medicus ope medicamentorum perficere nititur, & hanc docuit Gal. 2. lib. ad Glauco. Nam interdum egrotantes non præstant se ad hanc incisionem faciles, & quandoque locus nō potest nisi cū periculo ferre sectionem, vel si posset ferre, fugimus tamen ob magnam cicatricem, quæ partem illam multum deturparet: sicuti in facie has cicatrices quātum fieri potest fugimus. cum ergo in hunc modum se habet vlcus, solebat Gal. lixiuio lauare, vt purgetur sinus: deinde adhibebat ea, quæ humida essent actu secundum suam

suam consistentiam, vim tamen insignem desiccandi haberent. Nā si eis utamur ait Gal. quæ consistentiā sint sicca, tenuis illa cutis adeo resiccatur, ut similis fiat corio vel pelli tritæ: præfert autem in hac re Gal. suum emplastrum, quod diachalciteos, nostri diapalmā nuncupant, si conficiatur ex vetustissimo oleo, & mediocri sit consistentiā, quod neque durum admodum, neque ita molle sit, ut inquinaet: Præterea vero illi & mel catenus coctum probatur, ut emplastri compagem habeat, nempe ut neque durum sit, neque diffusus. Nam tanquam optimum medicamentum ab antiquis habitum est: si ad congruentem cocturam deueniat: & quia non vnicuique facile est ad eum concoctionis modum vel deducere: ideo Galenus defectum concoctionis docet corrigere super asperso pulvere tenuissimo thuris, vel myrrhe, vel aloes, vel aliquorum vel omnium nimirum, quando linteo inunctum liquidius videatur, quam ratio requireret. excutiat verò pulvis per cribrum, & semel tantum, vel ad summum iterum excutiat. Sed si maior & profundior fuerit sinus, consulit ut inter coquendum præfati pulueres in spargantur, tamen & centaurium minus, interdum & symphytuni, quandoque & erui farina addi possunt. Sed de his satis egimus: agamus præterea de medicamentis, quæ exterius apposita sinu comprehendunt, ea itaque huic officio apta esse ait Galenus, quæ præterquam quod insigniter desiccant, etiam è profundo attrahant: hæc tamen omnia citra morsum faciant. hoc tamen diligenter obseruato, ut pro diuersa ratione & conditione ipsius vlcus diuersis utamur medicamentis, atque etiam, quod tamen idem est, pro diuersis scopis, qui nobis offeruntur. Nam si vlcus purgatum mundumque redditum sit, sola agglutinatione laterum opus est perinde ut in recentibus & sanguinolentis vulneribus. Vnde & eadem usui esse poterunt medicamenta, quibus uti solemus in eiusmodi vlcibus, uel uulneribus, qualia antiquis ea erant, quæ barbara appellabantur & quæ cirrha, hoc est fusua, vel quæ fusca, phæa autem à Græcis dicebantur, de quibus Galenus sermonem in secundo & sexto de compositione medicamentorum secundum generis satis etiam copiosum habuit. & de hoc medicamentorum genere quantum uidebatur posse esse satis, nos quoque superius egimus: in hunc usum uenire posset emplastrum Gal. cuius paulo ante meminimus, quod phoenicinum ipse, uel diachalciteos appellat, & illud præterea, quod ex lythargyro & oenolio, vel

vel ex oxelæo conficitur: sin autem nimis humidum esset, exiccantioribus medicamentis agendum esset, si sordidius Isisemplastrum ex cerato quantum satis esset ad hoc, vt non morderet accommodatum esset, vel aliquod istiusmodi alterum: si callosum esset vlcus, mollientibus & digerentibus esset opus, vt esset diachylon magnū additis & his lacrimis, quas vulgo gūmas vocant: item hisopi seu mauiæ æsopi ceratum, quod à Mesue describitur. & id genus alii, quæ magis minusve digerere & mollire possent, pro maiori minoriue duritie. Nam dum initio res est, neque induruerit callus, vel diapalma posset sufficere, nam vim molliendi ex adipe suillo habet, digerendi autem & desiccandi ex chalcite. vbi vero magis obcaluit, ea medicamenta quæ duricies digerunt magis erunt opportuna. Sed in modo vsus horum hoc animaduertendum quod à Gale. moniti sumus secundo libro ad Glau. quod eiusmodi medicamenta linteis extensa & illita apponenda sunt, quæ comprehendant vniuersum sinum, vt tamē forcipæ pluribus foraminibus sint incisa ad os ipsius sinus, nempe vt pus ichoresque facilem habeant effluxum. immo & hoc consuluit Gale. quod altero & latiori medicamento vniuersus contegatur sinus præter os eius, altero uerò os quod breuius sit, & quasi par, vel paulo maius ipso ore, quod & sæpius: quotidie nimirum, vel alternis diebus mutetur, cum alterum nequaquam auferendum sit: nisi per longa interualla. Addit & tertio, quādo agglutinationi sinus damus operam, aliis medicamentis spongiā nouā madidā, vel vino vel mulso superaddendam. Sed de callofis sinibus, vel fistulis, paucula quædam dicamus.

De callofis sinibus fistulisque ac alijs vlcerebus, quæ ostracosa iuniores appellant. Cap. 14.

ET si vlcera oīa vel ratione male affecti corporis vitiosisq; humoribus referti, vel ex imperitia medici, vel ex pertinacia & inobedientia ægrotantis possint callosa fieri, & omni ex parte, hoc tñ vitiū fistulis & sinib. magis familiare est; præsertim verò labris ipso rum interius. quandoque tamen vt à Galen. quinto de simplicium medicamentorum facultate haberi potest, & exterius circum circa ipsum os. indurantur autem duplici præsertim de causa. Nempe aut ex immodica siccitate, aut ex infarctu materiæ: imprimis vero crassioris, qua repleta particula distenditur & indurescit. nam de
tertia

tertia causa, quia aliquid à frigore concrefcens induratur, mihi in præfentia meminiffe opportunum minime videtur, vt pote quoniam, nunquam, aut rariffime ea de causa indurefcunt labra vlceris. plerunque enim, ni fallor, fiunt calli in vlceribus, eodem modo quo fcirrho, quippe, qui aut ex infarcto frigido & craffo humore, aut ex calido quidem inter initia, craffiori tamen, atque mox defefufcente, digeftisq̃ tenuioribus & humidioribus partibus gignitur, ficut quando inflammatio in fcirrhum tranfit. fit tamen interdum ex importuno refrigerantium vfu, vt herifypelas in fcirrhum vertatur. Sed potius duobus prioribus modis fiunt callofa vlcera: dum humores influentes in eas partes, nec excreti uel feperati, ibi diutius retinentur: maxime uero fi craffiores fiunt, atque ibi tum à calore nativo, magis etiam ab extraneo, quo femper aliqua ex parte affecta fiunt vlcera, tum uerò ui exiccantium medicamentorum, difcusfis paulatim tenuioribus & humidioribus partibus, ibi quafi durus tumor gignitur. Horum porro callorum, ut duplex poteft effe condicio, ita duplex indicatur curationis ratio: in initio enim dum nondum exquisite induruere, fed indurefcunt, & molliiri & digeri ui medicamentorum poffunt: at ubi exacte induruerint, nequeunt hac curandi ratione uinci atteriq̃. Sed tantum manuali operatione, ut pote fi neuacula, aut cultelo abfcindantur, aut fi igne urantur, & hac ratione detrahantur, at fi uel locus non adinittat, uel ægrotus nolit uel nequeat ferre hanc operationem, medicamentis cruftas inducentibus urentibusq̃ perinde, ut ignis, inurenda fiunt: hæc medici tum cauftica, tum feptica appellant. Sed de prima curandi ratione priorem fermonem habeamus, cæterum iftius morbi ratio non eft una & fimplex, fed conftat ex complexu duorum affectuum: nempe ulceris, & calli uel duritiei: & proinde medicamenta quorum ufus ipsis curandis idoneus eft, componenda fiunt, habita femper ratione duorum fcoporum, quæ nobis duo illi affectus offerunt. callus enim requirit tum mollientia, tum digerentia, ulcus uero detergentia & deficcantia: unde tum ea quæ in ulcus induntur, tum ea quæ defuper apponuntur comprehendētia finum & ulcus, oportet mixtis faciliatibus effe prædita, ut & ficcent & detergent: fed præterea & digerant molliantq̃. uerum quia plerunque cum indurantur, labra imprimis indurefcunt, non cavitates & profundiores partes ulceris: ideo maior deterfio & deficcatio neceffaria eft medicamentis quibus fpacium ulceris repletur: maior uero mol-

licendi

liendi & digerendi facultas illis, quæ comprehendunt vniuersum affectum locum supra posita prioribus. Nam cum labra, vel loca circa ipsa, quæ ad cutim solent pertingere, solent ad uritiæ occupari, magis poterunt ea afficere externa emplastra vel cerata medicamenta: ergo vlceri imponenda mihi illa maxime opportuna videntur, quorum superius fuit habitamentio. nempe id quod isis dictum est ab antiquis, relata à Gale. quinto de compositione medicamentorum per genera præsertim confecta eo modo, quo videtur Gal. solitus conficere, itemque illud quod apostolorum appellauit Auicenna. vel alia quæ cum his rationem similem habent. Ad attenuandos tamen vlcerum callos, maiorem vim si recte velimus vniuersum que confectionem æstimare, videtur habere Auicennæ medicamentum, quod ipse apostolorum, vel veneris appellauit, quam isis. detergendi vero sordes & desiccandi, isis, quod & longè acrius est. Nam apostolorum accipit terebinthinæ, ceræ albæ, rhæsinæ, picæ singulorum drag. iij. opopanacis, æruginis singulorum drag. ij. ammoniaci drag. iij. Aristolochiæ longæ, thuris singulorum drag. vj. myrrhæ, chalban singulorum. dragm. iij. bdellii. drag. vj. lythargyri drag. xi. bdellium ex aceto dissoluitur, coquitur vero medicamentum ex libris. ij. olei æstate, tribus verò hyeme. omnia qui dem plus minusve siccant oleo excepto, & ferè etiam lythargyro. detergunt verò præcipue ærugo, deinde myrrha & Aristolochia, at terebinthina, picea, opopanax, ammoniacum, chalbanum, bdellium partim molliendi, digerendi que insignem facultatem habent: præterea verò & attrahendi ex profundo. thus autem concoquendi: plurimum ergo poterit esse vtile medicamentum callosis vlceribus. roborandi tamen & repellendi, vel nullam, vel exiguam vim retinet, cum se re astringentibus careat. isis autem in hunc modum à Gale. sententia Critonis describitur. Gutte ammoniaci, salis ammoniaci, squammæ aris, æris, usti æruginis singulorum denarios viii. aluminis rotundi denarios. vi. Aristolochiæ, thuris singulorum denarios. viii. myrrhæ, Aloes, chalban, singulorum denarios xii. ceræ denarios viii. colophonæ terebinthinæ singul. denarios vi. olei veteris, aceti singulorum heminas duas, medicamentum magnam vim habet attrahendi e profundo. Nam ammoniacum, chalbanum, terebinthina, item & colophonia præter facultatem molliendi, & concoquendi, digerendi que non parum etiam attrahunt e profundo; & omnia siccant, non minus etiam attrahunt ærugo, squamma æris & es ustum, sal

sal ammoniacum, quæ & detergendi vim obtinent insignem. aliquâ etiam habet myrrha, maiorem tamen concoquendi, tum ipsa habet, tum nec etiam thus: astringunt autem & subinde particulas roborant, fluxionesque repellunt alumen & Aloe: Epigonus verò succum marubii, quod & ipsum attrahit, & non parum detergit, & sordes, quæ calorem aliorum potest aliquantulum temperare: confecto autem hoc medicamento in sinibus curandis bifariam uti possumus: sicut duplex potest ei us esse usus. Nam & in fistulas, vel sinus iniici potest, & exterius apponi, iniicitur autem, vel linamentis, siue ut iuniores loquuntur, tentis coinunctis, aut per instrumenta paulo ante exposita eliquatus: præterea verò potest & lintheo extensus exterius apponi. Si quidem hoc modo utamur cerato immiscendum est, nam & moderatiora hæc mixtura sunt id genus acria medicamenta, quæ raro ferri possent sola & immixta, ut potest quia eroderent carnem, sit autem eius cum cerato miscella secundum eam symmetriam, quæ magis videtur medico esse opportuna. Nam quo plus istius emplastri, & minus cerati simul commisceatur, eo acrius & fortius erit medicamentum: quò verò plus cerati, & minus emplastri, mitius & minus potens euadet: unde illud laudant quod & recentia vulnera possit conglutinare, & carnem generare, & cicatricem inducere. Sed id pro varia ratione illius mixturæ. nam eo modo magis minusque siccans, magis minusque detergens & itidem astringens fit: At vero si aut infundendum est medicamentum, vel etiam illinendum linamentis, oportet ut fluxus & mollius reddatur: unde erit aliquo oleo eliquandum quod magis erit medici scopo congruens. Nam si in fistula, vel sinu aliquæ sint inflammationis reliquæ, uel principia, accommodatius erit oleum rosaceum, uel maturum, uel omphacinum: & id quatenus sit opus maiori repulsione & refrigeratione: sin autem humidior & sordidior, ut & digestionem delicationemque maiori & deterfione sit opus, oleo veteri dissoluetur. ita & maior copia ad oleum emplastri, uel minor imponenda. Vnde dicebat Gal. quod aliquando una pars emplastri componitur cum duabus cerati, uel olei, aliquando tribus, uel pluribus. quo enim sordidior erit sinus uel ulcus, eo etiam ex minori cerato dissoluendum erit. & quo purior fuerit, eo etiâ copiosiori cerato, uel oleo liquandum erit. Quando uero magis incaluerint & induruerint labra ulceris, quâ ut speremus medicamentis digerî & atteri posse duritiem, tunc uel abscessione totius illius

illius partis ferè erit agendum, qua ablata, vt vlcera recentia & cruenta erit affectus curandus, vel si id minime liceat, medicamentis quæ caustica vel septica, hoc est vrentia, vel putrefacientia dicuntur à Græcis, res est tractanda, nostri chyrurgi interdum ægyptiaco dicto vnguento vtuntur, incisus prius, vel, vt ipsi aiunt, scarificatis labiis, sicuti præcipiebat Auicen. credereim quodd & isis sine alia mixtura posset illud præstare. ad hoc officium non ineptus esset vsus illius rubri pulueris quem præcipitatum appellant, cuius auctor fuit Ioannes de Vigo: sit autem ex sublimato hydrargyro, vel, vt nunc appellamus, argento viuo. conficitur etiam medicamentum ex calce viua assumpta ex nigro sapone. aliqui etiam cõponunt medicamentum ex arsenico albo, quod sublimatum vulgo appellant. quæ oia vrunt, & crustam inurunt; quæ deinde, aut butyro, aut alio molliente & concoctorio medicamento paratur vt cadat; deinde curatio instituenda pro ratione vlcera: vt tamen cum his causticis vtimur, illis sit desuper apponendum medicamentum refrigerans, & aptum ad arcendas inflammationes. possemus autem hoc loco multa eiusmodi describere medicamenta caustica, quorum copiosissima reperitur sylua apud auctores, qui hanc materiam tractarunt: sed mihi in præsentia hæc satis sint: properamus enim ad finem tractationis vlcera: agamus in futurum de excrecente carne præsertim molli in vlcerebus.

De his quibus curanda sunt vlcera, quibus superexcrefcit caro inutilis, quem affectum Græci ὑπερφυεῖς appellant.

Cap. 15.

Quia vlcera interdum superexcrefcit caro; quem affectum *ὑπερφυεῖς*, Græci medici appellauere, esseque morbum auctæ magnitudinis Gal. 3. meth. sensit, qui sui detractionem indicat: si cum ea deficit, esse per aggenerationem augendam: quamuis deinde vtriusque officii, nempe detractionis auctæ carnis, & aggenerationis, qua caua vlcera replentur & ad æqualitatem deducuntur, vt cicatrix commodè illis obduci possit, non sit eadem ratio, quia solius naturæ, vt & superius monuimus, munus est carnem aggenerare: medici verò, vt ea amoueat, quæ naturæ possunt esse impedimento. contra vero res in carnis detractione se habet, quia ad solum medicum hoc officium pertinet, cum natura nihil ipsa in hoc possit.

possit. unde neque abre fuerit: si de instrumentis egerimus, quibus
 vi solent medici ad reprimendam & amouendam super excrescen-
 tem vlceri carnem. cum autem caro excrescat imprimis, vt Au-
 cenna testatus est sen. 4. lib. 4. quando medicus procurat, ut caro
 generetur in vlcere antequam purgatum à sorde sit vlcus, & pro-
 bè, quantum nempe satis sit, desiccatum: videtur inde sequi, quod cū
 cur fiat hyperfarcosis, sit redundans in vlcere excrementosus & su-
 peruacuus humor: & proinde caro; quæ hoc modo accrescit, inuti-
 lis & vitiosa caro est, quæ propterea neque vnius est naturæ: sed po-
 tius diuersa, pro diuersitate excrementi exuberantis: Nam aliquan-
 do superacrescens hæc caro mollis madens & flaccida est: interdū
 vero durior & quasi callosa: ideo neque eadem erit ratio eorum in-
 strumentorum, quibus & accretio reprimenda sit, & aucta detrahen-
 da, ratio verò hæc diuersa harum differentiarum à diuersitate natu-
 ræ excrementosi humoris oritur, qui ad vlcus affluit. nam si tenuis
 & quasi aqueus, copiosus autem, generatur caro mollis, &, vt eam
 Hippo. tertio libro, de articulis appellat, mucosa, quam ex affluxu
 multæ humiditatis procreari ait ibidem Gale. si autem sit consue-
 tus crassiorum humorum, vt est crassa pituita, vel melancholicus
 humor, vt potius sordidum quam ichorosum sit vlcus, caro callō-
 sa & durior ibi generatur, quò modo & calli alibi gignuntur; eua-
 porantibus nempe partibus tenuioribus. Longe facilius autem est
 carnis detractio, quæ mollis sit, quam eius, quæ callosa, sicut & il-
 lius quæ non plurima est, quam illius quæ plurimum excreuit, sed
 præterea quoniam, vt inter initia probauimus, ab usu indicantur &
 eliguntur remedia, vsus verò pendet à primis illis indicationibus;
 quæ tū à natura & magnitudine affectus depromi solent, tū à natu-
 ra particulæ: ideo sicut horū amborū multiplex est differentia: ita et
 necesse est, multiplicem esse differentiam eorum instrumentorum,
 quibus in remouenda hac inutili carne medicus utatur. quandoq;
 enim medicamentis, interdum vero ferro igneque, & quando medi-
 camentis negocium transigi posse videtur: interdum quidem acro-
 ribus & fortioribus vt necesse est: non nunquam mitioribus & fa-
 ciliioribus, atque id tum ratione magnitudinis & difficultatis mor-
 bi, tum etiam ob naturam ipsius corporis, quod aut mollius & ten-
 nerius est, aut durius: itemque quod aut acriori, aut obtusiori sit
 sensu. Et cum docuerit Hippo. ad officium medici imprimis perti-
 nere, ut citius quidem, quam fieri potest, sed suauiter & quanta

mino-

Cap. 6.

Cap. 14.

non potest molestia morbos curet, atque ut inuuet; minime vero
 nocet, in vlceribus vero curandis dolores & morsus: præter quam
 quod ægrotantes cruciant, vlcera etiam irritant & fluxionum subin
 deque inflammationum in causa sunt: & cum ad detrahendam su
 perer crescentem in vlceribus carnem, sit opus his medicamentis,
 quæ ut tertio methodi docuit Gal. vehementer siccent adeo, ut
 hac ratione proxima illis sint, quæ cicatrici obducendæ idonea sunt,
 quæque etiam vehementer detergant, & pleraque id genus medica
 menta, ut idem. 5. de comp. med. per gen. calida sint & acria & pro
 inde mordacia: recte cōsulant, qui aiunt, ut si citra morsum transigi
 hoc negotium possit, abstineamus ab illis quæ mordent. quod si
 necesse sit acribus & mordacibus uti, ita paratis utamur, ut quate
 nus fieri potest, temperetur, & moderatior reddatur acrimonia
 mordacitasque: in qua quidem re præstanda consideranda sanè erit
 medicamenti natura primum: deinde verò conferenda cum natu
 ra, tum corporis, tum etiam particulæ, quæ vlcus habet. æstimata nē
 pe duritie, vel mollitie eius, sensus acrimonia, & hebetudine. præ
 terea & aduertendum, an in vlcere aliqua adsint initia, vel reliquæ
 inflammationis, vel etiam sit aliqua suspicio eius superuenturæ. quæ
 istiusmodi medicamenta: si insignem haberent deterfionem, aut
 desiccationem, irritarent vlcus, & inflammationem auerterent: unde
 in his fortasse, qui non possunt ferre acriora medicamenta, non abs
 que ratione esset dictum in libello de theriaca ad Pisonem, posse
 Aloem exicare superer crescentem in vlceribus carnem. Sed magis
 particularim rem hanc tractemus. in vsu itaque plurimo nostris his
 temporibus & præcedentibus est alumem, quod rochæ vulgo dici
 tur, combustum: Nam dum vritur, fit minus mordax, & hoc medi
 camentum etiam mulieribus familiare est, quo nonnunquam solo,
 interdum vero ex Auic. consilio illi bolum armenam admiscet: ef
 ficax sane medicamentum, quando multa non fuerit caro, quæ su
 per accreuerit, neque callosa: in eodem ferè ordine est, & illud,
 quod vulgo alumen zuccarinum vocant: est autem medicamentū
 non simplex: sed ex multis compositum, & priori minus mordax.
 quod conficitur ex non vsto alumine trito subactoque aqua rosa
 cea, & albo oui, ex quibus acrimonia vel mordacitas aluminis non
 parum delinitur. quidam hermodactilis tritis & cum fece vini, quā
 tartarum vocant, mixtis vtuntur. utilis etiam est vsus cineris con
 chiliorum, vel eorum piscium, qui testacci sunt, vel testa claudun
 tur,

ur, vt sunt ostrea, buccinae, purpuræ, & id genus alia quando comburuntur & in cinerem, vel puluerem vertuntur. eius enim meminere antiqui ferè omnes. Quidam autem chyrurgi vt quoquo modo ægrotantes decipiant, præsertim pueros & timidæ mulieres, excerpunt ex tritis & laceris lintheis panniculis fila, easque in iuriâ, aut ex decocto al uinini macerant, moxque exiccant ad hos vsus. His fortiora sunt misy, sory, difriges, chalcitis, atramentum sutorium, sandaraca, de quibus superius fuit habitus sermo. In fortioribus etiâ sunt es ustum, squâma æris, flos æris & ærugos. Sed vt sæpius ex Gal. sententiâ monuimus, hæc ita parari possunt, vt & magis & minus acria sint. si enim vrantur, minus quidè acria sunt, non tamen minus desiccant. & si exquisitè præterea lauentur, adhuc minus acria & magis mitia redduntur: Composita quoque medicamenta, quæ ex his conficiuntur, hoc officium possunt præstare, sicut sunt viridia vnguenta, vel emplastra, vt illud quod licem appellari diximus, & damascenum, & apostolorum, & Isis, tandem & ægyptiacum. Iam enim declarauit Galenus quòd eisdem sæpissime medicamentis uti possumus ad agglutinandum vlcera & ad aggenerandam in eisdem carnem, & ad cicatricem obducendam, & tandem etiâ ad detrahendam & consumendam excrescentem in vlcibus carnem: quamuis enim diuersos medicamentorum ordines & rationes, vt superius docuimus, hæc requirant: possumus tamen medicamenta hæc ita, additis, aut detrahis illis, quorum mixtura, aut mutescit & obtunditur, eorum vis & acrimonia, aut intenditur & exacuitur, parare vt differentibus illis munieribus posine pro diuersa eorum symmetria accommodari: Vnde vt diximus, vel ipso etiâ ægyptiaco interdum carnem excrescentem reprimimus, & carne vlcera replemus, & agglutinamus & cicatricem inducimus. Quæ omnia a Gal. & 3. meth. in vniuersum: & primū de comp. med. per gen. de diachalciteos emplastro demonstrauit, & 2. de viridibus emplastris, & 4. et de lside & de alijs. præter autem hæc sunt ad hos scopps non inutilia multa medicamēta arida, tū simplicia, præsertim vero illud cuius ante meminimus, nèpe quod iuniores mercurium præcipitatum appellat, & apud omnes chyrurgos in pñsentia est in multo vsu: quodq; & ipsum si lauet mitius deditur, tū pastillorū multæ differentiæ, q̃ antiquis in frequēti erāt vsu, vt sunt Andronis, Pasionis, Polijde descripti a Gal. 3. de cōp. med. per gen. nostris autem temporibus Andronis pastilli ubique ferè

parati reperiuntur de quibus etiam superius nos sermonem habuimus, præterea vero & pastilli ex carta combusta: Interdum vero adeo excreuit caro, & illa adeo callosa & maligna, ut sit opus causticis septicisque medicamentis eam auferre: ubi multi in præsentia utuntur oleo ex atramento sutorio, quod ex viriolo vulgo appellant, aut oleo, vel aqua sulfuris: sæpe etiam ad ferrum transire & ad ignem necesse est; nempe eam rescindendo, ut de calloso etiam ulcere paulo antea diximus, aut candenti ferro inurendo. Sed quatenus ad usum horum medicamentorum, quæ mordent & exedunt pertinere potest, est id aduertendum, quod cum pleraque: immo omnia calefaciant irritentque locum: in causa interdum esse poterunt concitandi fluxiones, & accrescendi inflammationes: quapropter hoc imprimis perito & prudenti medico attinebit, ut his periculis se opponat usu eorum medicamentorum, quæ refrigerent & repellant imminentes fluxiones, sicuti si vel panniculus aliqua aqua, vel succo alicuius herbarum huic rei idonearum, prius immersus post appositos exedentes pulveres, vel alia medicamenta, desuper apponatur, comprehendens vlcus vniuersum, aqua vero, vel succi sint solani, plantaginis, polygoni, sempervivivi, herbe lichenæ, quam hepaticam vulgo appellant: Sed & oxalidis & id genus aliarum. Vel emplastrum aliquod unguentumve refrigerans. Nam, & vires diutius servabit, ad quæ usum utilia essent albi unguentum ex cerusa cõfectum, vel simplex, vel quod caphoratū appellat, iteq; diaprophlogos, ut nunc appellat, ex thucia, aut ex plumbo usto & loto. nec minus utile esset id quod ex succo solani dicitur, de quo sumus suo loco sermonem habitori; vel quodpiam aliud istius naturæ, neque præter rationem esset, si circum circa ea illinerentur, quæ à iunioribus defensiva appellantur; de quibus superius longus est habitus sermo. Reliquum autem est ut de causticis vel urentibus agamus medicamentis, quæ septica dicuntur hoc est putrefaciencia medicamenta, eum eorum usus sit interdum illis medicis necessarius, qui in ulceribus istiusmodi, fistulosisque & putridis, præterea & multis tumoribus præter naturam curandis versantur.

De compositione & usu eorum medicamentorum, quæ caustica quæque septica: hoc est urentia & putrefaciencia dicuntur; Cap. 16.

Sunt quidem proxima qualitatibus & viribus medicamenta, quæ caustica Græce, hoc est urentia, quæque sepra, vel septica, hoc est putrefaciencia dicuntur: non tamen eandem omnino naturam, & rationem

rationem habent. Nam caustica illa proprie dicuntur: quæ carnem, vel alias similes partes perinde ferè vt ignis exurunt, relicta crusta in exusta parte, illi simili, q̄ ab igne inuri solet: Vnde escharotica etiam medicamenta dicuntur: quasi crustam inducentia: escharam enim crustam ab igne excitatam Græci appellauere. quæ vt testatur Gal. nihil aliud est, quàm pars exusta carnis, quæ cōsumpto proprio & natiuo eius humore, relictis tantum terreis partibus, induruit, & quasi in carbonem, vt in combustis lignis fit, conuersa est. vt ergo ab igne, ita & ab igneis medicamentis exiccatur, immo quasi uritur, & dissipatur natiuus carnis humor & calor, quæ ab illis tãgitur, & in crustam duram conuertuntur partes crassiores & terrestriores. Vnde hæc ratione corrumpunt partes quâs tangunt, & ad interitum deducunt: constans siquidem ignea imprimis terreaque natura. Septica vero medicamenta improprie sanè dicuntur putrefacientia, quia putrefactio fit a calido cum multa humiditate, quam cum natiuus calor regere nequeat, externus corripit, & extincto, vel potius digesto natiuo calore, mixturam dissoluere nititur: atque ita per putrefactionem exstinguuntur, & intereunt mixta corpora. consequitur autem putredinem, quasi proprium eius symptoma foetor. Vnde proprie putrefaciunt, ea medicamenta, quæ calida & humida sunt. Quæ autem *erustia*, vel *erustica* a medicis Græcis quasi putrefacientia dici solent, ea calefaciunt & desiccant, cum partium tenuitate, vnde carnes & alias etiam partes quasi colliquant, & natiuum calorem corrumpunt, vt quasi cadaueris partem eas relinquunt, neque alioquin crustas inurunt: neque cum dolore id agunt: & id quia neque ita terreæ, neque ita crassæ substantia sunt, sicut caustica seu vrentia medicamenta, quæ crustas excitant. hæc enim cum dolore fixo propter substantiæ crassitudinem, ac si infixus loco esset stipes, cruciant. propterea ergo quod citra dolorē & citra crustâ colliquat & corrumpit extinguitq; partē cui inheret, sicuti & ea, quæ putrefaciunt verè proprièq; ab effectu quadâ similitudine putrefaciētia dicta sunt: Hoc tñ tēpore chyrurgi hæc cōfundunt & cauteriatâ ea quæ propriè caustica sunt, quâ illa quæ septica, vel putrefaciētia ab antiquis dicebant appellât. Sed de his magis particulatim agamus & eorū materias: plerim vero illas, quæ in maiori usu sunt, exponamus sunt autē in ordine vrentiū, vel crustas inducentiū medicamentorum ex simplicibus, mineralia ea de quibus multa sæpe facta est mentio: nempe atramentum sutorium, quod chalcantum

thum Græci vocant, chalcitis, mysi, sory, siue illa vsta sint ait Gal. 5. meth. siue citra uestionem illis vitamur. præterea vero calx vina. in his nonnulli vini & aceti fecem si crementur posuere. Imprimis vero Dioscorides, & in his eisdem æruginem esse ponendam arbitrarer. septica autem, quæ à Gal. 5. de simp. medicamentorum referuntur, sunt auripigmentum, vel ut Græci arsenicum appellant, sandaraca, quæ similis ferè generis cum arsenico est: de sandaraca autem græcorum loquimur. præterea vero & chrysocolle, sed & filicularia ex herbis Gal. dryopteris appellat, aconitum, & pithyocampe. nisi quod hoc est animaduertendum, quod sicuti nostri iuniores caustica cum septicis ubique ferè cōfundere videntur: ita & Gal. nam quamuis ea ita mutuo distinxerit ut caustica & crustam inducant, & crassiorum partium sint, & citra dolorem non vrant. Septica autem omnino neque crustam inducunt, & citra dolorem eliquant ferè caracem, & inter septica medicamenta in principe loco arsenici, vel auri pigmenti meminit 5. de fac. simp. med. 9. tamen libro illud causticæ esse facultatis ait, quæ modum & sandaracam. in horum putrefacientium ordine existimare ponendam oleum illud, quod ex atramento sutorio fieri solet, inuentum alchimistarum: item & oleum, vel aqua sulfuris: Nam ex modo quo conficiuntur, tenuitatem partium suarum acquirunt, utpote quia terre partes separantur, & aquam etiam illam acerrimam, ex qua fit sapo, & illam etiam qua vrantur, qui aurum ab argento separant, & quæcunque alia his similem habent virtutem. puluerem autem, quem præcipitatum appellant, potius in ordinem cauteriorum redigerem. Sed hoc longe maiori consideratione dignum, quod ad vsum corum pertinet, nempe quod similibus medicamentis, quæ vel caustica, vel septica appellamus, multiplici de causa medici uti solent. Nam aliquando ad aperiendos abscessus, sicuti in illis, qui incisionem & ferrum timent, aut inter dum nimirum sanguinis effusionem, timemus propter multas, magnasque venas in loco in quo incisionem moliri oportet, aut præterea ut putredo serpentium & depascentium vlcerum résistatque & passio reprimatur, & tandem superetur. aut etiam ut sanguinis eruptionem ex insigni aliqua uena, vel arteria refrenemus & intercipiamus: præsertim si profundior illa sit, ut neque medicamentis, quibus sanguinem fluentem sistere & suprimere solemus quicquam agere potuerimus, neque uinculis, neque ligaturis & fasciis

fasciis: quod imprimis contingere solet in corrosiuis vlceribus. nā aut candenti ferro, aut causticis medicamētis inurimus locum. crusta. n. quæ ex vltione inducitur, cooperculi vicem supplet, quod exitum sanguinis prohibeat, donec superēxcrelescens in vlcere caro, verum & naturale illi fiat operculum. & quia hoc; si insigne sit vlcus, breui tempore fieri nequit, quantum possunt procurant medici, vt crassior duriorque excitetur crusta, quo diutius ibi possit manere. alioquin enim si cito ante genitam carnem, quæ cooperiat & consolidet locum, cadat crusta, deterius quā prius, vt 5. methodi docuit Gal. semper res se haberet. quia cum crusta nihil aliud sit, quā illius loci exusta caro, cū illa cadit, foramē maius euadit: & proinde consuluit, vt illis causticis ad hoc munus vtamur, quæ proprie caustica & escharotica appellantur, potius quā septiciis. quæ licet carnem corumpant, duram tamen crustam non excitant. illa verò sunt imprimis huic officio comoda, quæ præter vrēdi vim, insignem etiam astringentem habent. vt atramentum sutorum vstū vel non vstum, chalcitis, mysi, sory. longe etiam magis quā calx viua, quia crusta quæ ab ea inuritur, citius cadit, quā quæ ab aliis, quæ præterea insigniter quoque astringunt. insuper & tertio neq; omnino hoc prætermittendum, quod idem Gal. videtur aduertisse 7. de simp. med. fac. vbi de cedro & eius oleo, quod cedreā anti-qui appellabant, sermonem habet. Nempe quòd medicamenta, quæ vim habent eliquandi carnem, siue ea sint vrentia proprie, siue putrefaciencia, non easdem vires habent. Nam alia maiores, alia minores, quod ipsæ cedriæ, vel cedreæ, exemplo docuit ibidem: ait enim quod vim quandam habet liquandi mollem carnem, duriores tamē particulas nequaquam: vnde cadauerum carnes à putrefactione seruat, vt pote quæ possit humorem earum vnde essent putrefaciendæ exicare. multa vero sunt septica, vel vrentia medicamenta, quæ etiam cadauerum carnes, ubi diutius illis hæserint, eliquare & putrefacere possint, vnde in his multi ordines, siue simplicia sint, siue composita, obseruari possunt. quæ observatio non erit parum utilis ad id, vt possit medicus aptare hæc medicamentatum affectibus: nempe pro ratione eorum magnitudinis vel paruitatis, cum extremis morbis extrema, vt docuit Hippo. remedia opportuna sint: tum etiam corporibus. Nam corpora molliora leuioribus & facilioribus possunt facile cedere. duriora vero & solidiora non vincuntur nisi à fortiori-

bus & acrioribus, præterea vero aliqua perspicacissimi & acerrimi sensus sunt, quæ ferre sine magna noxa & cruciatu acriora medicamenta nullo modo queunt. alia vero obtusiora sunt, vt hæc facile tollerent. Sed de hoc medicamentorum genere magis particulatim sermonem instituamus. & quia simpliciora medicamenta huc spectantia, si non omnia, saltem quæ in maiori vsu fuere singulatim paulo antea fuere exposita, & aliqua etiam factitia, quæ & si vires habuerint ab alijs pluribus, per quæ dilabuntur, vel excolata sunt, ferè inter simplicia recensuimus, quia illis quasi simplicibus in compositione vtimur. Sicut aqua prima, ex qua saponem conficiunt, eam in oleum, dum coquitur, infundendo. fit autem aqua illa ex viua calce, & cinere, vel sale, ex qua cum lapidibus rotundis & fluminibus detractis ac exquisitissime tritis vitra conficiunt; ex cinere ergo & aliqua et parte illius salis quod alchali Arabes vocant, & ex viua calce aqua desuper affusa aquam parant ex qua, ut dixi, fit sapo, quæ acerrima est, affusa enim in has materias, ab illis vniuersam eam igneam substantiam vel facultatem, quam Aristo, vt & Gal. testatur, empycema vocabat, abluens fit admodum acris, vt ferè exurat & liquefaciat carnem, quâ attingit & diu madefacit. aliqui verò quibus fortasse non est copia cineris illius herbe: vtuntur cineribus illis, quibus tinctores utuntur, ex quercu, vel cerro. nonnulli hanc aquam, quâ vulgo chirurgi capitellum vocant, adeo coquunt, vt tandem crassescat & condensetur in quandam quasi gypseam substantiam, & illa vtuntur pro ruptorio medicamento; vt illi loqui solent. tritum enim vel ex salua, vel ex modico sapone, vel melle exceptum, & inclusum calici ex cortice auellanæ, vel cera ne desinat & lædatur partes alias, apponunt loco qui inurendus est, vel rumpendus, & breui tempore imprimit, & opus suum perficit, & vailidum admodum medicamentum est. alij, cum similibus medicamentis fuerit opus, promptum statim habent hoc, accipiunt viuam calcem tritam, & cum nigro sapone commiscentes emplastrum, & ipsum acre & vailidum conficiunt. alij tantundem aut pigmenti quantum calcis & ex eodem sapone medicamentum eodem modo conficere soliti sunt. vailentissima sanè medicamenta. Sed ni fallor, fortius his omnibus & acrius est; id quod argentum sublimatum appellant alchymistarum inuentum, quod ex hydrargyro, vel ut nunc appellant, argento ui-

uo, & sale ammoniaco, dicto simul mixtis, & ex alembico sublimatis conficitur, perniciosum alioquin medicamentum, ut pote quod exedat exuratque. illud autem alijs admistis, quæ aliquantisper leniant & reprimant acrem & perniciosam uim, tum ipsius, tum aliorum causticorum, ualidorumque medicamentorum componunt. & licet uariæ fiant ex his compositiones: ego tamen quarundam mentionem faciam, quæ possint tanquam exempla modum compositionis communi quadam ratione insinuare. Hoc quidem inter ualentissima habitum à multis est, sicuti omnino efficax admodum est. accipit autem lytargyri, hæmatitis, lapidis chalcanti, quod uitriolum romanum appellant, singulorum drag. ij. argenti istius sublimati drag. ij. s. quibus simul tritis, conficiunt aridum medicamentum inspergendum loco, ubi eo sit opus, super addito alio aliquo emplastro uel unguento panniculo extenso, a quo contineatur, quodque inflammationem aut calidiorem intemperiem possit arcere. Alii medicamentum liquidum ad consistentiam aqueam conficiunt in similem modum: accipiunt sublimati istius argenti, exempli causa, dragmas ii. aluminis communis dragmas v. aquæ rosacæ, uel plâtaginis, uel alterius similis, dragmas vi. simul omnia ad medietatem coquantur. Aliqui aquam mirifice urentem & exedentem ex destillatione ad alembicum nio re alchymistarum conficiunt; cuius materia hæc est: accipiunt atramenti futorii partes duas, aluminis rochæ appellati partem unam, salis nieri partem mediam. prius tamen atramentum & alumen coniuncta in testaceum uas ad ignem calefaciunt, non tamen eatenus ut rubescant, sed quatenus digestis tenuioribus partibus ui ignis exiccantur: mox extracta in vitreum instrumentum, in quo solet fieri destillatio addito nitro iniiciunt, & appposito altero quod capellum vulgo dicunt, & subiecto eo uase quod recipiens nuncupant, oblititis tamen solito luto optime commissuris, & subiecto igne mediocri, procurant, ut destillet inde aqua, adhibita ignis ea moderatione, quam ars illa requirit. validissimum euadit medicamentum perinde ferè, ut oleum ex calchanto, uel ex sulphure. Fiunt præterea & uariæ differentiæ pastillorum, uel trociscorum, & aliquorum auctores fuere prisca Græci, ut sunt troscisci Andronis, Mesue, Passionis, quorum Galenus sæpe meminit præsertim uero, quinto de compositione medicamentorum secundum gene. ibi & eorum confectionem describit, aliquo-

rum Arabes, qui alcalicon & . . . appellantur, & ab eisdem eorū de-
scribitur confectio. Aliqui etiam a nostris recentioribus sunt in-
uenti, in quibus recensendis nolumus esse longiores & nimium
temporis conterere: sed duntaxat illis expositis, qui his tempori-
bus a multis plurimum laudantur, & in Ioannem de Vigo celebrē
hac tempestate inter chyrurgos auctorem, referuntur. Accipiunt
autem panis fermentati quatuor vncias, argenti purissimi sublima-
ti singulorum vnciam, minij semunciam. panis optime ex aqua ro-
sacea, vel cucurbitæ vel alia simili maceratur & diluitur, ac deinde
tria illa in tenuissimum puluerem redacta pani inspergantur, & si-
mul mixta subigantur, & mox fiunt pastilli, vel troisci diuersæ
magnitudinis, qui siccantur in tepido clibano, & ad vsum ser-
uentur.

*De medicamentorum ratione quæ in curandis affectibus nervo-
rum ad solutam continuitatem attinentibus in usum solent
uenire. Cap. 17.*

ME non sane præterit consueuisse iuniores præsertim qui istius
artis professores sunt, seorsim & propriis caputibus agere
de verminoso vlcere. præterea vero & de illis, quæ aliqua intem-
peratura in vlcerato loco contracta difficilem curationem habent.
nos vero, quia in maius volumen, quam voluissemus excreuit tra-
ctatio, longitudini parentes hæc omnia summatim percurremus:
quia neque etiam longior horum explanatio videtur esse necessa-
ria. nam vt à priori incipiamus, vermes non gignuntur nisi ex pu-
redine, vnde illa curatio, qua nitimur putrefactioni resistere op-
portuna etiam erit ad prohibendam vermium generationem: sicut
deinde illos genitos interimunt amara omnia, sicut aloë, succus
absinthij, marubij & tandem omnia amara. Intemperatura vero, in
quacunque parte sit, contrariis corrigenda est. Vnde fomenta,
olea, cataplasmata, emplastra, vnguentaque & cerata, quæ secundum
suas qualitates vlcerum intemperaturis erunt aduersaria, opportu-
na & vtilia erunt ad eas tollendas: Quare longe maius operæ pre-
tium nos facturos existimauerim, si statim de ratione curandi per
medicamenta eos nervorum affectus, qui in soluta continuitate
essentiam habent, sermonem in præsentia instituamus, præsertim ve-
ro quando ab externa causa & pro catartica ortum & occasionem
habent,

habent, & imprimis de illis agemus differentiis, quæ aut a diuersa figura instrumeti, aut diuerso quo inferuntur modo. nã quãdo vulnus, aut ab acuto telo & punctim infligitur, & punctura nerui dici solet, aut ab incidente, & cesim, & vulnus illud appellamus neruorũ, quãuis sit generalius vocabulum. Item quando hoc modo ceduntur nerui, aut per transversum vniuersus nervus rescinditur, aut non vniuersi sit abscissio: sed tantum secundum partem, sicut & per longitudinem, nervus quandoque inciditur. præterea uerò aut sauciatus nervus apertus & detectus est, aut pfundus & occultus. per has ergo distinctiones: si quis hæc neruorum vulnera, vel ulcera recte curaturus est, & curandi rationē & medicamentorũ naturã & vsum metiri oportet. nã punctura malum est, quod maius affert periculũ, cũ illã facilius soleant sequi dolores & conuulsiones: præsertim si altum sit vulnus: postea illi proximum est vulnus, quantũ ad discrimen pertinet, quod per transversum neruum fuit inflictum: si prorsus non fuerit recisus. sed secundũ aliquã duntaxat partē, quia cũ omnino præcisus est nervus, res fetè periculo caret, nisi quòd pars ea cui nervus inferuebat sensu, vel motu destituta remanet, nec aliam curandi rationem desiderat, quam vulnera alia recentia & cruenta: Sed cum non est totus nervus recisus, fibræ quæ recisæ non sunt ab illis quæ sectæ sunt, læduntur, utpote quæ fiunt & ipsæ inflammationis participes: illa ab incisis ad integras transeunte: propter integras autē facile accersitur neruorum distētio & conuulsio, minoris momenti vlnus est, secundũ fibrarũ longitudinem illatũ. maioris vero periculi ratio, quatenus ad rationē vulneris pertinet, ex duabus occasionibus, uel fortasse tribus pendet: primũ quidē ex dolore, qui & causa & comes plerunque inflāmationis esse solet: quique facillime in neruorũ læsionibus uel maximus solet excitari, & illud ob insignē corũ sensum, dolorē uero & inflāmationē: imo insignes noxas omnes ferè, cōuulsio sequi solet, propter maximum neruorum cum cerebro nexum & consensum. alterum uero periculum, quod in neruorum plagis impendit, ex frigore occasione habet. frigus enim ut Hipp. 3. aph. testatus est, summe neruis & spinali medullæ aduersarium est. Vnde Gal. 3. de comp. med. secundũ gen. historiam refert cuiusdam, qui cum in neruo uulnus haberet, & recta curandi ratio esset alioquin adhibita, bene usq; ad quartã diē, & citra dolorē & inflāmationem se habuit: Sed cũ ab urgēti negotio coactus domo fuisset egressus, in ære quæ frigido diu degisset,

digessit, domum rediit totum membrum vsque ad ceruicem conuulsum deferens non sine vehementi dolore. Tertium vero periculum est putrefactio, quod periculum præsertim in chordarum vulneribus, quas tendines antiqui appellabant, contingit. quæ & ipsa ad vulnera neruorum referri possunt, cum magna ex parte ex nerueis fibris contextæ sint. facile ergo putrescunt, atque vicinas partes putredine afficiunt. Sed agamus primum de vulnere punctum illo ab acuto aliquo instrumento, vt sunt acus, vel pugiones acutissimi: in his enim maximum est periculum, quod in hoc consistit, quod vbi neruus punctus profundior est, & angusta admodum est, & quasi cæca via per quam effluere aut exhalare oporteret virus, aut sanies illa tenuis quæ præcipue in faucibus neruis generari & congeri solet, illa nequit effluere. quo fit vt dum continetur aliquo tempore, diffilarique & transpirare nequit, acrior iuxta neruum male affectum mordens & pungens, dolores vehementes, & subinde inflammationem concitat. vnde summa curationis vniuersa in hoc sita est, vt arceamus inflammationem, quod nequit, nisi remotis illius causis, fieri: causa verò inflammationis est fluxio humoris ad affectum locum concitata à dolore. obstandum ergo & prohibendum, quo minus dolor fiat, & fluxio exoriat. fluxionem verò inhibemus euacuatione corporis reuulsionibusque, vnde in his, quod ad tuti ab inflammationis timore sumus, tenuis admodum victus imptimis est necessarius, & abstinentia à vino. Nam Hippo. est sententia in aphorismis, quod vbi morbus statim extremos labores habet, statim tenuissimus victus instituendus est. extremus autem labor est conuulsio quam plurimum timemus in his affectibus. Mesue vero dixit vinum per se oculis & neruis nocere. Sed & nisi aliquid magni momenti, vt sunt vires & ætas obstat, ad vacuationem pariter & reuulsionem vena erit secanda: sed & purgandum erit corpus: si vitiosis scatere humoribus videatur. nam & hæc in illis vulneribus recensenda sunt, in quibus utilis est purgatio. si Hippo. in libro de vlceribus & Gal. quarto methodi credimus. Sed hæc ita summatim percurrenda sunt, vt quæ ad primum nostrum institutum non videantur attinere, sed potius ad rationem & procuracionem vniuersi corporis. De localibus ergo & exterius adhibendis remediis agamus. cum ex ipso ulcere maxima omnium malorum occasio sit, quando eo quasi obæcato, nequit extra effluere vel effundere ichor saniesque, ex puncto neruo, incumbere imprimis oportet,

ret, ut apertum & liberum exitum & exhalationem paremus, quod & opere manuum & medicamentis erit præstandum. nam incisione cutis, ut tertio de compositione medicamentorum secundum genera & sexto. methodi docuit Gale. & aliarum etiam partium vulnus erit aperiendum dilatandumque: sectionem vero moliri ad duos angulos rectos, ne iterum facile claudatur idem docuit. Medicamentis præterea agendum erit, quæ possint ex alto saniem extrahere, & in his impræsentia instituamus, ut pote quæ primario ad hanc tractionem spectent, de eisque primum agamus in vniuersum: mox uero, & particulatim. Ea ergo medicamenta, commode hanc attractionem præstare poterunt, quæ modestam vim calefaciendi & siccandi habent, sine dolore tamen & molestia, & huic muneri accommodatissima erunt illa, quæ tenuis substantiæ sunt. hæc enim facile possunt suis tenuibus partibus se in profundum indere, atque saniem inde extrahere citra ullam molestiam, quippe quæ neque etiam mordicent: Hæc ergo est medicamentorum natura in vniuersum, quæ curandis neruorum ulceribus, præsertim vero puncturæ, quam maxime idonea sunt. Particulatim vero Galen. cui posteriores omnes subscribere, omnibus aliis medicamentis, quæ ad curandos puctos uel vulneratos neruos utilia sunt, resinam terebinthinam præfert, nam moderate calefacit & desiccet, circa morsum, & est tenuium partium, sed quia non ubique huius copia potest haberi. & ut idem Gal. sæpe testatus est, huic proxima & ferè similis est laricea, præsertim vero illa eius differentia, quæ terebinthinæ, & substantiæ ratione & colore, odoreque similis est, ita, ut promiscue penè nos altera pro altera posse uti confessus sit: ideo cum terebinthina hanc in eodem ordine ponendam censemus. Deinde vero in secundo fere loco ab eo ponitur propolis, quæ est sor-des quædam in alucaribus reperta cæxæ similis, quam quidam vulgo cæram uirginem appellant. hanc uero: si durior fuerit, pauxillo oleo molliendum esse ait. non inutiles autem præterea futuras & resinam liquidam ex figulinis, & eam quæ frictæ dicitur, & abietinam interdum & strobilinam censendum est. sed præcipue hæc durioribus corporibus magis apta erit, ut quæ calidior & siccior sit. Hoc tamen aduertendum, quod in corporibus tenerioribus, ut essent delicata corpora: præsertim puerorum, mulierum, & eunuchorum, & eorum qui umbratilem & otiosam vitam degunt. hæc satis effect. poterunt, & hoc quantum pertinet ad naturam ipsorum corporum.

ram. Quatenus ad differentias vlcis pertinet: in vulnere non ceco sed aperto & vbi nervus sit detectus nō occultus, hæc quæ nūc proposita, sine alterius acrioris & valentioris medicamenti mixtura idonea vtiliaque sola esse poterunt: verum si corpus siccius duriusque erit, aut si nervus profundior, & minime detectus, verum occultus: his aliquid erit addendum, quod valentius sit, vt facilius vis medicamenti eo perveniat, & saniem latentem in alto desiccare vel extrahere possit. solebant autem antiqui terebenthinæ, vel aliis nuper expositis immiscere aliquantulum euphorbii: præsertim vero Gal. qui profitetur vbiq; se primum fuisse inventorem auctoremque istius rationis curationis in istis vlcibus. minorem autem vel maiorem copiam immiscebat, pro ratione corporum, aut profunditatis vlcis, aut vigoris ipsius medicamenti: nam quo corpus durius & siccius est, eo copiosioris euphorbii mixtura erit opus: ita quo magis in profundiori & magis occultus erit affectus nervus, eo etiam valentius medicamentum erit magis opportunum. Nec minor medicamenti ratio consideratioque habenda. nam quāto recentius & magis novum erit euphorbium, eo vires in illo maiores erunt. dum enim inueterascit, vis eius obsolescit & elanguescit; & proinde si recens terebenthinæ immiscendum est, minus immiscere oportet, plus verò, si vetustius. verum adhuc magis particularim res est tractanda. Ait ergo Galmeth. §. non cognovisse medicamentum in his nervorum affectibus quod hoc esset præstātius, cuius ipse fuit auctor. accipit autem terebenthinæ, picis: singulorum partem vnam, ceræ vero duas. interdum autem ex altera tantū earum & cera medicamentum conficiebat: præsertim vero ex terebenthina. quamvis si interdum deesset eam habendi facultas, fricta, aut abietina, utebatur. addamus nos & lariceam, quandoque vero strobilinā, sed tantum in durioribus corporibus. hoc ergo erat illi præcipuum medicamentum, quo citra alterius mixturam vteretur, in mollioribus corporibus, vel in apertis vulneribus, & detectis nervis. in durioribus verò & profundis: præsertim in puncturis, illi addebat euphorbium: varia tamen vt diximus symmetria, pro diversis illorum ratione, quæ nuper esse considerata dicebamus. nā si recens fuisset euphorbium, & mediocriter medicamentum fuisset compositurus, & resinam liquidam haberet, illud tritum & tenui cribro excussum reliquis prius eleuatis iniiciebat, tantum autem vt duodecimam ceræ partem equaret, aut tantum plus hoc, quantum

rum videbatur esse opus validiori medicamento: tertio autem de comp. med. secundum genera Gal. hoc modo medicamentum componit ad neruorum vulnera, valde idoneum utileque, præsertim ubi vbi timeamus, ne plaga clausa & obscureata sit, accipit euphorbii recentis partem vnam, tres ceræ, duodecim olei, mollius enim & magis fluens, erit hoc medicamentum priori. unde facilius poterit fluens penetrare in intimiores vlcis partes, vel etiam angustas, & inde saniem extrahere, & propterea magis aptum puncturis, & oculis plagis. Quamuis autem hæc horum symmetria optima sit, & plerunque utilis, non est tamen ita superstitiose semper & ad amussim seruanda, ut aliquando non possit ex ratione, immo cogatur etiam medicus illam mutare, nam si secundum hanc mensuram videtur quandoque medicamentum debile, erit addendum euphorbio, poterit enim accipi pars eius vna & semis, quandoque vna & altera, quandoque etiam vtiliter tantundem euphorbii accipiemus, quantum ceræ, & ea varietas à diuersitate ipsius euphorbii, quod aut recentius, aut vetustius sit, erit petenda, vel adiuersitate vlcis, quod magis vel minus angustum & profundum, vel à diuersitate naturæ vulnerati corporis, quod durius & solidius sit, uel magis tenellum & aciori sensu præditum. Sed quoniam vniuersa ferè ratio hæc in quadam coniectura sita est, in qua nemo sanè est, qui non possit aliquando falli: ideo præterea exposui Gale. quandam quasi regulam, qua possimus facile conicere, nam recte iudicauerimus fecerimusque in commensuranda compositione istius medicamenti: nempe ex impressione in vulnus & affectu, quem obseruando percepiamus post primam administrationem medicamenti, quia si adhibito medicamento paulo post dolorem & morsum perceperit ille, qui vulnus habet: præterea vero si circum circa partes calidiores sint, atque plusquam pars sit punctura intumuerit, & in ore eius velui quædam inflammationis initia conspiciantur, hæc indicia erunt, quod medicamentum acius iusto, valentiusque fuerit, quare exoluendum est, antequam iterum apponatur. exoluetur autem, aut copiosiori oleo addito, aut accepto euphorbio vetustiori, contra vero agendum erit, si languidius visum fuerit medicamentum, quod quidem inde poterit deprehendi, quia omnia contraria visa fuerint circa vulnus illis, quæ nuper exposuimus: sicut si omnia moderate se circa vlcus habuerint, nihil erit omnino immutandum, quantum ad medicamenti robur, & facultates

cultates pertinet. vnde tres rationes diuerſas ſecundum ſymmetriã exponit Gal. quibus conſcific hoc medicamentum poteſt, robore differentes. nam illa quam nuper deſcripſimus nempe in qua ceræ ratio ad euphorbium tripla eſt, ſerè potentiffima eſt. inſimiſſima vero, quæ quincuplam cerã ad euphorbiũ accipit: quẽadmodũ me diocris erit, quæ quadruplam ceram accipiet. Hiſtamen & illud ad dendum, quod non ſemper vna, & eadem forma vel compages me dicamentorum æque facile accommodari poteſt omnibus particu lis & occaſionibus: interdum enim ſtuido & liquido medica men to, ſicut in profundioribus anguſtioribusquẽ vulneribus, magis in digemus. non nunquam craſſiori & tenaciori vt craſſitudinem em plaſtri, vel, vt nunc aiunt, vnguenti habeat. Quare vt nuper expoſi ta ratio apta erit ad componendum medicamentum molle & dif fluens: ita ſi pari menſura erunt accepta oleum & cera, euadet me dicamentum, quod craſſioris emplaſtri, vel vnguenti compagem habeat: ſicut ſi tantundem terebinthinæ, quantum ceræ addideris, aut quando illa deſit, friſtam colophoniam eius loco acceperis, fiet medicamentum tenaciter cuti hærens, quod non facile inde auelli poſſit. Non eſt autem putandum artem medicam ita angu ſtis aſſectari ſiribus, vt ſi medicus in locis degat, vbi aut terebenthina, aut euphorbium deſint, non poſſint medici illis opem ferre, qui vulnus vel puncturam in neruis acceperint: immo quantum ad terebenthinam pertinet diximus iam, quod & aliæ reſinæ ſunt, quæ in locum terebenthinæ ſuffici poſſunt. Nam in puncturis & profun dioribus neruorum vlceribus terebenthina & cera quibus in com ponendis medicamentis vtuntur, magis vtuntur, ſicuti ibidem te ſtatur Gale. tanquam apta materia ad id officium vt medicamenta craſſitudinem & compagem emplaſtri, vel vnguenti habeant, quã vt ipſa poſſint aliquid alioquin vtilitatis curationi præſtare, quod ſi alicuius momenti. Sed & ſi euphorbio careamus, quod in prædi ctis medicamentis principem locum habet, multa præterea alia do cet Gal. quæ vbiq; ſerè reperiri poſſunt, & ſimilem, quatenus ad præſens negotium attinet euphorbio vim habent. nam tantundem ſerè faceret ſtercus columbinum rheſinis, vel aliis medicamentis immixtum, & innumera ſerè alia. quæcunque enim tenui conſtãt ſubſtantia, nullamquẽ aſtriſtionem guſtui repræſentant, vt ex her bis & radicibus, quæ ſaporis ſunt amari, & quæ acris quoque; mo do non immodice acres ſint & aſtriſtionis ſint expertes, quales ſunt

sunt dictamnium, amaracus, marum, polium, argemone, chamepythis, centaurium, utriusque aristolochiæ radix, dracontiique & præterea cucumeris agrestis, bryoniæ, iridis, acori, meu, assari, phugentianæ, & id genus multa alia. hæc igitur diligenter, trita & tenuissimo cribro excussa & quasi in polinem comodo redacta, quo arida colliria confici solent, aliquo cerato excipienda sunt, accepto eo istorum pondere, quod euphorbiæ accipiendum superius diximus. & cum fuerit hoc etiam paulo ante expositum, quod diuersitas in euphorbiæ viribus non parua est ratione temporis. nam si recens est, quod non exccsserit secundum annum fortius & acrius est, imbecillius vero, si trium annorum fuerit, atque ita subinde: ideo cū horum etiam enumeratorum simplicium, non eadem sit vis: quæ gustui dum manduntur manifestum calorem representant, qualē dictamnium, meu, acoris, & id genus alia, erunt in mensura conferenda cum bimulo euphorbio: quæ uero potius amaritudinem cū trimulo euphorbio, talia sunt aristolochiæ, iris, dracontii, gentianæq; radices, centaurium & alia similia; Nec hæc modo hūc in usum venire posse ait Gal. sed & multa alia. sicut erui farina ex lixiuiō, præterea & propolis, aut per se, aut cum fermento: atque etiam fermentum, quod etiam quo vetustius fuerit, erit etiam melius, sed & idē cum succo tithimali, farinæ quoque lolii, vel fabarum, vel lupinorum ex oleo veteri, vel etiam ex lixiuiō: exceptæ præferam vero durioribus corporibus, ut rusticorum sunt, hæc magis accommodari possunt. sed quatenus ad horum medicamentorum usum pertinet, quædam, ut idem Gal. monuit, sunt maxime aduertenda, & primū quidem, quod medicamenta, quibus videntur medici in his nervorum affectibus curandis, omnia sunt calida imponenda & administranda: non frigida ullo pacto. Nam ut pronuntiauit Hippocr. frigidum vulneribus mordax: præsertim vero inimicum esse nervis idem. 5. aph. ait, neque etiam tepida, tepidum enim laxat & ad putrefactionem facit. præterea vero in vlceribus nervorum præmittendus est usus aquæ, cauendumque ne illa vulnus attingat: unde Gal. vel oleo potius, vel spā voluit nervorum vulnera detergi. Hæc est ratio curandi solutam in nervis continuitatem, cuius inventor & expositor fuit Gal. Nisi quod ut res absolutior habetur istis, quæ hæcenus à nobis fuisse explanata hæc etiam ex Galeni doctrina sunt addenda, nempe quod interdum soluitur nervi continuitas non solum per incisionem & puncturam, verum & cum contusione

Aph. 19.

tusione: quod ille duobus modis fieri posse autumat. Nam quandoque contunditur vna cum neruo & cuius atque dilaceratur vlceraturue, quod frequentius accidere solet. nonnunquam tamen contusio soli neruo accidit, nequaquam contusa cute: quamquam id raro fieri soleat, & semel tantum accidisse animaduertit Gal. si cū neruo vnà & cutis fuerit contusa, curatio per exiccantia medicamenta perinde erit instituenda ait ipse 6. meth. ac in neruorum vulneribus, vt tamen ea sint, quæ possint contrahere constringereque partes disiunctas. eiusmodi vero est, cataplasma, quod ex farina fabarum & oximellite paratur, cui esse adiiciendum aliquid picis liquidæ ait, quando præterea & color fuerit infestus. & quia pro ratione corporum magis vel minus desiccantibus medicamentis est opus: ideo si sicciori sit opus, his & farina crui addenda erit & iridis illyricæ, vel myricis tritæ puluis. Dioscorides verò in contusis neruis dixit vtile esse, si ex cinere sarmentorum adipeque & oleo fiat cataplasma. At verò si neruus fuerit contusus nullo cuti illato vlcere, calido aliquo oleo, quod vim digerentem habeat, fouendus erit locus. Multa autem prætermisimus quæ in vulneribus neruorum vtiliter in vsum venire posse tradidit Gal. 6. meth. & tertio de compositione medicamentorum secundum genera, vt sunt sagapenum, opopanax, præsertim in durioribus, succusque cyrenaicus: si cum oleo & terebenthina componantur: his enim pro euphorbio vtili-
 cet. Item & sulphur ignem non expertum nec lapidosum ex oleo tritum ad sordium crassitudinem, in minus duris corporibus sicut in durioribus ad crassitudinem mellis. & alia multa: sed nimis longum esset omnia recensere, quare quibusdam præterea relatis, quæ iuniorum nostrorum aut inuenta, aut illis in nullo sunt vsu, huic tractationi finem imponemus. in neruorum itaque vlceribus in vsu frequenti est vnguentum basilicon magnum descriptum à Mesue. de quo in superioribus capitibus egimus. eo autem vtuntur excepto vel extenso panniculo, vel linteo, & aliis, quæ in vlcus instillantur super addito. Nam vim & ipsum habet attrahendi desiccandi que, præterea & concoquendi, aliquam præterea detergendi. His etiam præteritis temporibus erat in frequentissimo vsu empiricis præsertim nostris, quod & plurimum admirabantur tanquam preciosum secretum oleum, quod ipsi zanetum, vel zanetinum appellabant, eo que in neruorum vulneribus: præcipue vbi videbatur illis imminere conuulsionis periculum. & sanè non ignobile medicamentum

camentum censendum est: si compositionem velimus recte extimare. conficitur autem in hunc modum. Accipiunt succi apii, ro-
ris marini singulorum drag. i. saluiz, rutę, lumbricorū terrestrium
singul. drag. ii. mille folii, plantaginis, herbę, quam Laurentiam
vulgo appellant, calendulę in pręsentia dictę singulorum drag.
iii. Verbasci, lanceolę quę est alia plantaginis species, quę angustio-
ra folia habet, ciclamini sing. drag. ii. abinthii drag. i. succos harū
herbarum additis olei veteris libris duabus, terebenthinę, resinę
abietinę singulorum libram. j. chalbanı drag. ii. resinę pini lib. ii. si
mul vero omnia bulliant ad succorum consumptionem, & illis pos-
tea tepesactis addendę sunt æruginis optime tritę vncię duę, ac ita
seruandum medicamentum, quod postea vulneribus instillandum
calidum atque panniculo exceptum illis apponendum. Medicamen-
tum vero multiplices vires habet. Nā ex multis conficitur, quę ca-
lesfaciunt, & e profundo attrahere possunt, utpote quę tenuium par-
tiū sint, ut saluia, ros marinus, apium, ruta, herba quam Laurentiam
dicunt, abinthium, omnia enim hęc attenuandi & digerendi facul-
tatem habent, & his etiam magis cyclamen. de oleo autem veteri
resinaque terebenthina: siue veram intelligamus terebenthinā, seu
lariceam, & abietinā, piniq;ue, non est cur aliquid in pręsentia dica-
mus, cum satis superq;ue de illis egerimus: Sed aliqua in his sunt,
quę & influentes humores repellere & inflammationes arcere pos-
sint, faciuntq;ue ad vlcerum consolidationem, ut vtraque plan-
tago. Lumbrici vero terrestres adeo viles nervis vulneratis esse
creduntur, ut mirifice possint, quemadmodum & Gal. de simpl. me-
dicamentorum facul. tradidit, eos incisos conglutinare & conso-
lidare. Vnde & ex eis confectis oleis: nam & camemelinum & ro-
faceum oleum ex lumbricibus passim conficere solent, & illis exic-
catis & in pulverem tritis sepiissime in his nervorum affectibus
vuntur medici vulneribus insperso pulvere. Sed cuiuspiam fortasse
non videtur rationi consentaneum, quod his medicamentis, in qui-
bus omnino sit cauendus omnis morsus, ærugo sit immiscenda,
quę est acerrimum & mordacissimum medicamentum: Sed si rem
velimus recte extimare, & cōsiderare quanta ærugō, quanto medi-
camēto, quod vim insignē habet reprimendi & demulcendi acrimo-
niā & morsum æruginis habet: Siq;ue pręterea & id cōsiderauit, qđ
à nobis ex Galeni sententia, vbi de viridibus emplastris agamus ex-
positū fuit, de miscēda ærugine cū cerato, neque à ratione alienum

Victoris Trincauellij

illi videbitur , quòd ergo huic medicamento fuerit iniecta . Nam ita commoderata, non mordet . Sed desiccat detergitque citra nullum morsum , & ex alto attrahit . & de his quidem satis diximus .

Quibus medicamentis sistendus sit sanguis immodice à vulncribus , vel ulceribus profluens. Cap. 18.

Post rationes illis quæ ad curationem vlcera, vel vulnerum pertinebant non primario & per se quatenus vlcera vel vulnera sunt, sed quatenus aliquid aliud illis præterea cōiunctū erat, qđ illis erat ipedimēto, quo minus possent admittere curationē , siue id symptoma aliquod esset , quod causæ rationē subinduxerit , siue causa, siue alius affectus illis adiunctus, & quæcunque tandem essent, quæ aliquam vim haberent propriam indicandi . Iure merito etiam agendum videtur de sanguinis profluentis immodice a vulncribus vel vlceribus, represiones: nimirum quibus medicamentis sisti possit. Nam quamuis res hæc potius symptoma cēscenda sit, symptoma autem vt symptoma est , nullam vim indicandi habeat, symptomata tamen multa sunt , quæ ita excrescunt , vt ferè symptomata esse desinant, & causæ subinduant rationem , & proinde etiam sibi vim aliquam indicandi vendicant, atque interdum adeo validam, vt superet & obscuret aliorum omnium indicationes quæ admodum se habet interdum dolor & in his est & sanguinis profluuium. Nam præter id quod curationem præcipue affectionis prohibet, in causa etiam esse potest multorum & maximorum incommodorum, vt sunt virium omnium debilitas & dissolutio, conuulsiones, singultus, aqua intercutem, & alia id genus multa, vnde tū ratione impediementi quod curandæ solutæ continuitati affert, & periculi, tum vero ratione difficultatis suæ curationis plurimum negotiū facessere solet medicis, & longe etiam maius ipsis ægrota tibus. At vero quia institutū nostrum in his libris omnibus , quæcunque tractamus , illa ex methodo definire & eadem est methodus qua componimus, quæque dum curamus hos affectus medicamentis vtimur, necesse est vt prius methodum exponamus , quam vulnerarij medici sequentes immodicam hanc sanguinis profusionē oppugnant, ac supprimunt. Verum quia methodi fundamēta prima sunt indicationes, quæ à natura rei indicātis depromēdæ sunt: ideo

ideo de hoc sanguinis profluuiò aliquis sermo habendus est, atq;
de eius causis. his enim perceptis facile nobis methodum hanc
configemus. sanguis itaque si copiosus a parte quapiam profluat,
exire non potest, nisi ex vasis, nimirum ex arterijs, aut venis, cum
secundum naturam sanguinis nullibi contineatur, nisi in his vasis,
aut in corde. à venis autem, & arterijs effluere confertim nequit,
nisi illis aliqua ratione apertis. aperiuntur uero aliquando eorum
oscula, & fines, ab ipsa natura sponte sua se exonerante, dum uel
a multitudine sanguinis aggrauatur, uel a praua aliqua eius qua-
litate irritatur: aut ex aliquo calore immodico laxante, & rarefa-
ciente: ut prætermittam nunc, quod interdum accidat quòd san-
guinis effluxio ex nimia accidat uenarum imbecillitate nequaquã
illum continere ualentium, sed exire permittentium, quæ imbe-
cillitas sit exorta ex aliqua intemperie in illis contracta, uel ex ni-
mia dissolutione spiritus, & natui caloris, cum rarissime hoc in uul-
neribus, ac ulceribus accidat. quamuis non sit etiam negandum
quin possit non nunquam accidere. Interdum autem potest san-
guis profluere ruptis uasis, hoc est soluta in illis unitate, quod fie-
ri potest, recisis uenis, uel arterijs in aliqua particula, uel illis di-
sruptis ex aliqua uiolenta distentione, uel distortionem, ut inter-
dum incasus è sublimi loco ex saltu uiolento, ut quandoque in tho-
racem contingere solet in clamoribus summa ui concitatis, in suffla-
tionibus uiolentis, quod aliquo confractione uase sanguis excreatur,
& hoc etiam uenis nonnunquam euenit, quæ sunt in membranis
cerebri & illis quæ ad nares pertingunt. aliquando uero ex erosio-
ne, quæ fit uel ab acris & mordacibus excrementis, quæ uel in ul-
cere in dies ex proprio illius particulæ alimento corrupto gigni-
tur propter intemperiem aliquam, qua pars illa affecta est, ut in
erodentibus ulceribus fieri solet, aut ex acris aliqua fluxione, quæ
aliunde eo confluerit, ut ab acris distillatione erosio uenis narium,
aut oris & faucium, interdum pulmonum & thoracis, erodun-
tur etiam ab acris & mordaci humore intestina, nonnunquam &
uentriculus, possunt & ad exulceratas partes mordaces & acres suc-
ci cõfluere, & facta ad uasa usq; abrasione, & erosione, tãdẽque cor-
rosio illis in causa esse eruptionis sanguinis. Sed istis & illud
addamus, quòd cum fieri fere non possit confertim largum proflu-
uium sanguinis ex apertis quoquomodo uenis, nisi ab alijs alia-
rum partium cum quibus continent es sunt uenæ, quæ apertæ

ad has confluant . Vnde hoc modo refertur ratio profluvii immodici sanguinis vndecunque fiat , & quamvis princeps causa fit aperta vena , nam ab alijs ad illam confluit sanguis quadam confectione , & , vt ita dicam , ratione vacui . attamen interdum in loco affecto ex quo effluit sanguis , præterea est aliquis aliarum caufarum conuentus . Vnde concitatur ad eam partem maior fluxio irritata nempe affecta parte , sicuti si sit calor aliquis alienus ab illius natura sanguinem eò attrahens , itidemque & dolor & illius partis inflammatio , quæ vtroque nomine sanguinem promonet , sed & situs particulæ à quo sanguis profluit non parum ad hoc facit : facilius enim & promptius atque magis confertim effluit sanguis , si declivis sit , hoc est , deorsum vergat pars affecta , quàm si acclivis , quia facilius sanguis innata gravitate descendit , quàm ascendat . Hæc quidem exposui quàm potui brevius , vt pote quæ ad rationem compositionis , & usus medicamentorum non parum sint necessaria : Si id ex methodo sit agendum , quæ ab indicationibus summi habet fundamentum . Quamvis autem vniuersum methodum exposuerimus , qua omnes causæ profluvii sanguinis possunt inveniri : non tamen illæ omnes ad institutum nostrum attinere censendum est . Nam de his tantum in hoc libro sermonem habere institui mus , quæ generali vulnere , vel vlcere rationi accidentia , priuatam aliquam rationem indicandi retinent . nam de illis quæ certum aliquem locum , vel definitam aliquam particulam respiciunt , agemus in sequenti libro : Sicuti de fluore sanguinis e naribus , vel ex ore , vel de mixtu sanguinis , vel de immodico profluvio sanguinis ex utero , vel ex venis sedis . Nam in præsentia vt statim ab initio monuimus , tractatio fuit instituta de usu & compositione medicamentorum secundum genera , quæ apta sunt curandis istiusmodi vulneribus , & vlcerebus , quæ occupant communia & simplicia membra : plerumque autem in his fiunt sanguinis eruptiones copiosæ , vel recisæ , vel erosæ venis quamvis interdum & vasa aperiri possunt , ex confluxu multi sanguinis ad illam partem , ob id , quia plenum sit admodum corpus , & inde fiat fluxio ad affectam partem , tamquam ad infirmiore locum quem cum aggrauet , cumque illi sit molestus , facultas expultrix ad quam pertinet expellere ea quæ particulis corporis molesta sunt impellit ad eam par-

tem spiritus conferim, ut facto impetu vasa aperiantur, & grauis il-
 li loco sanguis effluat: vnde septimo aph. dixit Hip. quod à pulsu in
 ulceribus expectandum est sanguinis profluuium, vehementius,
 enim pulsant arteriæ spiritu & sanguine repletæ, atque ea pro-
 pter magis calefactæ, quamuis hoc ut ibidem exposuit Gale-
 præsertim fiat si inflammetur locus, aut ob id quia attrahitur ra-
 tione caloris, aut doloris excitati in ea parte. neque putamus ne-
 gandum esse quin & id fieri possit ex insigni illius particulæ im-
 becillitate, qua venæ nequeant sanguinem retinere. verum
 quia imbecillitas hæc, ut diximus, aut ex intemperie aliqua pen-
 det, aut ex laxitate & dissolutione spirituum & natui coloris:
 ideo de medicamentis eligendis atque de eorum usu non aga-
 mus nisi in vniuersum, quia horum multa ex illis percipi poterūt,
 quæ magis particulatim superius fuere explicata. Nam nemo esse
 videtur, qui non nouerit, quod si calida fuerit intemperies illa, indi-
 cari, occurrendum esse refrigerantibus medicamentis, & itidem vi-
 tius ratione commoda ergo erunt cataplasma refrigerantia, itidē
 etiam embrochæ seu perfusiones, inunctiones, emplastra, cerata, &
 id genus omnia alia. Contra vero, si frigida fuerit intemperatura,
 quæ illam imbecillitatem attulerit, & quia mutatio intemperamen-
 ti non potest ita cito fieri, & interim sanguis effluit, ideo ut citius
 ille reprimatur sunt illis simul intermiscenda astringentia: ita etiam
 si fuerit virium infirmitas ex laxitate & resolutione spirituum, & na-
 tui caloris, opportunum quidem erit corpus reficere: modeste ta-
 men, & astringentibus robur illis partibus addere. Quæ uero ple-
 runque & ex propria ferè ulcerum, uel uulnere ratione solent ac-
 cidere sanguinis profluvia, ea sunt, aut uasis resectis, uel ex re con-
 tundente dilaceratis, aut illis erosis, quod propemodum in ulceri-
 bus erodentibus solummodo fieri consuevit. Quamuis ut diximus,
 possit & fomentum aliquod habere, ex dolore, uel ex calore, & cū
 Galenus quarto libro methodi medendi in uniuersum hanc pro-
 tulerit sententiam, quod, quotiescunque in aliquo morbo
 præsens est causa, quæ fouet, oportet prius, inde illam re-
 mouere: ergo siue dolor sit, siue calor, siue inflammatio,
 siue situs decliuis, de quibus nolumus in præsentia uerba
 facere: quia hæc non uidentur, proxime spectare scopum in
 hoc capite propositum, illis primum consulendum erit. Ac-
 cedamus ergo ad ea quæ nostro instituto in præsentia ma-

gis attinent. Cum itaque duæ uideantur esse causæ, ut nuper meminimus, fluxus sanguinis ex ulceratis, vel vulneratis particulis præcipue si multus fuerit fluxus ille, nempe apertio vasorum unde sanguis effluit, & confluxus sanguinis confertim ad locum affectum: utæque hæ causæ propriam priuatamque indicationem habent. Sed prius de confluxu loquemur. Porro indicatio, quæ inde petenda est, nobis statim ostendit, intercipiendam esse eiusmodi fluxionem: quia uero duplex est illam intercipiendi modus, vel ratio: ideo isthæc indicatio duos nobis scopos spectandos offert, duobus namque modis id quod indicatur, fieri potest, nempe ut sanguis repellatur à loco in quem confluere capit atque ut alio instrumentis medicis attrahatur, & quia in aliâ partem attractio vim habet maiorem: immo tantam, ut parum admodum prius ille possit: præsertim si aliqua fuerit corporis plenitudo, aut magnus confluentis succi impetus, nisi hic alter præcedat: ideo de hoc priorem sermonem instituimus, nisi quod fortasse operæ premium erit, ut pauca quædam uerba dicamus de ratione usus eorum remedium, quæ accommodari solent his duobus scopis, utpote quoniam sit adeo diuersus, ut ferè aduersarias rationes habeat. nã repulsio quidem fit à loco affecto, & ea quæ hac ratione administrantur, oportet ut vim habeant repellendi à loco affecto succos ad illum ingruentes, & proinde, aut affectæ parti, aut circum circa sunt apponenda. Contra uero in attractione ad locum conuertitur motus defluentis humoris, in quo sunt illa quæ attrahunt: Unde is motus reuulsio ab antiquis medicis dicta est, & propterea reuellentia remedia accommodatum locum habent in remotioribus particulis, vel si in vicinis, non tamen in particula affecta, neque in illa quæ affectæ proxime adiacent. eiusmodi uero attractio, quæ alioquin ad vicinum locum fieri solet, deriuatio dici solet. Sed his expositis, horum quæ hoc officio fungi solent remedium rationem exponamus. huiusmodi ergo attractio, quæ reuulsio à medicis, vel deriuatio solet appellari, vel vacuatione fieri potest, vel citra vacuationem, quæ saltem sit sensibus conspicua. Cum vacuatione fit reuulsio per sectam venam, aut per aliam rationem, qua sanguis detrahi solet, ut per cucurbitulas cum cutis præcisione, vel per irudines: his enim instrumentis detracto sanguine, & subinde inanitis partibus in quibus hæc molimur conuerteretur motus & fluxio in illam partem in qua sanguis detrahitur, & hoc

hoc pacto reuellit ab ulcerata parte. de ratione autem istius reuulsionis est, ut procul fiat & in contrariam partem. fit etiam per euacuationem reuulsio vsu purgantium medicamentorum, tum per superiora, ut per vomitum, tum per inferiorem aluum, uel deuoratis medicamentis purgantibus, uel per clysteres, uel glandes injectis: Sed de his particulatim hoc loco non est habendus sermo, cum alibi hæc sint distinctius tractata, hic enim rerum connexionem & consecutionem, hæc à nobis dicta sunt, quibus tamen si & hoc addamus, non erit ab re. Nempe, quod in supprimendo sanguinis profluuii, longe aptior & tutior efficaciorque est uacuatio sanguine detracto, quam quæ per uacuantia medicamenta fieri solet. Reuulsio uero, quæ fit citra conspicuam uacuationem, tum & ipsa manuali operatione fieri potest, tum uero per medicamenta. opera manuum fit reuulsio frictionibus, dum enim fricantur partes remotiores & fiat ualida frictio, duplici nomine fit reuulsio. Nam per frictiones mouetur sanguis & exprimitur uersus eas partes ad quas ducitur in fricando manus: præterea uero locus etiam qui fricatur calefit, & per calorem attrahit ad se aliò confluentes humores. Sed & per cucurbitulas. nam & ille citra etiam præcisionem cutis attrahunt ratione doloris concitati, & proinde si deuinciantur partes remotiores & oppositæ, fit reuulsio. medicamenta etiam, ut cataplasmata, perfusiones, & quæ rubificancia dicuntur, uel Græce sinapismi, uescicantia, & huiusmodi reliqua, quæ calefaciunt, quemadmodum balneæ aquæ calidioris administratæ remotioribus partibus, reuellendi uim habent. pro ratione autem urgentis rei, & impetus fluentis sanguinis, ea eligenda sunt instrumenta ad hoc officium, quæ ualentiora aut imbecilliora sunt. Venæ enim sectio alijs uim maiorem habet, deinde detractio sanguinis per cucurbitulas, aut hirudines. Vomitus uero, aut purgatio per medicamenta, non ita sunt opportuna ad sistendum sanguinis profluuium, nisi interdum sit in causa tenuitas & acrimonia sanguinis, ubi purgatio biliosorum, calidorum, & tenuium humorum mixtorum cum sanguine conferre potest. Nam per purgationem eductis partibus, quæ calidiores & tenuiores sunt, & subinde magis fluxioni aptum sanguinem reddentes, sed & motus excitatus humorum uel medicamenti communi quadam uacuationis ratione reuellit. Quantum uero ad alium scopum pertinet, repellendi ni-

mirum ab affecto loco confluentem in illum sanguinem, illa eadem remedia sunt opportuna: quibus ad arcendas inflammationes uti solemus, nempe refrigerantibus, & astringentibus, de quibus suo loco erit instituendus sermo: & ideo hoc loco in illis exponendis tempus non conteremus, nisi quod hoc non prætermittendum videtur, quod hæc eadem videntur, & vim habere proxime & sua ferè ratione obturandi ora vasorum per quæ sanguis effluit, tum quia astringunt, densant, tum vero quia horum ope sanguinis qui in extremis partibus reperitur facile concrefcit, & grumescit, sed de his satis quantum ad nostrum institutum pertinet. neque enim hæc quæ cum multis alijs communia sunt: quæ alibi, aut exposita, aut exponenda sunt, particulatim hoc loco sunt explicanda. hic autem à nobis in uniuersum proposita sunt, ductis, ut diximus à magna connectione & consecutione, quæ inter eas sunt, & hæc de quibus sumus acturi. Altera causa: immo prior & princeps à qua pendet sanguinis profusum, est apertio vasorum, quæ facta est, aut per eorum incisionem, aut per dilacerationem, aut per corrosionem, & hæc quamuis particulatim à diuersis causis sit facta, cum tamen vnâ communem rationem habeat, quæ est apertio: vnâ etiam habet communem indicationem: nimirum claudenda esse ora apertorum vasorum, si sit suppressendus sanguis. quæ tamen conclusio & ipsa facienda est per varios modos, diuersitas vero claudendi accipitur à diuersa ratione vulneris, vel vlcis: quatenus ad eorum magnitudinem & profunditatem pertinet, vel à modo quo apertæ snerentur, aut arteriæ. res autem hæc facilius percipi poterit, si particulatim tractetur. clauduntur ergo primum aperta vasa per coniunctionem mutuam laterum, vel ut recentiores dicunt labiorum vulneris, vel vlcis. adducuntur enim impellentibus manibus, donec mutuo iungantur & hæreant. ex mutuo nanque occurſu & coitu clauduntur aperta vasa, donec vulnere consolidato omnis affectus tollatur, deinde deligatura est opus, utpote, quæ & ipsa paulatim astringendo & impellendo facit ad adducenda latera. sæpe etiam eorum confusione egemus, qua illa vnita seruentur. Verum his utimur, quando non admodum vulnus, vel vlcus fuerit altum. Nam in profundis ea neque adduci manibus, neque deligatura possunt latera in parte profundiori. & proinde ad alios modos

modos accedendum est. Hi vero sunt, ut obturentur vasorum oris aliquo operculo illis appetito. opercula autem quæ in vulneribus procuranda sunt, aut ab ipso ulcerato, vel vulnerato loco petenda sunt. nam ut quinto methodi docuit Galenus, aliquando aliqua caruncula prominens in vulnere reperitur, quam procuramus ut adducatur, vel impellatur, ita ut ab ea contextum os claudatur, in aliquibus autem vulneribus vel ulceribus ipsa cutis nobis potest hoc officium præstare; non nunquam etiam operculum hoc a fluente sanguine petendum est. ut enim paulo ante diximus, cruori refrigerantium, & astringentium medicamentorum vulnere impositorum crassescit & densatur in grumum, qui hærens in oris vasis, officio operculi fungitur, aut operculum hoc non à sanguine petendum est: Sed vniuersa ferè eius ratio in vi medicamentorum sita est. horum autem diuersus modus est parandi eiusmodi operculum. Sicuti diuersa etiam est eorum natura. Nam hæc aut emplastica sunt, quæ crassæ viscidæque sunt materiæ, vel substantiæ, & dum locis vnde sanguis effluit apponuntur illis lentore suo tenaciter hærentes: præsertim vero oris vasorum, eis obturatis, prohibent, quo minus possit sanguis effluere. alia vero sunt, quæ vrentem vim habent, Græcè vero caustica medicamenta vel cauteria dicuntur, quamvis aliquando, ut ubi de putridis & erodentibus ulceribus sermo habitus est, diximus sæpe igne, uel candenti & ignito ferro fiat hæc iniunctio. ab his autem medicamentis, uel instrumentis sit vasis operculum, non ex se, ut à prioribus, hoc est, non quòd ex ipsis fiat operculum ori vasis. Sed operculum sit ex carne exusta. dum enim uritur caro, uel partes, quæcunque uruntur, exusta carne fit crusta, quæ operit, & hac ratione claudit, & interceptit exitum sanguinis donec in eo loco manet, & inde non decidit. nam necesse est, ut tandem subcrecente pure aut aliqua humiditate cadat: Expositis autem modis quibus sanguis restringi potest, eos ad utilem usum referamus, tum secundum se consideratos, tum vero mutuo inter se collatos. postremus itaque in alijs omnibus magis fallax est. nam nisi cito caro subcreseat, decidente crusta, iterum sanguis rumpit, ut repressio sit postea difficilior, quia cum crusta fiat exusta particula vulnerata, necesse est, ut carenus magis petens fiat cavitās ulcers. Sæpe autem nequit ita cito caro regenerari. Sicubi vero uidetur ap-
tius atque ferè necessarius is modus, in ulceribus, quæ putrida
aut

Cap. 3.

ad 1. a
2. 2. a

interodentia sunt, vtilis videtur: Nam exustio siue medicamentis fiat, siue igne vel ignito instrumento, præter id, quod indurata crusta intercipit profluuium sanguinis, consumpto etiam, atque resicato vitioso humore, qui rosionis, aut putrefactionis erat in causa, sistit etiam rosionem, vel putrefactionem, vt facilius deinde vlcus possit curari. nam licet cadente crusta, iterum sanguis quandoque erumpat, ille iterum per alios modos retineri poterit, & eo retento, facilius caro regenerari & vlcus curari. primus verò, qui sit per reductionem laterum vulneris, atque per alstrictionem & compressionem futuramque & deligaturam: locum quidem habere potest & satis faciem in vulneribus non admodum in profundum præterea vsus: in profundis tamen, præsertim si in alto sint vasa aliqua insignia, quæ confertim sanguinem eructent. maximeque si arteria, hoc modo nihil efficere poterimus. Sed erit necesse vt altero, aut tertio, nempe vt vulnus, aut alstringentibus impleatur medicamentis & refrigerantibus; nam hæc deliccant & desiccando generationem carnis iuant, quæ est exquisitissima curatio istius rei, aut illis quæ emplastica insunt, vel vtrisque nempe vt in profundiores partes emplastica indamus, desuper vero refrigerantia & alstringentia imponamus, vel ea quæ vtraque facultatem mixtam habet. Antequam autem de compositione & vsu horum medicamentorum particulatim agamus, operæ precium fortasse fecerimus; si cuiusdam præcepti Hippocratis meminerimus, circa rationem restituti sanguinis. Qui Galenus primum, deinde verò & Auicenna, sed & ante Auicennam antiqui ferè omnes subscribere, cum id ab illis admodum vtile fuerit indicatum. Consultit itaq; Hipp. in recentibus vulneribus: præsertim quæ nõ sint in internum ventrem, sed in externis partibus adacta, sanguinẽ non esse statim cū inde effluit, suppressendũ: sed permittendũ aliquatenus defluere, & id quatenus medico visum fuerit expedire. vtilitas verò, q̃ pōt egrotanti accedere, est, quod facilius arcetur, quo minus inflammatio vlceri, aut circũstātibus partibꝫ superueniat. qua aut de causa mod est sanguinis profusio tutas ferè reddat partes vulneratas, & circumstantes ab inflammatione, facile percipiemus, si eorum memores fuerimus, quæ sæpius & in hoc libro & in aliis fuere explanata. nimirum enim ostensum est, inflammationem originem habere à fluxione humorum confluentium ad aliquem imbecilliorẽ locum. facile autem excitantur fluxiones in corporibus plenis. vbi vero obest plenitudo,

do, partes, quæ supernuacuo humore carent, auariores reddite, contendunt quanta vi possunt, ne vilis & serè necessarius succus illi subtrahatur. Neque minoris momenti illud est, quod Gal. 5. metho-
 dodi docuit ad sanguinem reprimendum ex vulneribus profluentem, in quo exponendo hac methodo procedit. si incisa sit vena, & vulnus eius oculis conspici, & digitus, eo usque peruenire possit, digito vulneris osculo admoto atque leuiter compresso: ita ut exitus sanguinis intercipiatur, citra tamen dolorem, facile sanguinem suppresses. nam sanguine in grumum interim dum digito locum premes conuerso, osculum obturabitur. verum si vas in penitioribus vulneris partibus fuerit incisum, tunc diligentius rei attendendum, & situs magnitudoque illius erit exquirenda. insuper uero, & quodnam uas illud sit, num uena, uel arteria. quibus examinatis & perspectis: si unco uas apprehensum leuiter attolles, moxque aliquanto intorqueas: hoc pacto forsân supprimetur sanguis, quod si id ex uoto non successerit: si uenâ illa fuerit, medicamentis erit agendum, quæ uim habent sistendi sanguinem, præ alijs autem, emplasticis. At si arteria fuerit, uix medicamentis, hoc assequi poteris: si uas hoc fuerit alicuius magnitudinis. quare relictis medicamentis, necesse erit manibus agere, & aut circumducto uinculo deliganda erit arteria, aut uniuersa rescindenda. & si uinculo uti uolueris, hoc tibi obseruandum erit, ut deligetur arteria ex ea parte; unde illa ortum habet, nempe versus cor. quia sanguis inde impetum facit versus vulnus. unde si arteria ascendat à corde, vel ab aliquo ramo, qui statim à corde defluerit, in inferiori parte uinculo deuincienda erit. verum si ex illis fuerit quæ deorsum versus particulas inferius feratur, in superiori parte deliganda erit. Sed sæpe medici non sunt uinculo solo contenti, sed præterea & vas uniuersum præciidunt, quod in uulneratis uenis moliri quoque interdû cogimur. præsertim ubi uena sanciatâ ex valde profundo loco ascendens: per vias angustas fortur, aut per aliquas ex partibus, quæ aliquo pacto in præcipuis sit. uasa enim hæc hanc habent naturam, ut si escendantur, aut alioquin diuellantur, utque partes retrahuntur, unaquæque ad suum. locum circumstantibus uero superpositis quæ corporibus quasi conuiuentibus, absconduntur præcisæ uasorum partes secundum ora. atque ita intercipitur sanguis, quo minus effluere queat: consulit autem Gal. 5. metho. ut utrumque agamus. nempe ut primùm partem uasis quæ suum initium respicit,

vinculo deligemus, alteram verò, quæ ad extremum vergi rescindamus. Quo peracto nihil antiquius nobis sit, quam procuratio ut carne aggenita vulnus repleatur anteaquam vinculum à vase decidat, alioquin nisi caro cito excrefcens comprimat partem præcisi vas: præsertim verò quando sit arteria, quæ vulnus acceperit, quæque sanguinem effundat, sed inane aliquod ibi relinquatur, anteaquam vinculum excidat, excitabitur tumor illæ, qui à Græcis *ἀνέμω* ab Arabibus autem mater sanguinis appellatur: vnde ex hoc concludit ibi Gale. quòd omnino in hoc negotio præferendus sit vsus medicamentorum emplasticorum, vsui eorum qui crustam inducunt, & id propterea quia magis & citius carnem reparant, sed ab hac reprimendi sanguinis ratione eximenda sunt vasa, quæ per cerebri membranas digesta sunt, nimirum venæ, & præterea illæ, quæ *κυστιδὲς* à Græcis dicuntur, à Latinis vero iugulares appellatur, in quibus solo medicamento, de quo agemus cirra vinculum sanguinis erit astringendus. Sed videreur forsitan opportunum accedere particulatim ad horum medicamentorum tractationem, additis ergo his paucis ad præcedentia, ea exponemus. Nam diuersam aliquanto curationis rationem sanguinis requirit. quando ex profundioribus partibus profunditur, quia siue velis vincula exquiri, siue ligaturas, nihil omnino proficies, minus quoque si medicamentis crustam inurenribus vtaris. Sed neque si aliis fissuræ imponendis, verum solis reuulsionibus, aut deriuationibus proficies. præterea verò tam cibis, quam potu, tum astringentibus, tum refrigerantibus. quæ non modo in his profusionibus ex partibus, quæ in alio sunt, maxime sunt opportuna, verum in illis etiam, vbi ex externa remedia, vt sunt refrigerantia, siue astringentia sint, siue citra astringentem, solent censei esse accommodata, nihil proficere poteris, nisi prius impetus confluentis humoris per reuulsionem, aut exsecta vena, aut per ligaturas, aut per cucurbitulas auertatur. Addamus præterea quod si effundatur interdum sanguis quasi exudans ex venis per *σπασμὸν* Græci dicunt, quod sit vel propter raritatem, & laxitatem substantiæ vas, aut propter tenuitatem substantiæ sanguinis, quamuis id ad solutam continuitatem non pertineat, non erit tamen ab re: vt saltem in vniuersum de hoc etiam paucula dicamus, nempe quomodo sit reprimendus, porro nemo ferè non videt, quod id per refrigerantia & astringentia sit agendum, in quibus est facultas den-

sandi

ſandi & colligendi vaſorum ſubſtantiam, & cibis quoque ineraſ-
 ſantibus, quando id à ſanguinis tenuitate pendet. tandem ergo par-
 ticularim ad rationem horum medicamentorum exponendam ac-
 cedamus. quorū in vniuerſum paulo antea facta eſt mentio: & cum
 hæc in tres ordines, vel tria genera ſint digeſta, prius ea deſcribe-
 mus, mox non quidem omnia, ſed quæ magis in promptu, & in fre-
 quentiori uſu ſunt, recenscimus, genera vero ſunt hæc. quædam
 refrigerantia, & aſtringentia ſunt, alia emplaſtica, alia cauſtica, vel
 inurentia: de cauſticis ſanè non eſt cur in præſentia aliquid dica-
 mus, cum multa fuerint à nobis, dum de malignis putridis & ero-
 dentibus vlceribus ageremus, literis tradita. emplaſtica vero ea
 ſunt, quæ craſſioris ſunt ſubſtantię cum quodam lentore, & quam
 uis eorum aliqua non videantur expertia alicuius caloris, quæ tamè
 aliquantulum in frigus inclinant, noſtro huic ſcopo magis viden-
 tur accommodata. ergo ex ſimplicibus in primis album oui, quod
 cum expert morſus, & lentoris ſit particeps, atque quoquomodo
 refrigerans, nonnulli præterea & vim aliquam aſtringentem attri-
 buunt, ſuit ſemper in frequentiſſimo uſu, atque maxime vulgare
 medicamentū, quo tū ſolo præfertim lincis puluillis, excepto, tū ve-
 ro tanquā materia, qualia aſſumantur vti ſolent. emplaſticam etiam
 facultatem habet aranea tela, quæ præterea refrigerando appoſita
 loco, vnde ſanguis effluit, ibique hærens, ſolet ſupprimere, vel èt
 ſola: ſed ſi illa accipitur, quæ reperitur vbi triticum molunt, vel vbi
 à ſurfure excutitur farina. ſunt enim telæ illæ reſertæ tenuiſſima
 farina quæ euolat, inde maiorem vim emplaſticam & agglu-
 tinatoriam conſequitur. nam & pollin, hoc eſt tenuiſſima fa-
 rina vim emplaſticam inſignem habet. ſed ſi aliis interdum me-
 dicamentis careremus, raro deſſet pulvis communis. ille
 enim ſi Gal. 8. de facultate ſimplicium medicamentorum credi-
 mus, eas omnes vires habere videtur, quæ plurimum valent
 ad ſanguinem ſupprimendum. Nam emplaſticus eſt, refri-
 gerat & repellit. Gypſum quoque, præfertim vero ſi fuerit exquiſite
 lotum, in hac re plurimam vim habet, vel ita aridum inſperſum, vel
 ex albo oui mixtum, vel alio liquore ſimilis conſiſtentię. nam & in
 emplaſticis medicamentis eſt, & refrigerandi deſiccandiꝫ facul-
 tate præditum. reſina etiam friſta, vt ait Gal. 3. meth. quamuis non
 refrigeret, quia tamè emplaſtica & ipſa eſt, reprimere poteſt ſuen-
 tem ſanguinem, ualide etiam poteſt fluentem ſanguinem ſiſtere
 bolus

bolus armena: quæ & ipsa aliquid habet emplastici; quamuis vt Gale. nono de facul. simpl. medicamentorum testatus est, magis exiccando id agunt & partim etiam refrigerando. Cum his autem posuerim lapides hæmatitem & schistum & terram lemniam vel sigillatam, & si quidpiam aliud est istius generis, refrigerantia autem & ea ratione sanguinem supprimentia, sunt aqua frigida, posca succus cucurbitæ, palustris lenticula, lactuca. refrigerant autem cum aliqua astrictione portulaca & eius succus. refrigerant quoque & astringunt simulque aliquantulum siccant solanum, plantago, polygonum, semper uiuum. utrunque possumus cum his recensere, malum coroneum reliquaque mala & pira, quæ alicuius austeritatis & astrictionis non sunt expertia: præterea sorba, & mespila, præsertim quæ mitia minime sint, & corna & fructus comari. Sed & omnium horum folia, sicut & fructus rubi, atque etiam mororum, quæ immatura sunt, & rubi quoque germina, insigniter autem astringunt & refrigerant gallæ, præsertim immaturæ, balaustra, cytini, malicorium. sed & myrtus, hypocystis, rhus, omphacium. sunt & aliqua, quæ & si calida sint, ratione tamen, qua astringunt & siccant, huic muneri possunt esse utilia, vt Aloe, thus, & eius manna, & frixa resina. sed & aliqua in illis emplastica facultas id adiuuat, & pini etiam cortex, vinum præterea austerrum: præsertim nigrum astringendo potest iuuare ad supprimendum sanguinem: sed & multa alia his iuniores addunt, quæ, ni fallor, desiccando potius quàm alia ratione fluentem sanguinem intercipiunt, sicuti fuligo quæ à clybano, uel à lebeate aenoue deradiat, sed fortasse & thuris fuligo vel mastiches vim haberet maiorem, ita & gallinaceæ plumæ combustæ, pilique, leporis item combusti, ossa vsta, spongia etiam exusta, quamquàm & alia non modo siccando, sed etiam astringendo esse possunt utilia, vt rhabarbari torrefacti puluis, gallæ exustæ, moxque aceto, vel vino præsertim austero restinctæ, cinis quorumcunque lignorum, quæ astringentem facultatem habuerint. possemus alia præterea multa ascribere, quæ orationis prolixitati parcens, dimittimus, & Galen. imitati, vno capite colligemus. omnia nimirum dicentes, quæ astringendi facultate prædita sunt, ad hunc scopum pertinere. vnde si paucula quædam de compositionis istius generis medicamentis literis tradiderimus, huic capiti finem imponemus. cum autem omnia composita medicamenta ex simplicibus conficiantur, & ex his præsertim, quæ iam à nobis proposita sunt. aut saltem, quæ

ad idem genus cum his tandem referenda sint ea cum omnium non sit vnum omnino & simplex genus. Nā alia magis emplastica sunt, alia vero astringentia & refrigerantia partimque exiccantia, non nulla caustica, vel exurentia; ideo diuersus reperitur modus & diuersa methodus compositionis id genus medicamentorum: vnde si diligenter velimus ea medicamenta examinare, quę ab auctoribus, tum priscis, tum recentioribus descripta reperimus (nam alii quidem omnia serē ad idem genus pertinentia, commiscunt; alii vero ex diuersis, & sępe etiam ex omnibus generibus vel etiam inter se contrariis medicamenta colligunt commiscuntque, & aliqui multa, alii pauca (incipiēmus ab illis, quę antiquis & maxime precipuis medicis fuisse in vsu. Gal. itaque duo composita medicamenta quam maxime laudauit, alterum quod confici potest ex resina ad dito pollinē triticeę farinę, vel gypso trito in tenuissimum puluerē: vel etiam additis vtriusque ea portione, vt fiat molle emplastrum, uel cataplasma. uel etiam si duo hæc simul mixta assumantur ex albo oui, erit nihilominus accommodatum medicamentum, quamuis ex farina & gypso potest fieri aridum medicamentum. uel puluis, qui uulneri & ori nasī inpersus, dum fluenti sanguini commiscetur, sit ueluti emplastrum, uel cataplasma; nam aliqui etiam sanguinis grumo exiccato ac trito in pulueremque redacto utuntur ad astringendum fluentem sanguinem, quomodocunque aut medicamentum pareretur emplasticum erit, & ex emplasticis confectum: Alterum uero quod à Gal. ceteris omnibus præfertur, est id cuius materia est Aloe & thus, & eius ut recentiores loqui solent, basis, quamuis non semper idem erat illi modus utendi, neque eadem mēsurā simplicium, quę accipiebantur, sed uaria, tum pro diuersa ratione corporum in quibus medicamento erat usus, tum etiam pro ratione uulneris: Nam illi interdum uidebatur esse opus magis emplastica facultate, interdum magis astrictoria, & desiccatoria. Cōmunis tamen eius ratio erat; vt esset thus duplex ad Aloem. & thus illud eligeretur, quod mollius esset & recētius, iuniores dicerent gūmosius, vt pote quoniam hoc magis emplasticum est, atque in magis emplasticum euadit medicamentum. Si tamen corpus cui esset opus istiusmodi medicamento siccius esse uideretur: sicciori etiā esset opus medicamento. par ergo portio vtriusque esset assumenda. interdum uero & aliquantulum plus Aloes indebat, nunquam tamen Aloe thuri erat superius: Aloes autem magis desiccet, & magis

gis astringit thure immo nonnunquam, quando plus præterea esset necessaria & astrictio & desiccatio, pro thure consulit Gale. esse assumendam mannam, quæ thuris corticem iuniores solent appellare. Nam ut idem testatur, manna magis astringit, quam thus. hoc autem emplasticum magis est. modus verò utendi isto medicamento frequentior & utilior est ille, quem ibidem Gale. docuit, ut acidum paretur, nempe contritis omnibus simul, & in tenuem pulverem redactis, atque ita feruetur: cum vero utendi occasio fuerit oblata, albo oui subigendum est, atque ad crassitiem mellis deducendum & assumendum mollissimis pilis leporinis, & nasi sanguinem effundenti imponendum, atque subinde uniuerso vulneri mox quæ tenui fascia id deligandum accommodata ligatura figuræ & sicuti ipsius particulæ deligan-dæ; ita, ut primum ter, quaterue, aut et quinque vulneri locoque vnde effluebat sanguis circumducatur, mox vero circumductio procedat versus radicem originemve ipsius secti vasis, quatenus tamen id fieri potest. Nam in lauciatis cerebri membranæ id nequit sanè fieri. Mihi vero neque satis comper-tum est, an hoc medicamentum membranæ cerebri hoc modo ex albo oui subactum & pilis leporinis exceptum membranæ com-mode possit imponi, vel potius illis sit aridum inspergendum, ac mox ex oui albo & leporinis pilis, vulneri exterius imponendum. nostris autem temporibus sæpe pro illis pilis utuntur medici mol-lissimo lino, aut etiam coto. laudatur autem adeo medicamentum hoc, propterea quia, præter id quod agglutinando & astringendo sanguinem sistere potest, vim etiam illam habet, ut carnem aggene-ret. quod non modo utile, verum & summe necessarium ad reddē-dum omnino tutum hoc negotium. Auicenna vero & ipse suum quoddam medicamentum reliquit conscriptum, in quo expone-ndo vel examinando non ero multus, quia idem ferè in aliis est, nisi quod bolum armenam & draconis sanguinem medicamento Gale-ni addidit, omnia vero accipit pari pondere, at idem est modus eo utendi, & hi quidem auctores persistere in illis medicamentis mi-scendis, quæ ad genus emplasticum pertinent. Nam & melius id est & tutius: Posteriores vero his minime contenti, alia etiam com-miscuere, quæ diuerforum generum sunt. Nam & caustica, vel cru-stifica cum emplasticis composuere, quemadmodum Brunus inter recentiores chyrurgos vetustior, Arabas, præsertim vero Rasim, & Albucasim imitatus. is enim in hunc modum conficit medicamē-tum.

tum accipit calcis viuę, de qua sermonem alibi habuimus, sanguinis draconis, Gypsi, aloes, thuris, calchanthi, singulorum tantundem, omniaque simul contusa in tenuem puluerem redigit, & ex albo oui addita tela aranea, eatenus commisceat, donec ad vnā compagem deuenerint, eoquę utitur, vt supra. in qua compositione, cętera emplastica sunt. calchanthum vero, causticum est, & ex ijs, quę crustam urendo inducunt. at calx uiua inter septica, vel putrefacientia recensetur. possemus longē maiorem copiam medicamentorum compositionum describere, nisi superuacuum fore hunc laborem putarem. nam his recte perceptis, atque seruata memoria simplicium, quę fuere paulo antea literis commissa, non erit difficile uariare rationem medicamentorum, & sylvam ingentē sibi parare, vel istis aliquantisper mutatis partim additis aliis, quibus aliis pro ratione opportunitatis, partim etiam nonnullis detractis: vel diuersis etiam ab his commixtis pro ut videbitur, vel ratio corporis, vel temporis, vel loci nobis ea facile subministrare, atque expetere. Quapropter iam videtur opportunum, vt finem quatenus ad hoc caput pertinet, faciamus.

De curandis tumoribus, qui in corpore humano, præter eius naturā existantur per medicamenta, primūque de eorū natura in uniuersum. C. 19.

Expeditis autē illis, quę ad curāda tā vulnera, quā vlcera pertine-
re poterāt, quātū nēpe ad nostrū institutū spectare videbant, ad tumorū rōnē, qui præter corporis laborantis naturā solēt cōcitari orationē cōuertamus, & exponamus, quib. medicamentis, & qua rōne administrādis curādi sint. verum quia, vt sæpius ex Galeno in prioribus capitibus fuit ostensum, aut vniuersa, aut maior pars methodi tam componendorum, quam adhibendorum medicamentorum a natura ipsius curandi affectus depromenda est: ideo de tumoribus, tum vniuersim, tum etiā particulatim agemus: Sed quantum diutaxat poterit ad faciliorem eorū quę dicenda sunt explanationē conferre. Attolluntur itaque in tumorē partes nostri corporis nō alioquin, nisi quia aliqua replentur materia a qua infarcta distenduntur. quāuis autem possit illa materia qua replentur in eadem particula quę in tumorē attollit paulatim ex aliquo in eo cōtracto vicio generari: sepius tñ, vt Gal. in lib. de cau. morb. tradidit, à fluxione fiunt, expellentibus nimirum foridioribus particulis inutiles vel

Cap. 3.
Cap. 95
Cap. 1.

Com. 1.

ob copiam, vel ob malitiam & excrementofas materias naturæ instituto à fe, & id ministerio expultricis facultatis, quā natura ab illis irritata excitat hanc facultatē, atque id subinde fit, donec impulsio ad eā particulā definat, quæ non eas vires habeat, ut à se alio ingruētes humores possit impellere. tunc autē replentur primum plus iusto ab hac fluxione vasa maiora distendunturque: mox autem & minora. demum per vasorū ora & per meatus angustos & sensibus incōspicuos humor copiosus infarctus, cum contineri amplius ferē ne queat, quasi expressus exudat exciditque inter spacia quæ in musculis sunt inter similes partes, ut idem & in lib. de ineq. intem. & libro de art. med. & 14. meth. docuit, quales sunt membranz, neru ligamenta, venæ, arteriæ: Ut tandem & caro ipsa istiusmodi humore suffundatur, eumque veluti absorbeat. Is ergo est modus & ratio generationis omnium id genus tumorum de quibus in præsentia sumus sermonem instituturi. & quamvis in vniuersum eundem modum generationis habent, differentem tamen speciatim habent naturam, quæ vniuersa diuersitas, a differente naturā influentis humoris ortum habet. nam influens humor, aut naturam sanguinis habet, aut bilis, aut pituitæ, aut melancholici succi. præterea vero quandoque non ex corpulento succo excitatur tumor: sed ex flatulento potius, ut testatur Gal. 4. de ratio, vict. in acut. mor. spiritu, & quasi ventoso. pro ratione ergo fluxionis unde ortum habent, diuersam quoque naturam sortiuntur tumores hi, & pròinde sicuti fluxio, aut calida aut frigida est, ita alij calidi sunt, alij frigidi, & antiquitus quidem, nempe tempestate Hippocratis, omnes calidi tumores, vno quasi communi nomine a medicis plegmonæ Græce, inflammatio vero Latine dicebantur. posteriores. uero, ut idem Gal. tum loco a nobis nuper adducto, tum etiam. 3. lib. artis cura, ad Glauc. commune hoc nomen determinarunt ad vnam tantum horum tumorum calidorum speciem: nempe ad illam, quæ excitatur a sanguinea fluxione, in qua significatione nunc passim accipitur inflammationis nomen, quem morem & nos in præsentia sequemur. prius autem de tumoribus calidis agemus, & primū de inflāmatione: nisi quod prius quædam adhuc in vniuersum cōsideranda sunt antequā particulam res hæc tractetur: primūque, quod aliquādo simplices sunt hi tumores, utpote qui ab vno tantum & simplici humore influente ortum habeant: aliquando vero compositi vel mixti, quando à pluribus, & diuersis humoribus mix-

tim confluentibus excitantur: sicuti aliquando exquisita est inflammatio, aut exquisitum erisypelas, aliquando vero inflammatio erisypelatoſa, vel erisypelas phlegmonosum. Sed huic & illud addamus, quod nos idem Gale. 13. meth. docuit, quod quando dicimus purum, & exquisitum erisypelas fieri à simplici humore, itidemque exquisitam inflammationem, hoc ita accipiendum, quasi rarissime, aut nunquam accidat. quia semper ferè misti fluunt humores, & erisypelas, aut inflammationis aliquo modo particeps est, aut scirrhi, aut œdematis, & ita etiam alii, vel huius vel alterius particeps, aut hoc ad sensum referendum est, quia adeo copia & viribus vnus humor alios superat, ut illi à sensibus nostris nequeant discerni, sed ab illis tanquam vnus & simplex humor habentur.

De ratione medicamentorum, quibus curanda sunt inflammationes. Cap. 20.

INFLAMMATIO, quâ phlegmonē, vt paulo ante monuimus, Græci posteriores Hippocrate particulatim nuncupauere, tumor est, vt idem. 2. lib. ad Glauc. ait, qui a sanguine optimo modice tamen crasso, aut sanè à sanguinea materia, hoc est in qua copia & viribus sanguis superior est, influente in aliquam particulam excitatur. Symptomata vero cōmuni quadâ ratione inflammationes consequentia sunt, vt. 14. methodi docuit Gal. calor primum, deinde rubor, mox dolor, tensioque & renitentia comprimenti, & calor quidem insignis & quasi flammæus, vel igneus. vnde & inflammationis, vel phlegmone nomen inditum. percipiunt enim ægri calorem adeo vehementem, vt quasi accensa flamma videatur, cuius multiplex est causa: primum quidem, quia sanguis suapte natura calidus est, deinde vero cum comprehenditur constipatus in inflammato loco, se ipso longe calidior fit, quia cute obstructa, a multa, & crassiori materia, prohibetur, quo minus diffilari possit, atque ita maior accenditur calor, cui hac etiam de causa putredo accedens, priori calori & illū addit, quia a putredine accenditur: Rubor vero itē in sanguinis colorē referendus & distenditur ēt particula & prementi renititur, quia spacia quæ inania prius erant, sanguine inculcato & in facto plena sunt. dolor autem tū ex nimio calore feruoreq; excitatur, tum vero quia partes a materia effervescente distenduntur, ac

Cap. 2.

Bb 2 quasi

quasi dilacerantur. tum etiam quod ab incumben-
tibus partibus comprimuntur, & aggrauantur, qui plerumque cum pulsu est: si in-
flammati insigniter crouerit, & in loco fuerit, qui sit sensus par-
ticeps & propinquas habeat arterias, pulsus enim is ab arteriis, vt
7. aph. docuit Gal. prodit, quæ & refrigerio egent maiori, & no-
xiam rem expellere nituntur, & compressæ angustiori spacio, dū
impetu maiori mouentur, circumstantes partes percutiunt, præcipue
vero is pulsus fit cum inflammatio in suppurationem propensa
est. Sed antea quam ad eorum tractationem accedamus, quæ magis
particulatim huic nostro instituto attinent, aliqua insuper circa
communem rationem inflammationum sunt explananda necessa-
ria ad methodum componendorum medicamentorum, quæ apta
sint illis curandis & ad rationem vsus eorum, & hoc primum qui-
dem declarauimus, quod tanquam corrolarium ex illis sequitur,
quæ nuper fuere exposita. nempe quod in inflammata parte du-
plex reperitur caloris ratio, & altera quidem natiui, ad quem prin-
cipem spectat & morbos curare & omnia pertinentia ad vitam &
salutem illius partis administrare: alter extraneus & aduentitijs,
præsertim; vt diximus ex putredine concitatus, qui omnino ad-
uersarius natiuo, corrumpit, destruit, & impedit omnia natiuo ad-
ministrata, qui licenti aduersarij mutuo sunt, ita semper inter se pu-
gnant ac veluti colluctantur: vnde ex his postea accidit, vt inflama-
tiones non semper vno & eodē modo terminentur, sed, vt à Gale-
no multis in locis fuimus docti, multipliciter: nam aut omnino na-
tiuus calor superior est, aut omnino externus & asciticijs, aut res
quali medio modo se habet: nempe quia neque natiuus, neque ex-
traneus alterum superat: sed vel pares sunt viribus, vel si impares,
vtriusque tamen actio in materia, quæ iam fluxit apparet. Et si qui-
dem omnino superior sit vis natiui caloris, nulla sequitur suppu-
ratio, nullus abscessus, sed per attenuationem, & digestionem, vel,
vt aiunt, resolutionem materiæ attollentis particulam in tumorem
inanitur inflammata pars, & inanita citra aliud incommodum re-
dit ad pristinum & naturalem statum, quæ quidem terminatio,
vel quæ curatio optima est, & præcipue semper optanda. Sin autem
externus & asciticijs calor penitus superet natiuum, pars omnino
corrumpitur & putrescit, quo modo fiunt gangrenæ & spha-
celli, & reliqua id genus, quæ quidem terminatio pessima est
& maxime detestanda. Quando vero non omnino alter calor

calor alterum vincit, tunc inflammationes in abscessum vertuntur & suppurantur, & quia in hac horum calorum quasi pugna, varii sunt ordinis, vel, ut aiunt, gradus, quatenus magis, vel minus alter alteri superior est. Nam natui operatio & scopus est quando digere per vacuationem sensibus inconspicuam humorem vitiosum nequit, saltem illum concoquere, & in optimum conuertere: ascitius vero semper putrefacere & corrumpere: ideo pus quod in abscessibus gignitur, aliquando excernitur album, & leue, & æquale, nullum, aut non insignem referens malum odorem. interdum odore consentientia, coloreque victoriam caloris extranei referens. si cut autem diuersa sunt hæ rationes, quibus terminatur inflammatio, ita etiam oportet, ut medicus, qui naturæ adiutor est, diuersas medicamentorum rationes inecat, quibus naturæ laboranti opem ferre possit. Quibus & illud addendum est, quod cum morborum temporibus occasiones mutandi rationes remediorum accipiendæ sint, non erit etiam ab re, si de temporibus inflammationum aliqua dixerimus: præsertim cum non vnus simplexque modus sit, quo distinguenda sunt eiusmodi tempora. ratio vero distinctionis à diuersis modis accipitur, quibus terminatur inflammatio, & materia in inflammatione transmutatur, quando per digestionem, vel per suppurationem, vel per corruptionem & putrefactionem terminatur. Nam principium, ut in libro de temporibus vniuersi morbi exposuit Gal. inflammationis est, quando ex influente sanguine pars affecta impletur, cum vero consistente fluxione iam cepit collecta materia putrescere, calor, vehementior ex putredine excitatur, à quo sanguis magis funditur, atque inde spiritum generari contingit. quo deinde fit, ut quamuis constiterit fluxio materię, pars tamen magis distendatur quàm antea, unde hoc tempus incrementum censendum est. cum vero concoquitur materia & per concoctionem paratur, aut ad digestionem faciliorem, aut ad suppurationem, maximus tunc dolor & maior concitatur febris. dum plus enim conficitur dolores & febres magis molestę sunt quàm cōfecto iam pure, atque tempus id vigoris vel consistentię existimandum est: postremo vero, vbi in pus uersus est sanguis, uel coctus digeritur, decrescit tumor, remittitur partis distensio, incipit inflammatio inclinare. est in his & illud adiciendū, quod triplex est ratio distinguendi tempora in ipsis inflammationibus, accepta à tribus, quę necessario simul semper reperiuntur in omnibus morbis, qui ex materia ortū

fluxionem supprimendam reprimendamque esse & cum duplici ratione fluxioni occurrere possumus: primū remotis causis fluxionis: deinde procurando ne particula ad quam defertur defluens materia, illam minime admittat recipiatque: & quamvis fluxionis causa a liquando in ea sit particula, vt 13. meth. Gal. docuit, ad quam humor confluit, & hæc multiplex sit: vna quidem communis, & est illius particula imbecillitas aliqua, vel ex ipso ortu, vel ex aliqua externa vel interna occasione contracta: alia vero magis priuata sunt, aut calor, aut dolor in illa parte excitatus: nam duo hæc præcipue vim habent attrahendi ad affectam particulam superuacuos humores in alijs residentes. Aliquando autem fluxionis causa non est in loco affecto: sed potius in alijs circumstantibus vicinis, vel remotis partibus, vt sæpe etiam in vniuerso corpore. cuius deinde vniuersa ratio in multitudinem, aut viciosam naturam fluentium humorum, qui irritant naturam earum partium, vt expulserice facultate excitata insurgat ad eos procul expellendos: attamen omnia in hoc tandem caput resoluuntur, nempe in repletionem multæ, aut vitiosi succi. Nā nili hæc adsit redūdātia, nihil attrahēti, pdest attractio: cū nihil reliquū sit quod attrahēdum sit. nā alia partes non cedunt attrahenti, cum nihil superuacui habent, quod attrahi facile permittant, neque impellentes quidpiam à se expellere conantur: nisi quod illis est, aut copia, aut mala aliqua qualitate molestū. In summa ergo primus scopus & cōmunis in omnibus defluxorioris morbis erit, tū vacuatio, tū ē reuulsio. vacationes aut quæ maiore in hoc munere præstādo vim habent, sunt, sanguinis missio, & purgatio per medicamenta: maxime vero quando euacuādo ē reuellunt. Hæc ergo erit princeps & cōmuniior pars methodi curandarū, tam inflammationū, quā aliarū etiam affectionum à fluxione excitatarū, quæ ita cursim à nobis tractata sunt, quoniam particulatim non videntur spectare præsens institutum, in quo de localibus remedijs vel medicamentis agere instituimus. Vnde ad aliam partem accedamus, in qua agendum est quonam pacto procurandum est, primum quidem ne locus affectus influentes ingruentesque humores recipiat: deinde vero si qui recipiuntur, illi vacuent. & hoc, quia cum fluxio aliquanto tempore in aliquē locum tendit, qui eas vires nō habent, vt illā à se repellere possit, necesse est, vt tandem victus aliquid recipiat, & subinde semper plus sit recepturus. Hæc autem nobis statim indicant, procurandum quantum

niero est; q̄ si ea referamus ad eas rationes & eas indicationes unde deprompta sunt: omnino vera sunt: quia tamen multe alię etiam rationes & conditiones; vel circumstantiæ cum illo affectu siue inflammatio sit: siue alius morbus; quę suam & ipsę rationem propriamq; indicationem, & etiam non contemnendam habent: ideo non nunquam à generalibus illis theorematibus desistere cogitur medicus, neq; tamen propterea tollitur quin ea vera sint: ecce enim si, ut parum ante dictum est, inflammatio primam occasionem habeat in ipso loco affecto à dolore concitato à spiritu flatuoso, & densitate cutis, non oportebit statim ab initio aggredi curationem, per ea remedia, quę repellant, utpote quoniam adderēt densitati cutis, & magis concluso spiritu auerent dolorem, & subinde etiam inflammationem: Sed potius erit agendum, ut. 13. meth. docet Gal. illis quę modice calefaciunt, qualia sunt quę laxantia dicuntur, quę quę densatum corpus rarefacere possunt, & flatulentum spiritum extenuare digerereque, & quicquid cōfluxit in inflammationē partē discutere. itidēque si ex refrigeratione concitato dolore oriatur inflamatio, calefaciētib; frigidiori cōtractę intēperaturę doloriq; & inflammationi esset cōsulēdū. cōtra vero si ex immo dico loci calore inflamatio originē haberet, refrigeratib; & intēperaturę calidę, & inflammationi esset occurrēdū. nā & intēperatura cōtrariis tollit, & per refrigeratā & astringētia, pars repleta, expressa quasi cōtrita materia & extracta, perinde inanitur ferē, ac per digerētia. his præterea & id addamus, q̄ si fluxio crassorū admodū humorū sit, aut materia plurimū fuerit inculcata in affecta parte, repellētib; & refrigerantib; insistendum minime erit: sed ad digerentiā transeundū. Vnde tandē vniuersam istius rei rationē in hanc suam mām resolvemus. q̄ si quando omnino humorum fluxio repressa constitit, corpusque probe mundum & inane fuerit, tūcque si mus ne iterum excitetur aliqua fluxio, tunc in principio quidem sola repellētia refrigerantiaque accommodata erunt. inclinante vero inflammatione, ut nobis breuissime exposuit Gal. 1. de cōp. med. secundū gen. sola digerentia, vbi tū vehemens adesset dolor mutanda esset hæc ratio, quia lenientia ad sedandū dolorē necessaria essent. inter mediis vero tēporibus, mistā esse repellētia oportet cū digerentibus: ut tamen repellentium vis inter initia superet, atque quod morbus magis per incrementum versus vigorē progreditur, eo magis de repellentibus detrahendū, digerentibusque adhi-

ciendum,

ciendum, adeo vt prope vigorem par sit fere vtrorūque ratio. in vigore verò, vt idem 6. de compositione medicamentorum secundum loca, concoctorijs medicamentis suus est locus, concocto verò morbo & inclinante, digerentibus: At vero vbi corpus non omnino mundum fuerit, & fluxionis timor non desit, semper oportet, vt eodem quarto de compositione medicamentorum per genera aperte pronuntiauit Gal. mixtam esse vtranque facultatem digerentem & repellentem. quæ si fuerint secundum artem & meth. mixtæ, non modo, quamuis videantur inter se esse aduersariæ, non se mutuo impediunt, at potius, vt eodem sexto de compositione explanauit idem Gal. mutuo se iuuent. Sed tandem ad hæc ipsa particulatim tractanda accedamus: Et quia diximus duplicem esse modum, quo sciliciter potest inflammatio terminari, curarique. Nam cum fiat inflammatio ex repletione sanguinis, qui defluxit in ipsam particulam, fieri nequit, vt curetur hic affectus, nisi per contrarium: nempe per vacuationem repletæ partis. dupliciter autem solet superuacua illa materia, cum inculcata est, & absorta ab ipsa particula: detrahi & vacuari. Nam aut per digestionem eius in halitū, aut per eius conuersionem in pus & effluxum ex facto iā abscessu rupto vel inciso. sed de priori ratione curandi inflammationes agamus: nempe per digestionem. Rem verò hanc diligentissime Galenus secundo libro artis cur. ad Glauc. tractauit, in hunc modum. inter initia inflammationum, vel vehemens admodum cruciat dolor, vel non est adeo vehemens (Nam vix fieri potest vt sit inflammatio omnino doloris expers, dolor tamen non tantus est, vt omnē, vel maiorem curationis partem ad se conuertat.) si quidem vehementior adsit dolor, neque vsus eorum quæ refrigerant & exiccāt, qualia illa sunt, quæ paulo post sumus exposituri, quæque solum repellunt, utilis futurus est, neque etiam eorum quæ laxant & molliunt, quale est cataplasma ex triticea farina oleoque & aqua confectum, aut aquæ calidæ, aut olei perfusio. nam quamuis hæc videantur statim ferè leuare & lenire dolorem: in affectibus tamen ab impetu confluentis materiæ concitatis aliena sunt, & noxia istiusmodi medicamenta. eos enim augent, quia fluxiones magis proleciāt. in his itaque dolor leniendus erit, quopiam simili medicamento, vt illud est, quod ex passo & rosaceo fit addita modica cera ex vtroque liquata, quæ apponenda sunt excepta lana plurimo ex oesipo sordida. sed & vtile præterea erit medicamentum quod fit ex plantagine

tagine lenticulaque, præsertim coctis addito pane, & exceptis rosaceo oleo, in his enim vis refrigerandi quidem est, & digerendi, & roborandi particulam, ut se tueri ab ingruentibus humoribus possit. Nam in plantagine & lenticula præterea in rosaceo etiam vis est astringentia: modesta tamen quæ potest robur parti affectæ præstare, non tamen tanta, ut contrahere & exasperare ipsam possit, atque ita dolorem exasperare: in pane uero itemque in rosaceo aliqua leniendi & digerendi: sed & refrigerant hæc medicamenta: & unde frigida estate, tepida vero hyeme sunt adhibenda: tertio, enim de temper, ait Gal. calidis affectibus æstate medicamenta æstu frigida esse apponenda, hyeme vero ne ex aere vehementer frigido contrahatur magis pars affecta, intendatur magis & ita exacerbetur dolor, tepidum medicamentum imponendum erit. ita enim dum partim corrigitur & reprimitur calidior intemperatura inflammati loci, digeriturque pars aliqua contentæ materiæ: unde illa minus distenditur, & delenitur etiam, fit dolor minor & minus molestus. verum quia istius rei summa inter initia in fluxione sita est, cui imprimis incumbendum: & quæ illam potentius reprimunt, si inflammationi parti imponantur, dolorem exacerbant: ideo præterea idem consulit, ut paulo supra male affectam partem apponatur spongia aspersa prius ex vino astringenti, aut aqua frigida, deinde vero expressa, quæ item frigida sunt apponenda. cui si præterea aliquid adiciatur aceti, res melius se habebit. hæc vero superiori loco apponenda voluit, per quem putat fluxionem descendere, ut eam astringendo & contrahendo fluxionem intercipiat prohibeatque. & hoc quidem medicamentum eorum officio fungitur, quæ à nostris iunioribus defensiva dici solent, de quibus cum abunde suo loco fuerit actum, in præsentia nullum habebimus sermonem, quâvis & illa huic loco posset accommodari. sin autem vehemens dolor non cogat nos à recta curationis methodo diuertere, toti erimus inter initia in repulsionem, cum refrigerantibus & astringentibus & subinde desiccantibus. Nam ut eodem secundo libro ad Glauco. docuit Gale. ea optima emplastra sunt, quæ mollia sunt, quæque reprimunt & coercent cursum fluentis materiæ: sed & desiccant: præsertim si sine dolore illud fiat. Nam quæ multum partem intendunt, dolorem maiorem concitant, & plus noxæ, quam utilitatis afferunt. Præsertim vero hoc cataplasma laudauit ibidem, quod conficitur ex semper uiuo, malicorio ex sapa, rhu, farina hordei. Nam potest reprimere repellereque

tis inflammationem: sed cum non vnica sit ratio hoc oleum conficiendi. Nam & ex oleo immaturo quod omphacinum Græci appellant, & interdum immo frequentius ex oleo maturo & quo communiter in cibis vtinur, primum illud, & frigidius est, & magis astringens, quare repulsiōi accommodatius, unde eius usus in ea parte incrementi, quæ principio proxima est, erit magis opportunus. quod vero maturius est, maiorem vim digerendi & concoquendi, quam obrem aptius erit, cum incrementum ulterius progreditur, immo uerus uigorem, uel statum, ut aiunt, accedente inflammatione: si cum chamemelino oleo commisceatur præstantius erit medicamentum. Nam & magis digerere, & præterea magis lenire dolorem poterit. & hæc quidem sunt simpliciora medicamenta. Nam & componi præterea multa cataplasmata possunt, quorum mentio & ab Auicenna & aliis auctoribus fit, sicuti defrutum, uel sapa inter medicamenta referuntur, quæ incremento accommodata sunt. vnde si acceperimus olei rosacei uncias duas primum, sapa unciam vnā, croci dragma vnā, erit utile medicamentum. maiorem uero digestionem habiturum, si ex succida appellata lana assumptum apponatur. alii in hunc modum componunt aptum cataplasma. accipiunt enim foliorum malua manipulum, quem ex aqua coquunt, adduntque absinthii, rosarum aridarum singulorum semunciam, farinae hordei vnciam: omnia ex aqua coquunt, & atterunt, & addunt olei chamemelini parum, commiscētque in molle cinplastrū & apponunt. pōt & ex oleo rosaceo & chamemelino: farinaque hordeacea componi cataplasma addito deinde oui vitello, interdum & pauco croco. sed innumera possent confici medicamenta, nobis tamen hæc satiserunt proposita iuuenibus tanquam exempla, ad quorum imitationem plura alia: si quis fuerit peritus facultatum simplicium medicamentorum, illa conferens cum explanatis scopis sponte sua cōponere pro opportunitate & occasione ipsi oblata poterit: Gal. autem. 2. artis ad Glaucō. & 1. de compositione medicamentorum secūdum gen. maxime laudat emplastrum suum diacalciteos, quod & phœnicinum appellauit. iuniores uero Latini, & Arabum multi diapalma. præsertim uero si ex rosaceo resoluator. digerit enim ex adipe ueteri & oleo. refrigerat ex rosaceo & spuma argēti, astringit ex calcitide & rosaceo: præsertim si sit omphacinum olsum, & ex palmæ succo. desiccatur uero

ro sine morfu & dolore, quamuis enim caleitis sit acre medicamentum, & per se dolorosum asperumque: aliorum tamen mixtura lenitur eius asperitas: mihi vero præcipue probaretur eius vsus ad arcendas repellendasque & partim digerendas, in vulneribus & vlceribus, inflammationes: nam & ad curanda vlcera, ea exiccando detergendoque, & ad arcendas inflammationes: siue ante inceperint, siue etiam nondum coeperint, sed timeamus earum superuentum. De medicamentis autem opportunis in vigore non est cur multa dicam. cum enim eo tempore dolores magis infestent, concoquentibus & dolorem sedantibus res tractanda erit, de quibus aliqua paulo superius diximus. post vigorem vero digerentibus attenuantibus præcipuus locus erit, & quia, vt Gal. 13. meth. dixit, inclinantis inflammationis similis, vel eadem ferè curatio est, quæ & scirrhi. & Auicenna non absque ratione eo tempore laudat vnguetum, quod basilicon diximus appellari, de quo sicut & de diacalciteos superius, quantum satis videbatur esse, actum fuit. præterea vero & diachylon: ytraque vero digerendi insignem vim habent, arque etiam molliendi: præsertim vero diachylon; de quo inferius & sermonem suum sumus habituri, præterea vero & oleum anethinum, chame-melinum, liliaceum & id genus alia. Quod si inflammatio in maturationem potius & suppurationem, & tandem in abscessum, quam in digestionem inclinet, alia erit curationis ratio ineunda. Nam illis erit agendum, quæ pus mouere possunt: præsertim vero in inflammationibus externarum partium. quia inflammationes internorum viscerum, cum in abscessum & suppurationem vertuntur, transeunt in aliud grauius etiam & difficilius genus morbi: nempe in vlcus, vnde pulmonum inflammationes, cum suppurantur in tabem vel phthisim, hoc est in vlcus pulmonis: pleuritis vero, primùm in suppurationem, vel vt Græci appellant, *πνευμονία*, & tandem in phthisim. de inflammationibus vero internis capitis, ventriculi, iocinoris, & aliorum viscerum, cum suppurantur, & tandem rumpuntur; non est cur multa dicamus, nemo enim ferè non nouit, quanta afferant pericula: vnde quam maxime in illis incumbendum est, quo minus suppurentur. illud vero fiet uacuationibus & reuulsionibus fortioribus, tenuissimo uictu, repulsoiis medicamentis, & reliquis, quorum hætenus satis copiose meminimus. in partium autem exteriorum inflammationibus curandis, non erit adeo remittendum maturationi & suppurationi, sed cum naturam propensam

in id viderimus, adiuuanda erit, vt citius & facilius suppurentur. Medicamenta vero quæ huic officio idonea sunt: nempe puri mouendo, ea sunt, quæ vt quinto de simplicium medicamento. facultatibus docuit Gal. temperaturam similem & conformem habent: cum humano corpore. pus enim præfertim illud quod in abscessibus exorandum est, nempe quod bonum est, opus est caloris natui imprimis & præcipue: quare medicamentis suppurantibus calorem excitari oportet, qui calori humano similis sit temperie, & proinde etiam alia medicamenta in aliis corporibus ad faciliorem & promptiorem suppurationem idonea erunt, & illum pro diuersis corporum temperaturis. simile ergo corpori in caliditate erit medicamentum, quod pus sit excitaturum, quia vis & copia natui caloris augenda est non autem qualitas, quatenus autem ad rationem substantiæ pertinet, ea quæ ἰσχυρά à Græcis dicuntur, huic muneri imprimis apta sunt. hæc enim cum obstruant inconspicuos cutis meatus per quos diffatur corpus, spiritus includunt, vt non digerantur, qui suppurationi velociori auxilio sunt. calida ergo medicamenta temperato calore erunt apta suppurandis abscessibus, quod & Hippo. testatus est. 5. aph. vbi ait quod frigidum prohibet: calidum vero suppurationi promouendæ idoneum in omnibus, præterquam in vlceribus putridis, & illis quæ ad huc à fluxione humorum tentantur fouenturque. in his enim id genus medicamenta putrefaciunt magis & fluxiones maiores concitant: præsertim vero, cum id genus medicamenta calida sint, uerum, ut Gal. 5. meth. ait, & humida, sint oportet. Nam cum puris generatio non solum à natuo calore, quamuis cum probum pus est, natiuus sit superior, uerum & extraneus accedit, & ideo quoquomodo putrescit materia, quæ in pus transmutatur: quare citissime medicamentis solet moueri pus, quæ calida & humida sunt. Sed de his tandem & particulatim agendum est: foris ergo inflammatæ partis ex aqua tepida, item ex oleo tepido maturo & dulci, vel etiam ex utrisque mixtis tanquam accommodata remedia ad suppurandas inflammationes à Gal. tum 5. de facultatibus simplicium medicamentorum, tum vero secundo artis ad Glauc. & quarto metho. habita sunt, item de coctum ibisci seu altheæ. composita uero huic muneri accommodata sunt: in calidioribus & feruentioribus, cataplasma confectum ex aqua, & oleo pari mensura coctis, atque tanta farina hordeacea in spersa, quanta satis sit ad constitutionem mollis emf lastri, in illis au-

tem

tem quæ non adeo feruent, mirifice pus mouet, simili modo confectum cataplasma: sed ex triticea farina. & hoc quidem magis suppurationem mouet. ex hordeacea vero farina, aliquantum etiam inflammationem repellit. Sed panis etiam qui nõ sit vehementer coctus, si ex aqua & oleo subigitur & coquatur, & modice calidus apponatur, aptum erit medicamentum. verum hoc ex fermento & sale præter maturandi, vim habet etiam non parum digerendi; ad facilem ergo suppurationem eligendus est panis non plurimum coctus; quia vt eodem quinto de facultate simplicibus medicamentorum Gal. testatur, panis quo magis coctus fuerit, maiorem vim exiccandi habet, & proinde aptior est inflammationibus, quæ concoctu sunt difficiliores, qui vero modice est coctus, calidioribus & feruentioribus. Sed & quo plus olei adicitur, eo etiam valentius ad suppurationem adducit cataplasma ex pane, velex farina etiam: quò vero minus olei, & plus aquæ, eò feruidioribus inflammationibus vtilius erit. ita etiam quò farina triticea purior & surfurum magis expers, itemque & panis aptior ad pus mouendum erit. Adipes quoque suppurandis inflammationibus viles sunt, non tamen omnes pariter, aptissimi enim sunt: primum suilla, mox gallinacea & vitulina; reliqui vero, vt sunt tauri, capræ, leonis, pardi, & id genus aliarum siluestrium animantium magis digestionem, sicut & oleum vetus, quam mouendo puri sunt apti. picem autem & resinam posse pus mouere, eodem quinto de simplicium medicamentorum facultatibus. tradidit Galenus, si quidem ex oleo liquentur: communiquidem & recenti quando feruidiores fuerint inflammationes. sed si frigidiores, aptius erit oleum cicinum, vel raphaninum, vel oleum vetus. Medicamenta vero quæ ferè vulgo in vfu sunt ad maturandos calidiores præsertim abscessus, in hunc sanè modum solent parari. Nam manipulum foliorum maluarum ex aqua coquunt, moxque in mortario terunt, additaque axungia suilla recenti salis experti pari ferè pondere, cataplasma componunt, cui non nulli & parum croci addunt nempe dragmam; valentius erit: si acceperimus radicem Ibisici, seu altheæ, & foliorum maluarum coctarum singulorum tantundem atque ex axungia suilla contritis omnibus molle confecerimus cataplasma. quidam etiam coctas radices liliorum alborum vnam nempe, vel alteram prædictis addunt. in illis vero, in quibus difficilior est suppuratio & alia addunt. coctis enim foliis malinarum radicibusque altheæ & liliorum, illisque tritis in mortario &

adiecta

adiecta axungia ex farina .seminis lini & tritici singulorum quantū videbitur satis esse pro emplastro cōficiendo cōficiūt medicamētum , eas enim subigunt ex decocto prædictarum rerum , mox illis radices tritas & axungiam commiscent in compagem mollis emplastri . nonnulli vero & caricas pingues cum alijs commiscent coquendas , teruntque . Hęc autem ex multis collegimus , quæ etiam in maiori vsu his nostris temporibus esse solent , quæque pro præsentī nostro instituto putauimus posse esse satis, & tanquā exempla aliorum malorū quæ confici possunt . nam in hac tractatione plus fortasse, quam par esset videmur esse vagari : Suppurato autem abscessu , duplex deinde reliqua est eius curandi ratio altera quidem qua abscessus aperitur , vel sponte sicuti quando pus sibi ipsi viam facit erodens cutim superpositam & quasi erumpens , quod accidere sæpe solet quando in externis & summis partibus statim cuti subiectis attollitur inflammatio , raro autem quando in alto suboritur . Nam & plerunque materia calidior & tenuior solet ascendere ad externas partes versus cutem ; crassior vero in profundum potius decumbere . Vnde in emplastris maturantibus abscessus , quando profundiores sunt , solent medici , vt

facilior fiat apertio , vel vt diximus sponte sua , vel per incisionem , vel per medicamenta , quæ ruptoria vulgo dicuntur , maturantibus emplastris aliqua commiscere , quæ materias in abscessibus contentas attenuent , & e profundo versus cutem attrahant . addunt vero plerunque fermentum , quod magis attrahit , quod fuerit vetustius . In hac autem curationis ratione , vt morbi ratio mutatur : nam inflammatio in vlcus apertum transit : ita etiam curatio : curandus etenim postea nouus is affectus , quomodo vlcera sunt curanda , de quibus copiosa etiam oratione superius tractatio fuit instituta . & hanc curationis rationem plerunque , aut fortasse etiam semper medici , qui nostris his temporibus chyrurgi nuncupantur , sequi solent . raro enim non procurant vt pure confecto aperiat abscessus . Altera vero curandi istiusmodi abscessus ratio magis Galeno . 13. methodi probari videtur . nempe ne statim ad abscessum aperiendum accurramus . Sed potius , vt quantum fieri potest , experiamur : si medicamentis attenuan-

Cap. 3.
Cap. 2.

Com. 1.

Cc tibus

eibus digerentibusque, & è profundo attrahentibus discuti possit latens pus citra incisionem, vel aliam alioquin apertionem. Nam facilius & minori cum molestia in hunc modum succedet curatio. voluit tamen & in usu horum medicamentorum medicum esse prudentem & cautum. considerata nempe prius diligenter natura ipsius affectus: quia si adhuc sint aliquæ in eo loco inflammationis reliquæ a fortioribus & acrioribus discutientibus omnino erit illi abstinendum, utpote quæ sint potius affectui irritatura, quàm pus discussura: sin autem nihil inflammationis sit reliquum amplius, materiaque subsit durior & ineptior, tunc apta & opportuna erunt valentiora & aciora medicamenta: sed horum mentionem faciemus, ubi de durioribus tumoribus sermo erit institutuendus. At vero cum ea est puris copia, ut potius vincat vim medicamentorum digerentium, quam quod ab eis vincatur, tum ad apertionem per incisionem vel vitionem ferro, vel medicamenti erit accedendum. Sed de his satis.

Com. 12.

transcramus nunc ad rationem aliorum tumorum per medicamenta curandorum.

De aptis medicamentis ad ignem sacrum recte curandum.

Cap.

21.

Tumor qui erysipelas a Græcis dicitur, ignis sacer à Latinis præsertim à Plinio nuncupabatur, quæ nuncupatio à multo incendio quod percipitur est deprompta, sicuti Græcis a rubedine quæ vicinas partes corripit: Est autem biliosus tumor atque a materia biliosa, nam a sola bile, aut a sanguine tenuissimo & effervescenti, atque ita ad naturam flauæ bilis accidenti, aut a sanguine cum copiosiori flaua bile mixto, excitatur. cum enim bilis sincera copiose fluens, ad cutem labitur (nam solius cutis sunt hi affectus) & illa naturali sit aliquantisper crassior, non tamen admodum aeris, aut sanguis tenuissimus & feruens, sit exquisitum erysipelas, quod citra conspicuum cutis tumorem sit, Si vero bilis acrior admodum fuerit summam cuticulam (Epy demida vocant,) serpendo excoriat ulceratque, & herpes proprie affectus dicitur, sed si acrior adhuc sit, & crassior, non modo cuticulam, sed & profundius cutem ipsam, usque ad subiectam carnem exedit, herpesque estiomenos hoc est exedens dicitur: herpes vero quia prioribus relictis ad alias partes serpat. prior vero herpetis differentia, miliaris dicitur, propterea quia efflorescant quædam veluti vesiculæ similes granis milij. fieri autem hunc affectum dixit Galenus in lib. de tumoribus ex 14. methodi cap. 16. præter naturam, vel ab exquisita & tenui bile, vel potius ex ea prompta cum tenuicare pituitoso. at cum sit mixta fluxio ex bile & sanguine præsertim tenui & calido, erysipelas dicetur. Nam raro contingit ut testatur Gal. quod fluant humores in aliquam partem omnino sinceri & alijs impermixti. Cum vero inflammatio ex sanguine non uitiatum ortum habeat, vel ex eius parte crassiori, ideo in maiorem tumorem particulam attollit, ita ut profundior in carne sit tumor, qui est si cutem possit attingere: præsertim tamen carnem cuti subiectam apprehendit. erysipelas vero, cum ex tenuissimo humore sanguineo, vel bilioso ortum habeat: imprimis cuti heret, parum autem vel nihil carnis subiectæ corripit: immo exquisita dicuntur erysipelata, vel herpetes, cum non descendunt ultra cutem. Nam cum descendunt, crassior est humor aliquis intermixtus: Vnde si-

.1. de diff.

1. de diff.
mor. c. 12.

.2. de diff.

cut mixta est fluxio, ita & mixta est natura affectus. Si enim sanguis non ille tenuissimus, qui cum bile conformis est, sed crassior ex quo fieri solent inflammationes, erit affectio composita & mixta ex erysipellate & inflammatione & pro varia ratione mixturæ, ita nunc magis in inflammationem, alias in erysipelas uergit, & ita appellabitur, aut erysipelas phlegmonosum, aut phlegmone erysipelatosa. & quo magis ad naturam erysipelaris accedet eo minus cutim in tumorem attollet, & quo magis ad inflammationis naturam inclinabit longe maiorem tumorem faciet. Quia vero biliosus est affectus, ideo rubet quidem, sed rubor in flauitiem degenerat in erysipellate: in inflammatione vero, obscurior est, rubor serè in puniceum vergens, & quia erysipelas ex tenuissima fluxione fit, ideo cum digitis locus affectus premitur, rubor delitescere videtur; & paulo post iterum redire, in inflammatione autem non item. Sed & illud prætermittendum minime est, quòd in inflammatione dolor maior est, & maior distentio & compressio, utpote quia a crassiori humore oritur, in erysipellate maior calor, neque ita eum pulsu est erysipelas, ut inflammatio. Quemadmodum autem refert Galenus tertio libro in tertium epidemia aliquando erysipelas satis facilis est morbus citra ullam malignitatem: & periculum: modo in ratione curandi non committatur error aliquando vero malignus & pestilens affectus est, quæ quidem diuersas à ratione, & natura materię confluētis ad affectum locum imprimis occasionem habet. Nam & si in tumoribus præsertim vero calidioribus, materia vnde illi excitantur inclusa & inculcata in ipso loco affecto, interdicta diffusione, aliquam ut paulo ante dicebamus contrahat putredinem; Vnde & acrior & calidior etiam euadit. interdum tamen & antequam deflueret & reciperetur in affecta particula putrem aliquam qualitatem vel naturam secum affert, quam etiam ob rem ut malignior acrior atque deterior est, ita maligniorem reddit affectum. hoc enim nos idem Gal. docuit nono de vsu particularum, vbi ait, quòd cum excrementa diutius intercepta excretionē retinentur, computrescunt, & acriora deterioraq; sunt, a quibus pro diuersa eorū natura, & rōne, cū ab expultrice facultate aliquò pelluntur, diuersos cōcitant prauos affectus, ut sunt herpes erysipelata, carbunculi, cancri, & id genus quā plura alia. Vnde 3. lib. in tertium epid. hoc longe clarius exposuit vbi ait erysipelas a biliosa

Com. 1.

Cap. 1.

Com. 3.

à biliosa fluxione oriri, quæ si talis sit, qualis naturaliter gignitur, nullum ferè damnū: si modo recte tractetur solet afferre. interdum vero malignior ea bilis ex putredine fit, quæ erodens est, & putrefaciens, quod in pestilentibus quibusdā tempestatibus solet acciderè, quando multa regnat humiditas aerisq; tranquillitas, cū aer nullis perflatur ventis. cui incōmodo illi plerunq; sunt obnoxii, qui sua sponte solent plurimā bilem generare, aut qui eam victus rationem sequuntur, quæ generandæ bili magis apta est. male vero cū illis agi solet, vt 7. aph. testatur Hip. in quibus erysipelas prius quidē extorsum erumpere videtur, mox vero intorsum conuersum delitescit. contra vero bene res succedit, si ab interioribus extorsum conuertatur. malum ē est erysipelas, vt idem 7. aph. ait: quod vbi os detectum est superuenit. malum item si in putredinē & supurationem vertatur. verum non est hoc primum nostrum institutum, vt de his exquisitè differamus: sed solum quatenus nobis ad expositionem rationis eorum medicamentorū possit satisfacere, quæ idonea nobis ad curanda erysipelata possint satis esse. Si quis eam recte perpenderit, quæ hætenus exposita fuere: facile poterit percipere, non vnā ac simplicem indicationem, sed plures & diuersas esse illi necessarias, qui recte curare voluerit erysipelata, & in illis curandis apta & accommodata eligere & componere medicamenta, illisq; appposito vi. quæ tamen multiplicitas & diuersitas à variis differentiis, quibus distincta est erysipelatum ratio, vel à diuersis ac variis conditionibus & circumstantiis, quæ in erysipelate sunt animaduertendæ, quæ varias etiam habent indicationes, ortum habet. Nam quædam cum cæteris tumoribus communia habet, quædam cum inflammatione duntaxat. præterea interdum ab aliqua manifesta, vel procatarctica causa ortum, vel occasionem habet. interdum vero à nulla tali occasionem habet, sed vniuersam originem suam ab interna & antecedente causa ducit, sponteque oritur. item quandoque simplex & exquisitum est erysipelas solumque ferè cutim afficit: non nunquam vero mixtum secundum naturam est; & est inflammationis, aut edematis, aut scirrhi particeps, quatenus non est simplex biliosa fluxio sed mixta. item aut est cum vlcere sicuti herpes est, aut citra vlcus, vt exquisitum erysipelas. præterea vero interdum cum malignitate est, non nunquam, immo sæpius, citra illam. sicuti ergo diuersa est erysipelatum ratio, ita requirit

Aph. 25.

diuersam curationem diuersorum que medicamentorum vsum. Sed negotium hoc magis particularim, & ex methodo tamen tractemus, & primum tanquam fundamentum ponamus erysipelas ortū habere ex fluxione biliosa, vnde quatenus ad eius curationem pertinet, subiectum erit communi & generali methodo eorū oīum affectuū, q̄ à fluxione excitatur. statim ergo examinādū erit, an eius modi fluxio vnde concitatum est erysipelas desierit iam, vt quidquid fluxurum erat iam fluxerit, an vero fluat adhuc humor incretcatū & adhuc foueatur affectus. Nam si iam constitit fluxio, nec aliquando foueatur: sicuti sæpe in illis solet accidere, quæ ab aliqua manifesta, & procatarthica causa habuere occasionem, non autem multa cacochimia seu copia vitiosorum humorum congesta sit, vel vniuerso corpore, vel in aliquo interno viscere: simplex erit & facilius curatio, qua duntaxat affectui ipso tollendo per indicationes illas duntaxat, quas nobis offert ratio & natura affectus, de qua paulo post sumus sermonem habituri. Sin vero occasionem habuerit internam a multa biliosi humoris copia congesta in vniuerso corpore aut in aliquo interno viscere, procedatque ulterius fluxio, a qua foueatur & augeatur affectus, non erit omnino tutum curare erysipelas: præsertim vero inter initia propria & priuata ratione curandi erysipelata: nempe per refrigerantia & repellentia, ne introrsum conuertatur erysipelas, & ad aliquam præcipuam particulam recurrat: quod maxime cauendum si malignitatis particeps videatur affectus, vt in pestilentibus cōstitutionibus. Sed erit opus procurare prius, vt fomentum illud subtrahatur, & vniuersi corporis ratio habeatur, vel illius visceris in quo consistit fluxionis & fomenti occasio, quod non nisi vacuatione erit agendū. & siquidem fluxio omnino biliosa fuerit, non erit, ait Gal. 1. 3. meth. 2. ad Glaucon opus missione sanguinis: sed potius purgatione per ea medicamenta, quæ bilem detrahunt: si multa fuerit copia fluētis humoris, & vires & ætas eam vacuandi rationem ferre possint, alioquin autem acrioribus clysteriis res poterit transigi: Nam subtracto fomento & remotis causis fluendi, poterit institui curatio quæ priuatim accommodata est erysipelati, accepta a propriis indicationibus & scopis qui particularim a propria natura & essentia ipsius affectuserunt depromendi. De quibus nunc agemus sequuti antiquorum medicorum decreta, præsertim vero Hipp. & Galeni. erysipelas itaque cum in tumorem genere sit, exciteturque a mate-

ria biliosa tenui quidem quatenus ad substantiam, feruida vero & plurimū calida quatenus ad qualitates p̄tinet, cruciet vero lōge magis calore & feruore q̄ corpore vel copia: neq; n. vt idē Gal. lib. 14. meth. c. 2. & 3. ait, tāta sit distētio, vel ēt cōpressio, vel grauitas in parte: sicut in inflāmatione, maius tñ incēdiū & maior feruor, i vtrifque tñ est, & plenitudo affectū particulā, ex infarcta materia quæ fluxit iam, & calor vehemens. Vnde primi scopi insurgunt euacuan dā esse materiā replentem locum, quia propria eorum curatio: quæ à replente humore concitatur, est illius euacuatio. præterea vero & alter scopus est, quod sit ēt refrigerandum propter molestiā ex ardore. & hi quidē scopi, tā inflāmationi, quam erysipelati cōmunes sunt: nili q̄ hæc intercedit differentia, q̄ inflāmatio non tantum ex insigni calore dolorē affert: sed adeo etiā magis & distentione & compressione a multa & crassiori materia inculcata & infarcta, erysipelas vero, nullam nisi e calore & feruore molestiā affert, quia non excitatur a crassa: Sed a tenui potius & leni, verum feruētī materia. vnde vt 13. meth. refert Gal. in inflāmatione indicatio vacuationis: si cum erysipelate conferatur, vincit refrigerationis indicationem: contra vero in erysipelate, indicatio refrigerationis vincit eam, quæ est vacuationis: refrigerantibus ergo medicamentis præsertim vero inter initia curanda sunt erysipelata, vt extinguitur fluentis materiæ feruor: ille enim est qui præsertim cruciat, & aliquantisper incrassetur, vt fluxioni ineptior reddatur. refrigerandum autem est ad mutationem vsque coloris. cum enim iam liuere locus affectus incepisse visus fuerit, atque adeo etiā magis si nigrescere incipiat, a refrigeratione desistendum, quia iam desinit esse erysipelas, & in alium affectum degenerat: & proinde etiā neque eo tempore exquisiti erysipelatis curationem requirit. Sed antequam hoc negotiū magis particulatim tractemus, illud in memoriā reuocandum erit, quod paulo ante fuit expositū: nempe diuersam esse erysipelaum rationem, quia & exquisitum est erysipelas, & non exquisitum, & aliud cum vlcere est, quod ad naturam herpetis accedit, aliud citra vlcerē, & si quidem exquisitum fuerit & citra vlcerē quæcunque refrigerantia loco affecto particulatim apposita feruorem possunt extinguere: siue actū frigida fuerint, siue potestate, apta erunt: medicamenta istius generis sunt solanum, semperui uū, portulaca, vmbelicus vencers, pulicaria herba, seu psyllium, altercus seu hyosciamus, lactuca, intubus, palu-

stris lenticula. Sed & acetum multa aqua mixtum actu frigidum as-
persum, vel ex inadido lintheo, uel spongia appositum, ceratum itē
ex frigida aqua, sæpius refrigeratum. Nam hoc illis omnibus com-
mune est, quæ actuali frigore præsertim agunt, ut frequentius sicut
incallescunt, immutentur aut refrigerentur. potuissimus autem &
aliorum multorum meminisse, quæ refrigerandis erysipelatis es-
sent idonea: nam & folia papaueris, mandragoræ & multa alia: ve-
rum longiores, quam proposuerimus videre inur. hæc enim tan-
quam exempla proposita sunt, reliqua vero ex Gal. Paul. Aetio, &
alijs, qui de materia medicinali scripsere, quorum monumenta
omnibus in promptu sunt, colligi possunt: sin autem erysipelas,
cum ulcere sit, utpote quod potius ad herpetis naturam accedit,
immo herpes iam est, refrigerantibus etiam num erit agendum.
Sed de hoc paulo post agemus. crit ergo refrigerantibus tractan-
da curatio erysipelatis, quod sine ulcere est. Attamen ubique
Galenus, ubi de hac re sermonem habuit, videtur: Si sit ery-
sipelas a procataretica & manifesta causa excitatum, ubi nulla
sit suspitio quod fomentum habeat ab interna & antecedente cau-
sa, audacter ad refrigerantia statim accedere: Sed ubi sponte, & ab
interna causa ortum habeat, suspectam omnino habere hanc cu-
randi rationem, neque ideo ut quisquam temere aggrediat, au-
det consulere, ne fluxio repulsa ab his medicamentis recurrat in-
terius ad aliquod viscus maioris momenti: Sed potius monet, ut
prior curatio atque maior illius pars conuertatur ad vacuatio-
nem vniuersi corporis, ut detractabile, fluxio intercipiatur, &
erysipelati subtrahatur fomentum. cui sententiæ innixus, cum sæ-
pius præfuerim curationi erysipelatum, rarissime tamen immo
nunquam, dum mihi res vniuersa stetit, ausus sum curare per
hæc externa refrigerantia, quia timebam ne impediretur exitus,
vel expulsio morbosæ materiæ, quam a natura intenta expurga-
tioni & expirationi sanguinis, & custodiæ internorum visce-
rum, ad cutem & externas partes ab internis visceribus excre-
mentis propulsis moliri solet, neque animaduerti vnquam ali-
quod accidisse incommodum ipsis egrotantibus: præterquam
quod interdum aliquantisper longiore euadebat curatio, sed se-
curior: cum tamen sæpe viderim multos, quibus adhibita
fuit curatio per hæc refrigerantia, maxima etiam vitæ subiisse
pericula. Nam neque videre possum quid mali impendat,
quando

quando natura valide expellit : si expellere sinamus , & interim interius & victus ratione , & medicamentis ; ut sunt syrupi , vel decocta , ietur sanguinem & corpus vniuersum refrigeremus ; neque id solum seruari : si exquisitum esset erysipelas ; sed etiam si inflammationis particeps , in quo quidem longe promptior , vt etiam consuluit Galenus in mittendo sanguinem eram ; & de his quidem hactenus . Vbi vero medicus utitur curandi ratione per frigida medicamenta , & cæperit mutari color , & iam liuere inceperit locus , non solum extinctus est calor : sed transmutatus est affectus in aliud genus , & materia degenerauit in frigidum humorem , vt proxime ad naturam scirrhī accedat ; immo , nisi ratio medicamentorum mutetur , iam nigrescente & indurescente loco , erit scirrhus . quare vbi ardor inclinet , ait Galenus , non erit amplius frigore aduentitio opus , nempe vt frigida aqua , aut niue refrigerentur medicamenta , immo & a succis herbisque valde frigidis erit temperandum , sed moderatioribus vtendum . quin etiam magis adhuc inclinante affectu , ad vsum seminis lini & chamaemeli transcundum : immo ad diacalciteos appellati emplastri , non ex rosaceo liquati : sed potius ex oleo per se . & præsertim hæc curandi ratio obseruanda , quando non exquisitum fuerit erysipelas : sed quod sit inflammationis particeps . in quo statim etiam a principio congrueret vsum istius emplastri diacalciteos , verum liquati ex rosaceo & refrigerati ex alijs refrigerantibus medicamentis , vt pote si in mortario contundatur affuso succo solani aut psyllii , aut succo acerbæ uux expresso ex ea simul cum portulaca , aut semperuiuo contusa . Nam uux acerbæ succus per se adhibitus , non esset idoneum medicamentum , ut quod supra quam impræsentia opus esset astringat . ex portulaca autem , sola difficilis est succi expressio . At & in hoc non simplici affectu magis animaduertendum , & procurandum ne vbi inclinare cæperit , in scirrhū vertatur , quamuis neque in exquisito hoc negligendum sit . immo . 14. meth. Galenus vt hoc incommodum effugeret , statim vt ardor remittatur , opportunum fore vsum ait cataplasmatīs facti ex hordeacea farina , de quo superius fuit habitus sermo , anteaquam liuere locus incipiat : Quod si iam liuere cæperit , etiā prius præcidendam scalpello cutim esse consulit , moxque cataplasma inponendum , atque sepius

Cap. 4.

pius fouendum locum aqua calida, ne materia induretur, sed facilius attenuari & digeri possit, & interdum ad maiorem exiccationem & digestionem aqua marina, vel salsa, & aliquando si cataplasma ex aqua marina addito aceto & hordacea farina conficeretur optimum esset medicamentum. De herpete vero non est cur multa dicamus, cum iam in vlceribus sit, sicuti & erysipelata quando aut suppurantur, vel exulceratur. sed nobis satis erit, sitantuni genera les quasdam summas exposuerimus. in vniuersum ergo eadē est rō curationis istorum affectuum: præsertim inter initia, quæ & erysipelatum, cum à similibus excitentur causis: vnde in his quoque inter initia corpus inaniendum, aut purgatione si sit exquisitus herpes, aut & missione sanguinis, vt fluxio intercipiatur, uel reprimatur. quandoque vero, si multus sit sanguis in vniuerso corpore, vel ex vitioso sanguine assato ortum herpes habuerit, non erit etiam ab re sanguinem mittere. & quatenus ad externa & localia pertinet, cum calida & quasi feruens sit fluxio, indicat valide esse refrigerandum, & non minus quam in erysipelate: præterquam quod non eadem ratio medicamentorum vtrisque accommodari recte potest, quia aliquid in herpete est, quod diuersam habet indicationem. Nam vlcus est, quod & ipsum à calida intemperie suam seorsum indicationem habet. vlcera. n. exiccantibus medicamentis sunt curanda, vnde neq; portulaca, neq; lactuca, neq; solanum, neq; semperuiuū, neque aliud quidpiam quod refrigeret & humectat aptum erit medicamentum: Nam quamuis solanum non sit expers alicuius sic citatis, non tamen illa tanta est, ut possit esse satis. sicut palustris lenticula, neque psylum neque seris. sed illa erunt apta his curandis, quæ refrigerant & desiccant, que madmodum plan tago, folia, & germina rubi, aut canini rubi, aut capreoli vitis, & cum vltius res progreditur, & lens in vsum venire poterit, ait Gal. cataplasma ex hordacea farina & melle: sed hæc expositio & aptior esset illi capiti, vbi de exedentibus vlceribus erat instituta tractatio. unde hic consistemus, & ad aliam differentiam. tumorum calidorum transibimus.

De tuberculo, furunculo Bubone, phygethlo, & carbunculo. Cap. 22.

AD genus calidiorū tumorū referēdi illi sunt, qui ^{ῥῥῥῥῥ} à Græcis dicuntur, Celsus vero tubercula nuncupauit, quique ^{ῥῥῥῥῥ} quos furunculos idem appellat, Arabes vero aldemenus, bubones quoque, item & ^{ῥῥῥῥῥ} quæ panos latine putauit Celsus dicenda esse, carbunculi quæ, quos ^{ῥῥῥῥῥ}, Græci, prunam & ignem persicum vocauit Auicenna. imo vtro in commune inflammationum genus hæc deducenda sunt, quæ omnia sunt veluti scaboles calidæ fluxionis, quæ occasionem habet à viti osis succis plerumque ex mala victus ratione in corpore congestis, præcipue verò à vitioso sanguine. Differunt autem vel ratione loci in quo constitit fluxio, vel ratione naturæ fluentis humoris. Nam bubones quidem vt Gal. tum. 13. meth. tum vero 2. lib. artis ad Glauc. inflammationes illæ dicuntur, quæ in adenis seu glandulosis exoriuntur partibus: in inguinibus præcipue: sed & sub alis & secundum aures, loca hæc iuniores nostri cū Clorion nuncuparunt, vt pote quæ ea sint, in quæ membra præcipua, vel interna viscera, quasi emungant, hoc est ex eant, ex aliqua interna, vel externa occasione in eis congesta excrementa. Nam capitis quidem excrementa à cerebro plerumque solent post aures relegari, à corde vero & pulmonibus, sub alas, naturalia autem viscera ad inguina impellunt, quamuis sæpe & ab vniuerso corpore propulsa materia ad has partes, hæc glandulæ in tumorem confurgunt, vt pote quæ aptiores sint ad admittenda id genus excrementa, cum & imbecilliores & laxiores à natura factæ sint. vnde harum partium inflammationes duplicem habent generationis modum. quandoque enim ex labore, vel dolore in artibus, vt ex infueta & laboriosa equitatione solent concitari bubones in inguinibus, & quandoque si quis ex aliquo dolore sit factus claudus & claudicando cogatur ambulare: præterea vero in scabie, dum copiosa materia expulsa ad crura vel brachia versus cutim, ex qua papulæ efflorescunt, interdū sub alis, non nunquam in inguinibus, repletis in transitu glandulis illis, fiunt bubones, & in vlceribus, quibus infantes exerceri solent, quæ faui appellantur, solent hac eadem ratione partes penè aures intumescere. Sed & in vlceribus, in manibus cruribusve: præsertim si fuerint prope aliquod magnum vas, nempe venam vel arteriam, vt & Gal. 13. meth. tradidit, citissime attolluntur bubones, & sæpe uena

Aph. 55.

Cap. 1.
Com. 16.
Com. 15.

vena quoq; ex ea fluxione calida rubra, tenſaq; apparēt per totū il-
 lud membrum, quæ ſi prematur, ēt dolet, & qui ex aliqua ſimili cau-
 ſa manifeſta excitantur bubones, non admodum mali ſunt, neque
 aliquam malignam præſeferunt naturam, & plerique ſine febre ſal-
 tem inter initia ſolent exoriri: niſi interdum aliqua excitetur
 ephemera. Qui verò in febribus, aut vnà cum febre putri-
 da exoriuntur, mali ſunt, malignitatis etenim febres ſolent eſſe rea-
 ſtes, quod animaduertit & Hippo. 4. aph. vbi ait, febres omnes ex
 bubonibus malas eſſe, exceptis ephemeris. ait vero Galeam ob cau-
 ſam malas has febres eſſe, quia à viſcerum inflammationibus fouen-
 tur. vnde maxime in malignis & peſtilentibus febribus ſolent extu-
 berare inflammationes, hæ, quæ vulgo dici ſolēt inguinariæ: & non
 ſolum in inguinibus, ſed ſecundum aures & ſub alis: & quamuis bu-
 bo proprie ex vi vocabuli ad inguina referatur, Galea tamen omnes
 harum glandularum inflammationes 2. lib. artis. cur. ad Glaucō. &
 13. meth. bubonum communi nuncupatione comprehendiffe viſus
 eſt. quamuis quæ poſt aures oriuntur proprium nomen ſint ſorti-
 tæ, & parotides dicuntur. in eiſdem vero glandoſis partibus ſolent
 oriri, ſi Gal. credimus, phyma, quod tuberculum appellari diximus,
 & phygethlon, quamuis in quinto de compoſitione medicamentorū
 ſecundum loca, in facie fieri phymata dixerit, & cætera quæ ad
 hoc genus pertinent, vt ſunt vari, quos ~~phyma~~ Græci vocant, &
 furunculi, quos furunculos appellauimus. qui quidem tumores ita
 differunt, quod tuberculi cito generantur, cito creſcunt, cito etiam
 ſuppurantur, vt ſecundo ad Glaucō. & 3. aph. expoſuit Gal. qui phy-
 mata, vel tubercula appellantur, & id quia à ſanguine calefacto ex
 bilis mixtura, vt idem 2. aph. ait, ortum habent: vnde rationem ha-
 bent inflammationis eryſipelatoſæ: furunculus autem ex ſanguine
 craſſiori. vnde non ita cito, ſed tardius creſcunt, & quamuis tandē
 ſuppurentur, tamen & ægre id faciunt. differunt præterea duritie,
 & figura. Nam duriores ſunt furunculi tuberculis, & magis in acu-
 tum attolluntur, cum tubercula ſint planiora. Quamuis in furuncu-
 lorum etiam genere aliqua ſit differentia. Nam aliqui ſunt, qui ad
 varorum naturam magis vergunt, vt pote qui & duriores ſint ac ad
 concoctionem difficiliiores: alii vero, vt quinto de compoſitione
 medicamentorum ſecundum locos tradidit Gal. magis ad inflam-
 mationis naturam prope accedunt, faciliusque ad ſuppurationem
 deducuntur, atque non nunquam non ſine febre oriuntur. phyge-
 thlon

thlon quoque cum his recenseri potest, parum enim à tuberculo diuersum est. in libro enim de tumor. præter. naturam ait, quod prope ad naturam inflammationis accedit & ipsum ea ratione, à tuberculis euarians, quod est illis adhuc calidius, & ortum celerio rem habet: vnde videtur ferè erysipelatosam esse inflammationem. Cellus autem ait esse tumorem latum non altum in quo est aliquid pustulæ satis simile, non nullos autem putasse ait Galen. phygethla tantum in inguinibus exoriri: Carbo etiam, vel carbunculus, qui à Græcis dicitur, & ipse in inflammationum genus potest referri, à feruescente enim sanguine crassiori, vt tum primo ad Glaiuc. tum vero in libro de tum. præter. nat. ait Gal. ortum habet. quamuis ille inter differentias potius vlcerum, quandoque retule rit carbunculos, & possunt sanè in vtrumque genus referri. Nam inter initia inflammatio est carbunculus, quæ à feruenti humore exulta cuti & subiecta carne cito in crustosum vlcus degenerat: Est autem duplex, vt eodem loco exposuit Gale. carbunculorum modus vel differentia. altera quidem, quæ oritur à calido sanguine & satis crasso, qui confertim in aliquam partem decumbens, eam exurens crustosum, vt paulo ante dicebamus, excitat vlcus, circumstantesque partes in inflammationem plurimum calidam cum vehementi admodum dolore attollit. Altera itidem à fluxione sanguinis nigri, crassi, feculenti, feruidiq; ortu habet: verum cui tenuis quidam ichor commixtus est, à quo bullæ quædam vel pustulæ similes illis exciuntur, quæ in ambustis ab igne fiunt, quibus ruptis succedit crustosum vlcus. modum vero, quo oritur is carbunculus. idem. 14. meth. ita descripsit: primum pruritu quodam locus tentatur. postea vero pustula aliqua subcrefcit, etiam dum à pruritu ferè coactus homo locum scalpit, palpulæ plures granis milii similes suboriuntur, quæ deinde suppuratæ rumpuntur, quibus subinde in ducitur crusta. vnde frequentius quidem crustæ in carbunculis oriuntur: non tamen semper. Nam in Asia, ait ipse, interdum gestiti sunt carbunculi pestilentes, qui statim citra aliquem pustularum ortum cutem exoriabant, quia vero multa est in hoc modo exustio. ideo crusta interdum cinerulentum, interdum atrum colorem refert. quia etiam potius à feruente sanguine crasso & alicuius exustionis particeps fiunt, non à bilioso: ideo licet summam cutem colore vitiet, tamen non eum habet colorem, qui erysipelas referat: Sed potius inflammationem: nempe subnigrum, vt si plurimo rubro parum nigri

Cap. 15

Aph. 50.

Com. 15.

nigri esset immixtum, vt quasi liuere videatur, cum quodam tamen splendore, vt & bitumen habet, aut pix. Nam bilis atra ad cuius naturam is ferè humor accedit, eum habet colorem, vnde etiam malignitatem carbunculi acceptam referunt. Nam aut ab initio statim arabilarius est, aut paulo post à nimio feruore exustus talis euadit sanguis à quo carbunculi excitantur: inde etiam fit vt maximam & acutissimam, sicuti ait Gal. 6. de compositione medicamentorum secundum genera, febrem adducant, & cum manifesto vitæ discrimine, vt pote quia ortum à vitiosa malignaque materia habuerint. pessimi vero & maxime perniciosi illi sunt, quibus natiuæ suæ malitiæ, alia etiam aduentitia à cæli mala qualitate accedit, quemadmodum in pestilentia solet accedere. huic enim attestatur experientia, & astipulatur Gal. 3. com. in 3. epide. Quod autem in aliis fecimus, in his quoque quorum hæcenus meminimus faciendum putamus, nempe vt anteaquam particulatim rationem compositionis & vsus medicamentorum ad hos affectus curandos exponamus, primum aliqua in vniuersum explanemus, vnde sint deinde indicationes depromendæ, quæ nobis ostendant scopos in vniuersa cu ratione spectandos. Hæc verò duo sunt, alterum, quod ad naturam affectus pertinet, alterum ad naturam loci affecti. Primum itaque quia omnes hi tumores, vt sæpius diximus, ortum habent à vitioso humore fluente ad locum affectum, & illum replente, essent omnes curandi per illius loci vacuationem. Sed quia res non semper eodè modo se habet: Nam interdum, quando curationem medicus aggre ditur, vniuersam vitiosam superuacaneamque materiam, quæ potest negotium facessere, vt Galen. 2. aph. docuit, iam ad affectas partes natura amandauit. interdum vero, licet pars defluerit: scate tamen adhuc corpus vniuersum superuacaneis vitiosisque succis. docuit vero Hippo. quam ratione discerni possit: expurgatū ne corpus an vero sit immundum & refertum malis humoribus. & ait obseruandas esse deiectiones alui, quia si biliosa fuerint ostendunt corpus impurum esse: sin autem similes sanis naturam demonstrant per eiusmodi tubercula excrementa exquisitè expurgasse: & quamuis de tuberculis duntaxat habere sermonem videatur, eadè tamen est, & reliquorum ratio. vnde eadem erit horum tumorum curandorum methodus, quatenus ad generalem rationem pertinet, quæ & aliorum paulo ante expositorum est, nempe vacuatio vitiosi vel superuacui succi, à quo particula in tumorem attollitur, & quia

quia id commodè nequit fieri manente fluxione, necesse est prius fluxionem reprimere & sistere, & id uel per sectionem venæ, vel aliam vacuandi rationem, quæ ut sæpius fuit expositum, vim reuelendi habeat, & fluxionis causam de medio tollere, de quibus in præsentia non est cur agamus, cum ad institutum præsens non faciat, quod versatur circa externa & localia remedia: unde eò conuertamus nostrum sermonem: & quamuis hoc sit tanquam commune theorema, quod defluxoriis morbis solet accommodari: nempe quòd inter initia sit repellendum: interdum tamen in istiusmodi affectibus aliquæ adiunctæ sunt indicationes, vel à natura fluentis humoris, vel à natura loci ad quem fluit, depromptæ, quæ vim maiorem habent, quam communis & generalis. indicationes uero hæc, & si à variis rebus occasionem suam habeant: Nos tamen duarum tantum in præsentia, ut quæ magis huic loco attineant, mentionem faciemus, prima autem est natura humoris unde tumor est excitatus: altera uero natura loci affecti. Nam si maligna fuerit natura fluentis humoris, pestilensque & venenosa, ut solet euenire in febribus, vel constitutionibus malignis & pestilentibus, non modo non est repellendum in initio, ut potius attrahendum sit fluens excrementum, ne repulsum, interius recurrat ad interna viscera. Altera uero est natura particulæ ad quam tendit fluxio. Nam quæ adueniunt à Græcis dictæ sunt; glandulosæ uero carnes à nostris, ea de causa imbecilles fuere à natura creatæ, ut excrementa amandata ab internis visceribus facile possent admittere, unde in his quidem quando cum febre putrida fuerint, omnes conueniunt nullo pacto esse repellentibus utendum: quia, ut ex Hippocratis sententia paulo ante diximus, hæc solent euenire in morbis malignis à mala materia excitatis. unde mala materia, quam natura nititur procul ab internis & præcipuis vlcibus exterius propellere, non est repellenda & retinenda interius. Sed statim ab initio digerentibus, vel etiam maturantibus res agenda est, & potius procurandum, ut recipiatur ibi, quam recurrat interius fluxio. qualia autem sint digerentia, vel mantrantia medicamenta, non est nunc cur exponamus cum priorè capite fuerint exposita. & ab hac ratione etiam non esse alienos bubones illos puto, qui post vlcera cariosa in pene contracta ex congressu venereo, solent in inguinibus exoriri, & sunt manifesta signa contractæ illius lois, quam nos galicam appellamus. quos nequaquam esse repellendos censerem, ne recurreret malignus succus.

Cap. 5.

succus, qui à naturalibus visceribus eò propellebatur, illa lōge magis afficiat, aut ad articulos conuersus dolores uehementes conciet, aut ad aliam aliquam partem, vt fauces, vel facies sunt, molesta, turpia, sepiissime etiam maligna adducat vlcera. vnde longe melius cum illis agi in his morbis videmus quotidie, in quibus suppurati sunt bubones, ac aperti diutius seruati, per ea etenim vlcerasti multa effluat vitiosa materia, per illam partem expiatis ab istis malignis excrementis naturalibus visceribus, non ita altas radices figit hæc lues. quare in his præstat prius probè expurgato corpore, maturantia, & pus mouentia experiri, vel saltē digerentibus rem agredi, quando ille, qui infectus est, nequaquam vult suppurationi acquiescere, à repellentibus autem omnino abstinendum. At vero si tumores communes sint, qui has glandulosas partes corripuit citra naturam aliquam malignam, & citra febrem, vt qui solent oriri quando vlcus aliquod fuerit prope insigne aliquod vas, præsertim si dolorosum fuerit, vel si ex labore aliquo, vel dolore ortum habuerint, sicuti in his qui claudicare coquuntur, aut qui non admodum assueti equitationi equo non sanè commodo vehuntur, vel ob similem aliquam occasionem bubones contrahunt. videntur præsci medici nō omnino inter se in ratione eos curandi concordēs esse. Galenim 13. meth. nulla repellentium facta mentione, nisi corpus plenum, aut scatens vitiosis fuerit succis, nam statim à corporis procuratione essent sumenda initia curationis, consulit primū illis esse agendum, quæ possunt dolorem sedare, cum inde præstita sit inflammationi occasio. præcipit ergo vniuersum membrum dolens calefacientibus & humectantibus medicamentis esse fouendū, atque adeo etiam glandulam illam, quæ inflammatione tentari cœpit. vnde instituit, vt hapso lanæ ex oleo calido madefacto membrū vniuersum inuoluatur, lanæque itidem prius oleo calido demersa foueatur. post principium autem, cum & tumor membri cœperit subsidere, & dolor mitescere, adiūci aliquid salis voluit ad digestionē fluxæ materię: interim vero vlcus & ipsum curandum medicamentis, quæ exiccent quidem, sed vim etiam concoquendi habeāt & maturandi cum leui aliqua astrictione quanta satis sit roborandæ particulæ. Quare laudat medicamentum id quod tetrartharmacum appellatur si rosaceo fuerit dissolutum, ex linamento autem appositū, vel illud etiam quod macedonicum nūcupatur eodem paratum, vt tamen supra illud medicamētum addatur cataplasma ex farina hor-

dei,

dei, vel tritici, vel vtriusque commixtis aquaë & exiguo oleo, de
feruefcente autem inflammatione, sensum a mitigantibus medica-
mentis ad digerentia transeundum. Vnde & oleo quo & inflam-
matio & vniuersum membrum fouebatur aliquantulum sal erit ad-
dendum, mitigatorio autem cataplasmati non nihil mellis erit im-
miscendum, & triticea farina detrahenda, relicta sola hordeacea,
semperque plus mellis addendum, atque semper ad digerentia ma-
gis transeundum: Sed quatenus ad rationem vsus pertinet, hoc ad-
dit Galenus quod in curandis bubonibus: præsertim si fuerint do-
lorosi, vtetur medicamentis mollibus & teneris, qualia sunt quæ
emmota a Græcis medicis dicebantur, quibus per linimenta vti so-
lemus, quia ab illis, quæ duriora sunt, qualia quæ antiqui emplastra
nuncupabant, leduntur irritanturque denuo inflammationes ex qui-
bus satis apparet, Galenum aliena omnino putasse repellentia à ra-
tione curandi inflammationes, glandosarum partium. Paulus ta-
men sup̄ medicinæ libro cui videtur subscripsisse Auicenna cap. de
alcoym. qui & propterea non caruit reprehensione, quia rationem
curationis, quam Paulus simplici buboni, qui a manifesta cau-
sa vt ab vlcere, vel ab aliquo dolore habet occasionem accommo-
dauit, ipse ad bubonem pestilentem & malignum transtulit. Sense-
re ergo hi bubones esse repellentibus inter initia curandos, si-
cuti & reliquis inflammationes; mihi quæ magis ratio Galeni
probat, & videtur tutor, neque de medicamentis, quæ his
tumoribus curandis accommodata. sunt longiorem sermonem
habebimus, quia alioquin eadem sunt, quibus & alix inflam-
mationes curari solent per digestionem, aut suppurationem.
Quare iam sermo conuertendus est ad rationem me-
dicamentorum exponendam, quibus apte carbunculi curari
possint, quorum generalem methodum 14. methodi Galenus
nobis descriptum reliquit. & cum non vnain & simplicem na-
turam habeat carbunculus, nam vel statim a principio, vt pau-
lo ante dicebamus, & si inflammatio incoeperit, degenerat ta-
men in crustosum vlcus & valde malignum: vicinæ vero & circun-
stantes vlceri partes inflammatione & illa feruentissima tentan-
tur, vt ferè exuratur in ea sanguis: Vnde & rubor quo sustulæ
sunt cum liuore est. Quamuis Auicenna malignitatem maiorem,
vel minorem in carbunculis & ex colore discreuerit. ait enim si

D d statim

Cap. 10.

statim rubeat carbunculus, moxque in luteum ferè colorem degeneret, minoris malitiæ erit: sin autem liuescat & nigrescat exquiritus iam erit carbunculus, & longe malignior, nam in priori assatur quidem sanguis: nondum tamen in atram bilem vertitur: Sed potius naturâ adhuc bilis flauæ retinet, in altero iam vertitur in atrâ bilē deterrimū humorē. Cū itaque ex humore facto crassiori per assationē fiant carbunculi, & eo omnino vitioso & malo, ideo omnes in hoc consensere à repellentibus abstinendum esse: & id duplici de causa: primum quia humor præ sua crassitie minime repellentibus cedit: Vnde nihil proficies: præterea si etiam esses profecturus, ratione malignitatis non est attentanda repulsio, nam non poterit malus humor repulsus nō afferre maiorem labem recurrēs ad interna viscera. Quare imprimis inter initia curationis, cū semper ferè adiunctam habeat febrem, & eam etiam plerumque malam, necessaria erit primum procuratio vniuersi corporis, & si in aliquo morbo opus videatur esse missione sanguinis: si nihil quidem adsit, quod illi possit obstare, in hoc maxime necessaria est, nec modo illa opus est, sed & liberalissima & copiosissima: ita ut vsque ad animi deliquium detrahi sanguinem Gal. consuluerit. ex tremis enim morbis opportuna sunt extrema remedia, & sicubi locum habet sententia Gal. 1. aph. descripta, ubi ait nullum se in febre ardentissima, in maxima inflammatione, & in vehementissimo dolore reperisse magis presentancum remedium, quam sit sanguinis detractio ad animi vsque deliquium. In hoc maxime effectu, si vires id patiantur, locum habet, cum & maxima sit inflammatio, & maxima febris, & vehemens dolor: sed hæc quasi *véry* dimittamus in præsentia, & particulatim de illis loquamur remedijs, quæ topica possunt communi quadam ratione appellari: non modo autem Gal. detestatur vsum eorum, quæ repellunt, utpote, quæ præter repulsionem constipent astringendo & refrigerando humorē crassum & in eo loco impactum, ut potius affectam partem præcidentem consuluerit multis incisionibus, adducto scalpello profundius, & id propter crassitiem humoris, ut euacuata eius parte aliqua, reliquum facilius dissiletur & possit melius a natura aduinstari. Sed quia non simplici natura constat is morbus, sed multiplici & composita, ideo neque vna est & simplex ratio medicamentorū, quæ requiruntur ad curationem. compositus enim est affectus ex vlcere

Com. 3.

ulcere, & eo quidem maligno admodum, multam referens ex putredine malignitatem, & præterea ex circumstantium partium inflammationem, & ea valde maligna. Vnde Galenus & ab hoc eodem affectu aliena omnino esse putat ea quæ puri mouendo sunt, aut vim concoquendi habent, utpote quæ putredinem fouere, & augere possint, cum potius omnino sit procurandum, ut arceatur, aut tollatur putredo. & quamvis posteriores Galeno, ut Paulus & Auicenna aliqua medicamenta ad carbunculos maturandos & aperiendos descripserint. sicuti est hoc. conficitur enim cataplasma ex ficibus fermentoque & sale. alii vero conficiunt cataplasma ex vitellis ouorum & sale. alii vero ex melle, triticea farina & sale & ouorum vitellis. In his tamen duo consideranda sunt, vnum quod ad naturam morbi pertinet; aliud vero ad naturam ipsius medicamenti. ad naturam quidem morbi hoc attinet, quod non est par in omnibus carbunculis ratio malignitatis. Nam cum ex assatione sanguinis confluentis ad excitandum carbunculum accidat vniuersa malignitas in hoc affectu: exustus enim conuertitur in atram bilem pessimum sanè humorem, dum assationis vero non est par ratio in omnibus, quod & colores ostendunt. nam crusta quæ tandem carbunculo inducitur aliquando aliquantulum ad flauum vergit, interdum cineritium colorem refert. interdum vero omnino atrum & luens perinde ut bitumen. ita & circumstantes partes, quæ inflammatione tentantur & rubent, interdum rubedinem habent cum quadam flauitie, interdum intermixta nigritie perinde, ac si aliquid nigri atramenti multo rubro esset intermixtum. Vnde pro varia ratione & veluti mensura malignitatis quam præferat affectus, ita varia etiam medicamentorum ratione tractandus est locus affectus. Nam si exquisitus sit carbunculus, & nigricans, neque speranda, neque tentanda est suppuratio, quia potius corruptio & putrefactio sequutura est, quam maturatio vel suppuratio, quod præsertim respexit Galenus. sed illis medicamentis potius erit agendum, quæ apta sunt putredini & depascentibus ulceribus curandis: sin autem non tanta videatur assatio inualuisse tantæque malignitas, quin maturatio sit desperanda, eam tentare prædictis, vel alijs istis similibus medicamentis, possumus. Deinde vero &

natura medicamenti quo sumus vsuri diligenter & ipsa est consideranda . Nam cum omnino carbunculi omnes sunt maligni, & nullus, cum ex assato sanguine ortum habeat, malignitatis est expers: possumus quidem in prima differentia carbunculorum maturantibus & suppurantibus uti, cum in ea non sit tanta malignitas, neque tanta peruicacia . Verum quia neque ipsa est expers insignis malignitatis, & prona ut per corruptionem & putredinem ad maiorem malignitatem perueniat, aliam suppurantium, vel maturantium medicamentorum rationem desiderat. Vnde si primum quod descripsimus medicamentum velimus examinare, quod sit ex caricis fermento & sale, non minorem vim habet digerendi, nihil enim non digerit in eo, sed & vim ex fermento attrahendi habet & aliquam quidem coquendi, maiorem tamen digerendi & aliquam desiccandi ex sale: præsertim vero humiditatem extraneam, quæ mater, ut est in proverbio, putrefactionis est . Vnde maxime a putrefactione illefas res seruare solet: maior autem vis concoquendi & pus mouendi est in caricis: alia vero, tum digerendi causa vitiosos & superuacuos humores confluentes ad affectum locum, ne putrefactionem illius partis foueant: alia ut prohibeant ulterius putredinem progredi: alia ut malignas materias foras attrahant, apponuntur . Eadem ferè ratione & alterum confectum est, triticea farina, melle & sale, triticea enim farina maturat: & pus mouere potest, mel digerit & siccatur, à putredineque tuetur . luteum oui maturat & ipsum concoquitque & dolorem lenit . facilius est & simplicius, eodem tamen spectat, quod ex vitellis ouorum fit & sale . Vnde omnes tandem secus in curandis carbunculis ac alijs tumoribus suppurationem & maturationem eorum procurant: Cum vero multa & exquisita malignitas apparet, quæ ex liuido, aut nigro colore, multo feruore & vehementi dolore cognoscenda est, omnes in hoc Galenum sequantur, qui acerbis & valentissime exiccantibus medicamentis curationem aggrediuntur, eisdem nempe, quibus curati diximus vlcera maligna putrida & depascentia: ita ut ad illa fiat interdum accessus, quæ urendi & crustam, perinde ut ignis, inducendi vim habent . Vnde & Andronis pastilli & Passionis, & Polyide ab omnibus tanquam aptissima huic negotio medicamenta referuntur, si diluti & triti ex vino dulci, vel sapa, si carcamus dulci

vino, ad sordium crassitudinem, interdum, vt secundo ad Glau. monet Gale. succo plantaginis: si uehemens admodum fuerit inflammatio & linamentis excepta vlceri apponantur. in præsentia, vt & superius diximus, Andronis pastilli parantur passim à seplasiar. nostri tamen chyrurgi in frequentiori vsu habent vnguentum quod ægyptiacum appellari diximus. interdum tamen adeo sçuit vis morbi, vt cogantur vrentibus vti medicamentis, quæ caustica, vel cauteria dicuntur: vt quæ ex atramento sutorio, vel ex chalcitide, vel mysy, vel id genus aliis, vel eo quod capitellum vulgo appellant: satis facile & lene medicamentum id est, quod præcipitatum dicitur. Quandoque vero adeo sçuit malum, vt candenti ferro sit necesse locum inurere, & ita demoliri vniuersam morbi malignitatem. sunt qui symphytum, consolidam maiorem nostri appellat, miris in hac re laudibus efferant, si inter duos lapides teratur, & postea tanquam cataplasma carbunculo apponatur. aiunt enim mirifice intra diem vnum carbunculum quasi interfectum sanare, vt nulla deinde alia sit opus curatione, præter illam, quam cætera requirunt vlcera. alij etiam mira de scabiosa narrant. aiunt enim quod commanducata, vel pota ex vino internos tumores ad exteriora protrusos discutit. Sed ad Gal. redeamus: ipse quinto de compositione medicamentorum secundum genera consuluit vt superad- damus carbunculis cataplasma factum ex erui farina & oximellite, quod cataplasma omnibus putrescentibus vlceribus perquam commodum est: Paulus vero cui & Auicenna subscripsit, plurimum ad carbunculos radicitus diuellendos & dirimendos ab adiacentibus partibus laudauit cataplasma factum ex malo punico: verum hic aliquantisper consistendum est, & non nulla eorum sunt in memoriam reuocanda, quæ potius fuere exposita. Diximus autem neque suppurantia neque repellentia Galeno probari, priora quidem propter putredinem, hæc autem ne recurrerent malignus humor maius negotium internis visceribus facessat. & sicuti primum præceptum non nulli posteriores moderari, vt paulo antea ostendimus voluere, ita Galenus in hoc altero noluit rem ita ad vivum refecari, vt putemus non esse aliquantisper refrenandum impetum maligni humoris fluentis: immo moderandam esse fluxionem dummodo id fiat his medicamentis, quæ modeste quidè, non valenter autem repellant, quæque coniunctam vim discutien- di habeant. Nam dum non ita præceps fertur in aliquam particulā

Cap. 15

mala fluxio, dumque vi medicamenti aliqua pars discutitur, facilius deinde reliquum a natura administratur. Vnde tum 14. meth. tum vero. 5. de compositione medicamentorum secundum gen. iungit ut cataplasmata non quidem vlceratis partibus. Nam diximus iam qualia vlcerata partes requirunt, sed circum positis partibus imponantur, quæ pariter refrigerare repellereque: sed modeste, possint, non minus autem digerere: eiusmodi vero cataplasmata sunt, quæ ex plantagine, vel ex lente cocta, addita medalla panis triticeï ex clybano cocti, confecti ex farina non multum a tursuribus purgata, quique non multum fermenti acceperit, ut si accipiamus medullæ panis, foliorum plantaginis, vel lenticulæ coctorum singulorum tantundem, coquantur simul, terantur, & fiat cataplasma. Auicenna & gallas addidit, & medicamentum hoc passim appellatur emplastrum de arnoglossa: Sed & monet idem Auicenna cataplasma partibus circumstantibus illiniendum, simile illis, quæ defensiva vnguenta a iunioribus diximus appellari, quale esset illud quod ab ipso describitur, & sit ex armena bolo, oleo rosaceo myrtinoque & aceto mixtis, quod quidem insigniter refrigerare potest; potest & astringere, parum autem digerere. nonnulli quidem credunt Auicennæ scopum in his esse ob stare, quo minus materia vitiosa quæ defluxit ad affectum locum, recurat intro: Sed hoc mihi videtur omnino esse a ratione alienum, quia ad eius repulsionem magis faciunt, quam quod ob stent. Auicenna vero satis aperte exponit qui fuerit eius scopus. nimirum defendere vicinas & circum iacentes partes, ne ad eas vlcus & putredo serpat. mihi vero si his esset videndum, magis Gal. cataplasmata probarentur. nimia enim vis repellendi in hoc Auicennæ medicamento videtur. & non caret periculo in his repulsio insignis, præter id quod modicam & fere nullam vim digerentem habet. Paulus vero cui & Auicenna subscripsit, plurimum ad carbunculos diuellendos & dirimendos ab adiectis partibus laudauit cataplasma ex malo punico acido prius minutatim conciso, moxque ex aceto donec incaluerit excocto, deindeque triti & leuigati, si lintheo exceptum carbunculo apponatur, & ubi siccescat aceto iterum humectetur. idem vero Paulus item & Auic. quod tamen ex Dioscoride descriptum est, laudant interiorem iuglandis nucleum ad maturandos & rumpendos carbunculos: præsertim si sit vetus: quamuis sit etiam vtilis vsus non veteris: Dioscorides vero consultit ut commanducata carbunculis imponatur. Sed de his satis

fatis abunde sumus: ad alios tumores frigidiores orationem transferamus.

De curandis frigidis tumoribus primumque de tumore molli, & Laxoque qui oedema a Græcis dictus est. Cap. 23.

Oedema generale nomen erat Hippocratis tempestate, quod si cui testatur Gal. tum alibi, tum vel maxime 4. lib. cōmentariotum in sextum epide. significabat omnes, qui præter naturam eius in corpore humano extuberabant tumores. posteriores uero generale hoc vocabulum, ad vnam diffinitam tumorum differentiam limitarunt, qui frigidi laxique & molles sunt, & a pituitoso succo ortum habent, non tamen a quocunque. Sed ab humido tenui & ferè flatulento. Nam cum duplex sit pituita: si eius differentias a ratione substantiæ spectemus: altera enim crassa & lenta, & ab hac duriores tumores, qui scirrhi dicuntur solent excitari. altera vero tenuis humidaque & flatulenta, & hæc est vnde fiunt oedemata. possunt autem istiusmodi laxi tumores in omnibus partibus attolli, in habitu vniuersi corporis: præsertim verò in manibus pedibusque, brachijs & cruribus, vtpote quæ a fonte caloris sint remotiora, & præterea magis exanguia, & cum chachexia, vel malo corporis habitui sit familiaris eiusmodi tumor, plerunque ille in pedibus & citra crura, deinde in manibus, mox & in facie sub oculis solet apparere. rarissime autem, vel etiam nunquam: si vera est Gal. sententia, quam 4. de presaga. ex pulsu literis prodidit, in iocinore vel intra thoracem oriri potest, ratio vero quam istius rei ipse affert, est, quod thoracis substantia compactior est, quam vt possit pituitam admittere: iecur vero præter id, quod ex densiori sanguine concretum est, habet etiam ingentem facultatem, qua potenter possit pituitam transmutare præsertim tenuem. Nam crassa & lenta non ita facile transmutatur. Vnde non est iecur ita a scirrhis: sicut ab oedemate tutum. quo loco non possumus id præterire (licet mihi hæc obiter dicere) quod hinc potest de promi validū argumētū cōtra illos, qui naturalē pituitā in vētriculo generari aiūt, & id ex Gal. sentētia. Nā si propterea, aut omnino nequit oedema in iecinore oriri, quia vim habet insitā, vt possit pituitā transmutare, & nequeat pituita in vētriculo genita digeri puenas in habitū corporis ad alēdas particulas, sicut & sanguis & alij

Cap. 3
Cp. 4.

humores alunt, nisi per iecur transeat, in quo cum sit insita tñs ipsam transmutandi in sanguinem, quo modo fieri poterit, quia in sanguinem antequam pertranseat vertatur: Sed de his alias cognoscitur vero hoc tumorem genus hoc præsertim argumento, quod si præmatur digitis, locus qui premitur, cedit digitis relicto digiti quodam quali ut stigio & fouea impressa in loco qui premebatur. Solent autem, ut idem Gal. 2. libro artis ad Glauco. & 14. meth. ait, oedemata nonnunquam sponte & per se oriri. interdum uero aliis morbis succedere: præsertim uero illis, qui laborantem ad malum corporis habitum deducere consueuerunt, quemadmodum aqua inter cutem, tabes, asthmata & id genus alia. in his etenim solent tandem pedes manusque intumescere, sed interdum in locis ulceribus circumstantibus, solent oedemata tolli. His ita expositis non est difficile scopos & indicationis desumere, quæ nobis rationem usus & confectiois medicamentorum ostendant quibus sint curanda oedemata. & primum quidem, cum ut nuper diximus, illa interdum spontaneum ortum habcant. nonnunquam uero alios morbos sequantur: quando aliis morbis succedunt, non aliam curandi rationem requirunt, nisi illam qua curandi sunt morbi quos sequuntur, aut saltem alioquin curari nequeunt, nisi curatis illis, quamuis aliquantisper interdum: Si adeo excrescant, ut nimis molesta sint, reprimi & mitigari nonnihil possint. Quando uero spontaneum ortum habent: id imprimis considerandum est quod plerumque: si non semper materia unde excitantur, non intumescente loco genita est: sed aliunde eò fertur confluere, & propterea statim duplex insurgit indicatio: altera quidem & prior, ut fluxio istius aquosæ materię inhibeatur; altera uero, ut quæ iam confluit & in tumorem attollit particulam, desiccetur & digeratur. Vnde quatenus ad ea oedemata, quæ alios morbos concomitantur, præsertim uero eos deterrimos: docuit Galenus. 14. meth. perfricare tumescens locum aut oxirodino addito sale, aut oleo addito sale: in oxirodino quidem maior aliquanto est repellendi, & refrigerandi facultas: sed & desiccandi, tum ratione salis, tum etiam aceti: digerit uero oleum. In oleo uero & sale uis maior digerendi, non minor exiccandi, & aliqua ex sale alstringendi, & subinde repellendi. At uero si sit oedematis spontaneus ortus, ubique Galenus dissolueri nititur, partim medicamentis, partim ope manuum, atque etiam repellere prohibereque fluxionem. his quidem medicamentis;

dicamentis posca primum, vel vt Græci loquuntur oxirato. immixto nempe tanto aceto aquæ, quantum immisceretur si bibenda portio, quæ non ingrata esset futura, pararetur: refrigerando enim reprimere fluxionem potest, acetum vero desiccat. his autem madefacta spongia iumenti loco apponenda & alliganda fascia, co modo quo deligari solêt artus cum fracta sunt ossa: sumpto nempe deligationis initio ab inferiori parte, vbi & strictior fit deligatio, semperque laxior, quo magis ascendit, oportet autem vt spongia noua sit, quæ in alios vsus non venerit, & id quia maiorem seruat siccandi vim, tum ex natura sua, tum vero ex ea, quam secum ex mari attulit. quodd si nulla noua spongia adsit, oportet ueteri vim exiccan- di addere, illam lauando aut lixiuio, aut aqua marina, aut in quan- mirum, vel aphronitum fuerit inspersum. medicamenta itaque hæc imprimis vim desiccandi habent, aliquam etiam astringendi; deligatio vero, dum strictior ab infernis partibus, laxior ad superiora fit, repellit quidem fluxionem & astringendo non parum facit ad expressionem & discussionem flatulentæ partis illius pituitæ, sed si valentiori medicamento videatur esse opus, cõsultat parum quid- piam aluminis addendum esse. Quod si diuturnior euaserit affectus & subinde difficilior, valentioribus medicamentis rem aggredi oportet dummodo mixtas habeant facultates, tam astringendi co- gendi que, quam digerendi. & inter alia medicamenta huic officio apta Gal. non parum laudat suum illud medicamentum, quod dia- chalciteos appellari diximus: à nostris autem iunioribus diapalmas cuiusque mentio superius a nobis facta est. Inueterascentia autem & pertinacia oedemata, vt ipse 2. ad Glauc. testatus est, solis desiccâ- tibus & discutientibus curare solitus est. spongiam nouam lixiuio madentē apponens, ac subinde deligans quo modo paulo ante dice- bamus, illito tamen prius loco oleo, quod valentius redditur, addi- to, vt prius monuimus, sale. idem ferè præstaret aqua marina & thermarum aque, in quibus esset vis digerendi attenuandi & discu- tiendi; vt sunt nostræ patavinæ ferè omnes, & porretanæ viterbien- ses, & quæ Corsenæ scaturiunt burnensesque apud reticos montes, & id genus omnes aliz, vt quæ Puteolis habentur. Sed de oedema- te hæc satis esse possunt.

Victoris Trincauellij

De medicamentis aptis ad curandos tumores flatuosos
Cap. 24.

Cum oedemate, ut antea dicebamus, aliquam affinitatem habent tumores qui à flatuoso spiritu excitantur, quos Græci *ἰσχυρὰ* Latini inflationes appellauere: iuniores vero qui Auicenna & Arabes sequuti sunt, apostemata ventosa. ab oedemate autem differunt, quia illius causa est pituita tenuis & aqua, cum flatu permixta inflationes verò à crassiori pituita in flatum crassum conuersa ortum habent, qui postea in aliquo spacio conclusus & comprehensus, locum in tumorem attollit. unde eiusmodi tumor comprimentibus digitis remittitur, ut illis remouis nullum ibi vestigium nulla fossula, ut in oedemate, relinquatur. Solent autem eiusmodi ventosi tumores attolli in locis prius confusis, & duplicem modum habent. interdum enim flatus contentus est in aliquo ampliori spacio, quod densiori aliqua membrana, vel cuti contegitur. nisi enim densior sit particula, flatum nequit continere: unde vel statim sub cute attollitur id genus inflationes, vel circa articulos, nempe sub membranis quæ periostia dicuntur, quibus obducta sunt ossa, vel illis quæ perinde sunt, ut tunicæ musculorum, aut in articulorum spaciis. in ipsis quoque internis visceribus, sub eorum membranis, in spacio itē ventriculi. præterea vero in eo spacio, quo naturalia viscera, intestina nempe, ventriculusque & id genus alia concluduntur. præterea & in seroto sæpe comprehenso flatulento spiritu vidi excitatos inflationes. interdum vero, dispersus est flatus per angustos meatus, atque subinde per substantiam membri. unde aliquos nonnunquam videmus, præsertim in artubus similes illis excitatos tumores, qui oedemata primo aspectu videbantur, dum tamen locus digitis præmebatur, nullum sub digitis relinquebatur vestigium, aut in oedemate, quia solus ibi erat flatulentus spiritus. quando autem in ampliori spacio contentus est spiritus, si locus percutiatur, sonitum perinde ut tympanum, quod percutitur, reddere solet: id vero clarius percipitur, cum ventriculus, aut spacium inferioris ventris intra abdomen insistantur. solet autem id genus tumoris circa artes imprimis excitari, cum ex plaga & contusione fuerint male affecti: præsertim autem, ut Auicenna monuit, circa genua. Nam & supra patellam genui, & circa ipsum articulum insignes hos tumores flatuosos sæpe elatos vidi: quandoque etiam in contusionibus & plagis

gis capitis obseruavi excitatos similes tumores, qui decipere, vel eos etiam chyrurgos, qui non erant obscuro nominis, quo loco & id maxime est animaduertendum, quod & Auicenna videtur iussuare, & eius etiam expositores moneant. illud autem est, quod tumores hi ventosi aliquando dum vtraque manu tractantur & premuntur alternatim inundant, vt quasi fluctuare interius materia perinde videatur, vt pus in suppuratis abscessibus quando maturuerit. vnde sæpe non bene aduertentes chyrurgi ad naturam horum tumorum, ac putantes esse suppuratum abscessum, ad incisionem deuenerunt, cum ingenti suo dedecore, & non paruo incommodo ægrotantium, incilo enim loco, nihil præter statum exiit, & vlcus deinde satis molestum successit: Ego dum Venetiis facerem medicinam, sæpe id contigisse vidi. quandoque enim accersitus ad consulendum cuidam nobili puero, qui acceperat ictum ex allisione capitis ad parietem, dum fugeret præceptoris flagellum; cuius rei cum nulla esset cura habita, lotum de more eodem die illi fuit caput, & ad solem exiccaturum, & dum tractaretur caput & secundum contusum locum doleret, aspicientes familiares deprehendere in tumorem insignem elatum cutem capitis: accersunt autem chyrurgum, qui tumorem tractans, & ipsum mollem reperiens, in quo percipiebat quandam veluti inundationem, statimque putauit ex contusione excitatum fuisse fluxionem humorum, ac subinde tumorem præter naturam excreuisse, qui deinde suppuratus fuerit in abscessum conuersus, volebatque adacto cultello locum rescindere vt pus excerneretur: Ego vero rem diligenter existimans cum animaduertissem nulla fuisse relata symptomata quæ indicarent puris generationem sicut par erat in insigni eo tumore: si fuisset suppuratus, obstiti quominus fieret inciso, & vli emplastris attenuantibus & discutientibus statum crassiores, curauimus affectum. alias etiam accersitus vt viderem mulierem senem & religiosam, quæ ex casu & contusione vulnus in capite acceperat, cui in loco vicino vulueri in syncope excreuerat similis tumor. cumque chyrurgus omni nitu instaret, vt incidere, putabat euim inflammationem ex affluxu humorum excitatum ad suppurationem fuisse conuersam, quæ vix ab incisione potui continere, continui tamen, & vsus emplastris discutientibus, quamuis aliquantisper difficilem se ad discussionem exhibuerit primus tumor, paulo post tamen cessit, statimque serè vbi aliquantulum valentioribus medicamentis fuimus vsi,

-cuauit

Victoris Trincauellij

evanuit tumor, moxque aptis remediis & vlcus fuit curatum. hæc
voluimus ascribere, vt iuniores cautiores fierent in his. Nam nos
hæc non consummatim scribimus. Sed iam ad rationem curationis
horum tumorum orationem conuertamus. Cum ergo hi tumores
tum ob densitatem partis in qua continetur flatus, excitentur, tum
vero à crassitie ipsius flatus, ab hac imprimis petendæ sunt indica-
tiones, scopos nobis ostendentes, quos ad compositionem medica-
mentorum, quibus sit flatus in tumore comprehensus facile discu-
tiendus, spectare oportet. Nam hic etiam prima indicatio est v acua-
tionis indicatio; nempe vt flatus, quo repleta particula tumet, va-
cuetur, neque in hoc vlterius alioquin, cum res sit clarissima, immo
rabimar: sed scopos quos spectare oportet particularim in illius
materie vacuatione, inuestigabimus, vt ex methodo rem hanc tra-
ctemus. in his autem duo sunt consideranda: primum quæ sit causa
cur intumuerit locus præ flatu, vt ea ablata detumescat. deinde ve-
ro, quia, vt diximus, plerunque sequuntur hi tumores plagam & cõ-
tusionem acceptam in articulis, vel musculis, vel membranis, quæ
particulæ sunt insigni etiam sensu interdum præditæ: vnde quando
que his tumoribus solent dolores assidere, qui possunt excitata hu-
morum fluxione, esse in causa cur succedunt inflammationes, qui-
bus & prospicere medicum oportebit, qui curationi horum tumo-
rum præfuturus est: Sed de causis primum agamus, neque tamen
tempus conteremus in exponenda communi causa generationis
flatuum, quæ est calor factus imbecillior quam vt materiam possit
omnino superare & rarefactum digerere; sed rarefacit quidem &
in crassam flatulentamque exhalationem conuertit. verum de illis
dicamus, quæ id præstant, vt flatus detineatur in vno loco, ne inde
effluens ad exitum permeet. harum enim causarum cognitio ad in-
stituendam rationem istius curationis non parum proderit. vnde
duplex est huiusce rei causa: altera crassitudo exhalationis, altera
densitudo particulæ, in qua exhalatio inclusa est, quæ si quis recte
animaduernerit, facile cognoscet duos statim inde scopos emerge-
re, nempe quod & attenuanda sit ea flatuosa materia, & quod lo-
cus in quo comprehensa continetur, sit rarior reddendus. hæc au-
tem præstare possunt illa, quæ calida sunt, cum tenuitate partium.
calefacientia ergo medicamenta, & extenuantia huic negotio
erunt accommodata, nec hoc loco in his exponendis diutius im-
morabimur, quæ toties fuere explanata: nempe ad statum vniuersi
corporis

corporis antequam particularim hæc medicamenta localia tractentur semper esse respiciendum. Nam si plenum sit eorum, & multis vel vitiosis scatens humoribus, qui semenium possint laboranti loco subministrare, necessarium erit prius aggredi vniuersi corporis procuracionem: si feliciter sit curatio succellura, sed cum hæc non pertineant ad præsens institutum, redeamus ergo vnde diuertimus, sed hoc posito, quod ea sint accommodata medicamenta his scopis, quæ calida sunt & partium tenuium; hæc siquidem & particulam laxare rarioremque reddere possunt, & præterea flatum extenuatum discutere, & quia horum copiosa est sylua, de aliquibus, ut pote quæ tanquam magis præcipua & prisceis, & his nostris temporibus semper in maiori usu fuere, agemus. inflationi itaque ventris præsertim inferioris tanquam accommodata medicamenta à Paulo Auicennaque proposita sunt olea, quæ sint calida cum partium tenuitate, qualia sunt chamæmelinum, anethinum, rutaceum, quibus si inferbuerint semina ea quæ discussoria facultate polleant, ut sunt semina apii, scæniculi, anisi, earos, amii, cumini, & id genus multa alia, efficacius erit medicamentum: posset pari ratione imponi aliquid piperis, vel cinamomi, vel alterius cuiuscunque aromatis, & radices, ut iridis, præterea & lærime, vi opopanax, ammoniacum, castorium: ex herbis vero pulegium, calamentum, hyssopum & sexcenta alia istius naturæ, meminere autem illi iidem & cucurbitulæ maioris sine ulla cutis præcisione, quæ ex eo piofiori igne affigatur loco. quod remedium tanquam efficacissimum ab antiquis medicis semper est habitum, ad euellendos & profundis partibus, & discutiendos erasiores flatus. Eiusmodi vero flatulentos tumores, qui circa articulos & in membranis musculos & ossa contigentibus solent attolli: præsertim vero vbi plaga & contusio præcesserit, quandam curationis rationem habent ab hac non nihil euariantem: præcipue vero, si eorum sit comes dolor. vbi enim dolor ex eotusis musculis sit concitatus, mitigandus erit in primis: ne inde excitata fluxio accedat inflammationem: erit ergo princeps scopus doloris mitigatio, quæ medicamenta requirit, in quibus sit mixta facultas ex concoquente digerenteque & modice astringente. nam si astrictionis sint omnino expertia, facile in causa erunt, ait Gal. eur. incitentur, vel augeantur inflammationes: maxime vero si corpus, vel etiam bonis succis sit refertum: vnde quo maior fuerit dolor, eò magis erit mitigantibus opus. laudat autem inter

Victoris Trincauellij

inter initia Gal. si paretur medicamentum ex sapa & vino, vt exempli causa, si sapa & vini singulorum vncias sex acceperimus, illis autem aceti vnciam addiderimus, & olei dulcis & maturi vnciam quatuor, quæ optime mixta & reposita ex lana non lota, quam vulgo succidam vocant, excepta loco tumentis sunt imponenda. vinum vero oportet vt austerum sit ratione astrictionis, vt per ipsum fiat repulsiō, & aliqua digestio, quibus etiam vtriusque facultatibus præditum est acetum; concoquunt autem sapa & oleum, quamuis non nihil digerant & laxent. vbi vero dolor mitescat, paulatim his ea cōmiscenda sunt, quæ maiorem vim discutiendi habeant: lixiuium nēpe & acetum, & quod magis recesserit indicatio ab ipso dolore, eo magis de concoquentibus, & mitigantibus detrahemus. plus vero digerentibus & discutientibus addemus: vt solo vtamur lixiuio & aceto cum nulla erit mitigandi doloris ratio. quamuis donec fluxio timenda est, nunquam à vini austeri mixtura sit continendum. Huc etiam spectare possunt, thermæ naturales: præsertim quæ sulfureæ, nitrosæque sunt & bituminosæ. præterea vero & æstuaria illa, vel foueæ calidiores, quæ in his locis, vbi thermæ sunt, reperiuntur, à quibus fumus calidus effertur, vbi maxima vis est discutiendi & desiccandi. Sed & salæ aquæ, vel marinæ immixto aceto insignem in his vim discutiendi habere possunt. hic autem, consistendum est quatenus ad hoc tumorū genus pertinere pōt, & ad aliud genus transeundum frigidorum quidem tumorum, duriorum autem, vt pote quia lenta & crassa pituita indurata, vel ab humore melancholico ortum habent.

De scirrhis exquisitis & non exquisitis per medicamenta curandis. Cap. 25.

Scirrhū Græci durum tumorem excitatum à crasso succo, siue illa crassa & lenta sit pituita, siue melancholicus succus, qui veluti sex sanguinis est & naturalis melancholia à iunioribus solita est appellari, aut ex vtriusque miscella. est autem tumoris sine rubore, caloreque atque sine dolore, quibus inditiis ab inflammatione discernitur, interdum vero & sine vilo etiam sensu est. Nam duæ horum tumorum differentię reperiuntur, alteram quidem scirrhū exquisitum appellauere medici, quoniam talis dicitur, cum eo progressa est res, vt penitus sit expers cuiuscunque sensus: ille autem qui

qui adhuc aliquem sensum obtinet, licet non admodum insignem illum habeat, non exquisitus scirrhus dici solet. aliqui scirrhum nō exqui situm appellant illum, qui ab humore melancholico ortum, habet, exquisitum vero à pituita crassa. Gal. tamen has differentias non distinxit nisi penes vim sentiendi seruatiā, aut ablatam. inter scirrhos autem, qui à crassiori pituita, quiq̃ue à melancholico humore ortū habent, hanc Gal. differentiā exposuisse videtur, quod fiunt qui ab humore melancholico, affinitatem multā cū cancro habent, & in eum tantam propensionem, vt tandem: si diuturniores fiant, sicut in lib. de atrab. & 14. meth. ait in cancerum desinant, vnde & cancrum esse hunc scirrhum quinto de facultate simplicium medicamentorum idem autumauit. Sed de differentia inter scirrhum & cancerum sequenti capite sermonem instituemus. in præsentia vero hoc imprimis aduertendum, cuius idem 2. lib. ad Glau & 7. de compositione medicamentorum secundum genera meminit, quod duplex est ortus scirrhi. Nam interdum statim ab initio dum incipit, scirrhus est, vt pote qui fiat ex fluxione frigida & crassa pituitosa vel melancholica, & ab eadem etiā paulatim incrementum suscipiat: interdum vero fit ex alio tumore, sicut ex inflammatione mutata in scirrhum: præcipue vero si excitata sit inflammatio à crassiori & lenta fluxione. si enim medicus ad eius digestionem nimis calefacientibus & siccantibus vtatur medicamentis, tenuiores partes discurruntur, crassiores vero indurantur, ita interdū & erysipelata in scirrhos transeunt, ex immodico vsu refrigerantiū & astringentiū medicamentorū. incrassantur. n. & concresecunt atq; subinde indurantur. sæpius autem in solidioribus particulis scirrhi, vt Gal. 4. de prælag. ex pul. testatur, suboriri solent, quam in mollioribus. vnde raro cerebrū, aut pulmones occupāt scirrhi. Exquisiti, aut scirrhi, qui omnino sensus sunt expertes, nullam omnino curationem admittunt, qui vero non exquisiti sunt, curari quidem, non tamen: si Gal. credimus, facile possunt. Curantur vero qui curationis sunt capaces, ea curationis ratione, quæ communis est tumoribus omnibustimo si velimus exquisitius loqui, omnibus morbis qui ortum aut fomentum habent ab aliqua materia. in his etenim omnibus vñus est communis scopos. quem 13. meth. & 14. Gale. exposuit, nempe illius materiæ vacuatio aqua & fomentum, & q̃ sit, habet affectus. ex plenitudine namq̃ue factos morbos vacuatio sanat. vtrum quia multiplex est vacuandi ratio: alia quidem commu-

Cap. 4.

Cap. 19.

Cap. 9.

Cap. 4.

Cap. 9.

Cap. 9.

Victoris Trincauellij

nis, quæ imprimis vniuersum corpus respicit, sicut illa est quam missione sanguinis, aut purgantibus medicamentis moliri solent medici: interdum vero sudoribus, exercitatione, balneis, frictionibus: altera autem, quæ particularim loco affecto solet accommodari, quam digerentia: nempe quæ attenuant & calefaciunt subindeque discutiunt & dissipant materiam in affecta particula absortâ, molliuntur: & quamuis vtraque interdum vacuandi ratio curandis scirrhis sit opportuna: præsertim vèro inter initia: prior tamen ad præsens nostrum institutum nequaquam pertinet, vbi de externis medicamentis instituta est tractatio. vnde de his solum in præsentia sermonem sumus habituri: quæ digerendo vacuant, quæque calefaciunt & siccant: particulatim ergo in hos scopos huius curationis ratio resoluitur: nisi quod duo præterea videntur his esse addenda: vnum quod initium: alterum vero reliquum tempus omnino respicit. & primum quidem accipiendum est à communi ratione affectuum, qui à fluxione sunt: nempe quod inter initia dum viget fluxio, repellentibus ea sit inhibenda: quia tamen repellentia, tum refrigerando, tum astringendo suo funguntur officio, refrigerantia autem & astringentia condensant impinguntque materiam, vt deinde difficilior ad digestionem reddatur: ideo si opportunus videatur horum vsus, illis vtendum est, quæ modice refrigerent, vel astringant: Sed etiam quantum ad alterum pertinet, cautum oportet esse medicum in vsu digerentium: Nam calefaciunt & desiccant: quæ veto vehementer tum calefaciunt, tum desiccant, non sunt apta ad digerendos & subinde curandos scirrhus. Nam quæ valde calefaciunt, vehementer etiam & conferim digerunt. vnde conferim digestis partibus, quæ aptiores à digestionem sunt, licet videantur qui ita agunt plurimum profecisse, cum tumor videatur eorum ope factus minor, reliquæ tamen partes destitutz à tenuioribus & mollioribus, adeo resiccantur & indure scunt, vt deinde digeri amplius nequeant, vt pote quæ perinde, vt lapis induruerint: Sed etiam quæ vehementer desiccant: vt quinto de facultate simplicium medicamentorum docemur, nimis exiccando, idem suapte sanè natura præstare possunt, vnde, vt idem paulo inferius docet, ea medicamenta requirunt, quæ vel in secundo calefacientium ordine sint, vel saltem tertium non excedant, & hoc quidem rarius, resicent autem ultra primum, quo ad medicamentorum genus, ma lignata à Græcis, vt ille 7. de compositione medicamentorum secundum

Cap. 4.
Cap. 5.
Cap. 6.

reatque etiam digerere est cerui medulla; deinde vero vituli. Sed neque illud in presentia prætereundum sub silentio, cuius meminit Gal. primo & septimo. de compositione med. secundum gene. & 3. de fac. simp. med. quod tam adipēs, quam mellē quō magis inueterascunt, eō & calidiores euadunt & sicciores, & proinde etiam in digerendo, & exiccando fortiores, quōd vero recentiores, eō aptiores ad molliendum & mitigandum: præterea vero & adipēs syluestriū animalium aciores sunt, & vim siccandi maiorem habent in hoc eodem genere. eorum nempe, quæ molliendi & digerendi vim habent, sed maiorem quam adipēs, sunt ammoniacum, thymiana, stirax calbanum, Bdellium scithicum, oleum sicyonium, & fusinum etiam. nisi sit vetustum. sed & maluz folia cruda vel cocta, & altee radix, item & radix cucumeris agrestis cocta ex oleo vel aqua. in his etiam poni & opopanax potest, plus tamen digerit quam molliat: sicut chalbanum plus molliat & concoquit quam digerat thus etiam aliquid emollientis habet & concoquentis, ut & semina sœnigræci: si ex aqua coquantur, & magis etiam si cum aliquo adipe misceantur. Multa sunt & alia medicamenta simplicia, quæ possunt digerere & emolliere: Nam & laudanum modice molliat digeritque, & oleum liliaceum nempe ex albis lilijs. caricę etiam pinguiorē: si ex farina triticea conficiantur, aut hordeacea, nisi quod cum triticea magis concoquant & molliunt, cum hordeacea vero magis digerunt, quia farina triticea maiorem molliendi, hordeacea maiorem digerendi vim habet. sunt & alia ferè innumera, quæ ad hoc genus referri possent, quæque ex Gal. Diosc. & alijs medicis colligi possent: Sed hæc in presentia nobis erunt satis, ne nimis in longum excurrere cogatur præfens sermo. Sed & illud animaduertendum, quod sicut non omnia hæc relata medicamenta sunt eiusdem ordinis, ita & differens omnino est eorum, ut docuit Gale. 7. de compositione med. sec. gen. ratio, quatenus ad usum pertinet. differentia vero emnis ex triplici capite sumenda est. primum ex parte naturæ affectus, quia inter initia dum scirrhus nondum valde induruit, leuioribus & faciliioribus, tum mollientibus, tum digerentibus erit opus, ut dissoluatur. quod vero magis inueterauerit & induruerit, eō vehementiora & valētiora desiderat remedia. Deinde vero ex parte laborantis corporis: quia corpora duriora & solidiora, ut sunt rusticorum & qui in puluere & sole degunt, exercēturque fortioribus & acioribus

Cap. 7.

ribus tractanda sunt medicamentis . molliora vero & delicatior,
mitioribus & lenioribus , qualia sunt mulierum præsertim nobi-
lium, & puerorum, eunuchorumque & eorum tandem qui in um-
bra & otio & frequentibus balneis vitam transigunt . Tertio etiam
ex parte ipsarum particularum, quæ a scirrho fuere correptæ . Nā
illis quæ solidiores & duriores sunt ; validioribus medicamentis
opus est. mollioribus autem & laxioribus, faciliora & initiōra sa-
tis esse possunt. Vnde. 1. 4. meth. & 2. ad Glauco. consultit, ut si quan-
do in tendonibus, aut ligamenti fuisset contractus scirrhus , illis
quæ emolliunt addenda esse ea quæ habent vim incidendi, ut ha-
bet acetum: Sed ut tamen in eius vsu sit cautus medicus , quia ne-
que sæpius & frequentius in talibus eo uti oportet, neque diutius,
neque etiam inter initia ipsius tumoris , quia alioquin, vis aceti:
utpote, quod tenuiores partes cito absumat, reliquum in lapidem
quasi indurat: præterea vero, ex immodico eius vsu nerui læduntur.
Vnde tunc maxime utilis est eius administratio, quando præcesse-
rit emollitio. quare ut eorum medicamentorum, quæ ex acetopar-
antur administratio prodest cum emollitio præcesserit : ita etiam
post eorum aliquem moderatum usum debet iterum succedere
emollitio , atque ita alternatim . atque hoc in durioribus partibus
præsertim seruandum est, quia in laxioribus particulis, ut esset lien
redditus scirrhusosus, aut in teneris & carnosissimis partibus musculorū,
non esset adeo vsus aceti timendus, tum propter laxitatem earū, tū
vero, quia non ita sit, ut in neruis timendum. præterea vero & hoc
non est ignorandum, quantum ad rationem vsus & administratio-
nis eorum remediorum quæ molliunt, & eorum etiam quæ dige-
runt pertinet, quod duplex est eis vtendi modus : alter qui Galeno
longe, ut ipse 2. de Glauco. attestatur, fuit frequentior & familiarior.
alter vero in frequentiori vsu fuit aliis medicis. prior ergo est, ut
primum per aliquod tempus solis laxantibus & mollientibus tra-
mur, quo paratior & promptior ad digestionem reddatur materia.
postea vero digerentia succedant, atque ita alternatim & per vices
fiat, donec vniuersus absumatur scirrhus. modum autem hunc idē
exemplo exposuit eodem 2. ad Glauco. pueri, quem ab insigni scir-
rho contracto in femore ferè toto ob importunum usum refrige-
rantium & astringentium , ut erysipelas curaretur , hac ratione &
methodo curauit. cum enim censuisset non posse tumorem dissolui
nisi vi & ope medicamentorum , quæ digerant , quæque cale-

Cap. 5.
Cap. 4.

Ec 2 faciant

faciant moderate cum partium tenuitate & aliquantisper siccarent: Sed cum horum vsus: nisi præcesserit eorum, quæ sunt digerenda emollitio, vt hæcenus sæpe diximus, potest longe magis interdum obesse indurando quod post digestionem reliquum est, quam prodesse absumptis tenuioribus partibus: decreuit erus demittere in profundius vas olei sabini plenum, quod maiorem vim molliendi & laxandi habet. mox vero confecto medicamento ex prædictis adipibus illius illiniuit, in quibus cum emollitione erat modesta adiuta digestio: quibus postea & ea addebat, quæ molliitionem iuuabāt, sed magis etiam digestionem. interdum enim illis pingue bdelium, & mastichæ Aegyptiæ, ammoniacumque recens & pingue: præterea vero & chalbanum. postea ubi parata ad valentio-rem digestionem illi videbatur digerenda materia, obliniebat femur vniuersum ammoniaco prius ex acerrimo aceto dissoluto. cui paucos post dies, & chalbanum itidem pingue & recens ex acerrimo aceto solutum addebat atque procurabat, vt maior alimenti pars ad alterum femur deferretur, vt tumori subtraheretur fomētum, & id diutius insistendo alteri pedi, mox vero scemur affectum curauit, vt & ipsum instauraretur vsu eorum emplastrorum, quæ conficiuntur ex pice: Alij autem, quos neque damnat Gale. compositis & mixtis & vtraque facultate medicamentis vti consueuere, quæ propterea etiam malagmata appellauere, quasi mollientia, de quibus reliquum est vt paucula quædam, & quo breuius fieri poterit dicamus, & primum de illis, quæ apud medicos in vsu erant, postea vero etiam de aliquibus, quæ iunioribus sunt magis familiaria: Gal. itaque 7. de compositione medicamentorum secundum gen. ubi emollientium medicamentorum meminit, illa in quendam ordinem digerit, in quibus illud tanquam infirmius & aliis imbecillius constituit, quod ipse coleum appellat, quia ex cera & oleo conficitur. oportet autem ceram esse pinguem & mollem: non duram & aridam: oleum vero, quod sit cuiuscunque astrictionis expertum. simul autem pari potest eligenda miscenda sunt, vel et aliquantum plus ceræ imponendum: nepe si olei sex, ceræ vero octo uncie accipiatur. Aliquantisper maiorem vim habet, quod ex butyro, resina colophonia & cera non vterique pari portione componitur præter vim: enim molliendi ex ipsa cera & butyro aliquid est digerētis & siccātis ex resina colophonia accirit: his vero omnibus aliquanto valētius est compositum id quod *ῥαπὴ* Græce dicitur. sit autem acceptis uncis undecim adipisulli

simili mundi ceræ sex cerusæ argenti spumę singulorum sesquiu-
cia, componitur vero eliquatis primum cera & axungia, illisque
inspersis aridis medicamentis prius exquisitè tritis, magis hoc prio-
ribus mollit: sed & deficcat & digerit, nondum tamen ualidum est
medicamentum. vnde istius ordinis medicamēta tenerioribus cor-
poribus & incipientibus potius, quā plurimum induratis scirrhis
erunt accommodata: in durioribus aut corporibus, & induratis inue-
teratisq; scirrhis, hæc parū possent efficere. valentioribus. n. mol-
lientibus & digerentibus esset opus, de quibus pauca quædā dice-
mus. Nā quæ hæcenus sunt exposita in durefcentibus potius quā
in duratis tumoribus sunt apta. sicuti dū inflāmatio in scirrhū iam
degenerare incipit: valentiora ergo medicamenta, & ad molliendū
& digerendum potentiora sunt, quæ ex medullis, atq; ex illis quæ
opi seu guttę, vel lachrimę à Gręcis Latinisq; dicuntur: Gumme ve-
ro ab Arabibus & recentioribus, vt sunt ammoniacum, bdeliū,
chalbanū, opopanax, styrax, & id genus reliqua. in quibus inter-
dum aliqua itcm induntur, quę vim aliquā ob tenuitatē partiū in-
cidēdi habent, vt piper, propolis: præter acetū. Gal. vero 7. de med.
comp. secundū gen. multa istiusmodi medicamenta ex libris tum
Herę, tū vero Andromachi excepta describit, quę nimis longū ef-
set singulatim referre. vnde primo qui ab eo ēt examinatur, erimus
contenti, cuius licet ipse duos describat cōpositionis modos, vnū
tū duntaxat nos proponemus, cōficitur aut in hunc modū: Bdeliū,
seui vitulini, amoniaci, iridis illyricę: singulorū drag. xvi. opopa-
naxis, chalbani, cachryos, styracis, thuris: singulorū drag. viii. piperis
grana. l 60. fecis vnguenti yrini quantū satis sit, cerę, resinę terebin-
thinę: singulorū selibrā, vini quantū satis sit. Bdeliū, thus vino ma-
desiunt, amoniacū aceto dissoluitur, cętera contundūtur. pistello
inuncto irino, & quę liquari possunt liquantur, ac deinde omnia
miscentur. in hoc malagmate, valide quidem molliunt seuum vitu-
linū, Bdeliū, amoniacū & chalbanū & styrax, quę & digerunt non
parū. aliquantisper præterea, vt ferē in primo ordine sint, thus, ccra
& terebinthina molliunt & concoquunt. potenter opopanax, pi-
per, chachrys. digerit & vinum. incidunt uero imprimis acetum,
piper, chachrys. quod vt idem Gal. docet, admodum commodum
est his scirrhis, qui ex pituita crassa & lenta ortum habuere. vnde
valentissimum medicamentum esset: in eius tñ usu moer Gal. hoc
seruandū esse: nec modo in hoc, sed & in aliis, ut si cerati formam

habuerit, & sit lentum tenaciterque hæreat parti scirrhosæ, dimittatur ibi, donec sponte decidat, neque detrahatur vi. in illis autem quæ mutanda sunt, ablato primo antequam alterum apponatur, oleo fouendum esse locum affectum, vt materia mollis reddatur, & particula laxior. Multa alia malagmata possemus hoc loco describere, quorum confectiones legi possunt apud Gal. 7. de compositione medicamentorum secundum gen. & 8. de compositione secundum locos, & apud Paul. & Aetium & Arabes: sed nimis longus esset is sermo: præsertim vero huic loco atineret, vt de emplastro de meliloto cuius satis frequens est vsus nostris his temporibus: præcipue iuxta compositionē a Mesue relata ex Philagrij sententia: quia tamen maxime medici nostris temporibus, cum quibus etiam Gal. 8. de cōpositione medicamentorum secundum locos consentire videtur, in duris viscerum affectibus: nempe ventriculi, iecinoris & lienis vti solent: ideo ad aliam partem; vbi de medicamentis particulatim certis & diffinitis locis accommodandis agemus; illud seruabimus; interim vero de cerato agemus, quod ex oesypo conficitur, tãquam de optimo medicamento ad molliendas & digerendas, vel etiam inueteratas duricies vbicunque fuerint contraxæ. & quamuis a diuersis auctoribus diuersimode conficiatur, omnes tamen in vnum scopum tendunt, & idem præstant: quamuis non equaliter. alię enim vehementiores, alię aliquantisper infirmiores sunt: Mesue tres cerati ex oesypo confectiones descripsit, primum quidem in Gal. auctorem refert, quamuis nullibi apud Galenum illam repperim. alteram in Philagrum, tertiam in Paul. quidem 7. libro. describitur cuiusdam liquidi medicamenti ex oesypo compositio, quæ tamen ab illa quam ex sententia Pauli retulit Mes. & modo compositionis & materia plurimum differt. In vsu autē plerisque in locis his nostris tēporibus est secūda à Mes. descripta, quę Philagrio est inscripta, vtpote quæ ad molliendas & digerendas durities alijs habeat vires maiores. accipit vero croci drag. x. Bdely, mastiches, ammoniaci, aloes, styracis liquidæ singulorum drag. viii. ceræ. lib. i. terebinthinę vnc. i. s. medullę cruris vaccæ, adipis anseris: singulorum drag. xv. oesypi lib. i s. olei nardini quantum satis sit. subiungit autem Mesue, quod medici quidam: post Philagrium addidere huic confectioni succi scillæ vnc. iii. thuris. vnc. i. feni vitulini drag. xv. Medicamentum potens est & opimum. Nam aliquod concoctorii habet ex croco & thure & terebinthina

rebintchina, emollit a ūt cera, oesypus & adeps tam vituli quam an-
feris, & medulla uaccina. Nam adeps vituli & uaccina medulla ferē
eiufdem sunt facultatis. Vbi hoc considerandum quod Græci me-
dici antiquiores medulla potius vitulina quam vaccina vtuntur in
suis emplastris & id genus aliis medicamentis. Nam si iuuenis sit
vacca vnde fuit medulla accepta parum a vitulina differt: nam pue-
ri & femellę parum saltem in humiditate differunt. Si autem vacca
consenuerit magis eius adeps, aut medulla desiccabit. Bdelium ve-
ro ammoniacūq; & styrax potenter molliūt, & strenue digerūt, ali-
quātisper digerit & aloē. qñ aut addit succus scillę, maiore attenuādi
& incidendi vim sibi cōparat. vnde inueteratis & induratis scirrhis
magis potens redditur medicamentū. quod si Bdelium & ammonia
cū ex aceto diluerentur, adhuc maiore vim haberet. de aliis autem
compositionibus medicamentorū ex oesypo confectorū non ha-
bebimus longiorē sermonem, tū quia nunc in nullo sunt vsu, tum
vero quia ex earum collatione cum hac illarum ratio facile potest
percipi. Sed de diachylon, quod & ipsum his temporibus in mul-
to vsu est, & ad præsens institutum pertinet, pauca quędam di-
cemus, quamuis Galenus inter *ῥαλασθέντα* medicamenta, hoc est, re-
laxantia numerauerit, quę distensis potius, vt ipse 7. de compositio-
ne medicamentorum secundum loc. testatur, curandis cōmoda sunt
quam induratis. Sed quia satis strenues præterea etiā molliunt: ideo
non erit illis ineptus is locus: præsertim si fiat, vt vulgo dici solet,
cum gummis, hoc est, cū guttis seu lacrimis, quę *ῥαλασθέντα* à Græcis appel-
lantur. Nam si in hunc modum conficiantur, ad emolliēdas & di-
gerendas durities validum erit medicamentum. plures enim re-
periuntur modi, quibus diachylon a diuersis auctoribus confici so-
lebat. Vbi primum id aduertendum ad facilem perceptionem eo-
rum, quę de hoc medicamento dici solent, siue illud ceratum dica-
tur, siue emplastrum, siue vnguentum: nam his omnibus nuncupa-
tionibus a iunioribus solet appellari, a succis nomen habuit. *ῥαλασθέντα*
enim, vt plures interpretantur, succum significat. non tamen ex il-
lis succis componitur, qui ex contusis herbis, vel fructibus ex-
primuntur. Sed succi vnde fit hoc medicamentum, sunt muco-
sus humor, qui vel maceratis illis seminibus sit, puta fœnigræci
lenique: & coctis radicibus altheę & pinguibus caricis passullif-
que, & deinde percolatis & expressis. hos succos mucilagines
iuniores & seplasiarii appellant. frequens est eius vsus & pris-

Cap. 10.

eis & nostris etiam temporibus, & eius sæpe fit ab auctoribus mentio. sub diuersis tamen nominibus & diuersa eius reperitur compositionis ratio. apud Arabes enim interdum vnguentum de mucilaginibus: interdum vero ceratum de mucilaginibus: triplex vero illud componendi modus reperitur: alter quidem antiquorum ferè omnium, cuius meminit Galenus septimo de compositione med. per gen. à Democrate versibus descriptus. quæ tamen in primum auctorem Menecratem refert, & eadem Paul. & reliqui Græci retulere, & est simplicior & facilior. accipit enim libras quatuor mucilaginum extractarum, vel percolatarum ex decocto seminis lini, foenigræci, radicum althææ, olei. ætate addunt illi libro 7. hycme vero libras nouem, quæ simul coquantur quoadusque non amplius bulliendo attolluntur bullæ. mox inspergantur spumæ argenti libræ sex & coquantur, donec non inquinet. quæ quidem confectio a Galeno potius inter medicamenta numerantur, quæ χαλαστικά hoc est, laxantia, quam inter illa quæ μαλαγmata, vel malactica, hoc est, emollientia dicuntur, quæ non magis molliendi quam digerendi vim habent. hoc enim laxare quidem & molliare partes intentas potest: non autem insignem vim habet indurata membra emolliendi. nihil enim accipit, quod possit insigniter emollitas partes digerere. facilius ergo & minus vehemens ad scirrhus curandos est is compositionis modus. Huius etiam Mesue meminit, & ex Hamech auctoritate ait, quod si prædictis addatur aliquid iridis, & mucilago melliloti, euadet medicamentum longe fortius ad tollendos tumores duros. Alter vero qui literis a Mesue traditus est, ad dissoluendas durities potentior & nehemetior est, & ab eo appellatur diachylon magnum: describitur autem in hunc modum. Accipe spumæ argenti optimæ mundæ triquetæ & cribro tenui excussæ, vnc. 12. olei irini, chamemilini, anethini singulorum vnc. 8. mucilaginis seminum lini, mucilaginis foenigræci, mucilaginis radicum althææ, item & mucilaginis caricarum pinguium & passularum quoque pinguium; succi iridis, succi scillæ. item & cæspi, & glutinis piscium. ita enim interpretantur vocabulum illud arabicum alzanach. singulorum drag. 12. s. terebinthinæ vnc. 3. resinæ pini, hoc est picæ singulorum vnc. 2. coquantur quo modo paulo ante expositum fuit, & fiat, ut nunc solemus appellare, in modum cerati. Longe, ut dixi, potentius malagma hoc priori est. nam præter chylus, hoc est mucilagine, quæ laxant

laxant & molliunt, accipit æſipum quod præter uim mollientem & laxantem, digerit etiam: ſed & oleum irinum, anethinum magis digerunt, nec chamæmelinum ea vi caret. iris quoque ſuarum partium tenuitate craſſos humores ſecare, attenuare, & non parum digerere & detergere poteſt. Sed & ſcillæ ſuccus plurimum citra caliditatem aut exiccationem inſignem attenuare & in cidere poteſt craſſos & induratos humores: itidem & iridis ſuccus. Tertio uero modo ſit prætereadiachylon hoc additis, quas uocant gummas iuniores: Græci uero præſcriptę compoſitioni: fuerunt autem a iunioribus noſtris additi: & tres ſunt hæ lacrimæ, quę adijci ab illis ſolent: nempe Bdelium, ammoniacum, & ſagapenum: ſingulorum uero additur vncia. & cum his vna etiam viſ maior additur molliēdi & digerendi, & ſicut ſimplicibus facta eſt i hac poſtrema cōſecutione additio: ita nomē eſt imutatu. Nā hoc dyachylō cū gūmis appellāt, alter ū uero ſine gūmis. Fit ēt Venetiis medicamentū, quod ſerē ſimile uiribus eſt primę compoſitioni diachylon: nempe Græcorum. accipit enim mucilaginum althęæ, ſeminum ſœnigræci, & ſeminum lini ad uncias ſex, ſpumæ argenti libras 2. medullę cruris vaccæ, uel vituli, terebinthinæ ſingulorum uncias 3. ceræ uncias quatuor, olei ex ſem. lini uncias 2. s. in quo pro oleo communi, ut in prima, oleum ex ſem. lini accipitur, quod maiorem uim laxandi & digerendi habet: minorem tamen digerendi quam anethinum & irinum. ad-

dit autem iridis puluerem ſecutus, quicunque fuit au-

tor, Arabes. non apponit tamen æſipum, ſed

loco eius medullam cruris vaccæ: Vn-

de medium poteſtate eſt inter

primum Græcorum,

& magnum

Melue,

&

de his quidem ſatis dictum

putamuſ: in ſequen-

tibus de can-

cro curan-

do age-

muſ.

Victoris Trincauellij

De ratione compositionis & usus medicamentorum, quibus curandus est cancer. Cap. 26.

Cap. 9.
Cap. 9.
Cap. 9.

Cancer est tumor durus ex humore melancholico excitatus: nisi quod ab altera scirrhi differentia ea ratione diuersus est, quod à melancholico humore, qui sanguinis comparatione eam naturam habet, quam fæcula in vino & anurca in oleo, nondumq; aliquam expertus est aduersionem fit scirrhus: cum vero vstionem aliquam, vel ex putredine, vel ex aliqua assatione fuerit expertus, tunc, vt in libris de atrabile, & de tumoribus præter naturam tradidit Gal. cancer verus est. vnde scirrhus is, vt idem 14. meth. voluit, à cancro non nisi maioris minorisq; ratione differt: quia si materia quæ in scirrho comprehensa est, magis incalcescat, in cancerum fit transitus, calefit autem vel à febre ardentiori, vel contracta aliqua putredine. Nam temporis progressu humor infarctus & conculcatus in vasis solet putrescere, & proinde etiam cancerosus scirrhus is solitus est ab antiquis dici, quia facile in cancerum transit. Sed neque deinde melancholici humoris vnde fit cancer, par vbiq; ratio est, aliquando siquidem, & si aliquam sibi comparat exustionem, illa tamen non est tanta vt iam acris etiam fiat & erodens, & tunc fit cancer sine vlcere, qui & ab aliquibus cancer absconditus, vel occultus dicitur. cum vero acrior fit, vt iam erodat, ulceratur cancer, non est tamen ita effervesceus is humor, vt in inflammatione, & carbunculo: unde non est ita calidus sed nigrior inflammatione. In ipso etiam & circiter ipsum venæ turgidiores & acriores sunt, quam in inflammatione: quia crassa & nigra est materia quia venæ refertæ sunt, & præ crassitie nequit adeo facile e venis effluens, in circumpositam carnem effundi, & inde etiam canceri nomen illi fuit inditum. venæ enim illæ manifestæ apparētes circa tumorem, videntur referre similitudinem canceri aquatici animalis. videntur enim quasi pedes canceri circa ipsum quod præsertim conspici solet in mulierum mammis: in quibus præ omnibus aliis partibus frequentius solet suboriri, & id duplici quidem ratione, primum quia si accidat vt menses supprimatur sanguis ille excrementosus & magna ex parte crassus & melancholicus per venas vteri excerni solitus, intercepta ea via, sæpe ad superiores partes quasi regurgitans, ad mammæ fertur propter naturalem nexum & consensum, quem eum mæmis vterus habet. deinde, quia mammæ, quæ carne adnosa laxa &

quasi

quasi spongiosa constant, & ea facile admittit & suscipit crassa excrementa, & cum multarum & crassarum venarum à natura propter lac generandum sint factæ participes, illæ distentæ & repletæ crasso & atro illo sanguine crassescunt & nigrescunt : vnde in hac maxime parte representant quandam canceri effigiem. & quamvis extremum hoc melancholicum in iecore primum generetur vna cum sanguine, non habet tamen cancer minorem suæ generationis occasionem à liene, vt pote cuius officium sit, vt quicquid excrementosum & non amplius naturæ utile superest istius melancholici humoris, at trahat, atque inde partim addatur, partim vero quicquid superuacuum & inutile illi est, vt corpus ab eo expietur, per vias consue- tas excrenat. quod si viscus hoc ab eo suo munere deficiat, vel quia ex aliqua intemperatura sit factum imbecillius, vel quia obstructio- nes impendant, vel quia tantum istius humoris ex victus non proba ratione gignatur, vt illi excernendo non sit satis hæc particula ille exuberans & ad hæmorrhoidas propulsus, illi negotium facessit, aut sua grauitate ad venas in cruribus translatus narices concitat, aut in habitum vniuersi corporis digestum & ad cutim propulsum elephantiasim, vel elephantem procreat, aut in vnum aliquem circumscriptum locum decumbit, & inde fit cancer: quæcunque vero vel temperaturæ, vel ætates, vel victus ratio aptæ sunt generando humori melancholico, ea omnia possunt generandis & illis etiam fouendis in causa esse. Potest autem is morbus inter initia, quando nondum in insignem tumorem est elatus, sicuti Gal. 6. aph. & secundo ad Glau. testatus est, medicamentis & cognoscatur, curari. nā neque cognita in principio facilis est, adeo enim parum & obscure molestus est, vt quam plures non admodum peritos medicos lateat: sed vbi increuerit, ita solet esse molestus, vt neminem ferè latere possit. oculos vero crancos, non esse curandos censuit Hipp. 6. apho. nam cum curantur, & vi medicamentorum eos superare nitimur, irritantur magis & citius interimunt. facilius autem & minori cum afflictione degunt, qui sine curatione transcunt. oculos autem Gal. intelligit tum illos, qui nondum vlcerati sunt, tum uel etiam illos qui internum & occultum aliquem locum occupant, ut si in ore, intra nares, in utero, aut in sede oriatur. Ego memini cuiusdam religiosæ & sacræ mulieris, quæ tum haberet durū sub alis tumorem ad naturam canceri vergentem, & fuisset commissā curanda duobus præstantissimis medicis, illi post multas purga-

Cap. 19.
Com. 49.

tione

tiones aggressi curationem localibus medicamentis, tandem in eo
 loco visus est tumor digestus euanuisse, sed paulo post subcreuit
 durus & dolorosus tumor, & insignis in iecinore, qui post multos
 cruciatus tandem mulierem interfecit: translata ad iecur: curandi
 vero cancerum duplex poterit iniri ratio: altera quidem quæ vera
 & absoluta curatio dici possit, vt pote qua morbus omnino tolla-
 tur & particula suæ pristinæ restituatur integritati: & hæc quidem
 si aliquando spectanda sit: speranda est in initio antequam materia
 omnino inculcata induruerit, & aliquam sibi comparauerit mali-
 gnitatem ex vteriori putredine, vel assatione, & quo tempore dixi-
 mus à paucis cognosci: plures autem fallere: cum vero iam tumor
 in insignem aliquam magnitudinem elatus fuerit, non est amplius
 speranda hæc in eo curationis ratio: sed altera de qua paulo post sec-
 monem sumus habituri, in præsentia vero de priori breuiter &
 cursim ageamus, cum illis medicamentis sit absoluenta & illis reme-
 diis, quæ nihil ad institutum præsens pertinent. Nam vacuationi-
 bus reuulsionibusque & purgationibus tractanda erit hæc curatio.
 omnes ergo statim rem auspiciantur, modo nihil sit, quod uetet à ve-
 ne sectione: in talo vel poplyte: si præcesserit suppressio hæmorida-
 rum, quæ alioquin sint solita fluere: nam si aperiantur, vt iterum re-
 uocetur earum fluxio, utilis & salubris erit operatio, vel si præte-
 rea in mulieribus sint menstrua suppressa, alioquin vero & superio-
 ribus venis iecur, vel lienem recte itinere locum affectum respi-
 cientibus erit mittendus sanguis: deinde vero medicamentis parâ
 tibus hos humores, & delinientibus eius asperitatem, ac illis dein-
 de quibus mouentur erit agendum: neque tamen de illis magis par-
 ticularim loquemur, cum quantum poterat satis esse, in primo & al-
 tero libro egerimus: imprimis vero recta erit victus ratio instituen-
 da, & aliena, quantum fieri poterit, ab illa quæ sit apta melancholi-
 co humori gignendo. quod si videatur corpus suapte natura pro-
 num esse, vt illud generet, succurendum saltem illi erit repetitis
 per intervalla euacuationibus: Sed de his satis superque. ad eam
 curationis rationem accedamus, quæ magis attinet præsentî institu-
 to: nempe quæ per medicamenta exterius loco affecto administran-
 da ab oluitur: itaque sub communi ratione & methodo compre-
 henditur, quæ & cæteri tumores præter naturâ curantur: immo affe-
 ctus omnes a fluxione humorum excitati: ea nempe est, vt tum re-
 pellentibus, tum digerentibus medicamentis agamus: in quo qui-
 dem

quidem negotio fœlicem successum sperare possumus , quando materia nondum admodum crassa fuerit . Nam hæc non ægre primum medicamentis purgantibus , deinde vero & repellentibus & digerentibus cedit : si autem crassa fuerit , illis quidem non facile cedit . his autem parum proficiemus : si facilioribus quidem uti vulerimus : sed si potentiora aggrediamur , aliquas sanè tenuiores partes sanguinis contenti in venis partim repellemus , partim digeremus : vnde videbimur statim inter initia aliquid profecisse , quod reliquum tamen erit : nempe crassior materia , durior & magis rebellis euadet . dum ergo corpus purgatur diligenter , primum repellentibus utendum : mox ubi mediocriter iam sit purgatum immiscenda repellentibus erunt digerentia , illo autem exquisitè purgato , conuertenda est omnis curatio ad digerentia , ut tamen in illis eligendis hæc sint imprimis seruanda : primum ut his utamur tam repellentibus , quam digerentibus , quæ vires habeant mediocres , quia leuiora nihil ferè faciunt , valentiora irritant exasperantque morbum & crassiorem reddunt humorem : deinde vero ea omnia fugienda sunt , quæ acrimoniz & motus cuiuscunque non sint expertia . tanta enim est istius affectus prauitas , ut facillime à mordentibus medicamentis exasperatus irritetur . Metallica ergo medicamenta cum & exusta prius , & postea exquisitè lota fuerint , deponunt omnem morsum : quapropter , & illa , & composita medicamenta , quæ ex his fiunt : si rectè confecta sint , optima sunt in hac curatione . ab omnibus etiam solani succus , statim èt inter initialaudari solet , nam repellit quidè sine vlla exasperatione . Nam refrigerat in secundo ordine : præterea & astringit , vel solus administratur , vel etiam longiori tempore in mortario plumbeo , pistillo etiam plumbeo donec crassescat & colorem plumbi contrahat ductus & tritus . in hunc eundem vsum apprime utile erit oleum rosaceum eodem modo tritum & paratum : inter initia quidem illud quod omphacinum appellant . Nam magis & astringit & refrigerat : mox vero & illud quod in præsentia completum dicunt . nam aliquanto magis omphacino digerit , & minus repellit . quod si progrediente curatione , maiorem item digestionem quæremus , nō esset præter rē chamemelini cū rosaceo , dum in mortario tererentur , intermiscere . Hæc est ergo summo rationis

cauit: sed & non nulla etiam de eo cancro dicenda sunt, qui cum ulcere est, cuius curandi: & si nulla reliqua sit spes, non tamen propterea non potest illis, qui ab eo affliguntur, ars medicinz plurimū prodesse. cum possit eos mitiores reddere, minus molestos, minus erodentes, minusque dolorosos. Nā & si iam apud plurimos adeo inualuerit hæc sententia, ut ferè in prouerbiū transierit, non esse cancrorū; qñ iā cū vlcere sunt, querendā curationem, ea quidem, si hoc pacto intelligatur, quod non sit neque querenda neque speranda vera curatio, verissima est sententia, quia medicamentis vel aliis medicis instrumentis nequit is morbus omnino superari: immo quo magis illum superare contenderit medicus, eo magis ferus, & malignus reddetur, non tamen propterea omne curationis genus prætermittendum. Nam mitigari & deliniri aliquantisper ferina eius natura pōt, ut minus molesta & magis tractabilis euadat. nam cum in his ulceribus, sicut & in quibuscunque aliis, semper aliqd pus, vel sanies, uel virus gignatur, acrior autem & deterior, quō fuerit vlcus peioris naturæ, qd quidē virus pungit, imo rodit etiam, atque dolores auget. nam & semper dum diutius vlceri hæret acrius & deterius fit: necesse est, ut & Gal. monebat, alicuius uti medicamentis, quibus malignus ille humor ablatur, & facile quasi, ut aiunt, blandiendo deliniatur praua mali istius natura. Iam ergo satis diximus superius, quod succus solani imprimis & præcipue huic officio commodissimus est, siue ita simplex adhibeatur: siue cum aliis componatur. componi autem potest, ut post dicemus. nam ductus in mortario plumbeo donec colorem plumbi acquirat & vnguenti crassitudinem, quam maxime utile medicamentum erit. sed & polygoni succus, & cicorei, & portulacæ expressus cum succo vuz immaturæ pari modo ducti in plumbeo mortario, utiles esse possunt, quamuis non habeant tantam uim quantam solanum. rosacea etiam olea, siue omphacinum, in quo maior est desiccatio, roboratio, & extinctio, siue quod completum appellant, in quo maior est digestio & lenitio, itidem in mortario plumbeo ducta: pro quibus & oleum coroneorum, & myrtinum possent interdum sumi. Præterea vero omnia metallica medicamenta usta prius, & optime lota: præsertim uero pompholix, & plumbum ustum & lotum, deinde & cadmia, quæ uel composita simul, uel cum aliis prædictis posunt utiliter uenire in usum: unde Gale. 10. de simplicium medicamentorum facultatibus ad maligna ulcera & cancrōsa laudat lac præsertim

præsertim si in eo immiscentur pompholix, quam nunc tutiam vocant, aut plumbum, aut cadmia lota & vsta. Nos autem in exemplum duo medicamenta ex Gal.& Paul. Aetioque deprompta proponemus. Primum accipit cerusam & lythargyrum pari pondere, eaque in plumbeo mortario eatenus in sole ex rosaceo oleo conterunt, donec mixtum horum colorem plumbi omnino contrahat. Alterum vero quod & efficacius est, accipit pompholygis plumbi vsti vtriusque vero lori, thuris: singulorum vncias quinq; absinthii vnciam, olei rosacei sex vncias, ceræ fescunciam, succi solani quantum ad crassitudinem sit satis. Galenus autem quarto de compositione medicamentorum secundum genera laudat cinerem ex concrematis fluuialibus cancris ad reprimendam istius morbi malā naturam, si cum pari portione cadmiæ vlceri inspergatur, aut si idem cinis cerato exceptus imponatur: cuius & Auicenna & alii meminere: sunt & quidam, quæ plurimum in sedandis doloribus laudari solent, vt malua, & althea ex mulso cocta & subacta, & oleum quod ex vitellis ouotum extrahitur. non nulli præterea & herbam illam, quam virgam auream multi appellant, summo-pere laudant, quæ ignoratur, quæ fuerit antiquis: alchymistis vero plurimum est familiaris: siue eius succus, seu aqua per destillationem accipiat. De elephantiasi etiam, quam Arabes & illos secuti iuniores nostri, immo & vulgus lepram appellant, quamuis lepra antiquis vna sit ex scabiei differentiis: possemus aliquid dicere, quia tamen eandem ferè cum cancro rationem habet. nam ex eo dem humore gignitur nisi quod decumbente illo in vnam circumscriptam particulam, & illam in tumorem attollentē, fit cancer, illo verò digesto per vniuersum corpus, ac tandem ad cutem expulso, fit elephantiasis: vnde sicut cancer solum inter initia solet curari, in ueterascens autem nullam admittit curationem, ita & elephantiasis, quæ eandem vniuersi corporis procurationem, quatenus ad vacuationem requirit. in externis vero medicinamentis explicandis non admodum multi fuere antiqui medici: & de his neque etiam nos multa verba faciemus: sed de quibusdam aliis tumoribus, qui cum iam dictis multum & similitudinem & affinitatem habent, pauca quædam dicemus.

De ratione curandi reliquos tumores & abscessus frigidiore, qui ex pituitosa materia ortum habent,

Cap. 27.

Quia vero sunt & alia tumorum differentia, qui variis in locis suboriri solent, quorum frequens est mentio apud medicos, de his antequam primam hanc de externis medicamentis partem finiamus, aliqua dicemus: non est enim multis opus, quia sicut cum multis illorum quae haecenus exposita sunt similitudinem quandam habent saltem ratione materiae aqua excitantur: ita etiam multum cum illis in ratione curandi habent similitudinem. Incipimus autem ab illis tumoribus, qui strumae a Celso & latinis, cherades Graecis: ab Arabibus vero & recentioribus nostris scrofulae appellantur, voluere enim Graecum vocabulum exprimere, qui ita appellarunt, vel quia huic morborum generi propter voracitatem maxime obnoxiae sunt scrofae, vel quia sicut numerosae sobolis sunt scrofae, ita in hoc morbi genere numerosi generant tumores sibi ferè multo heredes, vel quaecumque alia fuerit istius nuncupationis occasio: solet autem plerumque hoc tumorum genus, ut 3. aph. ait Galen. in partibus glandulosis oriri, ubi etiam bubones: immo, ut idem testatur in lib. de tum. praeter naturam. inflammationes, quae in his partibus oriuntur, cum verum seruant inflammationis naturam, bubones, aut phygethla dicuntur: sin autem indurentur, in strumas transeunt porro & ex ulcere interdum exurgit bubo ut primo de locis affectis idem docuit, qui aliquando facile suppuratur. non nunquam vero induratur & in strumam desinit. sunt ergo ut ibidem monet Galen. hi & similes tumores veluti soboles vitiosae non quidem calidae, sed potius frigidae materiae & pituitosae, quibus praesertim obnoxii sunt, qui voraces nimium sunt: Vnde in pueris, ab eo tempore quo primum dentes incipiunt emittere, usque ad tertium decimum annum solet esse frequentior is affectus, utpote qui plures congerunt cruditates, plerumque autem tumores id genus aliis de quibus statim sermonem sumus habituri, similes sunt, qui generantur circumdati quadam membrana quasi vesicula quam vulgo chirurgi chistim Graeco vocabulo appellant pro diuersitate autem materiae differunt. aliquando enim si aliquid caloris immixtum habeant, maturantur & suppurantur: aliqui vero, duriores sunt, & ad scirrhi naturam, ut 14. methodi tradidit Galen. proxime accedunt.

*Com. 16.
Cap. 16.*

Cap. 11.

Ff dunt.

dunt. Sunt verò & plures aliz eorumum frigidiorum differentiz, quorum medici meminere frequenter, ad hoc ferè genus pertinentes, qui particulatim nullum habent nomen: differunt autem penes diuersam materie rationem, quæ in illis cum aperiantur, reperiri solet. nam aliquando quasi pilos repetitis inclusos, inter dum quasi vngues, interdum res, duras perinde vt ossa, aut lapilli, aut testæ, quâdoque callosum corpus, sæpe quod aut coenũ aut lutum aut amucca videatur, quandoque reperitur res adeo fœtida, vt vix possis odorem perferre: sunt autem omnes quando, vt diximus, frigida materia in vnum locum confluens ibi conclusa diutius detinetur, ibique vario modo afficitur, quatenus aut digestis partibus tenuioribus humidioribusque magis minusque induratur: interdum verò maiori minorive contacta putredine vi caloris extranei aut coenũ lutumve immitatur, aut amucca, tetrusque magis aut minus odor inde excitatur. frequentiores tamen aliis solent esse abscessus illi, qui vno communi nomine ab Avicenna nodi appellantur. commune autem nomen nullum apud Græcos habent, præter nomen tumoris & abscessus, quod & alios tumores continet. horum tres sunt præcipue differentiz acceptæ a triplici ratione illius materie, quæ in illis continetur. eorum enim aliqui liquorem quendam in quadam quasi vesicula contentum habent. vulgus chirurgorum in folliculo dicerent, qui liquor melli colore & crassitudine similis est, & a iunioribus nodi mellini dicuntur, a Græcis vero, melicerides. Alii verò crassiorem substantiam colluctam habent, quæ colore & crassitudine pulcem imitatur, quam atheram Græci nominant. Vnde & atheromata Græce dicuntur, alij crassiorem & solidiorem congestam habent, quæ crassitudine & colore seuum vel adipem imitatur, quod cum steat Græce dicatur, steatomata etiam ab illis nuncupantur. id vero omnibus his, vt paulo antea diximus, commune est, vt materiam quadam membrana inclusam contineant, quasi in quadam vesica. est & similium tumorum quædam quædam differentia, cuius non nunquam etiam meminit Gal. in quibus antequam aperiantur, spiritiosa quædam tensio apparet. illis autem apertis reperitur grumus sanguinis. & quia non modo in externis & summis partibus solent oriri id genus tumores: Sed in profundioribus quoque: præsertim vero glandulosis: immo & in ipsis visceribus. Ego enim in cadauerum dissectionibus sæpe in iocinoris substantia vidi hos tumores subortos

ortos, maxime vero steatomata: Qui tamen in externis & summis generantur paribus tactu & digitis dū præmuntur, ex maiori, uel minori renictia & cessione, ac citiori & faciliori ad pristinā figurā tranſum deprehendi a medio poterunt. qui vero in alto oriuntur, quo digitus peruenire nequit, non ita deprehendi poſſunt: Sed de his quantum ad noſtrum inſtitutum pertinet hæc ſatis ſunt. de aliis enim pluribus diſtincta capita fecere iuniores & aliqui etiam ex antiquis, qui ſuis etiam nominibus diſtinxere. quæ tamen ſi recte cōſiderentur, ad aliquod horum, quæ hæcenus ſuere a nobis expoſita referenda ſunt. Nam & quæ natta, & quæ talpæ, immo magna ex parte tumores qui anteriori parte & exteriore ceruicis ſeu gutturis ſolent exoriri, & boccia a iunioribus ſolent dici, bronchochile a Græcis, quaſi dicas ramicem gutturis, ad aliquod horum tumorum referenda ſunt, ita ut & aliqui ramicoſi tumores ſint iſtius generis, & differunt aut loco in quo oriuntur, aut magnitudine, aut figura, non autem natura, aut eſſentia: Quatenus autem ad curationem pertinet, id imprimis conſiderandum, quod nos. 14. meth. docuit Gal. duplicem eſſe rationem curandī hos tumores, quæ in vnam omnium tumorum communem tandem reſoluitur: nempe ea eſt evacuationo materiæ in abſceſſu contentæ: Sed dupliciter illa vacuari a medico poteſt. Nam aut medicamentis aut manuali opere. per medicamenta autem duplex poteſt fieri curatio: quia aut per digerentia, aut per putrefactentia. manuali opere curantur quando per præciſionem partis affectæ tolluntur: horum vero aliqui vna tantum ex his curari poſſunt, alii duabus, alii tribus, quæ diuerſitas tum a ratione loci ortum habet, tum a ratione materiæ: nam qui in alto ortū habent, ſolis digerentibus, & attenuantibus poſſunt curari, nec quo cunque modo adminiſtratis. Sed aut illis ſolis, aut illis maxime quæ per os ſumuntur, in quibus ſit vis attenuandi & in vapores diſſoluendi materiam concretam, qualia ſunt medicamenta, quæ ex aromaticis conſiciuntur, ut antidoti illæ maiores, ut ſunt theriaca, mitridatia, ambroſia, athanaſia, diacalamentum, diaſpolicum, diacyminum, & quod diagalanga iuniores appellant, & id genus alia multa, quæ nos cuſim pertranſimus, utpote quæ quaſi *ἀντίφω* dici poſſunt, neque primo ad præſens inſtitutum pertinentia. natura autem materiæ petenda eſt ratio diuerſæ curationis: quia quæ tenuiori conſtant materia, ut mellicerides poſſunt tres has curationes admittere. nam & digeri, & per putrefactionem extrahi poteſt mate-

Cap. 18.

ia, & per præcisionem, quæ verò crassiori, non ferè: nisi aut præcisione, aut putrefactione. steatomata officio duntaxat manus & incisione possunt abstrahi. non erimus autem in his particulatim exponendis multi, quia quæ sint medicamēta, quæ sceptica, hoc est, putrefaciētia sunt, & qualis sit eorū vsus, satis superius fuit à nobis expositum: quæ vero ad chyrurgiam pertinent, huic non attinent negotio. de digerentium vero vlu & compositione, & quomodo tractanda, satis superque locuti sumus superius: præsertim vbi de duristumoribus fuit institutus sermo. Nam in omnibus his & corpus prius à crassis & crudis humoribus purgandum, & victus ratio attenuantis instituenda. postea externis & localibus agendum, & si digestio ni cesserint, illi incumbendum: sin aūt aliquādo videantur posse suppurari, sicut strumas aliquando videmus, vel quia cum crassis & frigidis fluxerit aliqua calida materia, statim inter initia, vel postea et dunt tractatur curatio: attracta ab vsu calidiorum medicamentorū quæ possit pus mouere, maturationi & suppurationi esset operanda. indigerendo autem, quæ sint animaduertenda, satis superque diximus superius: vnde de scabiei & pruritus differentiis per medicamenta curandis paucis expositis huic priori parti finem faciemus.

De ratione eorum medicamentorum, quibus apte curari possunt cutanei affectus, nempe prurigine scabie atque huiusmodi. Cap. 28.

Postremo loco quatenus ad istius tractationis partem aninet, & de cutaneis affectibus medicamenta propria exterius administranda curandis non vulla dicenda sunt, quales sunt pruritus, psora, lepra, quæ à Latinis tanquam scrbiei differentiæ proponuntur, & lichene, quam impetiginem Latini soliti sunt appellare. horum enim ferè omnium commune symptoma est desiderium quoddam scalpendi, quod manifestum est argumentum, eos esse quasi sobolem vitiosorum humorū acriū & mordaciū, qui ad cutim impulsī, ibi retinentur & manent: præterea vero, quod aliqua constent crassitie. Nā si oīno tenues essent, cutim perinde ut sudor trāfigerēt neque illā abradere possent, neq; tamē adeo crassi sunt, ut illi à quibus phagedenæ

phagedenæ aut cancri gignuntur, nam non modo extimam cutim abraderent, uerum & subiectas carnes ulcerarent exederentq; inter se vero differunt hi cutanei affectus crassitie & tenuitate materie, vnde concitantur: nam à crassiori materia ortum habet lepra, ut pote in qua separentur veluti squammæ quædam & quasi serpentis appellatum senium, à psora vero veluti furfures, quæ quidem ad abrasionem summæ & extimæ solum cuticulæ, referuntur. profundior vero est abrasio in lepra: sicuti crassiores sunt squammulæ ab ea resectæ, quam furfures. his utrisque adhuc tenuior est materia impetiginis vel lichenes, commune autem his omnibus est cutim reddere asperiores. Sed pruritus materia aliis tenuior. Quæ autem & qualis sit materia, quæ omnium horum affectuum fomentum est, non videntur omnes consentire: præterquam quod omnes acrem esse aiunt. Arabes enim ut Auicenna Aliabas & alii videntur quidem voluisse psoræ & lepræ materiam esse sanguineum vitiosum, quia aut illi sit immixtus melancholicus humor exustus; aut quia pars aliqua, quæ per putredinem, vel assationem sit conuersa in melancholicum humorem. vel etiam quia interdum sanguini sit immixta salsa pituita, vnde subdit, quod si ex humore melancholico sit orta scabies sicca illa est: sin autem ex mixtione pituitæ salsæ, pinguior illa videtur. Galenus vero & cæteri Græci, non in sanguinem referunt hos affectus: sed duntaxat in melancholicum humorem & pituitosum falsum. Nam in libris de atrabile, & de tumoribus præter naturam, affectus hos melancholicos censet: vnde eos sæpe mutuam transmutationem habere cum elephante visum est. si enim aliquando elephantiasis curationem habet prius in lepram, postea in psoram mutatur. sicuti sæpe si negligatur lichene, in psoram: mox psora in lepram, & tandem in elephantiasim fit transitus. Paulus tamen psoram & lepram à melancholico succo fieri solere ait. pruritus vero à falso humore. At Galenus secundo lib. de causis symptomatum ait, pruritus à tenui & falso humore ortum habere. psoram vero & lepram à multo crasso & falso & non moto, quia si in motu sint & per partes sensu præditas ferantur, horrorem aut rigorem concitant: tamen ibidem exponens quid sit pruritus, cum prius dixisset esse sensum excrementorum, pruritus mouentium, id magis particulatim explanare volens dicit, nisi quis ea nitrosa, salsa, vel amara uelit nominare. quibus uidetur insinuare & bilem posse prurientes concitare.

Cap. 6.

turæ affectus . amaritudo enim bili propria esse videtur . Sed si recte considerare rem velimus , cum frequentissime hi affectus præsertim vero p̄sora , & lepra reddât cutim & asperâ & ferè aridâ , sepius a sicco & exusto : nempe melancholico humore videtur originē hēre . Interdū vero cū in his cutaneis affectibus papulæ quædam parvæ quidem exoriūtur , è quibus tenuis quidam quasi ichor exprimitur acer quidem & mordax , putarem eas a tenui & falsâ pituita esse excitata : quandoque vero papulæ maiores , quæ tandem suppurantur , & inde pus satis crassum affluit . quam vulgo pingue scabiem vocant : sed harum duplex est differentia , aliquæ enim dolorosæ sunt & rubræ anteaquam suppurationem assequantur , ut quasi inflammationes imitentur . aliæ vero tandem & ipsæ ad suppurationem veniunt , neque tamen ita inflammatae sunt , neque etiam adeo dolorosæ . priores ego putarem omnino mixturam sanguinis habere , alias vero potius in falsam & crassiorem pituitam esse referendas . Impetigo vero ex ichore tenui cum crassiore & acri humore generationem habere , dixit Gale . § . de compositione medicamentorum secundum genus . est autem omnium communis sententia eos qui vitiosis utuntur cibis , esse hiæ cutaneis affectibus imprimis obnoxiosos : senectus etiam frequenter ab illis solet exerceri , & adeo cruciari , ut aliquando pruritus in senes inueteraverit , aut nunquam curari possit , aut ita ægre , ut illis satis esse possit : si leniatur & mitigetur . Sed iam conuertamus orationem ad rationem medicamentorum , quibus sit laborantibus hac molestia succurrēdum . huc enim spectant quæcunque hætenus fuere exposita . nempe ut scopos depromeremus , qui nobis rectam rationem compositionis & usus medicamentorum huic curationi accommodatorum ostenderent : Et quia omnes hos affectus in copiam vitiosorum humorū , vel ex prava victus ratione , vel ex aliquorum viscerum intemperie congestorum , & tandem in cutem propulsoꝝ ortum habere ab omnibus constitutum est , nemo non videt primū statim scopū in illis curandis insurgere , qui indicat causam , quā medici antecedentē appellant , tollēdam : nempe subtrahēdum esse hoc fomētum per vacationem eorum malorum succorum , qui in venis , vel visceribus continentur , & factum morbum fouent , & pro ratione naturæ illius extremētij humoris , atq; pro conditione corporis , aut lecta vena , aut medicamētis purgatorius moliri vacationem oportere . Verum quia hoc extra fines præsentis sunt instituti , quo agere de
externis

externis medicamentis propositum est: ideo hanc partem non magis particulatim tractabimus: Sed his summatim expositis, de ratione eorum medicamentorum agamus, quibus affecta iam cutis curanda est. & cum, ut docuit Gal. 6. de compositione medicamentorum secundum gene. quando iam squamosa, vel furfurosa cutis facta est, id quod in squammas, vel furfures iam versum est, nequit amplius in naturalem & pristinum statum redire, ut & crustæ quæ ulceribus obducuntur. Sed neque etiam impacti ipsi cuti pravi humores amplius corrigi possunt: ideo proprius scopus in his curandis est, hæc omnia ope medicamentorum, quando alia nequeunt ratione, esse remouenda: remoueri autem poterunt, tum per digerentia & siccantia, tum uero per detergentia. his ergo facultatibus ea medicamenta, quibus curandæ sunt hæc affectiones prædita esse oportet: Sed cum pruritus ex tenuiori humore ortum habent, qui ut ait Auicenna, quasi inter duas cutes, hoc est ad cuticulam consistit, quam nequit transire, quia aut constipatio sit facta, aut obstructi sint eius meatus, ideo digerentibus potius & desiccantibus egere videtur. Sed quoquomodo etiam laxantibus. Vnde & balneæ aquæ communis & tepidæ, tanquam utiles laudantur præsertim a Paulo & Aetio, ut laxiore reddita cute facilius fiat uitiosæ materiæ uapouratio, & ipsius humoris fusio attenuatioq; & præterea eius acrimoniæ delinitio. deinde uero opportunus est foras & fricatio cum his quæ digerunt, & exiccant. fortioribus uero ad lichenas, uel impetigines est opus, ut pote cuius materia constat ex tenui quidem & acri ichore. sed qui mixtam etiam crassam materiam habeat pituitosam uel melancholicam: unde cum horum affectuum differens sit ratio, quia alii difficiliores, & id ratione materiæ crasfiores & contumacioris: alii uero facilius medicamentis cedunt, ut pote quia ex materia minus contumaci & crassa ortum habent. præterea uero, & particulatim ille idem affectus non in omnibus equalem rationem habet. Nam lepra a lepra, & psora a psora pruritusque a pruritu non parum interdum facilitate & difficultate; vel prauitate differt, quod tum ratione prauitatis & malæ naturæ materiæ unde excitantur accidere solet, tum uero ratione corporis male affecti, quia aliqui adeo sunt obnoxii his cutaneis affectionibus vel propter prauam viscerum intemperaturam illis perpetuo fouentum sumministrantem, vel propter malam victus rationem qua utuntur, vel quia adeo eas diu pertulere, ut iam

uitiata ſit temperatura & habitus ipſius cutis , vt præter id quod iam facta imbecillior facilius excrementa undique amandata ſuſcipit , & difficilius digerit , & expellit , corrumpit etiam delatum alimentum quamuis bonum in vitioſum humorem , vt vix ab eis ſe vnquam poſſint explicare , cui accedit præterea et natura corporum . qui enim duriori & ſicciori ſolidiorique habitu corporis & cutis conſtant , maiori negotio & fortioribus medicamentis curantur : qui laxiori & teneriori , facilioribus . Vnde ea ratione pueri & teneræ mulieres facilioribus & leuioribus medicamentis cedunt , viri autem ruſtici & id genus alii , fortioribus & acrioribus . ſenes autem præſertim in ſecundo ſenio ægerrimè curari ab his poſſunt , tum quia ex imbecillitate viſcerum excrementoſiores ſunt , tum quia expultricem & digeſtricem facultatem imbecillioſiorem præ aliis ætatibus habent , tum etiam quia cutis eorum aridior & denſior facta . Vnde in medicamentis etiam his affectibus curandis aptis varios oportet eſſe ordines : in quibus exponendis : ſi omnia ſingulatum , quorum medici meminere , velle-
mus literis mandare , nimis in longum noſter ſermo prouche-
retur . Vnde nos aliqua tantum in exemplum proponemus , quæ nobis magis in promptu eſſe poſſe videbuntur , quibus & multa alia addere poterit qui materiæ medicinalis aliquam habuerit peritiã , & ſcopos a nobis & aliis medicis in hac re propoſitos memoriter tenuerit . inter leuia & ſimplicia medicamenta eſt hominis ſaliua , præſertim ſi fuerit ieiunus , ſurfures farinæ tritici affricati cuti , vel decocti ex aqua , malug tam domesticæ folia & radices quam ſylueſtris expreſſo ex eis ſucco ſcabioſo loco affricati item & betæ & apii , lapatii , celidoniæ , anemonæ , ſaluæ folia cucumeris ſylueſtris , præterea radices . ſuccus malorum medicorũ tam citrii , quã appellatorum vulgo limonum , vel aranciorum , multis & ſuccus uug immaturæ profuit ; Vrina etiam humana : ſi ea lauetur affectus locus , non erit inutile medicamentum . neque tanquam languidum medicamentum proponitur decoctum ex eruo , ſed & recrementa glandis vnguentariæ vnde fuit expreſſum oleum plurimum omnibus ſerè probantur : inter medicamen-
ta affectibus his apta , ſunt reſina , terebenthina , & laricea , & gũma pini diſſoluta ex aceto . efficaciora his ſunt aqua falſa ,
lixium ,

lixium, sal, nitrum, nitri spuma, sal armoniacum, bal-
neæ minerales nitrosæ, sulfureæ bituminosæ & ferreæ. valida
præterea sunt virunque veratrum, tam nigrum, quam al-
bum, radix vitis albæ, dracunculus uterque. vtebantur an-
tiqui in his curandis affectibus, cum difficiliores sunt, & chal-
citæ & chalcantho præsertim vsto. vtuntur autem in præsentia
quoque in medicamentis ad scabiem hydrargyro, seu, vt nunc
appellant, argento viuo, vel vt chymici, mercurio: extincto
tamen, aut saliuâ, aut limonum succo, aut alia quapiam simili
ratione: immo etiam si difficilior reddatur curatio, addunt,
& quod sublimatum appellant. sulfur tamen coctum ex oleo,
vel eo dissolutum ita vt eo iniungi possit, optimum est me-
dicamentum ad scabiem tollendam, quamuis suo odore ingrato a
multis ferri nequeat. sed inter composita medicamenta lene quidē
& tutū, quodq; pueris mulieribus ac mollioribus corporib. possit
esse satis, est emplastrum ex lithargyro cocto ex hydræleo, de
quo facta est superius mentio: sed fortasse fortius esset id quod
fit ex oxaleo, hoc est, quod fit ex argenti spuma cocta ex aceto &
oleo. Sed longe his efficacius & valentius esset emplastrum illud,
quod à Galeno sexto de compositione medicamentorum secun-
dum genera describitur & *diabecatur*, hoc est, de herbis appellatur: Cap. 4. 1
cum autem omnes in his affectibus viuam calcem optime & sæpius
lotam laudent: si illa ex aqua diluatur ad mellis spissitudinem, &
inungatur locus scabiosus, crederem ego quod & vulgare vnguen-
tum, quod fieri passim solet ex calce lota, posset esse plurimum vi-
le ad scabiosos affectus. præsertim vbi sit aliqua ex scalpitu illata cu-
tis excoriatio. passim tamen in vsu sunt quædam medicamenta,
quæ vulgo vnguenta ad scabiem apud apothecarios dicuntur.
sunt autem ex multis eorum, quæ à nobis nuper relata sunt com-
mixtis, quorum duplex est ratio. prima quidem illis maxime apta
est, in quibus neque admodum contumax & difficilis est morbus,
corpusque mollius & tenerius subindeque delicatius est, vt pue-
rorum & femellarum, & eorum qui in vmbra & otio vitam transi-
gunt. & quamuis vario conficiatur modo: Ego tamen illum
referam qui magis trius magisque in vsu est. accipiunt er-
goterebenthinæ, vel larinæ resinæ, exempli causa, vncias duas,
butyri recentis dragm. j. ouorum lutea duo, salis communis
unciam

Victoris Trincauellij

vinciam mediam, succi malorum medicorum, quæ appellantur arā
cia quantum satis esse posse videtur: olei rosacei parum. ex omni-
bus simul mixtis faciunt moile medicamentum, quod ad ignem vel
solem deliniunt fricando scabiosas partes. lenit enim detergitq; &
desiccat modeste, & præterea extrahit excrementa subiecta & im-
pacta cuti ad exteriora: solet autem lauari resina: interdum autem
& butyrum, & pro lotionis modo additur, aut detrahitur vis medi-
camento. nam si aqua communi lauemur, mitius fit: si enim quid-
piam acrimoniz insit resinæ, lotionem lenitur: si autem alia re lavare
tur, sicuti rosacea aqua, minus calefaceret, melius oleret medica-
mentum, aliquantisper etiam roboraret cutim astringendo, & quo
quomodo repelleret ingruentes in eam humores. idem præstaret: si
succo rosarum: verum magis ad detergendum adiuuaret, & dige-
rendum, & odoratius redderet medicamentum; possent lauari &
succis & aquis earum herbarum, quæ vim habent delendi scabiei,
quas paulo ante recensuimus, ut est inalua vitraque, fumaria, apium.
efficacior esset celandonia, rumex etiam, vel lapathum, oxalis: præ om-
nibus autem aliis: si ex decocto vnius vel alterius veratri. his enim
lota resina & butyrum, longe valentius redderetur medicamentū:
si vero voluissent antiqui medici adhuc valentius reddere aliquod
sulfuris ignem non experti addidissent, interdum & oleum quod
laurinum dicitur. delicatiores tamen horum ingratum odorem nō
facile admittunt. Arabes autem & qui illos secuti sunt in multo vsu
habuere hydrargyrum, quod viuum argentum nuncupamus, & est
sanè efficax admodum medicamentum in his affectibus etiam diffi-
cilibus & inueteratis tollendis. vnde si prædictæ confectioni adda-
tur aliquid hydrargyri ex salua hominis præsertim ieiuni extincti
vel ex succo arancii in præsentia appellati, aut limonis, erit valens
& forte medicamentum, qualia ea sunt, quibus inungi solent artus,
præsertim vero manuum articulis & pedum aut etiam uolæ & plan-
tæ eorum. fit autem magis vel minus vehemens medicamentum,
quatenus plus, vel minus additur hydrargyri. Nam vel semuncia,
vel tres dragmæ, vel sesquidragma indi potest: & id habitum cor-
poris ratione, tum vero affectus: Conficiuntur autem & innumera
alia medicamenta similis ferè naturæ, quorum tamen materia sunt,
medicamenta simplicia, quæ hætenus fuere exposita: maiorem
vim habent ea quæ aut sulfur, aut calcanthum, aut chalcitem, aut
hydrargyrum, aut quod sublimatum vulgo appellant, aut veratrum
vtrumque

utrunque accipiunt: vtebantur tamen & alcyoniis antiqui: Sed nolimus diutius in his versari: satis enim excreuit tertius hic liber, & ultra quam putaremus: vnde iam finem illi faciemus, & interim ad quartam istius tractationis partem nos accingemus. in qua de localibus medicamentis agemus, in quibus maximam vim habet indicatio, quæ accipitur à locorum definitorum natura, & à capitis summa cute sumemus exordium: interim vero gratiæ sint quantæ possunt Deo optimo & maximo.

M. D. LIX. Patavij Sept. Kal. Augusti.

Libri tertij Finis.

VICTORIS
TRINCAVELLII
PHILOSOPHI ET MEDICI

V E N E T I

De compositione ac vsu medicamentorum,
LIBER QVARTVS



DE OPT. Maximo, qui bonorum om-
nium principium est, & finis, initium no-
bis nunc iuuenes studiosissimi quanti
istius nostri laboris libri, petendum (cū
compendii, ac formæ huius nostrorum
de vsu, & compositione medicamentor-
um, quos deo dante aliquādo edituri su-
mus commentariorum iam tres libri à
uobis me prælegēte fuerint excepti & ro-
gandus Deus ipse, vt nobis adsit, faxitque

vt noster hic labor ad ipsius præsertim honorem referatur, & in ue-
stram utilitatem, & gratiam, quibus, vt morem geramus, hanc pro-
vinciam suscepimus, possimus, & postremo huic nostri compen-
dii libro finem imponere: nam eo absoluto tum omni studio, ac di-
ligentia operam dabimus, vt & commentarii ipsi ad finem optatum
perducantur, ac deinde in lucem edantur. Huius autem libri argu-
mentum, ni fallor, non erit aliorum librorum argumento minus
difficile, sed longe magis varium, cum de illis medicamentis simus
æsturi, quæ propria, & particularia certis, ac definitis locis, ac parti-
culis in humano corpore particulatim, adhibere solent medici in
curandis affectibus, vnde etiam serè nomen accepere, & in iis cu-
randis diuersam curationis methodum indicet non solum diuersa
affectus secundum se natura, verum, & ipsarum, quæ male affectæ
sunt particularum. fieri enim quamuis possit, vt idem specie sit,
quantum ad affectus naturam, & essentiam pertinet, in diuersis par-
ticulis morbus. quia tamen ratio particularum varia admodum,
& diuersa est, quibus medicamenta aptanda, & accommodanda
sunt:

Victoris Trincauellij

sunt; necesse est, ut varia etiam tam usus, quam compositionis methodi eorum methodus euadat. In his autem tractandis hoc rudimentum nostrum, siue quarti libri commentariorum nostrum conpendium partiemur pro particularum ratione. & cum ordinem sequemur, quem Galenus, & plerique medicorum, celebriores saltem secuti sunt, qui idem argumentum tractauerunt. Incohabimus igitur à capite, & ab illis particulis, quæ in capite sunt. nam trium primarum, & præcipuarum partium, quæ in corpore sunt, ac insigni, & conspicuo interstitio distinguuntur, atque continent tres principes facultates, quæ vniuersum corporis rationem administrant, subinde eas particulas, quæ harum facultatum sedes sunt. & illas etiam, quas ipsis alioquin ministrant: prima quidem illa est, quæ caput à nostris, à Græci vero, *κεφαλή* dicitur: quæ continet membra animalis facultati deferuentia: altera vero, quæ *σπλήν*, à Græcis, à nostris vero pectus nuncupatur, quæ ea continet, quæ vitali ministrant. Tertia vero quæ Græce *σπλήν*, Latine vero venter, seu aluus appellatur: & est quasi armarium earum particularum, quibus tanquam instrumentis utitur naturalis animi vis. postea vero sunt extremæ partes, ut brachia, & manus, crura, & pedes quæ motricis facultatis præsertim sunt instrumenta. Vnde à capite ad alias partes eo ordine descendemus, quo sunt à natura digestæ. Sed & illud addamus quod in vnoquoque vnam tanquam primam, & præcipuam respiciant omnes particule, quæ his tribus quasi ventribus comprehenduntur, (in hoc enim iuniores nostros sequemur, qui in tres ventres corpus partiuntur, supremum caput nuncupantes, mediū thoracem, infimum vero interiorem ventrem, seu aluum: licet antiqui caput ventrem nunquam vocauerint. sed quia res hæc circa nomina tantū versatur, id non multum faciemus, nec in eo multum immorabimur, quia huiusmodi quæstiones; in quibus de nominibus est tantum controuersia, Galen. sequuti semper vti ineptas libenter prætermisimus) reliquæ tamen superuacue non sunt: omnes. n. propter illas præcipuas à summo illo rerum omnium opifice ita sunt procreatæ, ut earum ministerium, aut plurimum utile, aut ad modum necessarium sit. aliæ enim abrefactæ ut alimentum subministrant, aut alioquin materiam circa quam illa operatur, aliæ ut excrementa, quæ ex concoctione non possunt non generari, at trahunt & excernunt, ne retenta turbent omnia aliarum munia. aliæ vero ut has complectantur, contineant, foueant defendantque.

Ac

Ad hæc oportet medicum, qui recte & ex methodo velit harum omnium effectus, tum per alia instrumenta, tum vel maxime per apta medicamenta curare, earum omnium exquisitam cognitionem habere non tamen ad præsens instrumentum pertinet, particulatim omnia hic distinguere sed tantum summam ea recensere, quæ alibi diffuse, & per diædram a medicis præsertim vero a Galeno fuerit exposita, quæque a nobis hic tanquam posita & constituta sunt accipienda: & ne sæpius eadem repetendo tempus conteramus, orationem ad caput conuertamus, de quo primus est habendus sermo. In illo ergo plures continentur partes, quarum princeps est cerebrum, quod quemadmodum in lib. de Hyp. & Plato. placit, præsertimque in 2. & 7. cõcludit Gal. 1. quasi faciens est animalis facultas, ut in præsentia Hippo. Platonis & Gal. sequamur. huic enim sententiæ facilius, & clarius poterit accommodari methodus, quæ nostro huic scopo attinet: est & initium omnium sensuum. ut de partibus quæ sunt sensuum exteriorum instrumenta: præsertim vero quatuor circa caput sunt: nec fortasse aberraremus, si diceremus intra caput: nam in calvaria in anteriori parte duas habent forneas oculi, a quibus maiori ex parte comprehenduntur, immo & eorum tunicæ, quibus sunt inuoluti, sunt propagines membrarum cerebri. Instrumenta autem tam odoratus, quam auditus, & gustus potius interna sunt, quam externa, quæ item sæpe inferiunt ad excernenda excrementa, quæ copiosa generantur in cerebro. sunt præterea intra caput multi nervi, venæ, & arteriæ, quarum munus non est cur in præsentia exponamus, cum horum ratio alibi sit petenda. partes vero capitis, quæ hæc continent, sunt primum extima cutis, quæ hac parte ab aliis cutis partibus in humano corpore: si non omnibus, saltem pluribus differt, quod non vniuersa: sed multis, & magnis partibus naturæ instituto pilis obducta est, nam in summa parte capillata est, ex anteriori cilia habet & supercilia, circa metum, & verinque barbam in masculis procreat. Nam si Gal. sequamur in lib. 1. de compositione medicamentorum secundum locos, si in aliis partibus pili expullulant, id sit magis quasi ex accidenti ex ratione materiæ, quam p. insignè aliquè finem aut utilitatem. cilia autem & supercilia quasi necessaria oculis sunt. ex barba masculis ornamentum, gravitas, veneratioque accedit. capilli quidem, & ipsi caput faciemque exornant, sed & caput ab externis peregrinisque impressionibus, ut a radiis solaribus, frigore

atque

Cap. 2.

atque id genus aliis defendunt. Sub cute est membrana, quæ à Græcis pericranium dicitur, ob id quia cranio hoc est, caluarię circumquaque sit obducta. sub pericranio est caluaria, & sub caluaria duę membranę, quarum exterior crassior, & durior, interior tenuior est, quæ cerebro quasi eius tunica, vel cuticula hęcens, illud continet. Et quia medicus est artifex, qui, vt ferè in proverbio est, plerunque sensum solet sequi. externę vero, & continentes partes priores se offerunt sensibus, & prima cutis. de istis ergo, & primum de cutis capitis affectibus per medicamenta curandis, quatenus capitis est, agemus, hoc est de illis affectibus, qui illi attribuantur ratione illius ferè priuilegii, quod peculiariter consecuta est à natura quatenus capitis est, nempe vt capillata sit. nam quantum ad alios affectus pertinet, qui sunt illi communes, & quasi iudè cum aliis partibus cutis possunt ea quæ in priori libro fuere descripta esse satis; ne iusto longior euadat pręsens tractatio.

De Topicis medicamentis accommodatis ad affectus cutis capitis curandos. Cap. 2.

NON est autem vna, simplexque ratio affectuum, qui proprii sunt cuti capitis; sed multiplex, & varia. alii enim illi accidunt quatenus capillata; alii vero vt secundum propriam suam naturam considerantur, vt capillatę accidunt areę, quę à Græcis dicuntur *ἀλωπεκία* vel *ἀλωπίσις* caluities, quę à Græcis *φθρίσις* nuncupatur, & destiuuium capillorum, quod non habet proprium aliquod nomen Græcum vel Latinum. alii vero in ea oriuntur aggenita aliqua illi materia præter eius naturam ex excrementitio & vitioso humore ad illam delata, vt in affectu, qui *πυτρία* Gręce, porrigo vero, vel vt alii fursuratio Latine dicitur, in quo squamulę quasi inspersę sunt ipsi cuti, quę fursuribus sunt similes. vnde & nomen habuit. pytia enim fursur Gręce dicitur. itemq; in illo qui Gręce *φθρίσις* Latine vero pedicularis morbus, in quo multa animalia generantur, quę *φθίρι* à Græcis, à Latinis pediculi appellantur, alii vero proprie in substantia ipsa cutis proueniunt. sunt enim tumores, qui præter naturam in cute excitantur, & erumpentes in vlcera desinunt, vt sunt qui *ἔχθη*, *καρία*, *φθέρσις* à Gręcis nuncupantur: à Latinis vero, omnia communi nuncupatione dicuntur vlcera capitis manantia, propterea quia tenuis quidam ichor vel sanies emanat.

De medicamentis ergo quibus hi affectus curandi sunt, vel à medicis curari solēt, ac de recto eorū vsu in præsentia agemus. primū q; de illis quę ad capillos pertinet. nō q; vere capillorū proprii affectus, q; morbi pprie, referūtur ad partes corporis, q; animę vitęq; sūt participes. capilli vero, neq; viuūt, neq; pprie quis sint viles homini, partes corporis cōsēdi sūt, sed potius sūt aggeniti cuti ex excrementi materia. Sed affectus q; ad ipsos spectare vident, pprii sūt cutis, q; ī eius intēperie cōsistūt, vel cū materia, vel citra illā; q; vero capillis accidunt, sūt symptomata hos cutis affectus cōsequētia. Vnde neque curādi indicationes a capillis petuntur: sed ab affectionib. quę in cute sunt, quarū cognitionē inuestigamus ex obseruatione eorū quę capillis contingunt. duo vero vitia solēt capillis contingere ex male affecta cute. vt ī. de comp. med. secundū. loc. in pr. do. xij. Gal. nā naturalē suū. colorē immutant, in alium, alienum à sua natura, turpē & deformē, vt in vitiliginibus quę a Gręcis ^{Alumina} dicuntur, de quibus in præsentia nō agemus, quia non est is affectus proprius cutis capitis, sed cōmunis vniuersę cuti. Mutātur et in arcis, vt dicemus, ex parte capilli, ut quasi lineę videātur. alterū vero vitium est, quod cadunt & curim nudam relinquunt, aut rari admodū relinquūtur. & destituitur quidem cutis capillis, vel quia ipsa reddita est inepta ad eorū generationē, vel quia nō eas vires habet, vt eos cōtinere possit, qui, vel geniti sunt, vel generantur, sed illos decidere permittit vt in capillorū defluuiō, vel quia a viciosis humoribus, qui cuti sunt infarcti erodūtur illę, quę quasi radices infixę sunt cuti, a quibusque capilli pēdēt. illis autē erosio, cadūt necessitate quadā quod in arcis accidit, quę a Gręcis alopecię & ophiases dicuntur. quę re, & essentia sunt una & eadē affectio: figura tantum differens. nam in alopecia, cum incipiunt cadere capilli ulterius progreditur depilatio quasi recto tramite. aiunt autem nomen habuisse a vulpibus, quę maxime sunt huic affectui obnoxie. in ophiassi autem, obliqua & flexuosa fit depilatio, ut imicetur anguem serpentem per flexuosum iter. Vnde etiam inditum illi est nomen illud. affectus uero cutis a quibus euentunt, sunt raritas & laxitas cutis, quę sequitur eius consumptionem proprię & utilis substantię cutis & defectum utilius materię, ex qua possunt capilli procreari unde in conualescentibus ex magno aliquo morbo plerumque solent capilli defluere, multis etiam in autumno, idem solet euenire: Cal-

uities vero sequitur ariditatem cutis. nam cum nimis exiccatur cutis, sit perinde vii tellus squalida, in qua nullæ expululant plantæ. Vnde qui capite sunt siccori, tempestivius caluescunt: atque vero ab intemperie cutis cum materia viliosa & tum ad capillos generandos inepta, tum vero radices capillorum corrumpente vel erodente: Sed de caluicie, cum sit quasi naturalis affectus consequens plerumque exiccationem, quæ rationem ætatis sequitur, quamuis accedente ascititia etiam alia causa, cur corpus præsertim vero cutis citius & magis areseat, possit accelerare: non multa dicturi sumus, utpote quia illam credimus nequaquã posse evitari. & si quidam fuerint, qui crediderint eam posse tardari: sed cum proxima causa eius sit cutis ariditas & quasi squalor. si aliqua poterit ratione fieri, ut tardius caluescant: id ea erit, quod procuremus, ut corpus & præterea caput quominus fieri pōt, siccescat, quod fieri poterit, tū uictus rōne, tū vero, ab his cauēdo, quæ vim siccandi habēt. Vnde hoc affectu relicto, de capillorum defluuio agemus, ut à simplicioribus incipiamus. cum ergo defluuium id quātū ad præsens institutum attingit, duas habeat causas, raritatem & laxitatem cutis, quæ non potest firmare radices, ac stabiles eas stringendo reddere. & inopia præterea materiæ utilis, vnde possit cuti subministrari talis substantia, quæ apta sit ad capillorum generationem; duæ primæ exurgūt inde indicationes, altera ab affectu cutis, quæ nobis indicat eni esse addendum robur, ut ualide possit radicem capillorum continere. altera vero, corpus esse reficiendum: sed hæc nihil in præsentia ad nos pertinere videtur, cum illam uictus rationem ad hunc scopū accommodatam spectet: altera uero scopum maxime nobis offert, cui præcipue medicamēta, & præsertim ea quæ exterius solent adhiberi accommodantur. quamuis & priori scopo possint medicamenta esse utilia. cum non solum sit opus copia materiæ aptæ ad generationem capillorum: verum etiam ut illa ad cutem feratur. vnde ad hoc possunt conferre medicamenta: nempe si modestam aliquam vim habeant attrahendi, modestam inquam, quia cum attractio a calido fiat, quæ valide attrahunt, possunt, & subinde attractā materiā digerere, atque ita vacuare. duo ergo hi scopi spectandi in compositione, & usu medicamētōrū, quibus succurrendū est defluētibus capillis: nempe modeste attrahere, & modeste astringere. alioquin. nimmodica astringitio, præter id, quod nimis exiccet, cōstipans & cogens cutim, impedimento est, quo minus in ipsam possit pertran-

sire

fire fuliginosus vapor, qui vi caloris concoquentis vtilem illam materiam attollit, ex quo concreſcente & exiccato, fit capillus. Iam ergo nulli non euidens eſſe poteſt, qualia oporteat eſſe medicamenta huic inſtituto apta. nimirum quæ tum aſtringentia, tum attrahentia ſint ſed moderate. addit tamen Gal. quod ea uendum eſt ab aſtringentibus. validis, ea etiam ratione, quia hæc plerumque etiam frigida ſunt. quæ vero refrigerant & aſtringunt, repellunt & auertunt materiam quam attrahunt. Quamuis autem ex diuerſis auctoribus antiquis: Galenus multa deſcripſerit medicamenta, ipſe tamen ait, duo ſerè nobis poſſe ſufficere, quæ, & ſemper ab ipſo præ omnibus alijs ſunt habita tamquam optima, & experientia comprobata. & ea quidem ſimplicia ſunt & facultate ſimilia. nempe ladanum, quod ſincerum & naturale ſit, nullo ſane artificio tranſmutatum, & oleum lentſcinum. utrumque enim eatenus calidum eſt, ut attrahere modice poſſit, non inſigniter digerere. utrumque etiam eſt modeſte aſtringens. quod ſi utrumque commiſceatur in confectionem vnius medicamenti ea meſura, ut inde fiat, ut iuniores loqui ſolent, linimentum, vel molle vnguentum, quo cutis inungatur, optimum erit medicamentum. quod ſi lentſcino oleo careamus, alio erit vtendum, quod ſit modice alicuius aſtrictionis particeps, ut erat eo tempore hiſpanum oleum. hic autem apud nos quod aſſertur ex uicina regione, quæ Iſtria appellatur, poſſet eſſe aptum. nam non eſt aliquantulæ aſtrictionis expers: præſertim æſtuo tempore. nam ſi frigidior eſſet temporis ſtatus: poſſet accipi & maſtichinum. Non erimus autem longiores in his exponendis, cum neque affectus tanti ſit momenti, ut admodum diligentem requirar diſquiſitionem. nam, ut ait Gal. ſolent frequentius egrotantibus uel conualeſcentibus capilli deſluere, quibus, dum utuntur proba uictus ratione, qua reſiciantur, ſponte & ſine ulla medicamentorum ope, renaſcuntur. Sed unū prædictis ex Gal. addemus, lib. 1. de medicamentorum compositione ſecundum locos, quatenus ad rationem medicamentorum pertinet. nempe quod ſi nimium uideatur hoc deſluuium, oportebit pro lentſcino, alijs uti oleis magis adſtringentibus, ſicuti myrtinum eſt, aut melinum, quod ex cotoneo malo conficitur. alterum uero quod ad rationem uſus horum medicamentorum pertinet: eſt, quod deſcendendi ſunt capilli ſaltem ſecundum maiorem eorum partem, uel etiam omnino auferendi, & ad cutim abradendi. & hoc

Cap. 1.

habito respectu ad statum aeris, ratione frigoris; ne caput laedatur. ratio vero detrahendi capillos est duplex; altera, quia ante administrationem & inunctionem oportet ut cutis fricetur: nam & ita cutis calefiet & roborabitur, atque inde fiet facilior ad eam attractionem utilis materię, & penetratio medicamenti. Sed & medicamenti compagem non eandem nec modum unguinis semper eundem requirit ratio administrationis, quia si abrasa sint omnino capilli usque ad cutim, exigitur mollius & liquidius medicamentum, quo sit inungenda cutis, si ad cutim usque non sine detonsi, crassius sit cataplasma, & hic consistere volumus, ut in reliquis affectibus, qui maioris momenti sunt, habeamus ampliorem locum tractionis. agamus ergo de arcia, quę vulgo & a nostris ferè vulgaribus chyrurgis tinea appellatur. quarum ratio non est, ut diximus, ita simplex, ut eorum quę hactenus sint tractata: nam affectus priores in solam intemperaturam relati sunt, hi autem in intemperaturam cum materia & illa vitiosa. Sed hic paulisper consistendum, & petito quasi exemplo à Galeno in d. libro primo de compositione medicamentorum secundum locos, res hæc magis explananda. qui generationem capillorum, & pilorum reliquorum confert cum ortu, & incremento herbarum ex terra nascentium, & terrę quidem simile officium præstare cutim ait: naturam autem utrobique esse, quę tam herbas, quam capillos procreat, atque illis incrementum suggerit, sed illi necessaria est apta materia ad harum rerum procreationem, & incrementum. nam unaquęque res crescit ex simili materia illi ex qua generatur & quamvis pili non proprie ut herbe incrementum habeant. illarum nutrimento proprie crescunt, & secundum omnes dimensiones. pili vero proprie non aluntur neque crescunt, quia non nisi a longitudine crescunt, addita semper nova materia radici, cum quę crescit, & extra illā expellit atque ita longior fit capillus. Sed quomodocumque res hæc se habeat, hoc est illi quasi alimentum & incrementum suo sane modo, & quantum sua fert natura, & quantum nostro instituto in præsentia potest esse satis. Vnde sicuti duobus modis sterilis & nulla herbis fit terra, eisdem vel similibus rationibus cutis glabra & destituta capillis esse potest. & utraque ratio in materię defectum refertur. quāvis non sit eadem defectus ratio, nam aliquādo defectus est ex cuiuslibetque humoris penuria, sicut, quādo arescunt campi ex nimia siccitate

siccitate, intereunt herbæ quæ ortæ erant, ex inopia humoris, & in de neque aliæ possunt oriri. aliquando vero, non ex omnimoda humoris inopia: sed ex inopia humoris vel materiæ aptæ ad generationem & alimentum plantarum, vt in horto quando aluuntur ab aquis fallis, vel nitrosis inundantibus. priori modo fit caluitium: nempe ex nimia cutis ariditate, & aliquo etiam pacto defluuium capillorum. altero vero, atq. dum enim affluit vel corpus vniuersum, vel caput, malis & vitiosis succis, qui sicuti non sunt congruentes alendo corpori: immo sæpe bonos & viles vitiant & ineptos naturæ reddunt: ita halitus vel vapores ab illis attolluntur vi caloris natiui, quique materia apta erant gignendis capillis; huic muneri sunt inepti & inutiles, nec modo ipsi sunt inutiles, sed accedentes ad priores, qui erant iam in veluti radices conuersi, à quibus pendebant capilli, eos vitiant & corrumpunt, & interdum corrodunt, vt cadere cogantur. solent autem hi affectus plerumque esse soboles prauorum ciborum, & malæ victus rationis. congesti vero sunt vitiosi hi succi qui hos fouent affectus, nonnunquam in vniuerso corpore, nonnunquam in solo capite: interdum etiam vitio ipsius cutis ex affectu qui proprius factus sit ipsius cutis. nam cuti illud accidit, quod & reliquis partibus, ad quas confluit vitiosus humor. ab illa enim tandem vitatur, & corrumpitur eius habitus vel temperamentum, vt quantumuis ad eam optimum deferatur alimentum, corrumpatur tamen ab intemperie in illa contracta, & in vitiosum succum degeneret, qui affectum fouet. vnde consuluit Galenus vt inter initia antea quam inueterascat malum, & fiat cutis primarius affectus, eius curationi incumbamus, quia alioquin difficilior sit semper, & maiori negotio superat. His autem in hunc modum expositis, facile erit methodum citrandi hos affectus constituere & inire rōnē cōponendi apta medicamenta huic curationi, atque illis vtendi. nā cū morbus hic materiā præsentē & fouentē habeat, & intēperiē, quæ ab illa fouetur: nō erit simplex indicationū, & scoporū ratio: sed multiplex, nam & materia præsens suam habet indicationē, suā ēt hēt intemperaturā, & harum vtraque duplicem potest habere rationem. quia materia illa, aut occupat vniuersum corporis habitum, aut caput duntaxat, & cuti hærens, p̄xime cutim afficit, & pro diuersitate loci diuersam

Cap. 3.
Cap. 6.

Cap. 6.

etiam curationis methodum exigit, ita etiam cutis intemperata, & ra, vel iam eo deuenit, & ita impressa est, vt facta iam sit & independens, nempe ut vel remota quacunque vitiosa materia, ipsa adhuc maneat, & in causa esse possit, cur iterum cor: pro nutrimento possint cōgeri vitiosi succi fouētes hoc malum. Vel cutis nondū propriū & primariū contraxit vllū affectū: sed eius vniuersa ratio a pręsentibus malis humoribus pendet: Quatenus autem ad primum pertinet, si corpus, vt gręci aiunt sit cacochymum, erit omnino incohandum ab eius purgatione, & pro ratione humorum congestorum erit etiam instituenda purgatio, & Gal. in 1. libro de compositione med. secūdum loc. sequantur, itidemque in libello de facile parab. med. non semper ab eisdē excrementis excitatur is affectus, sed a diuersis. quandoque enim a vitiosa pituita, interdum vero a bilioso humore, crasso tamen. nam idem Gal. in libello de facile parab. proxime citato aut a crassis succis ortum habere areas, nonnūquā a melancholico. qui hęc distinguere eisdē libris, docuit, notatōi mirū colore cutis, an ad albū, vel ad pallidū flauū, vel ad atrū quomodo vergat, quāuis Alexan. Tralianus obseruari potius colorē capillorū voluerit, mihi tamē magis Galeni sentētia probatur, quibus autē medicamentis id sit agēdū, ad pręsens institutū haud pertinet: Sed ad primum librum: & ideo de hoc non habebimus aliūquem sermonem in pręsentia. corpore autem purgato, & pręterea, si ea humorū malorum copia habeat occasionem ab aliquo interno viscere, ex aliquo prauo affectu in illo contracto, illi etiam esset consulendum, postea ad caput purgandum esset accedendum. nam & ipsum proprium habet modum, quo particulatim purgari potest, per ea quę apophlegmatismata dicuntur, quasi pituitam educētia, quorum ratio varia est. nam alia per nares attracta purgant, quę Gręci enrina nuncupant, alia gargarizata, alia vero commasticata. Sed de his, vbi de internarum, partium affectibus curandis erit sermo, magis particulatim agemus. Vnde ad pręsentem locum attingere magis videtur, vt ea tractemus, quę priuatim spectant ad morbum iam factum remouendum. nempe vt; & vitiosos succos cui insidentes detrahāmus, & si vitium aliquod reliquum sit, post vacationem, illud etiam aptis medicamentis corrigāmus. neque tamen putandum, quod oportet eiusmodi moliri vacationē per medicamenta, quę soluentia, & purgātia proprie dicūtur, quāuis sepe tollatur omnino etiā malū hoc per diligentem

diligentem purgationem & rectam victus rationem : si inter initia id uioliamur antea quàm uiciatus sit cutis habitus, purgato. n. corpore & subtrahito fomento, quod illi sub miserabatur, natura ex se aliquas reliquias non multas digerit absomit que, & per rectâ victus rationem, genita vili materia in copia, capilli sine alia ope regerantur. Verum vbi inueterauerit affectus, & vitiosi succi copiosi sint cuti infarcti, non satis erit vniuersi corporis neque capitis vacinatio: sed topicis remediis erit opus, quibus, ut diximus, digerant & absumatur copia illa excrementorum, roboretur quæ & cutis interperies corrigatur: quod quidem officium ad præsens hoc nostrum institutum pertinet. Agamus ergo de medicamentorum ratione, quæ apta, & opportuna huic negotio sunt censenda. & quia ex methodo instituiamus agere, primum indicationes propriæ sunt depro-mendæ, quæ nobis scopos ostendat qui in eligendis, & componendis medicamentis sint spectandi. primariæ vero ac magis præcipuæ indicationes a duobus petendæ sunt. nempe a loco affecto, & a natura ipsius affectus. locus affectus est cutis capitis, quæ reliqua cute ferè durior & crassior est, atque propterea valentioribus opus esset medicamentis, quorum vis perueniat ad altiores eius partes, quibus capillorum radices infixæ sunt. affectus autem est intemperatura cum materia crassa atque impacta cuti, ut non facile possit discuti, & inde elui. quatenus autem ad hoc postremum pertinet, discussoriis egemus medicamentis. horum. n. ope vacuantur, quæ quasi absorta, & impacta sunt in substantia particularum: Sed & illa non minus oportet esse tenuis substantiæ, & tenuiorum partium, alioquin. n. nequirent in profundum, ut opus est, se indere, neque e profundis partibus materiam aptam ad capillorum generationem attrahere, præsertim vbi particula crassa & dura est. hoc vero sequitur, ut sit necesse id genus medicamenta non esse parum calida. ut tamen neque quicumque modus caloris sit huic negotio futurus utilis. nam neque is esse debet, ut cutim vrat, ut cuique potest esse perspicuum, sed neque propterea tantus, ut quauis non vrat, nimis tamen excicet. nam inter initia quod videbitur, plurimum profecisse: mox uero cutis euadet illi si milis, quæ conspicitur ita illis, qui caluescunt. oportet ergo ea medicamenta eligere, quæ tenues habeant partes, & intra certos quosdam & præfixos terminos calefaciunt, qui tamen non in omnibus, neque ubique, neque semper possunt esse iidem. ratio vero diuersitatis a naturali laborantis temperaturâ accipienda est, ab ætate, a sexu, a regione, a tempore. nam corpora iuniora & molliora lenioribus & facilioribus egent, tantum calefacientibus

quā deficcantib. hieme ēt facilius ferunt calidiora medicamēta. His in vniuersum explanatis opportunū sane erit vt particulatim de medicamētis, accōmodatis affectib. his curādis agamus, ac de apto corū vsu. prius tamē id cōsiderāōū est, quod ex Galeno & alijs aucto-ribus antiquis facile depromi potest: in ēpe quod arduū admodum est aliquod reperire simplex medicamentū, quod adamus sim possit ita statim aptari affectui, vt sit quantum satis sit pro ratione ipsius quatenus magis vel minus inueteratus sit, sit etiam maior vel minor & quantum etiam ratio corporis affecti requirit ex naturali eius temperatura, & etate, & sexu & id genus reliquis. Vnde multa solent proponere, & ea diuersorum ordinum, vt vnusquisque pro arbitrio suo ea eligat, quæ illi videntur propius accedere ad rationem scopi, quem sibi iuxta certam mensuram præscripserit. docent præterea, quo modo & ea quæ intensiora, & acriora videntur possunt remitti & mitigari: & quæ remissiora, intendi & aciora reddi. Gal. ergo horum meminit 1. de compositione medicamentorum secundum loc. & in hunc ordinem redigit, vt primum & supremum locum tum caliditate, tum partium tenuitate retineat euphorbium. mox vero illud sequatur thapsia, quæ planta est ferulacei generis, & copiosa nascitur in Calabria, Piceno, & Apulia, ac re admodum calidumque medicamentum, quod inter rubeficantia, & vesicantia eutem recensetur. hanc vim habent folia, insignem etiam radix & præsertim lachryma vel succus qui veluti in lachrymam concreuit. his succedunt semina sinapi, & nasturtii. & adarzæ, quæ & lymnitis dicitur. sed in præsentia neque in vsu est, neque, quod nouerim, nostris est cognita. est autem veluti spuma cannarum tenuium in paludibus nascentium quæ concreuit, vbi marina aqua dulcibus immiscetur. res adeo acris, vt exurat. hæc sequuntur illis aliquanto inferiora sulfur, spuma nitri, atque ipsum nitrum: non tamen quodlibet: sed illud quod molle sit: nō lapidosum. nā hoc tenuioris est substantiæ, quodq; prius fuerit nstrū, ex igne. n. adhuc tenuius fit sicuti & spuma nitri. quæ qualis sit non ausim ita facile affirmare, ideo neque in illa exponenda erō multus. nec ab his admodum distat verumque ueratrum, cum nigrum, tum album, & crucæ semen, oleumque laurinum, & his etiā accedit utrūque alcyonium: nempe quod à Dioscor. lib. 5. secundum & quartum appellatur, & a Galen. quoque præsertim in lib. 11. de simplicium medicament. fac. circa si. & hæc apta sunt medi-

camenta

Cap. 137.
vbi de Alcyonio
agit.
Capit. de
iis, quæ in
Mari, & a
quis salis
proveniunt. vbi
agit de Alcyonio.

camenta siue prius exurantur siue citra vstionem illis vtamur. præstantiora tamen fiunt, si urantur, eadem, quam nuper exposuimus, ratione, nempe quia fiunt tenuiorum partium ex igne. recentiores Arabes secuti, spumam maris vulgo appellant: præterea ad hunc etiam scopum vtilis sunt cortices combustarum cannarum: si sint exusti. in illis. nautæ sensit Aristotel. ex igne relinquitur, vt etiam in calce, aliquid igneum, quod potest calefacere & ex profundo attrahere. ab his deinde sequitur pix liquida, quæ vulgaribus quoque in his affectibus est in frequenti vsu. & cedria, & muri stercus; deinde vero, & sepum vrsi recens, & hyenæ, pardique & leonis, tandemque & anseris, quæ eò erunt efficaciora, quo fuerint viciustiora. tempore. n. adipeshi & calidiores fiunt, & tenuioris substantiæ, sicut, & oleum, & iâdem cetera omnia quæ calida sint, & tenuium partium. in quibus essent, & amaræ amigdalæ, vniuersæ cum suo cortice concrematæ. ex his ergo, & id genus aliis simplicibus medicamentis conficiuntur composita omnia, quibus in his affectibus curandis vtuntur, & vsi sunt medici. verum anteaquam de compositis agamus, quædam in vniuersum sunt explananda, quæ vtilia erunt, siue simplicibus, siue compositis simus vsuri: primum quod illud, quod cum sit necesse in eorû usu præsertim obseruare quosdam terminos in medicamentorum horum viribus, quos si excedamus, aut nihil nostra proficiet curatio, aut etiam, vt diximus, plurimû poterit obesse. nam si fuerit eorum vis languidior parum proderunt. sin autem acrior, & valentior, poterunt, vlcerata cute, aut nimis exsiccata, plurimum ledere. Vnde si his simplicibus vti voluerimus, illud erit primum aduertendum quæ ea, quæ in prioribus ordinibus fuere proposita; per se omnino nimis acris sunt & magis apta vt ledant quàm vt iuuent. postrema vero, sicuti pix, adeps vrsi, anseris, & alia quæ similia sunt, satis sunt imbecilla præsertim in durioribus corporibus, & magis antiquatis affectibus. vnde sepe erit opus, vt vel his vires addamus, vel aliis detrahamus, delinita & mitigata aliquantisper eorum acrimonia, & violentia. ut tamen hoc præ oculis habeamus, quod sæpe monuit Galenus: nimirum quod quia vix fieri potest, vt statim prima die scopum, quem nobis proposueramus adamusim attingamus, ita potius agendum est, vt infra terminum subsistamus, quàm, vt supra progrediamur, & id quia dum debilio

ribus

quò vero magis inuelescunt, eo etiam magis eorum vires exol-
lescant. vt autem res magis particulatim tractetur, imitabimur Gale-
nū loco superius citato. aliquando satis erit si ad ceratum sit duo
de cima pars euphorbii, nonnunquam vnde decima, quandoq; decima,
raro vltius, si euphorbii vires nō inceperint languescere ex a-
te. eodem modo dicemus de thapsia, quamuis enim illa sit aliquan-
to infra euphorbium, poterimus in eius vsu, aliquanto esse libera-
liores, non tamen multum. Sed & ad affectum respiciendum: nem-
pe si malignior, & pertinacior videatur vel secus. Quod vero de
cerato diximus, id ipsum & ad oleum referendum erit. vt enim cū
cerato miscetur, ita possunt dilui dissoluique copioso oleo, vel
parciori, vt commodatius citra ceram inungatur locus, sed neque
oleum quærendum est, quod sit astringens, verum id potius, quod
tenue sit & digerens. Galenus vero ex aqua diluebat hæc medica-
menta, ita illis dilutis & remissioribus factis. Sed duo addamus ad-
huc, quæ nos Gale. monuit, atque mox ad composita transibimus.
& hæc rationem vsus spectant. Primum, quia plurimum refert, vt
facile medicamenta se in profundum indāt, & inde attrahant: id eo
medici non solū quæ ut ea medicamēta, quæ tū calore, tū partū te-
nuitate facile pēnetrent: verum nituntur ita affectum locum pa-
rare, vt facilius ea dum penetrant admittant reddito expeditiori
transitu: vnde consulunt, vt antequam medicamentum medicus ad-
hibeat, locus fricetur, donec rubescat & caleseat. inde enim rarefit
cutis, & itaque facilius transit vis medicamenti. Alterum vero est ad-
huc momenti maioris. nimirum, vt medicus quandoque apposi-
tus est medicamen, priori deterso, aut alioquin ablato, diligen-
ter cutem intueatur, notetque quomodo illa se habeat, quamquā
mutationem acceperit. quia, si nihil videatur mutata; signum erit
lægui dum nimis esse medicamentum parumque esse profecturum:
nisi aliquid acris medicamenti addatur. si vero cutis videatur ru-
bens, & quasi feruens, peneque principia aliqua inflammationis cō-
traxisse, incepisseque aliquo modo excoriari, id iudicabit ualidius, &
acrius esse medicamentum, & proinde esse opus, vt de viribus de-
trahatur, vt præterea sit etiam danda opera lenientibus & sedanti-
bus inflammationem, vt res ea mitescat antequam medicamentum
aptum apponatur. in addendo autem aut detrahendo de uiribus,
attendendum est quid Galenus consuluit, qui recte monet, quod
si præmanibus acerrima habeamus medicamēta, quæ superent exi-
gentiam

gentiam nostrā vt euphorbium, thapsiam, adarcem, sinapin, illud erit molliendum, & mitigandum oleo, vt diximus, aut cerato aut etiam aqua. Sed si medicamentum quod in promptu habemus, lenius v. deatur, quam opus esset, illis erit dissoluendum, quæ eius vires excitare possunt, vt esset oleum laurinum. Sed de compositis ali quibus agamus, non tamen de omnibus: quatenus autem his probe perceptis iuuenes aliorum rationes facilius inire possint: hoc tamē prius considerandum, quod alias præterea in prioribus libris fuit a nobis expositum, nempe quod consuevere medici in conficiendis compositis medicamentis rarissime esse contenti vnico medicamento ad curandam vnā morborum differentiam, sed semper sunt necessaria plura, quæ aut easdem vires in vniuersum habeant, & secundum speciem & eundem scopum respiciant, ordine tamē vel, vt iuniores loqui solent gradu differant, vel efficacia, aut interdum etiam contrarias, istius vero rei causa est, quam paulo ante exposuimus: nempe quia differens est eorum corporum, quæ curanda sunt, ratio, & natura: differens etiam est morborum curandorum conditio tempore, magnitudine, malignitate, & pertinentia. vnde aliquando fortioribus opus est medicamentis, aliquando infirmioribus, cum semper oporteat, quod medicamenta se habeāt vt se habent & morbi. hoc enim & Hippo. docuit in aphorismis cū dixit, Extremis morbis accommodātur extrema remedia. potest autem medicus diuersimode sibi diuersa comparare medicamenta secundam propositam rationem. præsertim si peritus & versatus fuerit in materia medicinali, viresque eorum simplicium quæ in promptu sunt, perspectas habuerit. Negotium autem hoc longe clarius euadet: si rem hanc magis particulatim tractauerimus, & medicamenta, quæ ab antiquis & clarioribus medicis fuere composita, & multis laudib. elata: præsertim vero quæ Galenus primo de cōposit. medicamentorum secundum loca, descripsit, explanauerimus. Ergo ibi confectionem istius medicamenti, litteris mandauit, quod præterquam quod ea ratione compositum est vt possumus inde sperare, q̄ sit futurum optimum, illi etiam experientia adeo, fuit, vt ille testatus sit, hoc se nulli secundum unquam reperiisse. componitur autem in hunc modum. Accipit euphorbii, thapsiæ, olei laurini singulorum drag. ij. sulfuris viui, veratri alterutrius. in hac enim re nihil refert hoc, vel illud accipiamus. singulorum drag. j. ceræ drag. vj. liquefit cera ex oleo laurino, vel cicino,

vel

vel cōi, sed veteri, aut si his oīb. careremus, possemus, ut apte oleo
ex lucernis effuso, quod simile sit cicino & veteri, dū quasi exco-
quitur in lucernis, & ad formam cerati, mollis tū deducitur, cui re-
liquis prius intritis & inspersis optimeque cōmixtis absoluitur me-
dicamentum, quod præstantissimum iudicatū est: sed nō omnibus
hoc pacto confectū congruū est, quia strēuū admodū est & va-
letissimū. vnde ad difficiles alopecias & plurimū pertinacēs, & in-
lignas erit optimum, itemq; corporib. durioribus & solidioribus
mediocrib. vero, aut leniorib. affectionib. item & pueris, mulierib.
& tandem molliorib. minū asperū acerbūque medicamen-
tum esset. Sed de ratione compositionis, paucis tamen, ut iuue-
nes exquisitius instruantur, agamus. Scōpum sibi in conficiendo
hoc medicamento proposuit, id parare, quod esset generosum ad
modum & aens quantumlibet inueteratas & rebellēs superaret,
vnde statim duo simplicia prima accepit, quæ in primo, & supremo
ordinē sunt, vimque maximam habent attrahendi ex profundo,
ut ea essent tanquam fundamentum, uel ut iuniores aiunt, basis uni-
uersę compositionis: ea uerō sunt euphorbium, & thapsia, quia ta-
men adeo acria sunt, ut humana cutis quantumlibet dura sit, eorum
vim citra noxam & insignem quidem, terre nequeat iureretur, nam
que & ulceraretur, necesse erat aliquantulum delinire, & refrenare
tantum eorum vim, ut facilius ferri possit, aliorū aliquorum mix-
tura, bisariam uero hoc agi potest: nempe uel additis illis, quę li-
cet eisdem qualitatibus prædita sint, eas tamen remissiores habent,
illis, quæ qualitatibus oppositis sint prædita, ut pote quæ lenientia
potius mollientiaque sint. & per hæc quidem maior fit repressio
& refrenatio acrimonię, quam per priora, unde illis, quę quasi ro-
bore extrema sunt, addit sulfur, & ueratrum, quorum primum in
tertio ab illis, ordine est, alterū in quarto, in quo et est laurinū oleū,
quibus omnibus simul cōmixtis remanet adhuc vis medicamenti
adeo robusta, ut ferē pauci eam possint comode ferē, quia autem
instituerat medicamentū conficere, quod formā, vel cōpagē cerati,
aliquo mō mollis hōret, iō erat opus cerā illi addere, quę emplasticę
est naturę, potq; plurimū eximīā illā vim remittere, quæ longē et re-
missior fuerit, si cera, quā fundi & liquori necesse est, aliquo pingui
humore, fundatur, aliquo uero oleo laxate. iō, ne adeo retūdatur vis me-
dicamēti, voluit eā liquari aut aurino oleo, aut cicino, aut veteri,
vel adipe urli, vel alio simili, ubi si recte cōsiderauerim, quāq; basis
sunt

sunt proportionē alia superant, non eorum quatuor dragmæ acci-
piuntur. sulfuris autē, quod in tertio ordine est, vnum duntaxat ac-
cipit. olei vero laurini & veratri, tres drag. nam quatenus ad ceram
pertinet, illa tanquā materia medicamenti sumitur à Gal. tempera-
tius ergo hoc pacto redditum est medicamentum, vt & adulti &
quibus exercitatione robustius, & solidius redditum sit corpus, fa-
cile possint illud tollerare. potens quod sit superare difficiles con-
tumaces, ac malignas áreas, potentius tamen quā vt qui habitu
corporis molliori sunt possint perferre citra noxā, sed neq; medio-
cribus affectibus esset accommodatū. Quod si quis quærat. Cum
sæpius aræ soleant pueros, & adolescentes corripere. sæpiusque
affectus hi occurrant medicis non extremi & plurimum maligni:
verum potius mediocres: vt proinde in frequentiori vsu pos-
sint esse medicamenta mediocria & mitia, quā ea quæ potentio-
ra sunt. rationi magis consonum fuisset, si Gal. quem nos volumus
imitari, à mitioribus incepisset, & in illis magis versaretur? Re-
spondere huic obiectioni non est difficile. dicimus enim quod
quamuis non admodum sæpe vtamur his ita valentibus medica-
mentis: possunt tamen frequentissime esse in vsu medico perito,
& prudenti: quia hoc genus medicamenti potest aptari pertinaci-
bus, malisque affectionibus, nec minus etiam minoribus, & facilio-
ribus: si artem calluerit, augendi ac remittendi acrimoniam & ro-
bur eius virium, additis illis quæ possint id efficere; exempli cau-
sa, si cerati plus addatur. nam addita cera, & oleo, aut alio liquore
pingui, & molliente, laxanteque de viribus medicamenti detrahe-
tur. vnde licet fuerit hoc medicamentum tanquam vltimum descri-
ptum, tamen superat medicamenta multa potestate. Possunt ta-
men, si quis voluerit, componi alia medicamenta infirmiora si di-
mitamus ea acriora medicamenta quæ ad primum ordinem ferè
pertinent, vt est euphorbium, thapsia, adarce, sinapi, & vti illis quæ
ad tertium attinent ordinem, qđ quidē quo pacto fieri possit ostē-
demus, petitis exemplis ab antiquis illis medicis, quorum meminit
Galenus, & ab ipso etiam Galeno. nam docet, quod si accipiamus
vrsi adipem, atque etiam asseris: postquam nobis non ita facile es-
se potest in promptu leoninus adeps, vel leonē vel pardi. quibus
si duodecima pars thapsiæ, aut euphorbii, vel adarcii, vel omnium
simul mixtorum erit commodum, nec admodum acre medicamē-
tum. Sed si aliqua exempla ex aliis antiquis auctoribus acceperi-

mus,

mus, res hæc erit apertior. Heras huius meminit, hæc conficitur ex ad
 tyonio; quod diximus in præsentia spumam maris à iunioribus apa-
 pellari, prius vsto, mox trito, & ex oleo levigato, præsertim si ex
 oleo fiat ex tucernis arcepro, quod tenuius est, ut paulo ante dixi-
 mus, hoc medicamentum in Galenus, posse esse satis ad areas me-
 dias inagnitudine. moderatius autem erit quod fit ex amaris amig-
 dalis vstis integris cum cortice, vel ex carinarum radicibus, vel
 earum corticibus itidem vstis, vel si ex abrotano vsto, bis tritis, ex
 oleo quæ levigatis & illitis, hoc autem aliquanto fortius est. Altea-
 rum eiusdem Heræ, quod fit ex seminibus nasturcii, erucæ, nitri,
 singulorum pari accepta mensura, & liquida affusa pice quanta vi-
 deatur satis ad illa assumenda: poterit esse efficax medicamentum in
 pueris, & molliorib. corporib. si hæc quorū nuper meminimus, ut
 solent aliqui trita aceto excipiantur, & tantillum mellis addatur.
 alii hoc eodem modo vtuntur, cineribus ex herinaceis. marinis
 vstis, exceptis vsquo adipe, alii laurino oleo. ut tandem ad hoc mu-
 nus omnia accommodari possint, quæ tenuis sunt substantiæ & è
 profundo attrahunt, & hic nolumus quantum ad hos affectus per-
 tinet, consistere; Hoc eodem vero capite agemus de medicamen-
 tis aptis ad curandum affectum qui porrigo & pedicularis morbus
 à Latinis dicitur: Græce vero *veriglaia* & *phlogia*, quia neque admodū
 dissimilem generationis, neque curationis rationem ab his habet,
 de quibus hæctenus egimus. utrique enim ex vitiosis humoribus
 confluentibus ad cutem originem habent. quamvis inter se hac ra-
 tione differant, quod pytirialis, quam nonnulli exprimere volen-
 tes vim Græci vocabuli, furfurationem appellauere, fit à tenuiori
 bus & serosis succis, non expertibus tamen alicuius acrimoniz. vel
 ut Galenus ait, ab ichoribus ipsorum humorum qui sæpe tenuitate
 possunt etiam pertrahere cuticulam extimam, & ibi hærentes, con-
 crescent in corpuscula similia squamulis, vel furfuribus, unde etiā
 deducum est nomen illud Græcum. decidant autem dum vel un-
 guibus caput, uel pectine scalpimus. Pediculi vero sæda admo-
 dum animalia ex crassiori humore, sed calido gignuntur in pro-
 fundiori cute: præ crassitie enim nequit ad cuticulam usque pertin-
 gere, unde in parte cutis altiori contentus, ibique putrescens, fit
 materia generationis horum animalium, quæ de mum è cute eru-
 pant. differunt ergo fursures à pediculis loco in quo generantur,
 & natura materiæ ex quo ortum habent. nam illæ ex tenuiori, hic
 ex

affectio, & si ea nos perpendamus non deërit in eis astrictio. neq;
 tamen rem hanc dissoluit. fortasse quia aliis in locis hoc definitum
 erat, quia non omnino tutus esset usus id genus medicamentorum,
 quando aut ab vniuerso corpore, aut ab interno aliquo viscere affe-
 ctus foueretur, nam ea propter cutis procreata est imbecillior aliis
 partibus, vt facilius excrementa admittere posset: si tamen mun-
 dum esset corpus, possent in hunc usum venire, præcipui tamen scō-
 pi in quibus vniuersa ratio curationis posita est, non sunt omnino
 ii dem in porriginē & pediculari morbo: sicuti neque eadem est
 materia, neque idem locus in quo illa consistit, cum enim tenuis
 sit materia porriginis hērens sūmę cuticulę: illi satis erunt medi-
 camenta, quę modeste digerant, & aliquantum etiam detergant, pe-
 diculorum vero crassior est materia, & interius in alto sub cuti cō-
 tenta, & proinde acrioribus est opus medicamentis, quę maiorem
 discutiendi, & attenuandi vim habeant, præterea vero attrahendi
 ex altioribus partibus. In porriginē ergo satis esse poterunt deco-
 ctum scēni gręci, nam modice digerit, discutitque, itidemque &
 betę. præterea vero: & amarę amigdalę. amari etiam lu-
 pinij, & malna agrestis, vt tandem usque ad nitrum sit ascen-
 dēdum, terra præterea chinolea cū felle vel bubulo vel suillo. Quā
 tenuis autem ad rationem usus pertinet, potest harū rerū deco-
 ctis præsertim scēni gręci, betę, agrestis malux, lupinorum
 caput ablui. possunt etiam componi admodum mollioris vn-
 guenti, quo caput affricare mox oportet, vt docuit Galen. quod
 que vbi exaruerit, calida abluendum. amigdalas ergo amaras de-
 corticatas ex aceto uel aqua, sed ex aceto efficacius erit, contritas
 affricabis. maluum vero siluestrem coctam ex aqua marina donec
 reliqua sit pars decima si triueris, erit vtile medicamentum,
 validum & fortasse nimis est medicamentum, cuius memi-
 nit Galenus confectum ex spuma nitri & atramento futorio
 mixtis æquis partibus, & vino assumptis, & erit adeo validum,
 vt si quater affricetur in mense, non amplius gignantur hę squamu-
 læ. nam in atramento vis est astringens etiam insignis, laudat præ-
 terea serum liquidę picis illitum, asperso mox nitro. Ad tollē-
 dos vero pediculos maioribus auxiliis opus est, cum crassior, &
 profundior sit materia, vnde generantur: quare oportet,
 ut medicamenta a profundo attrahant, & desiccant. nam desiccantia

H h tia

ut præter id quod consumunt humorem ex quo generandi sunt pediculi, obstant, etiam quo minus putrescat, quod tamen necessarium est, si sint procreanda id genus animalia quæ propter multa ex illis quæ sanandis acris vitia sunt, possunt etiam in pediculari morbo venire in usum, quæ tamen, ait Galenus, experientia comprobata sunt, illa sunt, quæ agriani hoc est siluestrem staphin accipiunt, unde, & nomen a latinis accepit. pedicularis enim herba vocatur. Sed & veratrum nigrum, vel album, item & nigrum. sed & oxylapatum vel oxalidis radices inter medicamenta recensentur, quæ ex oleo trita accommodata sunt huic negotio: si illis affricetur cutis, nostris autem temporibus experientia docuit, quod his animalibus hydrargyros, seu, ut illud in præsentia vulgo appellant, argentum viuum, quam maxime his animalibus inimicum est, ut ab eo sicut & alia animalia quæ eandem rationem generationis habent, ut cimices pulices & id generis aliam fugiant, & necentur. Horum vero medicamentorum modum ita docuit Galaccipe staphidis siluestris partes duas sandarachæ, nitri, singulorum partem unam, terantur. ac ex aceto, & oleo mixta capiti illinantur. Item veratrum album, & siluestrem staphidem, nitrumque pari pondere, accepta & ex aceto, aut aqua marina commixta capiti illine: Sed ubi adsit nuditas capillorum staphis siluestris cum aceto, & oleo illinenda est hac autem tempestate ad necandos pediculos mulieres siluestrem staphin tritam inspergunt capiti ita aridam. hydrargyros, hoc est, argentum viuum vulgo dicitur, hac nostra tempestate in usum venit. extinguitur autem primum, aut salia, aut succo arancij vulgo appellati. postea suillo larido commiscetur. & extēditur lintheo stricto. sicut sunt, quæ vulgo cordellæ vocantur. & capiti super capillis circumdatur, hoc tamen obseruant, ut pars ea, quæ medicamento delinita est, caput non tangat, sed in exteriori partem versa sit. nam odore, vel vapore abigit omnes pediculos. fugiunt enim per stragula, unde obseruandi sunt, ne per ea diffugientes, aliis postea partibus, hærentes tunicis, sint molesti. capiendi namque & necandi. & quatenus ad hos affectus pertinet hæc esse satis possunt. de vlcerebus manantibus agamus.

De vlcerebus manantibus agamus. De vlcerebus manantibus agamus. De vlcerebus manantibus agamus. De vlcerebus manantibus agamus. De vlcerebus manantibus agamus.

De medicamentis aptis ad curandum manantia vlcera in capite, quæ
 ἰχθυῖς, & ὤφια, & ἰχθυῖς dicuntur. Cap. 3.

Postremus affectus ad capitis cutem præsertim attinens, vna cō-
 muni nomenclatione vlcera manantia appellatur: quia tamen plu-
 res in eo, possunt particulatim observari differentiæ, plura etiam
 sortitus est nomina apud græcos, differentiæ vero quæ in hoc af-
 fectu notari potest, est, aut ratione materiæ a qua procreatur, aut
 ratione loci in quo consistit. nam quæ ἰχθυῖς dicuntur, sunt velu-
 ti minutissimæ, quædam papulæ, quæ soli extremæ cuticulæ insident
 quasi vesiculæ, & inde etiam, illi nomen id inditum. ὤφια enim pa-
 pulam vel vesiculam significat, & ea tenuisimo quodam ichore
 ortum habent, ὤφια vero quæ fauôs latine possumus interpretari,
 ab humore crassiori consistentia & lenire simili mediocri secun-
 dum consistentiam, & proinde non modo extremam cuticulam, sed
 profundiorē etiam cutim afficit, eam quæ primum in tumorem
 attollit, mox quod perforat grandioribus quibusdam forami-
 nibus quibus humor quidam emanat, ut videatur hac ratione fauū
 mellis ὤφια, a cuius cellulis vel foraminibus mel emanat, unde ab
 hac similitudine & ἰχθυῖς græce, hoc est, fauus dictus est. Tertia dif-
 ferentia ἰχθυῖς dicuntur, his prioribus similis, quatenus ad hoc per-
 tinet, quod a vitiosis humoribus ortum habet, qui primum cutim
 in tumorem eleuant, mox ea pertusa ab illis foraminibus humor
 vel ichor quidam effluit, tenuior quidem quam a fauo, crassior au-
 tem quam a psyracis, & ferè mediū est affectus, ita & exiliora fo-
 ramina in hoc sunt, & tenuior succus qui effluit, hæc est horum dif-
 ferentia, qui tamen etiam in multis sunt similia. nam pariter sunt
 quasi soboles vitiosorum humorum, in initio item sunt in genere
 tumorum qui præter naturam dicuntur, postea in vlcera delinunt,
 & cum omnium horum comes sit pruritus, necesse est, quod hu-
 mor unde concitantur, sit acrimonie particeps. Sed quia ad rectam
 rationem componendi apta medicamenta non parum refert natu-
 ram materiæ a qua fit morbus, nouisse, ideo paucula quædam de ea
 etiam dicemus. psyracia itaque a tenui ichore & seroso humore
 excitatur, qui sæpe præsertim pituitæ naturam refert. acor autem,
 ut ait Galen. constat ex humore mixto cuius vna pars ichorosa &
 tenuis ubique: unde & achor, ut videtur redẽ Galenus lib. 1. de

Cap. 8.

compositione medicamentorum. secundum locos. insinuas-
 se. Hæc autem, quædam

Cap. 8.

quasi ichor dictus, ab eo qui ab illo effluit ichor, dictus: sicut & multi alii morbi ab aliquo symptomate denominationem habuerunt: altera vero crassior est, crassior vero est faui materia & he omnes prefertim, ut i. de compositione medicamentorum secundum libea videtur dixisse Gal. pituitosæ sunt, præcipue vero falsæ: pituitæ naturam, referentes: quod non credo ita accipiendum esse, ac si ille crediderit ab alio humore hos morbos minime fieri posse: quia scilicet, tam Actius, quam Alex. Trallianus, prodidere, sed quod raro ab alio: plerumque autem a pituita falsa. nã & ipse ait aliquos achores phlegmonosos esse. Quibus ita constitutis, cum reliquum videatur esse, ut ratione componendi appositæ medicamentis his affectibus curandis & congruenti eorû usu sermonem habeamus: ut ex recta methodo id facere possimus, hoc etiam considerandum est, quod affectus hi possunt quidem interdum oriri, ut de prioribus quoque diximus, ex vitio proprio ipsius cutis corruptentis suum nutrimentum in prauos humores: interdum vero ex affluxu, ex cremetitiæ materiæ ad cutem, quoniam ex sola male affecta cute oritur, soli cuti externis, & localibus remediis erit incubendum. quoniam vero ex affluxu, primum causæ attendendum: nempe ut tollamus fluxionem, primum remota eius causa, quæ uacuatione uniuersi corporis ac reuulsionibus uel derivationibus erit remouenda, atque ut etiam affluentem humorem post uacuationem aliquo modo repellamus. præterea vero ut si generatur humor ille, qui affluit ex aliquo cuiuspiam visceris vitioso affectu, ille etiam propriis, & accommodatis remediis curandus erit, quod ad præsens institutum non pertinet. si cut etiam, qua ratione & quibus medicamentis sit instituenda uacuatio, vel quod pro ratione humoris quo refertum est corpus eligenda sint purgatiua medicamenta moderandaque pro ratione nature corporum, ætatisque, & uirium, & temporum. Quare agamus in præsentia de indicationibus. & scopis, qui spectandi sunt in electione, compositione, & usu medicamentorum; quibus curandi sunt hi affectus, quatenus iam pertinet ad naturam ipsius morbi in uniuersum prius, deinde & particularitatem. sed quia interdum simplices sunt hi affectus, simplices inquam, quia non habent aliquam affectus alterius complexionem, qui possit propriam eius rationem variare: sicut si sint participes aliquo modo alicuius inflammationis, ut & rubicunda proinde uideatur cutis, & magis quam par sit dolorosa. nam si hoc modo se haberet indicatio quæ ab hoc esset depromenda, omnibus aliis locum præciperet, sicut in aliis etiam

etiam omnibus vlceribus solet euenire, quando annexam habent inflammationem. statim siquidem incohandum est ab illis remediis, quibus dolor sedandus est, & inflammatio tollenda. nam si hoc tempore uti vellemus medicamentis, quæ eiusmodi requirunt, morerent locum affectum, affectionenique irritarent, & aucto dolore, maior fieret attractio nocuorum humorum. medicamenta vero, quæ sunt huic officio accommodata, sunt, quæ humida sunt, vimque molliendi, & concoquendi habent citra ullam acrimoniam. qualia vero sint eiusmodi medicamento Galenus primo de comp. med. secundum locos exemplo demonstrat. ait enim eiusmodi esse id quod parygron Græce appellatum est, cuius descriptio. tum ab Herra litteris tradita sunt tum ab aliis antiquis medicis & eius meminit Gal. 1. de simp. med. fac. Paulus autem & ipse quandiu istius medicamenti confectionem exposuit, quam in Oribasii auctorem retulit. nos vero tertio libro cap. de scirrho de compositione & natura viribusque istius medicamenti sermonem habuimus, quare nolumus, ne tempus conteramus, eadem hoc loco, repetere, quia nobis restat grandis via. nisi quod non erit ab re de modo vsus eius aliqua referre. nam videtur aliquantisper diuersus Gal. primo de compositione medicamentorum secundum loca, & septimo de compositione secundum genera. hic enim componi oleo quod astringentis sit experts, ibi vero molliori hoc medicamentum voluit & dilui, ut illiniri possit oleo rosaceo. Sed si considerentur scopi, quos hic vel ibi spectauit Gal. utrunque protulit ex recta ratione. nam in libro de comp. secundum genera eius meminit quatenus vim habet molliendi partes induratas, id autem magis præstare poterit: si fiat ex oleo maturo adstringentis experte, in primo autem de comp. secundum locos instituit occurrere inflammationi cui officio magis aptum erit medicamentum: si ex oleo rosaceo emolliatur & diluatur. nam præter id, quod facilius refrigerat calidiorem loci intemperiem, atque ita dolorem lenit, astringendo etiam fluxionem arceat. Sed his addamus, quæ eiusmodi medicamenta, ut eodē 7. docuit Gal. quo magis inueteratæ magis et indurascunt. in his aut affectibus, de quibus in præsentia agimus, quoniam dolorosi & aliquid inflammationis habent, accommodatius est hoc medicamentum quanto recentius est. hoc enim modo magis dolorē sedat. Sed quo magis inueterascit, eo maiore habet vim dissiliiores emolliendi duricies, & proinde voluit Gal. magis adhuc

D. cap. 8.

Capit. de
pinguedi-
ne, & adi-
pe.

Cap. 1.

emolliri rosaceo, ut linimenti compagem retineat. Sed & id ad-
uertendum est, quod præterea memoriæ mandandum: nempe
quanta diligentia in his uti consueverit Galenus, qui consulit,
ut quando diluere ex rosaceo medicamentum volumus, id non
ad ignem agamus: sed manibus, aut spatula commiscendo subigamus.
quia ab igne medicamentum sibi extraneum quendam calorem cõ
parat. unde postea non euadit expertus alicuius acrimoniz & morsus.
quod si in hoc affectu tanta istius rei ratio habenda est, longe ma-
ior in alijs veris inflammationibus, & cæteris affectibus calidis, &
dolorosis. & cum non ægre hoc medicamentum emolliri & subi-
gi possit; hac etiam ratione minus necessarius est ignis. hæc vero
tanquam exempla proposita sunt, non autem propterea quia hoc
solum medicamentum huic negotio sit aptum. nam eodem capite
in tertio libro ubi de mollientibus & humidis medicamentis agit,
alia etiam descripta sunt, quæ possunt illi esse utilia: præsertim si hoc
modo parentur in modum linimenti ut in præsentia docuimus, si-
quæ illis utamur, dum sunt recentia. Gale. vero ait præterea, & illa
medicamenta posse admitti ad hunc usum, quibus solent medici uti
ad sedandos dolores in cancerosis affectibus. quia a vehementi dolore
cruciantur. itemque & illa, quibus utuntur in dolorosis, & non ex-
pertibus inflammationis ulceribus scissurisque ani, de his autem
non hic, sed suo loco agemus: nam in præsentia de ratione medica-
mentorum sumus sermonem habituri, quæ apta sunt curandis ul-
ceribus manantibus, quando citra dolorem inflammationemve
sunt, & complexum alterius affectionis vel symptomatis, quod
propriam privatamque indicationem aliquam habeat. Sed prius
indicationes, & scopos exponamus, quos intueri oportet in com-
positione, & usu medicamentorum. Porro affectiones hæc simpli-
ces minimæ sunt, verum consistunt in quodam complexu morbo-
rum, qui ad duo prima genera referuntur. constant si quidem ex
ulcere, quod ad genus solutæ continuitatis pertinet, & ex intem-
peratura, non simplici, sed ea, quæ fouetur à præsentē vitio-
sæque materia, quæ & si, ut diximus, plerumque sit pituitosa & fal-
sa, potest tamen, & ab alio vitioso humore originem habere,
qui ex loci male affecti colore maxime cognosci poterit. cum
vero ea sit semper curandi ratio, ut quando vlcus est cum
insigni intemperatura, prior semper uigeat ea indicatio, quæ
ab intemperie desumenda est, utpote quæ impediat ulceris cu-
rationem

rationem . intemperies vero , quando à præfente materia vel affluente fouetur , tolli nequit , non detracta prius illa materia , quæ præfens eft , & intercepto affluxu , fi à fluxione pendeat . & quamuis ad hæc peragenda , fit imprimis neceffaria optima victus ratio , ea nempe , quæ minime fit excrementofa : præterea vero corporis euacuatio & exspiratio a uitiofis fucis perapta & opportuna remedia , in quibus fit vis vacuandi & reuellendi , de his tamen agere ad præfens institutum minime pertinet : fed de localibus remediis quæ particulatim loco affecto sunt adhibenda . scopi vero , quos natura istius affectus spectandos offert , hi sunt principes , ut materia quæ laboranti particulæ infidet , & ab ea eft abforpta , per uacuationem detrahatur . alioquin namque neque intemperatura tolli , neque ulcera curari poterunt . non detrahuntur autem materię in his locis abforptæ , & inculcatae fecta uena , aut purgantibus medicamentis . fed localibus remediis , in quibus fit facultas per digestionē uel discussionem prauos eos fuccos dissipandi . Sed cum in ichore , & fauo non defint crassi fucci & lenti , quamuis & tenuēs etiam ichores mixtos habent , ideo altera indicatio infurgit , quæ nobis hunc præterea scopum ostendit , nempe aliqua esse attenuatio , & incisione opus . demum tertio , quia pars ea facta eft ex morbo imbecillior , ideo non parum conducet : si etiam aliqua eis non defit uis repellendi . hi ergo sunt scopi , a quibus methodus pendet uniuersa componendorum medicamentorum huic negotio accommodatorum , ac eis utendi . Sed si ita se res habuerit , possumus audacter profiteri , sicut & Gal , primo de compositione medicamentorum secundum locos professus est , inter simplicia medicamenta quam maxime usum aceti utilem esse ad curandos ichores & fauos , non quidem ut eo solo & simplici utamur , sed quasi quodam condimento , & apparatu aliorum medicamentorum . nam solum quidem sua acrimonia morderet , & ulcera posset irritandum uero alia medicamenta eo lauantur & parantur , non solum non ea acria & mordacia reddit : sed potius ab illis abluunt , & detrahunt omnem acrimoniam , & morsum si in eis sit . desiccantque semper natura , quod ulceribus salutare est . repellit etiam refrigerando . & quia acris eius sapor esse nequit sine aliquibus partibus , quæ caloris sint participes , ideo & digerendi facultatem habet . Medicamenta uero aceto lota uel parata apta sunt his affectibus curandis , & diuersos ha-

Cap. 8.

vbi de ter-
ris agit.

Cap. 8.

Cap. 14.

vbi de pa-
pyro agit.

bent ordines. quę in primo ordine sunt & faciliores, sunt differenti-
tę illę terrę quarũ à Gal. fit mētio nono de fac. simp. med. cir. pr.
přecipue vero cimolea. deinde vero sania terra & lemnia & cre-
tica. hęc itaque terrę: si tritę aceto quasi condiantur, & diluantur,
vt illiniri possint, vtile erunt medicamentum, leue tamen, nec ad-
modum validum. his valentiora erunt metallica seu mineralia me-
dicamenta itidem aceto parata, vt sunt pompholix, quam in prę-
sentia vulgo tutiam appellant, item lythargyros, hoc est, spuma
argenti, item & cadmia, & plumbum vstum, hęc itaque abluta & di-
luta aceto efficaciora erunt medicamenta: his vero omnibus supe-
rior efficacia est charta combusta, vt 1. de compositione medica-
mentorũ secundum loc. tradidit Gal. sed hoc in pręsentia care-
mus, quia & charta antiquorum caremus, vtpote quę his tempo-
ribus non conficiatur. fiebat enim antiquitus ex papyro, & quodā
glutino confecto ex tritici simila, vel tritici ex aqua macerati
succo. ex hac ergo charta combusta parabantur aliqua medicamen-
ta antiquitus valde vtilia, vt in 5. de compositione medicamen-
torũ secundum gen. Gal. refert. qui dum rari esset, nec in prom-
ptu aliud medicamentum congruens haberet, chartam cremauit,
& ea ex aceto diluta illeuit caput rustici, qui deinde reperito hoc
medicamento, tandem curatus est. quod medicamentum non inge-
nerosum esse insinuat Galenus, vtpote quod vim repellendi, & at-
tenuandi incidendique ex aceto habet, quam etiam adauget char-
ta, nam dum comburitur, ab igne, vt ex sententia Aristot. quando-
quę Gal. exposuit, igneam quandam qualitatem contrahit, & ali-
quandiu seruat, qua digerere attenuarequę & exiccare potest. quod
vero senserit eiusmodi medicamentum validum esse, verba quibus
ille vtitur, manifesto indicant. ait enim se cognovisse rusticum fa-
cile laturum id medicamentum, quia durioris & solidioris carnis
esset, fortius adhuc medicamentum esset, si ex combusto papyro cō-
ficeretur, quam si ex papyracea charta. quia papyrus, vt 8. de facul-
tatibus simplicium medicamentorum docuit, charta siccantius
est medicamentum, gluten namque quod additur papyro, non-
nihil detrahit de vi papyri. putarem autem, quod si ex nostra
charta, quę ex laceris & tritis lintheis conficitur, itidem com-
busta conficiatur perinde, vt confecit Galenus ex sua illa papyra-
cea, quod non erit quidē adeo validum medicamentum, non erit
tamen inutile. nam inter medicamenta apta achoribus curandis,
quorum

quorum Gal. meminit, vñ etiam reperitur, quod sit ex paniculis linter combustis, si tamen exemplari antiquissimo manu scripto fides est præstanda; immo memini, quod chyrurgus quidam insignis utebatur vnguento ex charta combusta, cuius Gal. I. de comp. med. secundum loc. capite de achoribus meminit. & illud ex nostra charta conficiebat. uidetur autem putare esse valide generosum medicamentum achores, quod maxime cōgruens sit in affectibus his quādo pertinaces, inueterati & maligni fuerint, & in durioribus corporibus: de hoc vero medicamento in 3. libro mentionem fecimus. vbi de medicamentis agebamus congruentibus curandis vlcerebus putridis. credimus autem hic fieri mentionem secundæ confectionis descriptæ ex 5. lib. de cōp. med. per genera. quod medicamentum aridum, & inspersile erat, vnde docuit Galenus quomodo mitius fieri possit, si interdum videatur nimis validum, & supra quam requirat, aut laborantis natura, aut ratio morbi. nempe addito lythargyro, pari pondere cum ipso medicamento, aut minori aut interdum maiori. quia quo simplicius fuerit medicamentum, eò & fortius erit. quò vero illi plus lythargyri fuerit additum, eò lenius & infirmius. illius enim mixtura lenitur & miscetur vis medicamenti. Ex multa medicamentorum saragine syluaque ab antiquis & iunioribus literis traditorum hæc nos delegimus, quæ putamus posse esse satis si iamquam exempla fuerint accepta. nimium fuissemus: si oīa, vel pleraque persequi voluissemus. nā facile collatis inter se simplicibus. vnde cōficiuntur, sicut nos ea cōferre, tū in hoc tū in aliis solemus. & cū his et quæ nos examinamus, poterit eorū ratio precipi, vnde nonnullis expositis, quæ ad eorū rectū vsum pertinet, finē huic capiti imponemus. Primum ergo, & in hoc affectu pīnde vt in prioribus. capilli ante adhibitū medicamentū detondēdi vel abradēdi sūt, atque mox fricāda cutis, vel vnguibus, vel asperiori lintheo. deinde cōsiderāda est natura & habitus corporis, quatenus durū solidūque est, an vero delicatum & molle, & id, uel ratione ætatis. pueri. enim præ mollitudine ægre se habent ad fortia & acria medicamenta, aut ratione sexus mollius enim muliebre corpus est uirili: aut ratione artis. & institutorum vitæ. quia qui exercentur: præcipue uero sub sole: sicca, & solida membra habent, vt rustici, & nauarum. qui vero otiosam & umbratilem vitam degunt, molles, & laxius carnes habent. Præterea, & diluens habenda est morbi ratio, quatenus maior vetustior & pertinacior videatur, vel

Cap. 14.

minor

minor, & faciliior. nam maior morbus valentiora desiderat medica-
menta. minor vero, leuiora, & mitiora. hæc ergo mutuo conferen-
da sunt, vt congruentem medicamento modum assequi possimus,
& quia difficile est exquisitè illum statim assequi, ideo semper quæ
do medicamentum mutamus obseruandum quomodo locus se ha-
buerit sub priori: num sit magis, quam par sit irritatus? & dolen-
tior redditus, vel iusto rubicundior, nam erit opus remittere vim
medicamenti. sin autem nulla videatur facta à medicamento improf-
fio in cute, addenda erit medicamento vis, addetur autem, aut eo
relieto & altero fortiori adhibito, aut priori, alio simplici acriori
addito, quod possit illud exacuere, aut aucto pondere eorum, quæ
in ea compositione vim habent maiorem. vnde Galē. in libro de fa-
cil. parab. medicamentis ait, quod & si acetum optimum sit medica-
mentum, vt diximus, in teneris tamen puellis longe melius est, vt
pro aceto vtamur vino. vnde & nos seriatim in proprios ordines
medicamenta ad hoc negotium pertinentia digessimus, & exem-
plo medicamento ex charta combusta docuimus, docti tamen prius
à Gal. quomodo remitti plus minusve possit. & hoc tanquam exē-
plo vsi, possumus, si his propositis forte fortuna careremus, alia ac-
cipere quæ ad curanda alia vlcera laudantur, & sunt in frequenti
vsu his temporibus, suntque huic de charta non dissimilia, hæc ea-
dem methodo, illis vt. nam & hæc vlcera sunt. Sed & hoc addamus
quod cum acrioribus medicamentis antiqui utebantur: illis in bal-
neo utebantur: ita enim minus mordent & irritant locos affectos,
sed & ablato medicamento, caput calida aqua liberaliter perfude-
bant. Accedamus autem ad alios capitis morbos.

*De ratione compositionis, & usus medicamentorum congruentium cu-
randis affectibus internarum partium capitis, primum
que de illis, quæ ad plagas capiti illatas pertinent.*
Cap. 4.

Quamuis in capite cuti succedat membrana, quæ ab anatomicis
pericraneum dicitur, & illi os quod caluaria à Latinis: craniū
vero à Græcis appellatur, de quibus videretur prius esse habendus
sermo: quia tamen affectus harum partium, non habēt aliam quam
piam priuatam ac diuersam, curandi rationem ab illis, qui ad idem
genus pertinet in aliis consimilis nature particulis: nempe in aliis
membra-

membranis, quæ alibi in corpore sunt, vel in alijs ossibus. nisi quatenus conficiunt internas capitis particulas, ita ut si sit aliqua alia indicatio sumenda præter illam, quæ à communi natura ossis vel membranæ sumitur illa vniuersa petenda sit ab internis particulis, quatenus cum externis consentiunt. Vnde in capitis vulneribus, cum tuti, & liberi sumus à suspitione alicuius noxæ cuius sint participes interiores partes, vulnera vel contusiones eodem modo curamus, sicut, & alios similes aliarum partium affectus: ideo neque deinde mirandum erit: si de his non instituamus separatam & distinctam tractationem: sed agemus simul de harum, & illarum partium affectibus per accommodata medicamenta curandis. primumque de opportunis medicamentis ad plagam capiti illatam. accipimus autem in præsentia plagam, & percussione acceptam vel ex casu, vel allisione vel percussione ad rem quampiam duram, siue attulerit continui solutionem euidentem in osse, aut membrana, aut cute, siue sola sit facta contusio, & præterea ut vulnus cum re incidentem inflictum significat. At vero quia diximus, hæc omnia in præsentia eatenus, in considerationem venire, quatenus istorum incommodorum participes fiunt partes internæ. neque tamen vna est ratio qua à plagis eiusmodi internæ capitis partes afficiantur, & propter diuersitatem affectionum diuersa etiam solemus adhibere remedia: ideo particulatim hæc etiam disquirenda sunt, ut particulatim vni cuique affectui congruentia medicamenta aptare possimus. Ex collisione ergo, vel casu, vel percussione interdum frangitur calvaria, interdum solum contunditur concutitur ve. Si solum contudatur & concutiat caput, hæc possunt in interioribus incommoda consequi. Primum potest cerebrum consentiens commoveri, & quasi concussari: quod, si accadat, statim percussus cadens obmutescit, cuius rei Hippo. meminit. 7. aph. ubi ait, quibus cerebrum concussum est bi statim muti fiunt, nec modo muti ait Galenus, verum quasi apoplectici iacent ab omni motu, & sensu destituti. cuius causam esse ait ille, quia ex cerebri concussionem quasi turbata & terrefacta vehementi illo motu vis animalis in seipsam contrahitur, & præterea quiescit. Interdum vero ex contusione vel concussionem, locali qua diuulsio uel dilaceratio alicuius uasis in internis partibus: nempe uenula aliqua uel arteria, potius tamen uena, uel aliqua particula ipsarum membranarum quibus annectuntur ipsi caluariz, uel cum pericranio per suturas connectuntur, ponnunquam, ut Galenus,

nus ibidē ait, contingere pōt, vt concussio cerebro & cū eo consen-
tiente spinali medulla & ea pariter concussa, subeat periculum, ne
nervus aliquis ex illis qui ab eo oriūtur, auulsus abrumpatur: quod
longe etiam facilius, vt idem testatur, in ipso quoque cerebro fie-
ri potest, quia maior est inanitas in loco, in quo cerebrum contine-
tur; quod si fiat: nempe, vt cerebrum auellatur aut aliqua eius pars,
ait Gal. hi non reficiuntur amplius, hoc est, nequeunt amplius con-
ualescere. sin autem nulla sit in cerebro ex concussione facta auul-
sio, animalis facultas aliquandiu colligens & quiescens, tandem
reassumptis viribus iterum exiens ad instrumenta motus, & sensus
expanditur. quod si ex concussione ex plaga facta, disrumpatur
vas aliquod: præsertim vero exigua aliqua venula, effunditur san-
guis, qui effusus cadit præcipue super internas cerebri membra-
nas, ibique nisi locus aperiatur, perforata terebelli caluaria, prius
tamen cute incisa, subiecta que membrana, vt materiæ ibi contusæ
fiat perspiratio, ac extractio, putrescens, membranas denigrat, at-
que ad inflammationem tandem perducit, quandoque tamen, siūt
ex his plagis, & contusionibus citra abruptionem vasis alicuius in
internis partibus inflammationes. nam cum ex vehementi percus-
sione agitetur cerebrum, humores inordinato quodam motu cō-
mouentur: ita, vt à natura nequeant probe administrari, quare con-
fluentes ad aliquam partem, quam fuerint nacti imbecilliotem,
eam occupant, & in inflammationem attollunt, doloresque capiti
afferunt, quod nos Galenus secundo de compositione medicamen-
torum secundum locos docuit, vbi de capitis dolore agens à pla-
ga concitato, ait quod ille ab inflammatione concitatur. Sed nō
nunquam ex his contusionibus primum quidem os ipsum infrin-
gitur non vulneratā vel disrupta cute, vel subiecta membrana, que
cæca fractura appellatur. interdum vero simul, & dilacerantur hæc
particulæ. quando autem os infringitur, aut vnica tantum oblonga
fit scissura, vel rima, rectaq; & ex illis hanc iuniores capillorū rimā
appellant, aut os in multa confringitur frustra, vt multæ appareant
scissuræ, & quandoque vero non modo os frangitur, verum, & in-
flectitur & deprimitur contusa & fracta ossis pars versus internam
capitis cavitatem, vt concaua eo loco fiat capitis caluaria, & aliquā
do vtraque ossis lamina. vel, vel vt iuniores loquuntur, tabula pa-
riter in carnata interiorius inflectitur, aliquando vero sola interior: in-
terdum & frustum aliquod contracti ossis elisum & ab aliis auul-
sum

Capit. pri-
mo ubi
agitur de do-
lore capi-
tis ex pla-
gis, aut ca-
lva.

sum cadit supra duram cerebri membranam, illique hærens, & pungens, plurimum lædit, ut pote quod inflammationem accersat, interdum reflexa ossis pars membranam attingens illam premit, subindeque & cerebrum, unde postea fit, ut homo à sensu, & motu destituatur, & quasi appoplecticus iaceat, aut ex altera parte resoluatur, aut quasi epilepticus conuellatur, aut id genus alia praua accedant. memini me Venetiis accersitum unum cum chyrurgo excellenti aduiscendum puerum, qui ex alto loco in caput ceciderat in impluuium lateribus stratum, & os fractum in multa frusta uidi, & illa quidem acuta, quorum duo interius reflexa, utraque membrana perforata, cerebro infixæ erant. qui tamen summa diligentia tractatus, tandem liber ab eo morbo euasit, sed hæc raro eueniunt. interdum etiam tamen secus, imo etiam sæpe pueris accidit, præsertim ante septennium, ut ex casu vel alioquin ex contusione deprimatur & inflectatur os ad interiorem partem. neque tamen frangitur vel scindatur. & id propterea, quia os in illis tenerum est, in adultis vero, vel nunquam id accidit, vel rarissime. sed & rimæ, quæ ex contusione in adultis fiunt, semper ferè in interiorem cavitatem desinunt, & proinde nisi cito detectæ eunt & subiecta membrana os perforetur, paulo post superueniunt praua, & letalia symptomata. quamuis enim nulla ossis pars, neque premit neque puugat membranas, per eas tamen rimas, ut testatur Hippo. in libro de vulneribus capitis, cui & Galenus subscripsit pluribus locis, ichor aliquis ex osse effluit ad membranas, ibique putrescens illas ad inflammationem aut gangrenam, aut quidpiam aliud his etiam deterius adducit. Vulnera nem, quæ capite insigniuntur punctim, telonepme acuto sicuti sagitta vel pugione, vel cæsim ense, nisi teliacies obtusa fuerit, ut aliquam vim comundendi habeat, simpliciora sunt: cum ex incisione non fiant multiplices rimæ: sed unam tantum & simplex: nisi interdum ad actum telum aliquo modo inuertatur uolenter, & oblique, in unam vel aliam partem contorta ferientis manu. nam ita & laminae attolluntur aliquando, & rima secundum capita transversa potest progredi. cum autem obtusum fuerit telum non modo incidit: sed frangi os poterit & interius incuruari, ut in constitutionibus fuit expositum. Hoc autem imprimis in his incisuris considerandum, quod interdum sola cutis & membrana illi subiecta inciditur, interdum & os incisio pertingit;

& quandoque totum os diuiditur ad internam vsque cavitatem capitis, aliquando non vniuersum in profundum vsque inciditur, sed primam solum laciniam secatur, interdum ad alteram etiam pergit, illam tamen non scindit vniuersam, quandoque non modo os sed & membranae discissae sauciantur: interdum vero & ipsa cerebri substantia. Hæc videntur omnes differentiae solutæ continuitatis, in hac particula quas particulatim volumus exponere, quia, ut sepius dictum est, prima fundamenta methodi componendi medicamenta apta curandis morbis, ac illis etiam appositè vtendi in indicationibus sita sunt, quæ tam à natura & ratione ipsorum morborum depromuntur qui curandi offeruntur, tam vero à natura id læque noxa internarum partium, non sint multi momenti vel discriminis, neque curationis rationem ab illis differentem requirant, quæ aliis externis partibus infliguntur, neque differentia medicamenta: ideo neque alioquin de illis particulatim alium habebimus sermonem: nisi quod monendos iuuenes censemus, ne si quando contuso capite non abrupta tamen cute, inter initia nullum exæsymptoma, quod ostendat illatum aliquid incommodum internis particulis, propterea confidant, credantque rem nullius esse momenti, sæpe namque non statim, sed post aliquod tempus ea apparent: nempe cum aliquid effluxit in internas partes. nã & huc quoque spectare potest, quod Hippo. in aphorismorum libro secundo protulit, circa initia & fines omnia imbecilliora sed summa diligentia rependenda & consideranda primum ea symptomata quæ possunt in his obseruari. nam solet cum tractum est os cecaque sub cute scissura latet, loco, vbi accepta est plagæ, & grotus manum adhibere, & aut scalpere, aut fricare: deinde vero extimare quanta potuerit esse facta contusio; & si ex aliquo loco ceciderit, an magno impetu fuerit casus, an ex præalto loco, deinde considerandus locus ad quem cadens alliserit, an lapidibus stratus, & durus, vel potius mollis, an in medio descensu aliquid acciderit, quod potuerit cadentem aliquantisper detinere, & obitare quominus tanto impetu deorsum ferretur. Sed si ab alio ictum fuisse, aut claua, aut saxo acceperit, considerandæ sunt vires percutientis, modus quo percussit: nempe an iratus & vsus suis viribus, an potius non serio agens, considerandum etiam instrumentum, quo percussit, an durum, an græue, & his omnibus recte perpenſis studere vt quantum fieri

Aph. 3.

fiert rationabili coniectura potest, si sequamur, vel etiam antequam
 scire & verenda symptomata accidant, iudicemus, fractum sit nec
 ne os. quia si credamus latere sub cute fracturam, quam primum
 cutis aspicienda, locus detergendus, ac os perforandum terebello,
 aut deradendum ferreis instrumentis quib. abradi solent ossa: vul
 go raspatoria dicuntur, donec fiat foramen penetrans ad internam
 capitis concavitatem, ut & perspirare possint, siqui defluerint
 ichores, vel sanguis, anteaquam correpti à putredine, male afficiant
 internas, & præcipuas particulas, atque facilius congruentium me
 dicamentorum vis perveniat ad locum affectum. Et quamvis vi
 deamus esse a primario nostro scopo digressi, quia tamen hæc ad
 rectum usum medicamentorum pertinere possunt, ideo neque pa
 rerga ab aliquo sunt celsenda. Sed ad princeps nostrum institutum
 redeamus, & eandem methodum sequentes, de plagis telo aliquo
 casim vel punctim factis agamus, pro ratione ergo teli, aut viriū
 illius, qui gladio hominem petit, maiora vel minora infliguntur
 vulnera, magisque vel minus profunda. ut & hoc addamus, quod
 sæpe ex violento ictu, præsertim si graue sit telum, non modo incida
 tur os: vel frangitur quoque, & circa vulnus fragmenta reperiun
 tur vel segmenta, quandoque penitus ab ossis avulsa, quandoque
 aliqua parte cum illis coniuncta, quæ ante curationem, quam me
 dicamentis molituri sumus, auferenda sunt, quia dum ibi manent,
 curationem & consolidationem impediunt. Magna autem ex par
 te pro ratione diuersi status ipsius vulneris diuersa, etiam quoque
 ratione exigitur. & quantum ad alia vel remedia vel instrumenta.
 & maxime quantum ad compositionem & usum medicamentorum
 pertinet. Sed tandem hæc omnia particulatim tractemus. primum
 tamen posito hoc fundamento, quod capitis plaga quantumcunq;
 magna non videatur, ac non multa vi illata, nunquam sit à medico
 contemnenda, quia anteaquam decernat quid sit agendum, non dili
 genter extimetur quia res hæc non est levis momenti: sed grauis
 potius. momentum vero uniuersum ab hoc capite pender, an reci
 denda sit cutis & subinde subiecta membrana. locusque sit deter
 gendus, ut perforetur os aperiaturretur. quia si temere hoc fiat, &
 citra diligentem examinationem ut sæpe ignari chyrurgi & impru
 dentes faciunt, qui ex leui quacunque occasione ad incisionem &
 apertionem accedunt, id sine magno incommodo atque insigni
 etiam discrimine, ut quidam non contemnendi auctores, monent
 fieri

fieri nequit. nam primum insignis dolor in incisione & separatione particularum illarum concitari solet, dolor vero, siquid aliud, concitat fluxiones: commotis siquidem succis, præsertim vero calidioribus, qui confluentes ad partem imbecilliolem, sæpe gignunt inflammationem: quia non modo afficiuntur, licet primo illæ lædantur, externæ & contusæ partes, verum & internæ. nam si fuerit insignis contusio, illæ etiam commouentur. præterea tantus est internarum partium cum externis consensus & connexio, ut necesse sit, & illas ex ea operatione male habere & lędi. huc accedit, quod cum os aperiendum est, siue scalpris id fiat, siue terebello, vel quo cunque alio instrumento: vix fieri potest, quin concutiat caput, quod sine interiorum particularum incommodo fieri nequit, dum concutiantur & ipsæ, & succi ex ea concussione concitantur, præterea, & dum citra necessitatem detergitur pars illa, cerebrum. & eius membrana, frigidiori exponuntur aeri quo nihil ferè nocentius est. quia & inflammationis, & aliorum grauium symptomatum in causa esse potest. neque tamen propter hæc se re diligenter perpensa, nostranos cōiectura ad hoc adducat, ut quāuis certi minime simus, potius tamen credamus os non esse integrum, ita nos esse timidos oportet, ut non audeamus accedere ad apertionem, quia longe maius est periculum & magis præceps, si decipiamus credentes non subesse fracturam, quæ tamen subsit, quam si credamus subesse, quæ tamen nulla subsit. His ergo in hunc modum expositis, particulatim agamus, quomodo negotium sit tractandum in omnibus his propositis differentiis. Porro si sola sit contusio absque vulnere vel vlcere, communi contusarum partium curatione curandus locus erit. quæ curatio spectatis his scopis peragenda erit. nam si ibi dilaceratis venulis tenuioribus & inconspicuis ex plaga, sanguis in inania spacia sit effusus, statim extat indicatio, quod quoniam exiens in grumum vertitur, neque iterum in venas queat redire, illud vacuum inde esse extrahendum, cum sit omnino iam factus, res præter naturam, inaniri autem locus nequit nisi per digestionem, facile digeritur, nisi facilior fiat digestio per ea, quæ molliunt alioquin enim digestis tenuioribus, & facilioribus partibus, reliquum crassesceret & induraretur. erit ergo localibus medicamentis mollientibus & digerentibus res tractanda. hæc autem quæ, & qualia sint particulatim explanare, atque rationem compositionis & vsus exponere, ad præsentem locum minime pertine,

cumt

cum abunde de illis in præcedenti libro fuerit a nobis actum, ne tempus frustra conteramus. ulterius ergo gradatim procedamus. Si ex plaga præter contusionem sit etiam cutis dilacerata, non erit simplex affectus: Sed ex duobus compositis, qui diuersas habent indicationes. est enim contusio, & vulnus, seu vlcus. cum enim sit necesse omne in vlceribus contusum putrefieri, vt docuit Hippo. & tandem in pus verti, & quanto id citius fit, eò etiam citius curatio absolui potest: ideo ratione contusionis extat indicatio accelerandâ esse suppuratione, quæ accelerari potest medicamentis illis, quæ vim habet mouendi pus, quæ maturatiua & cõcoquẽtia sũt. à chirurgorũ autem vulgo digestiua impropria nũcupatiõe uocari solẽt. vlcus vero exiccatione, & aliquã deterfionẽ desiderat. ita. n. eius indicatio ostẽdit. Sed lóge prior est indicatio quæ à cõtusione petẽda est, atq; prius illi incũbẽdũ. hoc tñ nõ esse prætermittẽdũ arbitror, quatenus ad re-
 ctã curãdi rationẽ attinet, qđ si cũ cõtusio sit vulnus illatũ, diligẽter illud cõsiderã. Iũ est: quoulsque nimirũ pertingat, & an cũ cute sit dilaceratũ et pericraneũ? & an id ab osse diuulsum sit, an vero integrũ & osli hærens? quia si mẽbrana illa sit lacerata & diuulsa ab osse, id indiciũ erit ictũ magnũ fuisse, vt suspicari facile possit medicus, os eẽ fuisse perpeßsum insigne incõmodũ, & dubitare, quod fractũ eẽ sit. vnde nõ erit ab re vt locũ ampliẽt, dilatato nempe vlnerẽ ad os vsque, poterit tamen & prius specilli cuspidẽ explorare, an subit ali-
 qua in osse rima, vel scissura. dũ. n. os cuspidẽ fricabit, nisi minima sit rima, manifeste percipiet asperiorẽ locũ ex iẽqualitate laterũ scissi os-
 sis. nisi fortasse ibi adsit aliqua caluariæ futura. quia in nõnullis interdũ hominũ capitib. suturę caluariæ euariant, neque in cõmuni loco re-
 periũtur. à qua deinde occasione quãdoq; cõsummatissimi in hac arte viri fassi sunt se fuisse deceptos. interdum verò si os, cum fuerit detectũ, & chirurgus aliquo instrumento ferreo percutiat, sonus qui ex ea percussione editur, significat an fractũ sit. si enim ob-
 scurior quidam & quasi raucus se offerat sonus, indicio erit fractũ esse. sin autem clarius sit sonus sicut in aliis etiam vasis tam testaceis quam metallo confectis, signum est ossis integri. neq; tñ factũ istius rei periculo adeo confidendũ est, vt quãtũcũque nulla sit deprehẽ-
 sa asperitas, oĩno putemus nos esse in tuto. aliquando etenim adeo exilis rima est, vt nõ modo tactũ, sed visum eẽ fugiat: & proinde si insignis fuerit facta percussio, tutius est vulnus dilatare, vt os aspe-
 ctui pateat, & diligenter inspici possit. & si sit adeo exilis rima, ut

aspectu deprendi non possit docuere medicum antiqui, quàm recentiores, ut & hac ratione experiamur: nempe affuso aliquo humore coloris acti, ut esset atramentum, quo scribimus, ac deinde locum detergamus, hoc enim sæpe scissuram detegit. ibi enim apparet veluti nigra linea, & si nihil etiam appareat factis his periculis omnibus, aliqua tamen contigerint symptomata suspecta: sicut si ille percussus ceciderit, si post plagam obmutuerit, si bilem euomuerit, si sit quasi stupidus factus: si uertiginosus: si caput graue videatur: si insigniter dolcat, si deliret: si oculi obtenebrentur, cum hæc nequeant fieri sine aliqua internarum partium noxa, præstat, ut locus aut scalpris aut terebellis, aut simili alio instrumeto, perforata calnaria, aperiantur, ut facilius hac ratione internis particulis & commodius possimus suduenire. Sed de hoc hætenus satis, ad institutum, vnde diuiteramus redeundum est, si ergo a fracture suspicionem liberi simus, tres in his præsertim nobis indicationes reliquæ sunt, prima quæ fuit a contusione accepta, quæque dictos scopos spectandos offert: nempe molliendum & digerendum, sed magis etiam pus mouendum esse, altera ab ulcere vel vulnere, quæ duos & ipsa scopos continet, detergendum siccandumque esse. quia vero semper in vulneribus timendum est, ne confluentibus superuacaneis succis ad affectum locum fiat inflammatio: istius autem defluxionis extirpare potest occasio ex illato dolore, tum ex contusione, tum ex aliis, quæ, ut nuper diximus, moliri oportet ut assequamur, & cognoscamus quatenus noxa ex contusione peruenierit: ideo inde exoritur & tertia indicatio ab hoc timore desumpta: nempe omni opem inflammationem esse arcendam, quæ indicatio nobis hos scopos ostendit: reuellendum ut occurramus fluxioni, & repellendum, ut fluentes succi minime ab offensis partibus admittantur, de priori scopo non multa dicemus, quia diuersis remediis illi erit satisfaciendum, aut enim vacuando fieri potest reuulsio, nempe secta vena, aut per medicamenta, nam, ut ait Gal. medicamenta aluum cientes, in affectibus capitis insigniter reuellunt, siue fuerint deuorata, siue per clysteres iniecta. cōditio vero vel status corporis hæc definiet: sicuti si corpus plenum sit, aut cacochimum: si febris adsit vel absit, non ubi febris insignis aliqua sit, ut secundo de rat. vict. in acut. mor. dixit Gal. longe tutior & magis commoda est sanguinis detractio. Sed si corpus neutro modo plenum est, possemus illud agere fricatis partibus inferioribus, aut affixis cucurbitulis præfixa,

cuti, aut citra incisionem. Sed hæc aliquantulum præter institutum videntur. Ad repellendum, & maxime oportunitum, & in maximo usu est oleum rosaceum, quod astringit, & leniendo dolorem sedat. & cum duplex sit ratio parandi oleum: si vrgeret magis dolor, aptius esset illud quod in præsentia completum appellant: sin autem magis videretur refrigerandum & repellendum, illud, quod Græci omphacinum nuncupant, aptius esset, quod ex oleo confectum est, quod non sit plane maturum. perfundendum ergo, quo ad erit tinuenda inflammatio, oleo rosaceo tepido, atque super addendus præterea erit lintheus eodem oleo perfusus circumuicinas partes contegens. neque oberit, si in vulnus inter initia infundatur. medicamenta vero prioribus indicationibus accommodata, vt prius quoque fuit dictum, tertio libro fuere exposita, & propterea non hic repetenda, quia curantur hæc sicut alia uulnera cum contusione aliis infliscta particulis. Verum quia interdum aut a primo illato vulnere cum cutis diducta & dilacerata est, aut est dum locus, & vulnus dilatatur, incisa cute & membrana, excitatur copiosa sanguinis profusio: cum venæ insignes etiam in ea operatione rescindantur, huic symptomati etiam occurrendum est, & sanguis est cohibendus. spongia autem in aceto intincta sanguinem nonnulli reprimebant. alii linamentis imbutis æneleo, hoc est vino & oleo. oleum enim dolorem mitigat, vinum vero præsertim austerum astringit. alii oxierato, hoc est posca. alii vero siccis linamentis vulnus replent, quæ præcipue loco apponunt, vnde emanat sanguis, super addito deinde lintheolo aliquanto ampliori quàm sit uulnus, imbuto vino, oleoq;: Suppresso autem sanguine, atque mundato osse, nisi reliquus sit dolor aliquis, in illis vulneribus, in quibus os pertusum non sit, aut saltem ad internas partes non penetret scissura, sola extat indicatio adgenerandam esse carnem qua os contegatur, vulnusque repletum ad æqualitatem perducatur, vt deinde & consolidetur. sed cum carnis procreatio, vt priori libro diximus, sit solius naturæ opus, quàm nõ modo generari oportet, uerùm & procurare, vt possit osi herere dum quasi pullulat, & in hoc præsertim, vt Gal. exposuit Gal. operâ medici desiderat. nam maxime naturæ obstat potius si pingue aliquod aut sordes quæpiã a circumstantibus partibus ad os cõfluat. in his ergo subuenire naturæ poterit suis medicamentis: si vim habuerint insigniter desiccandi. is ergo est scopus, quẽ in hoc statu maxime, tũ ab ipsius affectus, tũ ab ipsius patriculæ natura

deprompta indicatio nobis offert: nempe desiccandum propter as-
fectum, ut diximus: ualide vero, propter naturam affectuum par-
ticularum, primum quidem ossis siccissimæ partis, deinde pericra-
nei, tertio, & cutis capitis. ergo semper utetur medicus usque ad eu-
rationem absolutam desiccantibus, quæ morsus sint expertia, quæ-
q; cephalica, hoc est capitalia medicamēta appellari solita sunt, tã
quam huic negotio congruentia: id genus vero sunt, quæ primū
a Galeno enumerata habemus, & itidem ab aliis omnibus repetita.
ut sunt iridis radices, erui farina, thuris manna, radicum item cor-
tex tam aristolochiæ, quam panacis, & tandem cætera quæ similem
cum his naturam habent, nempe quæ sine morfu desiccant. ex his
enim tritis & commixtis conficitur aridum, & inspersile medica-
mentum. nam hæc imprimis huic officinæ aptiora sunt. Gale. enim
ac reliqui probati medici consuluere, declinanda esse medica-
ta, quæ tenera molliaque sunt, quibusque linamenta imbui possunt.
quia tametsi desiccent insigniter, tñ pinguis aliquid vel olea-
ginosi continent. Sed iam transeamus ad vulnera capiti infli-
cta cæsim vel punctim. de illis autem quæ ad caluariam non perti-
nent, non est quod aliquid præterea dicamus, nisi quòd eadem est
eorum curatio, quæ & aliorum vulnerum adeo, ut antiqui dixerint
ea etiam suenda esse: si amplitudo eorum requirere videatur. Sin
autem os attingant, pro maiori, vel minori noxa ossi illata, ita vario
modo res est tractanda. nam si in cistura aliqua in eo appareat citra
tamen ossis contritionem, scalpris os abradendum, donec illa
deleatur. alioquin enim cum necesse sit humiditatem aliquam in ea
contineri vel ichorem: is putrescens inficere atque corrumpere
os facile poterit, ac subinde ad internas usque partes vitium illud
ratione connexionis, quam mutuam habent, impertiri. sæpe enim
in similibus capitis vulneribus, cum alijs recte administratis, per
dies multos omnia recte successissent, tãdem cæpit os liuescere &
subnigrescere, quod deinde concomitata sunt grauissima sympto-
mata, ut sunt rigores, febres, tremores, deliria, & id genus alia mul-
ta: postremo vero & interius, imò & hoc interdū obseruaui, qd abra-
sū fuit os, ut penitus delere ē aliqua rima in eo apparēs, & eo usq; a-
bradētes scalpris chirurgi pgressi sūt, ut finita fuerit rima: adeo tñ
in fundo os exile relictū est, ut ab aere, vel ab alijs causis se defen-
dere nequiuert. vñ postea quasi extincto eius calore nativo cæperit
liuescere, & denigrari. quo neglecto, male deinde cū laborāte affectū
est.

est, aliqñ vero ablato tenui illo & vitiatò effo còsultù ē illius saluti. Quod si scissio arripuerit os vniuersū vsq; ad internas partes, illud aperiendū erit vel scalpñis, vel terebello, vel alio id genus instrumēto, ne aut resudans, aut destillans ichor, aut aliqua humiditas ad internās mēbranas, ibique còclusa & destituta à perspiratione, putrescat, & illas pessime afficiat; hominēq; ad extrema pericula adducat. Aperto itaq; osse, facto in ipso, vt diximus, foramine, id in primis còsiderandū, quid agendū sit, vt hominē ab imminētī discrimine liberemus: id aut pręstantissime agere poterimus: si quibus periculis est obnoxius, pbe teneamus. hoc. n. pcepto, rōnem nō ægre ini-
bitus quā illi còsultēdū sit: periculū aut duplex ī his affectibus ex-
eat. primū à fluxione: humorū impēdet, ne ob imbecillitatē loci tū oblectū, tū ēt internāz partes detectę aeris frigidiōri exponūtur, quī illis maxime noxius est. & ob dolores & còcussionē capitis ex pla-
gu. ex motu spiritus, & sanguinis, qui còcitur ex animi motio-
nē: dū timore qñ vulneratur aut ira aut similibus animi pturbatio-
nibz agitatū, calidi còfluāt succi, qui inflāmationē inferāt, & hoc cōe est ferē oībus vūneribus pferim inter initia, quia facile inflā-
mationibz patēt. & pinde inter primos scopos, is est, inflāmatio-
nē arcerē. In his aut vūneribus, nō mō ptibus extēnis timēda est inflāmatio, verū & interioribus: nēpe mēbranis & cerebro. Alterū vero qđ imminet periculū est ex humiditatibus, vel ichoribus, vel pure destillatibus ad internas partes: pręcipue ad mēbranas. nam si ibi morētē, cōtrahūt putredinē, & subinde acrimoniā; quę noxas illis vehemētissimas inferūt. his ergo prospiciendū est. & quia pri-
mū periculū magis pręceptū est, id maiore in initio vim indicandi hēt. quare ab hoc incohandū est, & primū cōtrā inflāmationē est pugnandū. Sed hoc aduertendū pręterea est, qđ eadē est rō oppu-
gandi aliqñ affectū, qñ iā in initio est, & qñ nondū quidē incē-
pit, sed suspicamur ac incipiat vt ex Gal. accipi pōt: in libro de cu-
ran. rōne per seēt. ven. cui vidēt & Hipp. attestari quī lib. commen-
tatiōrum in epidēm. ait; quod quę administrata curare possunt mōrbum pręsentem; illa, si prius fiāt, obstant quō minus fiat is mōrbus, cui & hoc addamū, quod inflāmatio membranarū, sicuti exponit vbiq; Galen. proprie phrenitis est. nisi quod cum phrenitim dicimus ita absolute, eam intelligimū, quę sponte sua oritur in capite, nulla illi pręstita occasione ab aliqua pla-
ga, si tamen ad ipsam rei naturam respiciamus, idem est omnino

affectus, & ideo eadem etiam methodo curatur. & si in aliquo exa-
 riant, id potius euenit ratione alterius conditionis diuersę quę re-
 peritur in particula affecta, sed primum ea quę omnino eadem cõ-
 munia sunt exponemus. postea vero, & illa in quibus aliqua est va-
 rietas. cum itaque scopus primus sit vt obsistamus futurę inflam-
 mationi, istius vero rei vniuersum momentum sit in ipsa fluxio-
 ne: quę possunt obstare fluxioni, ea omnia huic scopo attinent: vn-
 de, & tenuissimus victus, quantus potest a sauciato homine perfe-
 ri maxime congruus erit, interdictis præterea illis omnibus, quę
 possunt sanguinem commouere: in primis vero vitio, & quęcun-
 que calida solent replere caput: siue bibantur vel comedantur: si-
 ue odorentur, sicut aromata, & proinde etiam motiones tam cor-
 poris, quam animi noxię sunt, cum succos facile commoueant. Cõ-
 tra vero quies quanta esse potest, commoda est. Deinde vero, quia
 uix fieri potest, quin in huiuscemodi plagis non commoueantur
 succi: ideo, & necessarium est, vt rem nostram in tuto collocemus,
 motos humores reprimere, ac etiam a loco affecto auertere. hoc ve-
 ro: si vires, & ætas possit hoc remedium admittere, fiet scilicet a uena,
 aut interiori, aut exteriori, in cubito, aut media, & id pro ratione
 maioris, vel minoris plenitudinis corporis: sed interdum neque sa-
 tis fuerit semel venam secare: sed bis. & quamuis hoc pro-
 xime non videatur ad præsens institutum pertinere: non pos-
 sumus tamen & illud sub silentio præterire, quod legentibus ali-
 quando poterit esse utile. nam sape & Gal. in libris de medicamen-
 torum compositione quamuis instituisset ibi de medicamentis
 agere, interdum tamen a quadam rerum connexionē tractus, uel
 ex aliqua utilitate, aliorum etiam instrumentorum medicinalium
 meminuit. Porro cum semel cum aliis præstatis etiam medicis
 intercessem cuidam curationi nobilis cuiusdam patricii, qui vulnus
 præmagnum in capite acceperat, quod nõ modo os discisserat, sed
 & internas membranas, gladius quę in cerebri substantiam, quan-
 tus est transversus digitus fuerat addactus, vulnus autem erat pa-
 rum supra futuram, quę a littera labda nomen habet. cumque om-
 nibus recte peractis res, usque ad transactam quintam felicissime
 successisset, statim nulla alioquin externa præstita occasione, caput
 a rigoribus, cum aliquo dolore capitis corripit, vulnus quę solito
 pallidius & depressius visum est, unde omnes capimus esse conster-
 nato animo. ego vero ad me ipsam conuersus cogitabam unde hæc

ram ſeua capiffet procella. cūque pro certo haberē, hæc eſſe ſigna ſuborientis inſtāmationis, putabā huic eſſe incūbēdū, nec leui ſed valido remedio. apertū itaque cōſiliū meum, & cū vires eę eſſent, quę id genus remedii poſſent ferre, propoſui, vt iterū ſecaretur ex terior vena in cubito, quam cephalica appellat, conſenſere omnes. ſanguine autē detracto, omnia ſedata ſunt, & vulnus ē melius in colore & tumore uſum eſt, indeq; res ſemper melius ſe habuit, & tādē facile pro ratione vulneris conualuit. His autem & illud addamus, quod & addidit Gal. 2. de cōp. med. ſecundū loc. quod ſi vel vires, vel etas eiufmodi remedium ferre minime poſſent, alia ratione eſſet reuellendum, leuioribus & facilioribus inſtrumentis, nempe clyſterib; vbi vñum uidetur hic conſiderandum, quod in his fortaffe dāmmandus videretur Gal. vtpote qui eandem calamitatem pati uidetur (nam hæc à Galeno deſcripſimus,) cuius ipſe Apollonium inſinuauit, quia quibus clyſteribus ſit vtendum, cum eorum viribus & robore diuerſa admodum ſit ratio, vt 1. iſtius compendii libro oſtendimus non explicauerit. verum ſi aliqua volumus huc transferre quę ille hoc eodem libro expoſuit, hæc præſertim referenda ſunt ad aciores clyſteres. quia ſcopus illi eſt, fluentium humorum impetum reucllere. Auicenna vero in capite de ſedulo capitis ex caſu aut percuffione, rem hanc magis per appoſitas limitationes definiuiſſe viſus eſt, & quidem ex bona ſatis ratione, qui non modo laudauit clyſteriorum uſum, & illorum acrium quidem interdum: verum & catapotiiſ quandoque uti oportere ait, & ualētiorib; ē catapotiiſ, qualia ſunt quæ cochia dicuntur hac uero utitur definitione, ut cōſiderādū ſit ancū dolore ſit adiūcta febris, p̄terea uero, & tenor, vel modus febris, quæ ſi ad ſit febris alicuius momēti, oportet cōtinere nos ab eiufmodi catapotiiſ, aliisq; id medicamentis ſoluentibus. imo & clyſterib; q̄ ſunt ualde acres, & moderatis uti oportet: ſi uero, aut nulla, aut exigua ad ſit febris, & acris clyſteribus uti licebit. hæc uero definitio deſcripta eſt à Raſi, qui tamen uidetur uoluiffe imitari Gal. 2. de ratione vict. in acut. mor. ubi explanans Hippo. ſententiam qua præcipit pleuriticos uacuandos eſſe ſi dolor deſcendat p̄plio uel nigro ueratro, ait illud quidē fieri poſſe, cū ſi nulla adeſt febris, quæ acota & inſignis ſit quæ mihi adnotatu dignum uidetur, id tamē a multis medicis neglectū eſt. qui ſæpe hæc catapotia illis exhibēt, quibus uulneratum eſt caput aut concuſum, quamuis credant aut ſuſpiciantur male affe-

etas esse internas partes & periculum adesse inflammationis, neque enim potest adesse suspicio inflammationis internæ sine acuta febre, cum in eodem genere sit cum phrenitide: tuto ergo illa medicamenta dari possunt, ubi externæ partes incommodum passæ sunt, non autem quando internæ, quod uel ea ratione potest probari, quia si ad naturam morbi respexerimus, a qua prima remedium indicatio accipienda est, ut eodem capite insinuauit Gal. is affectus idem natura & specie est cum phrenitide, & eandem curationem, paucis admodum mutatis, desiderat, nullus autem in curanda phrenitide qui legitimus medicus fuerit, laudauit horum catapotorum usum. sed si aliquibus medicamentis aluum clementibus videatur esse opus, non transgrediuntur eorum ordinem, quæ leniunt & refrigerant. Sed ad nostrum institutum tandem redeamus. quod est de externis & localibus medicamentis agere. his itaque expositis, quæ communia sunt phrenitidi, quæ citra ullam causam procatartica oriuntur, & inflammationem, quæ plagam in capite acceptam sequitur, id considerandum quod alia ratione res tractanda erit inter initia: si nulla sit alia indicatio præter illam, quæ ab inflammatione accepta est, indicatio autem quæ sæpius solet in hoc affectu vim habere, ea est quæ a dolore proficiscitur, uel si ad sit, dolor adeo insignis, ut vim indicandi assumpserit, quam primum ab his medicamentis cui ratio incohanda erit, quæ possunt sedare dolorem, pargorica uero à Grecis dicuntur, ita enim instituit Gal. 2. de cap. med. secundum locos, in curatione doloris capitis ex plaga, ubi statim irrigandum esse caput ait oleo dulci ex lana eo in buta. In osse autem perforato: licet etiam incisa sit interior membrana, cum in calaminæ succum consilio Archigenis, infundendum esse dixisset, inspergandumque farinam milii aridam, deinde esse infundendum medicamentum confectum ex butyro, oleo rosaceo, & adipe suillo salis ex parte, uetoris, simi liquatis, & mixtis, in quo, si omnia uelimus recte estimare, butyrum vim habet molliendi, aliquantulum etiam digerendi. Japex suillus inueteratus aliquantisper & ipse mollior quauis longe magis dum recens est, insigniter autem salis digerit cum uetus est; oleum rosaceum, modice quidem ex oleo habet quod molliat, & digerat, sed potius in hoc medicamento accipitur, quia tum refrigerando, modice tamen, tum astringendo potest insistentes humores repellere, & robur particulæ seruare. est autem medicamentum uniuersum temperati caloris, atque ideo mitigando dolori aptum. Sed hæc omnia præ-

fertim

ferim congruentia sunt, quando morbus a plaga ortum habuit, & præcipue ex contusione, doloremque adeo magnum habet aspidem, ut eius indicatio urgeat multum. In affectibus autem capitis, ubi aliqua adest inflammatio, quæ, aut iam incæperit occupare internas particulas, aut ea pro foribus sit, alia erit incunda curandi ratio, nam in uniuersum quantum ad curationis methodum, eadem erit ratio, quæ & cæterarum inflammationum, nempe, ut a repellentibus in initio intohemus, in incremento digerentia cum repellentibus commisceamus, ut in tertio libro exposuimus. mox solis laxantibus & digerentibus utamur. particularim autem materię quæ his scopis satisfaciunt eligendæ sunt, habita in primis ratione illius particulæ quæ ab inflammatione tentatur, & inde de promptę indicationis. sed ne verbis nimis abundemus, rem perstringamus. itaque cum repellentia, tum refrigerent, tum astringant, & neque vehementer refrigerantia, neque nimis astringentia sint admodum capiti in his affectibus, ut paulo post ostendemus accommodata, ideo ab omnibus oleum rosaceum communi consensu ad repellendum in inflammationibus capitis laudatur siue cum vulnere sint, siue citra vulnus, ut in phrenitide. nam cum sit eadem ratio morbi, & eadem particula quæ inflammationi obnoxia est, eandem etiam requirit rationem remedium. rosaceum vero oleum omnibus visum est eatenus refrigerare, & astringere posse, quatenus his inflammationibus satis sit. & quamuis aliquam etiam vim digerendi habeat tamen hoc tempore venit præcipue in usum, ratione repulsio- nis, quæ sit ope astringentis facultatis, ut tamen neque inutilis sit digerendi & laxandi facultas, quæ præditum est. nam potest ab ea aliquantulum sedari dolor, cuius nunquam ex- pers est inflammatio, qua exercentur partes aliquo sensu præditæ. Est tamen aliqua diuersitas in usu ipsius rosacei, quæ non accipitur a morbi ratione, sed ab aliqua ratione affectus partis. nam in phrenitide: ubi nullum vulnus, ne- que ulla est in caluaria pertusio, modicum admodum es- set commodum, quod natura posset expectare ab usu olei rosacei. cum enim illi sit per tot partes transeundum antea quam petuenire possit ad inflammatam, quarum pleræque densæ & solidæ sunt. primum enim cutis capitis, & crassa, & dura est. pericranium etiam, & si satis tenuis sit mem- brana,

brana, densa tamen est, vt de caluaria nihil dicam, quæ os crassum, est. sed & membranæ internæ ita crassæ, & densæ sunt, vt non facile possunt medicamentomittere, in transitum, vt testatur Gal. semper dissoluitur aliquid virium medicamento, ex ea transmutatione, quæ mutua est inter particulas, & medicamenta. hac itaque de causa inierunt rationem medici, vt oleo rosaceo aliquid adderent aceti. hæc enim additio, cum & acetum repellat refrigerando; addit aliquid rosaceo: sed longe magis prodest, quia, cum, facilius possit, citiusque se in profundum indere ratione tenuitatis suarum partium, secum præterea & oleum ducit, anteaque fiat aliqua insignis virium eius dissolutio, neque tamen timendus aliquis morsus & irritatio ex aceti acrimonia, quia illa, tum in transitu, tum vero mixtura olei non parum miscetur. in affectibus autem capitis, vbi cuti detracta & pericranio est, pertusum est os: non est hæc difficultas medicamenti in transitu, quæ possunt in membranas infundi, & proinde non est alioquin opus, vt oleo addatur acetum, sed satis est oleum rosaceum, quod quidem: licet aliquid habeat digerentis, præsertim tamen repellit astringendo, & refrigerando. Sed in incremento etiam inflammationis opportunus erit vsus olei rosacei. nisi quis fortasse obijciat, quod hæc cum prioribus non videntur consona. diximus enim quod ratio curandi has inflammationes continetur sub generali methodo curandarum inflammationum, quemadmodum & hæc inflammationes sub cõmuni inflammationum genere continentur: methodus autem communis curandarum inflammationum in his regulis fundatur, in initio solis repellentibus vti oportet. in incrementa autem, cum repellentibus miscenda esse digerentia, donec in ipso vigore solis digerentibus locus relinquatur. hæc enim in tertio libro ex omnium medicorum sententia à nobis fuisse exposita. in his autem inflammationibus capitis curandis inter initia medici volunt medicamenta esse mixtæ facultatis: nimirum repellentis & digerentis, item & in incremento, inmo & in ipso vigore. Huic dubitationi respondemus, quod generalis curandarum inflammationum methodus ita requirit, vt regulæ quæ nuper relatæ fuere præscribunt. iidem in tertio fuit expositum. Sed hæc omnia solum de pronipta sunt à communi natura inflammationis quatenus inflammatio est, non autem, vt hanc, vel illam particulam respicit, quia in communi, & generali ratione nulla comprehenditur comparatio magis ad vnum definitum locum, quam ad alium. indicationes

dicationes vero, quæ à certis & definitis quibusdam particulis de-
promendæ sunt, vim tantam habent, ut communem methodum de-
flectere aliquatenus & variare possint: nam particula illa quæ alia
quas habent, obeundas actiones quæ nobiles admodum sunt vel
necessariæ vitæ stimulantis, eogunt medicum eorum robori semper
prospicere, ne dissoluatur: unde semper medicamentis vtuntur
medici, non modo in sanandis earum inflammationibus, quæ ha-
beant vim aliquam astringendi, verum & in ceteris quoque affe-
ctibus ad illas pertinentibus. Hoc, n. seruari solet in medicamentis
accommodatis ventriculo, iocinori, cordi, & cerebro. Sed in præ-
sentia hæc satis sint, & ut tandem finem huic capiti imponamus: ali-
qua quam breuius poterimus, quæ necessaria sunt ad ad rectum ho-
rum medicamentorum vsum, expediemus. Primum ergo hoc etiā
explanemus, quo modo oxirodino, vel solo rosaceo expediatur in
his affectibus uti? calidis ne? vel tepidis? vel potius frigidis? Al-
terum, quando acetum immiscendum est oleo rosaceo in initio,
quotuplum oporteat esse oleum ad acetum. nam secundo de com-
positione medicament. secundum locos, hoc vitio uertit Apollonio,
quod illud non definierit. quod tamen, & ipse prætermisit. Cap. 1.
Quatenus ad primum pertinet: si de usu rosacei in capitis vulneri-
bus sit sermo: præsertim si ad internas partes penetratum sit, nulli
potest esse dubium, quod oporteat, aut tepido: præsertim in æstate,
aut aliquanto calidiori: maxime in hyeme eo uti. nunquam autem
actu frigido, cum frigus illis particulis nocentissimum sit, cum
etiam in æstate aer frigidus tamquam res maxime noxia fugiendus
sit, ubi uero integrans sit os, & extetne partes, non est eque res hæc
clara. imo maxime in ea dissentiant medici, & illi sanè celeberrimi
in hac arte. Arabes enim ut Auicenna & Mesues præcipiunt, ut eo
frigido & insigniter frigido, ut pote quod sit ex niue refrigeratum
utatur, quæ à Gal. fortasse desumpserit, qui in eodem secundo de
compositione medicamentorum secundum locos in curatione do-
loris capitis ex causâ calefaciente, ut à solis ardore, siue sit sola in-
temperies, siue sit cum affluxu vaporum, vel humorum calidiorum.
atque hoc esse & optimi remedium in hoc affectu, ut pote, quoniā
re pellit, tum vapores, tum humores qui ab infernis partibus sur-
sum feruntur, eosque deorsum detrudit. Huic tamen sententiæ ad-
uersantur omnes ferè Græci auctores, imprimis quæ Aetius ex Posi-
dono apertissime ait, æstate tepidum esse perfundendum: hyeme
neros,

vero, aliquantisper calidum. Sed & Apollonius, vñ his refert Galē:
 idem sensit, Paulus quoq; in eandem sententiam concessit; cui &
 Alexan. Trallianus subscripsit. mihi autem cum his Gal. consentire
 videtur. nam propositis medicamentis quæ ad dolorem capitis de-
 scripsit Apollonius; singulatim ea in examen deducit; & ubi re-
 prehensione dignus ille videtur, reprendit; exponitque illa quæ
 nullo modo ipsi probantur. aliqua vero damnat; quia sint indistin-
 cte descripta, quæ tamen distinctione aliqua egebant, sicut de im-
 mixture acetum cum oleo rosaceo. si itaque putasset differentem es-
 se rationem oxirodini cum fractum est caput; & cum integrum
 est: interior tamen aliqua pars est inflammata; cum hoc multum
 referas, in eo etiam damnavit Apollonium. huic accedit, quod 137
 metho. cum de pleritide, & lethargo sermonem haberet; dixit: in
 ratione curationis in principio similes esse; eisdemque egeret re-
 mediis, itidemque in fine; in medio autem non inno. requirere contra-
 riam medicamentorum rationem. unde pariter in utroque oxiro-
 dinum laudat. postea vero, quia innascuntur symptomata in illis
 omnino aduersaria, in altero in modica vigilia; in altero ferè in
 exuperabilis somnus, ideo in altero necessaria sunt, quæ somnum
 conciliant. in altero, quæ maxime à somno excitent: si ergo sensit
 set in altero frigidum, in altero tepidum, aut calidum esse perfun-
 dendum, istius rei, cum non parui sit momenti, meminisset. nemi-
 nem autem puto sentire in lethargo frigida esse perfundenda: unde
 nobis videtur potius hærendum Græcis auctoribus, quam Ara-
 bibus in hac re. Et si quis dicat ad Galeni propositam sententiam
 de curando capitis dolore ab ardore excitato, quomodo respondebi-
 mus. Nobis Posidonius viam ostendit, quando non modo ait: tepi-
 dum adhibendum esse oxirodinum, verum & istius rationem rēdi-
 dit, & ait frigida actu declinanda, quia materiam in inflammatione
 comprehensam, & infarctam magis inculcarent; atque ita deinde
 eius digestionem longe difficiliorem efficerent. Ecce ergo tur fu-
 gimus frigus actu. in dolore vero ex ardore solis excitato: licet ad
 sit materia quæ partim fluxit, partim fuit ad caput: non est tamen
 illa infarcta, & inculcata in ipsam affectam particulam, ut in inflam-
 matione. sed fuit, & ut secundo libro commentario, in primum epi-
 dem, tradidit Gal. quasi alluit ipsas particulas: unde propterea ne-
 que deinde timemus ne intrudatur inculceturque in substantiam
 loci affecti. Sed, & alterum dissoluamus, quod de portione acetum im-
 miscendi

miscendi oleo rosaceo propositum fuerat. Dicimus ergo quod istius rei nequit fieri cerra, & exquisita determinatio. nam cum præfertim ad hoc immisceatur, ut faciat faciliorem penetrationem medicamenti ad internas partes, pro ratione corporis: ita varianda est aceti mixtura, nam alia aliis sunt densiora, duriora, & solidiora corpora, & tum cutim, tum caluariam crassiores, & duriores habent, quo fit, ut alia etiam aliis maiori egeant ope ad penetrandum. in his ergo erit etiam opus copiosiori aceto, & quamvis Gal. in libro de facile parabil. medica. hoc diffiniuisse videatur, dixisseque oportere, ut quadruplum sit oleum ad acetum: hoc tamen accipiendum ita esse prolatum, non ut semper sit hæc mensura seruanda, sed tanquam hæc sit satis mediocris, & quæ sæpius possit esse congruens. Hic mihi tamen neque id prætereundum videtur, in quo aliquos medicos hallucinari animaduerti, qui putant in oxirodino plus inter-dum aceti imponendum, quam rosacei. & id quando nimis vrget somnus, quia acetum maiorem vim habet excitandi. cui rei nullū antiquorum auctorum attestantem, mellegille memini. Gale. quidē 13. methodi dixit, omnes inflammationes cerebri, siue sit phrenitis, siue lethargum, siue sit affectus medius inter hos, in initio ege re repulsionis gratia, quando integrum est os caluariæ, oxirodino. sed si perforatum sit os, satis esse rosaceum oleum, in secundo de compositione medicamentorum secundum locos. pronuntiauit, acetumque addi, ut facilius ad fundum vsque perueniat vis olei rosacei, ex quo facile quisque percipere potest, satis esse ut tantum aceti imponatur, quantum sit satis ad penetrationem, & proinde, quāquam sit opus plus aceti indere quam olei, accedit ad hoc, quod idem Gale. in libro de facile parabil. medica. de dolore capitis ex solis ardore agens, ait quod sit in oxirodino imponendum quadruplum rosacei, & subiungit, nisi plus refrigeraret velis tunc enim plus aliquanto aceti imponendum. Quia vero hætenus de oxirodino verba fecimus quatenus pertinet ad mixturam aceti & modū illud perfundendi nempe calidum vel frigidum: quia etiam aliquod dubium posset alicui negotium facessere quantum ad oleum pertinet: cum duplex sit eius conficiendi ratio: interdum enim fit ex immaturo oleo, quod omphacinum, appellant, interdum ex maturo, quod in præsentia completum nuncupant. differunt autem eorum facultates. quia omphacinum magis astringit & refrigerat, quam alterum. quod autem maturum est magis molliet & digerit:

cum

Cap. 1.

Cap. 1.

Cap. 1.
ubi agit de
medicamē
tis, Ad ca
pitis dolo
rem ex fri
gore.

Cap. 1.

cum ergo ita differant, videtur rationi consonum, vt differens sub-
inde sit etiam ratio vsus eorum. Huic dubitationi ita videtur re-
spondendum, quod vbi maior viget caliditas, ibi magis accommo-
datum est omphacinum. vnde Gal. in dolore capitis ex ardore so-
lis præfert oleum rosaceum omphacinum. in initio etiam inflam-
mationum cerebri quæ proxime accedunt ad naturam phrenitidis
mihi magis probaretur omphacinum, siue fracta esset caluaria &
pertusa, siue secus, quia maiorem refrigerationem & repulsionem
requirunt. at in inflammatione has quæ magis naturam lethargi ha-
bent, putarent, oleum rosaceum maturum aptius fore, quia non
eget tanta refrigeratione & astrictione, cum a frigido humore sua
pte natura ortum habeat & crassiori, post principium vtrobique
mihi maturum magis probaretur: imo in lethargo magis etiam ca-
nemelinum. Sed quia hæcenus rationem curationis, quæ commu-
nis est omnibus incipientibus inflammationibus, exposuimus, qua
tenus nimirum ad naturam, & vsum medicamentorum pertinet, & vt
ait Gal. quantū ab initio deinde recedūt, tantū magis eorū ratio eua-
dit diuersa & quasi aduersaria fit, & id sicuti 13. meth. idē ait, ob di-
uersam & ferē ex toto oppositam symptomatum naturam, quæ op-
positam naturam ipsorum morborum sequuntur. phrenitidis si-
quidem, quæ à calida siccaque materia ortum habet, comes est vigi-
lia omnino modum excedens lethargia: vero, in exuperabilis som-
nus. itaque postea quàm circa has cerebri inflammationes vertitur
in præsentia nostra oratio, de illis particularim agamus, quæ ad cu-
randas vtrasque inflammationes solent in vsum venire. cum igitur
quo magis increscit inflammatio, eo ē magis symptomata sæuiant,
quæ inflammationis in ea parte subortæ naturā sequuntur: & phre-
nitidis, cuius causa est humor calidus & siccus, comes est maxima
agitatio corporis, & interdum tanta, vt vires deiciat, vigilia maxi-
ma, & plerunque continens & perpetua. deliriumque perpetuum,
inconstans, oris & linguæ ariditas & sæpe denigratio, febris etiam
ardens. his occurrendum erit non modo illis remediis quæ som-
num conciliant, sed interdum quia extremi morbi extrema reme-
dia desiderant, illis quæ soporem & torporem afferunt, nec mo-
do sensibus: verum & internis, & principalibus facultatibus.
vnde succo lactuæ viuntur medici; vel eius decoctio, caput
perfundentes, aut decoctio ex capitibus papauerum, &
aliis id genus medicamentis, quibus & caput perfundunt,
&c

Ca. 4. & 11

1. 1. d

4. d

3. 0.

1. 1. d

& naribus, vt odorentur, offerunt. Sed & illitiones interdum parantur, quæ temporibus naribusque illinuntur. vt sunt oleum violaceum, & nenupharinum, quibus interdum commiscemus; & succum leuicæ. aliqui accipiunt olei violæ cæci, nenupharini, anethini singulorum dragm. iij. opii grandij. & his mixtis inungunt internas nares & tempora. In maximo autem vfu his temperibus & prioribus fuit vnguentum, quod à Nicolao descriptum, & paratum apud omnes ferè scilicet plasiarios reperitur, & appellatur populeon, quia germina populi arboris aliorum omnium simplicium rationem excedunt. eorum enim libram accipit, seminis papaueris nigri, foliorum mandragoræ, summitatum rubi tenerarum, foliorum hyosciami, solani, minoris semper viui, quod vermicularem herbam in præsentia vocant, semper viui maioris, personacæ, quam bardanam nuncupant, violarum, umbilici veneris, singulorum vncias tres, axungie porcine citra salem libras duas, oculi populi. seorsum primum tunduntur, mox iterum cum axungia, ac efformantur, vt nunc dici solet, in magdaleones, perbiduumque ita dimittuntur. tertia vero die prædictæ omnes herbæ seorsum prius, deinde iterum simul cum prædictis magdaleonibus mixtim teruntur; iterumque confectis vt prius magdaleonibus, quod sciendum est per dies nouem, qui postea frustatim incisi coquantur ex libra vini optimi odoriferi donec vinum absumatur. semper tamen spatam agitando. postremo succo omnia imposita exprimendo colanda sunt, & vbi refrigerint, seruanda ad opportunum vsum. omnia quidem refrigerant, aliqua ratione etiam non nihil astringunt, vt rubi germina, solanum, plantago, alicuius temperati caloris est axungia, quæ materię officio fungitur. calefacit & vinum aromaticum, quod tam & si possit contemperare multum eorum frigus, putotamen petius fuisse impositum, vt perducatur & penetrare faciat vim medicamentorum frigidiorum: præsertim vero ad caput, atque in somnum conciliet. vim ergo refrigerandi insignem habet. solent tamen medici interdum aliquid opii immiscere, vt habeat maiorem vim soporem afferendi, vt semuncie duo vel tria grana. inungunt autem tempora & nares, vt paulo antediximus. In lethargo autem hoc tempore sicut diuersissima: imo omnino opposita accidunt symptomata, ita penitus opposita remedium ratio est instituenda. tam ratione materię à qua morbus ex-

citatus est, quā ēt quatenus pertinet ad ipsa symptomata, quē illi as-
dere solent. materia. n. cum frigida lenta, & crassa sit, ostendit opus
esse medicamentis, quā vim habeant attenuandi, siccandi, ac calefa-
ciendi. symptomata vero quā illam sequuntur, sunt quādam legni-
ties corporis, somnus vel potius sopor, & quasi stupor facultatis
tam sensitricis, quam motricis. quare his etiam obistendum reme-
diis excitantibus euigilantibusq; olsi & propterea cū oxirodino il-
la commiscenda sunt, quā & coquendi, & attenuandi digerendiq;
facultatem habent: vnde & oleum chamemelinum erit prāstantius
hoc tempore rosaceo. interdum vero, si & aliquid rutacei intermi-
sceretur, id non esset alienum ab hoc instituto. castoreum quoque
cum his contritum, atq; illitum syncipiti summis effertur laudibus
in hoc negotio, vt pote quod concoquat, attenuet & digerat euigi-
letq; discussis vaporibus frigidioribus qui somnum fouent. Sed &
odoramenta attenuantia, & euigilantia maxime vtilia sunt, aut na-
ribus illita, aut odoranda oblata, quemadmodum essent ruta ita
arida, serpillum, sampfucus, calamintha, pulegium, origanum
& id genus alia multa, quā, & efficaciora erunt, si ex aceto, & il-
lo etiam acerrimo cocta atque ita calida naribus olfacienda appo-
nantur. Sed quia de his satis longum sermonem habuisse vide-
bimur, opportunum erit, vt huic capiti sineui imponamus. Ve-
rum cum à nostro instituto alienum nequaquam sit censendum:
si paucula quādam de medicamentis illis addiderimus, quā ce-
phalica ab antiquis medicis dicta sunt, propterea quia in fractu-
ris capitis aestimarentur esse admodum vtilia. nam & de his egit,
Gale. secundo de compositione medicamentorum secundum ge-
nera, primum de illis in vniuersum agemus. deinde vero parti-
culatim. reuocemus ergo in memoriam, quā paulo ante fuere
exposita. nempe quod ea quā maximum negotium in capitis
fracturis facessere possunt, aut olsiis fragmenta sunt, quā at-
tingentia membranas cerebri, eas pungant uel premunt, aut
ichor aliquis, sanguisve, qui uel ex uenis disruptis vel inci-
sis, uel alijs partibus, vt ex osse fracto, vel circumstantibus
partibus effluens, supra membranas delabitur, ibique corrup-
tus, multa affert incommoda, & interdum extrema pericula. quā-
re cum princeps scopus medici in his malis curandis sit ui-
ciosum humorem extrahere, qui omnium malorum in cau-
sa est, & os, si quod depressum est, attollere, ad hoc offi-
cium

cū medicamenta illa erant apta, quæ vim insignem exiccandi, & e profundo attrahendi habent: quod deinde tum calore, tum partium tenuitate: præstant istius ergo naturæ ea medicamenta quæ cephalica ab antiquis medicis dicebantur, & in his affectibus erant in usu. Galenus uero in 6. methodi, emplastri quod isis dicitur meminit, & fuit ab eo litteris traditum & examinatum 4. de compositione medicamentorum secundum gen. cuius nos etiam meminimus. Priori libro, quia hæc eadem ad alios etiam affectus, quàm maxime utilia sunt, præfertim uero curandis ulceribus malignis, & putridis. inter cephalica etiam recensuit Galen. 5. de compo. med. secundum gen. emplastrum quod Hæras diactimna hoc est ex diactamno & sacrum appellauit, & erat celebratissimū suis temporibus. præterea, & illud quod diabotanon, hoc est ex herbis nuncupatum est, expositum ab eodem Galen. 4. de compositione medicamentorum secundum genera. & plura item alia, quorum idem 2. eiusdem operis meminit, quæ propterea quòd nostra hac tempestate in nullo aut in raro sunt usu, non putamus epportunum esse in hoc loco describere: sed de illis tantum in præsentia agemus, quibus uenerari medici nostri nunc temporis utuntur. Quæ tria sunt: nempe, quod ex periclimeno conficitur: vulgo uero vnguentū de matrissylua appellatur. alterū, quod ex betonica fit, & ab ea etiā nomē sortitū est, & tertium, quod ex gūma elemi, quia gūmi illud unā cū aliis medicamentis accipit. primūque de priori agemus, cū & magis vulgare, & in maiori usu sit. Accipit ergo periclimeni, uelut nūc vulgo appellatur, matrissyluæ quantū uidetur esse satis, & in optimo uino coquitur ad cōsumptionē tertiæ partis, quod ubi factū sit percolatur. deinde uero accipiuntur ceræ citrinæ, terebinthinæ, singulārū autem uncia quatuor, olei rosacei drach. ij. hæc simul colliquata cōmisceantur, ac ita in uinū illud colatum iniiciantur, ac in eo tam diu spata ducuntur, donec frigescant. atque ita deinde seruetur medicamentū, quod quidem vim habet deliccandi ac ex alto materias extrahendi. nam si uelimus res omnes singulatim æstimare, uinum primum optimū, quod accipitur, non nigrum neque austerū erit. neque enim illud uidetur comprehendi sub appellatione uini optimi. sed illud quod aromaticum & fuluum, estque tenuis substantiæ. hoc namque facile ob suarum partium tenuitatem potest profundius se indere. periclimenum uerò uel matrissylua, si recte uelimus

Victoris Trincauellij

ea penſitare, quæ de hoc medicamento à Dioſcoride in lib. 4. & Galen. de ſimpl. medic. faculta. fuere literis tradita, manifeſte percipimus vim habere inſignem attrahendi ex profundo, cum calidū ſit, & tenuioribus partibus tenuiq; ſubſtantia conſtet, cum & diſſecandi vim habeat, & extenuandi. nam vrinam potenter citat, vt tandem longo eius vſu ad ſanguinis miſctum deducat, & tam interius acceptum, quàm exterius ex oleo illitum lienera extenuet, præterea, & aſmaticis opem ferat. quòd autem, & terebinthina reſina ex profundo attrahat, nulli non notum, quia vero præterea neceſſaria eſt in his aliqua aſtriſctio, tum ut robur internarum partium ſeruetur, tum uel maxime, ut repellantur ſucci conſtuentes ad affectas partes hoc oleo roſaceo referendum eſt acceptū. eſt tamen hoc medicamentum ſatis moderatum in attrahendo, quod non eas habet vires, ut illi ſit ſidendum, in fracturis cecis, ſicut quidam antiqui fidebant illis, quæ proprie ab ipsis cephalica dicebantur. ſperabant etenim ui eorum poſſe & attrahi ichores uel humores effuſos ante quam putreſcerent, ac etiam depreſſas oſis particulas attolli, ut & 6. meth. & 2. de compoſi. medicam. ſecundum gen. viſus eſt Galen. inſinuaſſe. Alterum uero medicamentum, quod emplaſtrum uel ceratum ex betonica dicitur, in modum hunc conſicitur. Accipit ſucci betonicæ, ſucci plantaginis, ſucci apii: ſingulorum autem coloratorum, libram. i. reſinæ, ceræ, ſingulorum uncias iii. terebinthinæ lib. unam. cætera coquantur ad ſuccorum conſumptionem. ultimo addatur terebinthina, ac fiat emplaſtrum non admodum priori uiribus diſſimile eſt hoc medicamentum. nam poteſt è profundis partibus uitioſam materiam extrahere. betonica enim utrum ex ſapore, tum uero ex affectu percipere poſſumus, calidiuſcula eſt, & tenuium partium. ſaporem enim partim ſubamarum habet, ut ait Galen. partim uero acrem, quæ utræque partium, tum caliditatem, tum tenuitatem oſtendunt, cum præterea lapidem in renibus afferat, mēſes cieat, & à pulmone pituitoſam & purulentam materiā attenuet, & detergat, neque hæc fieri poſſunt niſi cum quodam calore & partium tenuitate à multis quoque in vulneribus & aliis affectibus mirifice laudatur, ut pote quæ citiſſime, ruſa atque in modum emplaſtri appoſita, illa conſolidet: vnde & deſiccat. Sed & apii ſuccus attenuat, & exterius attrahit, cum calidus ſit, & tenuis ſubſtantiz, ut lotia, menſesque muliebres poſſit ciere, & ſtatus diſcutere. ſed & plan-

plantaginis succum fuisse additum puto, ut inflammationes repellat. resinas uero, tam eā communē, quā terebinthinā, nemo est, qui nō nouerit uires habere exterius attrahēdi, ut 3. libro exposuimus. Reliquum autem est, ut de eo medicamento postremum agamus, quod sit ex gummi quod ab Arabibus elemi dicitur, cuius authorem tradunt fuisse Petrum Aponensem, qui conciliatoris cognomen sibi uendicauit. conficitur autem in hunc modum, accipit gummi illud elemi ad uncias tres, resinā uero ad uncias quatuor, his adduntur cerā uncię sex, olei rosacei uncię tres & semis, ammoniaci uncię duę, terebinthinę uncię tres & semidragma, atque ita ex arte fit unguentum. Alii uero in hunc modum parant. Accipiunt gummi illius uncias itidem tres, opopanax uncias duos, bdellii semunciam, resinę pini . . . cerā quantum sit satis, ac unguentum conficiunt. parū admodum differunt inter se duę hęc confectioes, nisi quod prior ammoniacum accipit. altera eo relicto accipit opopanax & bdellium. prior oleum rosaceum, altera uero minime. unde prior quidem aliquanto temperatior, & uim repellendi aliquanto maiorem habet. utraque tamen satis insigniter desiccatur, quę ex alto attrahit, quod ex examinatione eorum, ex quibus conficiuntur, percipi potest: de quibus prioribus libris egimus, unde & aliis ulceribus possunt esse commoda medicamenta; præsertim uero capitis, de quibus fuit hoc loco institutus sermo. nam gummi illud elemi, resina quædam esse uidetur alicuius peregrinę & nobis ignotę arboris, quę præter id, quod ratione qua resinaceę naturę est, & proinde uim exiccandi calefaciendique, & præterea ex alto attrahendi habeat, obseruatum etiam est à iunioribus in capitulis vulneribus in quibus caluoria scissa sit peculiari quadam & ci naturali ui quā maxime esse medicamentum utile. Sed & tertia etiam istud medicamentum componendi ratio reperitur. quod in auctorem Bartolomeum referunt Montagnanā, quodque licet materia à superioribus uarium sit, facultatibus tamen ab illis non est admodum dissimile, nisi quod hæc istius medicamenti confectio illis uim maiorem concoquendi habet, tam ex thure, quā etiam ex styrace: præsertim uero ea quę uera est, quā calamitem appellant, quia etiam facultate & liquida fortasse præditam esse credendum, est etiam non nihil astringentis particeps. ex ladano: myrrha uero præter id, quod calefacit & desiccatur

dine secundo & quòd detergit neque tamen perinde ut alia multa detergentia exasperat & capitis ulcera, ut tum sæpe præsertim uero in octauo de simplicium medicamentorum facultatibus Galenus. tum etiam libro primo Dioscorides referunt, glutinat, & fractis ossibus medetur, & hac fortasse ratione addidit auctor, quòd medicamentum adiecta myrrha erit fortius. Ladanum uero cum e profundo attrahat, scopo in his medicamentis proposito est accommodatum, & cum ut diximus prioribus capitibus, sit astringentis alicuius particeps, iuuare poterit, tum repellendo fluxiones, tum etiam robur addendo subiectis particulis. quia uero & sandaracæ sit mentio: non illius quæ mineralis est, & arsenici species: sed illius, quæ ita ab Arabibus & seplasiariis appellatur, & est resina uel gummi iuniperi, quam etiam uernicem vulgo appellant, de ea etiam aliquid dicemus: quàmuis aut nullam, aut raram eius mentionem factam ab antiquis medicis inuenerimus. Arabes tamen, & iuniores Latini in usu satis frequenti habuere, neque in hoc Plinio subscribere, quòd gummi iuniperi nulli sit usui. imo putarunt præter alios usus, quòd desiccet capitis superuacuam humiditatem, & proinde eius suffumigium naribus exceptum destillationes desiccans, illas sistit, commiscetur etiam pulueribus, quas capitales appellant, quasque capiti inspergunt ubi futura est, quam coronalem dicunt, ad desiccandum nimium capitis humorem, & illud roborandum. nam si eius effectum, quem medici exponunt consideremus, non caret aliqua astringentione: præsertim cum hoc medicamentum esse uiribus similem electro, vel succino dicant, quod Arabes carabe dicunt, in quo antiquorum consensu insignis est astringendi uis. in hoc ergo medicamento accipitur tum ut humiditatem uel ichores confluentes ex sauciatis partibus ad internas particulas desiccet, & præterea etiam astringendo robur capiti addat. postremo uero & pini resina ad cerasi uel unguenti absolutionem accipitur, quæ & ipsa siccat, & ex alto attrahit: omnia uero pari pondere accipiuntur, & ad ignem excocta componuntur. Horum uero hæc est utendi ratio, quòd tum linamenti ex-

cepta

cepta ulceri eis repleto induntur, tum uero lintheo, qui aliis omnibus super apponitur. Sed iam huic tractationi finem imponamus, nam satis superque in ea sumus uagati, & ad ea medicamenta componenda accedamus, quæ aliis internarum partium affectibus curandis accommodari possunt.

*De medicamentis componendis, quæ congruentia sunt alijs
affectibus internarum partium capitis curan-
dis. Cap. 5.*

QUamuis ceteri affectus, quibus exerceri possunt internæ capitis partes. si eos particularim per omnes eorum differentias ad ultimas usque persequi uellemus, quàm plures sint, & subinde longam admodum requirerent tractationem: si tamen illos in quædam summa capita colligere uoluerimus: sicut facile & non sine legentium utilitate contrahi possunt, seruata congruenti in illis exponendis methodo, clarior & faciliior euadet hæc disquisitio. Cum enim uniuersa ferè ratio, qua morbi in uarias & multas differentias diducuntur, aut à propria affectus natura sit petenda, aut à natura loci uel particulæ affectæ. Vt differentia omnes particularim, tum inueniantur, tum cognoscantur, necessaria est exquisitissima, ac exactissima, & naturæ morbi inquisitio, & particularim exquisitissima locorum omnium affectorum cognitio. in curandi tamen ratione internos capitis affectus, non est necessaria tam diligens, & exquisita internarum partium, quæ male affectæ sunt, mentio. sed ea satis est, quæ communis, & generalis sit. sicut & sola satis est indicatio communis, & generalis, quæ à quadam communi ratione omnium earum particularum quæ intra caluariam sitæ sunt, accipienda est. Sed ut res hæc quæ fortasse obscurior aliquibus uidebitur, clarior & apertior reddatur, magis particularim illam tractemus, & primum diuisiua methodo inueniamus omnes differentias morborum quibus obnoxia sunt hæc capitis particulæ. Itaque cum partim simplices, & similes sint, partim uero composita, & instrumentales, uel, ut Græci appellant, organica, necesse est, ut & affectibus pateant, qui simplicibus proprii sunt;

& illis, qui organicis: item & illis qui utrisque communes sunt proprie similis sunt intemperaturæ, tum illæ quæ citra ullum materiæ affluxum consistunt, tum uero illæ, quæ semper ab affluxu materiæ fiunt, & fouentur. proprii autem affectus partium instrumentaliū sunt, quicunque ad conformationem, uel ut iuniores loqui solent, ad compositionem istarum particularum pertinent, ut sunt morbi in uia in cavitatibus in figura, numero, magnitudine & id genus reliqui, communes autem sunt, qui soluta cōtinuitate constat, de quibus nihil est cur amplius loquamur, cum satis superque sit de illis superiori capite sermo habitus. in intemperaturam autem, tum cum materia, tum citra ipsam referuntur dolores præsertim: præterea uero sopores, qui comata à græcis, subet autem ab Arabibus dicuntur. sed & deliria, & quæ calidam & siccam cerebri intemperiem sequuntur, ut in febribus, & phrenitide, & quæ frigidam & siccam, ut in insania, uel, ut Græci loquuntur melancholia, & congelatio quæ catochus græce dicitur. stoliditas quoque ex cerebri intemperie ortum habet. Porro intemperatura, quæ sola, & citra materiam est, quatenus ad hoc pertinet unam duntaxat rationem, unicumque modum habet, quo consistere potest, ac subinde etiam particularum actiones lædere: At illā quæ cum affluxu materiæ, non unum & simplicem modum habet, sed potius duplicem, quia ut Ga. in 1. prorrheticorū commen. 1. tradunt, materia aliquando quasi alluit ipsas particulas & per uasā, hoc est, per uenas, & arterias diffluit, nōdum in substantiam particularum, hoc est in inanes earum meatus à uasis quasi profusa eorum repletionē expressa absorbetur & inculcatur adeo, ut particula in tumorem attollatur, quomodo fieri solent tumores omnes, qui in particulis præter earum naturam extuberare solent ad quod genus pertinent, & phrenitides & lethargi, & quæ inflammationes inter has utras mediæ sunt ex utrisque mixtæ, & quasi confusæ, nam sicuti lethargus pituitosa inflammatio est, quæ calorem, ut 13. metho. ait Galen. contrahit ex putredine materiæ. unde ortū habet, phrenitis uero ex bile, uel bilioso sanguine, mediæ uero est, quæ cataphora a græcis, subeth assari ab Arabibus dicitur, in qua si cut mixtus, & confusus est uterque humor, nempe pituita, & bilis: ita, & symptomata, somnus nimirū, & uigilia confunduntur ita, ut neque omnino dormiant, neque omnino uigilent, sed semper quasi dormitent, aut alternatim, modo in somnum, modo in uigiliam propensū sunt, non modo autem ratione materiæ, aqua excitantur dife-

runt

runt hæ capitis inflammationes, uerum etiam loco, quia ut itidem exposuit Galen. phrenitis proprie inflammatio est membranarum capitis, lethargus uero substantiæ cerebri. insolidum enim corpus ut sunt membranæ non facile admittitur crassus, & lentus humor ut est pituita: facile autem tenuis, qui tamen in rara & laxa substantia, ut cerebri substantia est, non potest facile contineri ne diffuset. Sed neque de his alioquin in præsentia sumus acturi, cum priori item capite diffuse fuerit actum. Ceteri uero affectus, quorum essentia in in temperatura, tam cum materia, quàm sine materia, consistit, ad particulas in capite contentas quatenus simplices sunt, præsertim in attinent, non tamen indiscriminatim ad earum quamlibet, affectus enim dolorosi, non possunt attribui nisi particulis, quæ sunt sensu præditæ, nam cum dolor sit actio sensus tactus læsa, nulla pars sensus expers, ut sæpe docuit Galen. doloris capax est, in capite uero membranæ, uenæ, arteriæ quæ insignem sensum habent, ossa uero nullum, cerebrum & ipsum, aut nullum ut plerique sentiunt, aut obscurum admodum, ut insinuasse uisus est Galen. in libro de utilitate respirationis. affectus uero, à quibus internæ actiones læduntur pertinentes ad principes facultates, ut est imaginatio, cogitatio, & memoria, cum illæ non in membranis: sed in cerebro eiusque substantia suam sedem & organum habeant: sunt affectus proprie attribuendi & primum ipsi cerebro, neque enim illæ lædi possunt, nisi cerebrum, aut per se, aut cum aliis consentiens male habeat. Morbi uero his particulis proprii quatenus non simplices sunt sed instrumentariæ, præsertim duo sunt, epilepsia nimirum & apoplexia, uel ut latini loqui solent, morbus comitialis & attonitus. plerumque enim, cum primarii affectus cerebri sunt, non autem per consensum, sunt acrasia aliqua, & frigida materia, & sæpius pituitosa. epilepsia autem non nunquam, & à melancholico succo: unde sæpe in melancholicum affectum transit, sicuti melancholia, uel insania quandoque in morbum comitalem definit. cum ergo hac materia uentres cerebri replentur, spiritibusque animalibus intercipitur transitus, concitantur, aut apoplexia, si omnino repleantur, aut epilepsia: si non sit exquisita repletio. unde quantumlibet sint morbi harum particularum quatenus instrumentariæ, cum tamen penitus à præsentē materia concitentur & foueantur, & citra frigidam intemperiem esse nequeant, eadē est tandem hos curandi ratio, sicut & alios affectus, qui in intemperie cum simili materia consistunt. quando uero per consensum ali-

quo affectu tentatur cerebrum, id ad præsens institutum nõ admodum pertinet, quia non ad caput dirigenda est princeps curatio: sed ad eã particulam, cū qua in affectu consentit. Quamvis autem ita multiplex ea ratio sit: unde indicationes sumendæ sunt, quæ à natura, & essentia morbi prodeunt: simplex tamen adinodū est illa à qua petenda est indicatio, quæ à natura partis affectæ peti solet. quia licet internæ capitis partes plures sint, & natura temperaturaque diuersæ: quatenus tamen ad administrationem remediõrū, perinde est, ac si una tantum, & simplex esset. nam & unus est tantum locus cui sunt exteriora, & localia remedia adhibenda: nēpe scinciput ubi futura est, quæ coronalis dicta est ab anatomicis. quæcunque enim pars laboret interiori affectu, siue posterior, siue anterior, siue media sit, item siue superior, siue inferior, & quæcunque tandem illa sit, oportet, ut 2. de comp. med. secundum loc. docuit Gal. medicamenta & remedia scincipiti, si eorum uis sit facile peruentura ad loca affecta, administrare, tum propter futurā, tum etiam propter raritatem & tenuitatem ossis in ea parte. sed quantumlibet interdum una tantum pars primum morboſa esse uideatur, omnium tamē pari ferè in medendo rationem habere necesse est, partim ob maximā quam mutuam habent, connexionem, partim quia quæcunque ad ministrantur medicamenta, fieri nequit, quin uis eorum tandē ad omnes non pertingat. unde quatenus ad usum pertinet, omnium ferè idem est. quare diuersitates curationis effectuum harum partiū uniuerſæ ferè in naturam uel essentiam ipsorum affectuum, non autem in diuersam rationem affectarum particularum referuntur. quæ tandē ad duo prima capita uel summa genera pertinent, utpote quoniam omnes hi affectus aut in sola consistunt intemperie citra ullū ab aliqua materia fomentum, aut sunt cum alicuius materiæ affluxu. Simplex adinodum est curandi ratio, quando illa à sola intemperiei indicatione sumenda est absque interuentu alicuius materiæ. cum per solam transmutationem, & correctionem illius intemperaturæ absoluenta sit, illis nempe medicamentis, & remediis, quæ qualitatibus illi intemperaturæ contraria sint. nā, ut sæpe testatus est Gal. præsertim uero in cōmentariis in librum Hippo. de his quæ in medica officina inscriptum, primus & communissimus scopus in parte medicinæ quæ circa curandos morbos uersatur, est, quod cōtrariis contraria curanda sint. multiplicior uero ea est, quādo præter intemperiem adest etiam inateria, quæ, & ipsa suam habet indicatio-

nem propriam. sed explicemus scopos & indicationes, & unde illi affectus ortū habeant antequam ulterius progrediatur nostra oratio, & rationē exponamus eorū medicamentorum usumque, quibus uti oporteat in curandis his affectibus, qui ab aliqua intemperaturaū proficiuntur, siue illa cum materia sit, siue citra materiam. nam illæ eadem ferē noxæ inferūtur particulis quatenus simplices ab intemperatura citra materiam, quæ & ab illa cum materia. quia materia, & ipsa non lædit, nisi quia per suas qualitates uitiant naturale temperamentum particulæ. q̃ si aliquando sua substantia quatenus corpulenta est lædat, læsio ad illam pertinet, quatenus composita, & instrumentaria est, uitriata nempe eius cōformatione, ut paulo ante exposuimus. Ex intemperie itaque humida imprimis, deinde & frigida somni sunt longiores, ab utriusque autem complexu sopores & ueterni, qui à Græcis, *νύκτα κατασέπας* & *ναΐσι* dicuntur. ab Arabibus subest iidē affectus ex pituitosa materia occupāte præsertim partē anteriore, quo loco sedē eam facultatē habere credimus, quæ cōis sensus à peripatheticis imprimis dicitur. occupāte uero hac intemperatura mediam cerebri partē uersus posteriorem, imaginatricis & cogitaticis facultatū actiones lædūtur, & si quidem fiat magna offensa, destruuntur omnino actiones, ut in apoplexia sæpe uidemus: sin autem minor hebetes & imminutæ fiunt, si cut in soliditate & amentia contingere solet. Sed si cerebri posteriorem occupet partē, sequitur obliuio, & hæc ab intemperie, tum frigida, tum humida, tum cum materia, quàm citra illam euenire possunt. A siccitate uero imprimis, deinde & à calore sequitur nimia uigilia, siue cū materia fuerint hæ intemperaturæ, siue citra illam: præsertim autē, ut diximus, à siccitate. nam frigida, & sicca intemperatura, ut melancholicis accidit, uigiliam affert. item & calida & sicca, sicut in biliosis affectibus, calida autem, & humida, ut ubi sanguis multus fuerit, reddit hominem prouum in longum somnum saltem; si nō in profundum. calida autem intemperatura sine cū siccitate, siue cū humiditate fuerit, deliria cōmouet illis similia quæ in phreniticis solent contingere. frigida uero, & sicca melancholica deliria concitare solet. humiditas autem præcipue sed & frigiditas memoriæ labem asferre solet, tam cum materia, quàm sine materia. His autē explanatis, methodū constituamus qua cōponere apta possimus medicamēta, & cōpositis præterea opportunē uti. cū autē uniuersa horū affectuū ratio in duo præsertim capita fuerit ita dem.

relata:

relata: nempe in solam intemperaturam, quæ sit citra ullius materiæ affluxum, & illam quæ ab affluxu materiæ, fouetur ita duplex erit ratio medicamentorum & remediorum, quibus sint tollendi hi affectus. nam cum horum omnium ratio ab indicationibus sit sumenda: in illis quæ citra materiam sunt, unica est tantum indicatio, quæ ab illa intemperatura depromenda est, simplex quidem: si simplex sit intemperatura, quæ una tantum qualitate excedat. composita uero, si in complexu utriusque contrarietatis sit aliquis excessus. ubi uero adsit præterea & alicuius materiæ præsentia: prima quidem, & princeps indicatio non est ab ipsa temperatura petenda, quam uis intemperatura sit proxima ratio, qua actiones læduntur, quod est quasi forma, ut sæpe fuit expositum, ipsius morbi: sed prima princepsque indicatio est illa, quæ nobis offert materia, quia ab ipsa materia omnino pendet intemperatura, ita ut remota materia, statim ferè definit intemperatura: nisi interdum ex longa transmutatione in membris à materia facta, mutata sit naturalis illius partis temperies, ut iam duæ ibi sint intemperaturæ, altera, quæ omnino adhuc pendet ab illa materia, altera quæ iam independens facta sit. Nos autem primum agamus de intemperaturis uel de medicamentis aptis ad tollenda intemperamenta morbosa internarum partium capitis: sumpto nimirum exordio a calida intemperie, in qua nulli obscurum esse potest, primum scopum nobis oblatum insinuare refrigerandum esse, & id medicamentis huic rei aptis. uerum hoc etiam considerandum, quod tamen summatim percurremus, cum parum ad præsens institutum uideatur pertinere, nempe quòd caput si calidius redditum est, quomodocunque id factum fuerit: uel ab aere calidiori, uel ob solares radios, uel propter ignem, uel ex nimis tegumētis, uel aliis id genus occasionibus, licet inter initia contraxerit calidam intemperiem citra materiam. nam externæ hæc & procatarcticæ causæ ex propria sua natura, non eam uim habent, ut aliquam intemperaturam cum materia imprimant, possunt tamen id agere ratione apparatus corporis, nam caput calefactum facile, tum uapores, tum etiā humores à subiectis partibus solet aterahere. Galen. 2. de compos. medic. secundum locos, ex Apollonii sententia, cibi subtractionem laudauit per uentrem etiam inferiorem uacuationem saltem glandibus & clysteribus, lenientibus etiam interdum medicamentis, & summum ut aluus lenis & fluida sit: præterea uerò ab illis omnibus abstinendum esse præcipit, quæ illam intemperiem fouere & augere possunt,

Cap. 1. ubi agit de doloribus capitis citra manifestas causas obortia.

sunt, ut potus uini: præsertim potētioris, cū & calefaciat, & caput repleat. Sol etiā ignis quæ loca calidiora, & balnea quoque calida, excādescētia, clamores uehēmētes. sed & animi perturbationes, & cōcitationēs mentis, motiones, uigiliz. sicuti contra quies, tam aniuui quàm corporis plurimum prodesse poterit: ita etiā conuersatio in loco qui probe perspiretur. & hæc quatenus ad rationem uictus pertinent satis superque, si præsens institutum spectemus satis sunt. cum circa rationem medicamentorum uersetur: de quibus etiam solum particulatim loquimur: quando de illis erit sermo, quæ erūt exterius adhibenda. nam de alijs quæ interius sumi solent, satis erit tantum summa capita prosequi. nam & de decoctis, & syrups qui refrigerant, & de cæteris tandem id genus medicamentis, in 2. libro fuit sermo habitus. Ad externa itaque medicamenta transeamus. Hæc solent habere formam uel modum fomentorum, aut per fusionum, quas Græci embrochas appellant, aut illitionum, aut emplastrorum, aut ceratorum, aut id genus aliorum. sed in his exponēdis eandem methodum, & ordinem sequemur, quam in alijs sumus sequuti. primum enim referemus scopus, qui à nobis spectādi sunt in exigendis & componendis, subindequē in utendis his medicamentis. scopos uero nobis indicationes ostendunt, quæ à natura rei indicantis depromendæ sunt. ut tamen neque alia quædam negligantur, quæ interdum, & ipsa multa uim habent. nam quandoque aliqua illum affectum sequi solent, aut causam illam quæ affectum attulit, à quibus, nisi occurramus, aut deterior reddet affectus, aut curatio difficilior. Hæc ergo, & ipsa in considerationem deducenda sunt. Cum ergo calidam intemperaturam, cuius curationē tractamus, statuerimus esse sine ullo alicuius materiæ fomento, habeat illa tamen ex sua natura hoc, quod ab ipsa tolli nequit, nempe quod attrahit, quantumlibet corpus mundum sit excrementis, à subiectis partibus saltem uapores: si non etiam aliquos tenues humores: præterea uero & humiditates quibus nunquam caput omnino uacat, fundit & in vapores dissoluit, quibus particula illa repletæ & distēta magis dolent. postremo autem à calore laxiores redduntur affectæ partes & quasi enervantur imbecillioresquē euadūt. cum his itaque omnibus sit prospiciendum in hac curatione, statim hi omnes scopi se medico offerunt. primum quidem refrigerandum, ut tollatur morbosa intemperatura, sed & repellendum propter attractos, & genitos uapores, & digerendum uero esse, ut qui repelli nequeūt,

per

per digestionem dissoluantur, præterea & cōcoquendum aliquan-
to. nam hac præsertim ratione lenitur dolor. repellunt autem tum re-
frigerantia, tum astringentia. digerunt & concoquunt ea, quæ calo-
re moderato prædita sunt, ita ut non exacerbent primum affectū.
Quamuis autem ita se habeat res hæc, sitque necesse omnium isto-
rum rationem habere, non est tamē eadem & æqualis eorum vis in
indicando. nam in initio quidem semper repellendi scopus vim ma-
iorem habet, qui cum refrigerantia spectet & astringentia: simul, &
primario morbo cōsulent & repellent, & laxitati imbecillitatiq̃ue
particulæ consulēt. sed ad exquisitiorem istius rei disquisitionem,
& id non esse prætermittendum existimo, quāvis alibi etiam fue-
rit à nobis expositum: nempeque, ut diximus, in his maxime uiget
refrigerationis indicatio. refrigerantia uero medicamenta dupli-
cia sunt. alia enim sunt actu frigida, ut aqua quatenus ad suam natu-
ram pertinet, nix, glacies & alia quæ ex his solent refrigerari. alia ue-
ro: præsertim suapte natura frigida sunt potestate. nam in primis re-
frigerantia à nativo corporis calore ad actum deducantur, qualia
sunt quæ soporifera sūt, ut opiu, mādregoræ radix, semē alterci, & re-
liqua istius generis, quæ insignē habēt in refrigerando facultatē. non
est autem harū duarū differentiarū refrigeratium par, aut eadem ra-
tio. nam sæpe auctores antiqui audaces sunt in usu eorum refrigerā-
tium, quæ actu insigniter frigida sunt. nam sæpe oleo rosaceo ex ni-
ue etiam, uel glacie refrigerato utuntur. in usu autem eorū quæ po-
testate frigida sunt, quādo summopere frigida sunt, qualia illa, quæ
à Græcis narcotica dicuntur, præci medicum parum audaces fuisse. nā
1. de comp. med. secundū loc. Gal. monuit, nos ut quātū fieri potest
hæc declinemus, neque illis utamur: nisi cū aut sæuitia doloris, aut
inmodica nos cogit uigilia: quoniam hæc internis facultatibus ce-
rebroque & initio neruorū maximā labē solent afferre. quæ aut rei
istius rō reddi possit, alias exposuimus, non. n. omnia ubiq; dici pos-
sunt. lōgiore. n. alioque essemus. quatenus aut ad astringētia prius,
hoc etiā est aduertendū. q̃ ea sunt huic scopo imprimis uilia, quæ
modeste astringūt, quia quæ immodice uel insigniter id agūt, læde-
re bifariā possunt. primum. n. constipatis & conclusis meatibus, per
quos corpus perspirabile est, uapores detinentur, ac deinde repleto
capite, morbum augent. deinde uero reddunt difficiliorem transi-
tum facultatibus applicitorum medicamentorum ad interiores &
male affectas particulas. unde in his non probatur Galeno succus
sola-

solani uel uua acerba, si solis his utamur: permittit autem: si illis di-
 latis aliquo alio medicamento quod refrigeret utamur. quod sit ta-
 men adstrictionis expertus, ut sunt succus tum cucurbitæ, tum portu-
 lacæ. & hæc quidem quantum ad methodum compositionis, & usus
 medicamentorum constituendam pertinet satis esse possunt. in præ-
 sentia autem de medicamentis particulatim agamus. Primum me-
 dicamentum cuius omnes medici, cum prisca tum iuniores memi-
 nere tanquam præcipui, & optimi ad corrigendam calidam capitis
 intemperiem est oleum rosaceum, quod est expertus mixturæ alte-
 rius rei. nam refrigerat, & moderate astringit, & cum, ut priori ca-
 pite fuit expositum, duplex sit ratio id conficiendi, nempe aut ex
 maturo oleo sit, sicut commune rosaceum fieri solet, aut cum oleo
 immaturo, quod Græce omphacinum appellant. hoc quidem & ma-
 gis refrigerat, & magis astringit: illud uero aliquanto plus digerit
 & concoquit & lenit. unde si magna sit intemperatura contracta, ut
 maioris refrigerationis sit indicatio, omphacium utilius erit: præ-
 sertim in initio. nam tunc maxime urget refrigerationis, & repul-
 sionis indicatio. postea uero, ubi & aliqua digestionem sit opus, leni-
 tateque ob dolorem sedandum, commodus erit usus olei rosacei
 communis uel completi, ut nunc appellari solet, atque hoc præ-
 stantius erit cum fiat ex multiplici rosarum maceratione, ut Me-
 sue docuit. præterea uero, & id erit aduertendum, ne oleum id,
 tum primum, tum alterum excedat primum annui, quod in omni-
 bus oleis refrigerantibus seruandum est, quia oleum quodcun-
 que, cum inueterascit, fit calidius. solet præterea, & huic oleo
 addi aliquid aceti ad faciliorem transitum, & penetrationem,
 quod nos indicatio à natura & conformatione particulæ deprom-
 pta docuit. quæ aceti additio magis omphacino oleo necessaria
 est propter maiorem astrictionem. in contemperanda autem ca-
 lida hac intemperatura aptius est acetum, quod non admodum acre sit. nam
 acrimonia nequit esse sine aliquo calore, de modo autem & copia mi-
 scendi aceti satis superius fuit actum. modus uero, quo medicamento
 uti expediat, quis persudatur frigidum actum ita, ut ex altiori loco
 cadat. nam ita maior sit impressio, & facilius penetratio: percuretque, ne
 statim disfluat, nam si aliquando tempore mora in capite traxerit, maior fiet refri-
 geratio. docuit autem Ga. quare hoc fieri possit. ait. n. quod si ex linco
 paniculo, aut ex tortis lanis caput, quasi corona circumdetur, quod ex ante-
 rior parte, & incipite locum occupet, ubi capilli desinunt ad frontem in tempo-
 ribus,

ribus, supra aures in occipite uero, parum infra uerticem qua parte locus incipit esse decliuior. nam hac ratione oleum intra illos terminos continebitur, & ibi moratus, magis eam partem afficiet, neque poterit diffluens, aut ad oculos, aut ad neruorum initium, aut frigore, aut alia ratione noxam subiectis particulis afferre. Hoc medicamentum, ait Gal. in d. 2. de compo. medica. secundum lo. ad id genus morbos curandos adeo mihi satisfacit, ut nunquam aliam expertus: quàm uis multa ab aliis referantur. Verum quædam sunt hic aduertenda. primum quatenus ad id, quod dictum est de actuali medicamenti frigore, quod hoc seruandum est in capitis affectionibus, ubi integra sit cutis, & subiectæ partes, quia si vulnus, uel fractura ibi esset accepta, nequaquàm tutum esset perfundere oleo frigido. posset enim eximie lædere internas partes. sed quando integræ sunt externæ partes, antequam ad interna possit penetrare, longum est iter, in quo adeo remittitur id medicamenti frigus, ut non possit partes in alto sitas immodice afficere. Deinde uero in eiusdem usu multa ratio habenda est corporum quæ hoc oleo, uel oxirodino profunduntur, nam aliqua corpora sunt, quæ sine eximia labe nequeunt ferre ea, quæ insignem habent uim refrigerandi, ut sunt mulieres: præsertim illæ, quæ in otio, & delitiis uiuunt, suntque albæ, & molles habent carnes. hæ enim calorem natium paucum, & debilem habent. præterea & eunuchi, dum enim castrantur animalia, degenerant in muliebrem temperaturam: itidem & pueri: sed hi propter mollitiem omnium partium, ita ut & osium, non propter defectum natui caloris, læduntur a frigore. in his ergo pro rosaceo præstat uti chamemelino, addito aceto itidem refrigerato. ratio autem cur huius magis quàm illius, quàm uis ambo actu pariter frigida sint, tutior censetur usus, est quia chamemelinum, potestate modice calidum est: ideo licet inter iniuria suo illo actuali frigore frigus imprimat, dum tamen modicus ille calor à natura particularum deducitur, & ipse ad actum, potest moderari frigus impressum, & natium particularum calorem fouere & defendere ne extinguatur, ab externo frigore. quod rosaceum, utpote quod utroque modo frigidum est, facere minime poterit. cum tamen chamemelinum oleum, si actu frigidum profundatur aliquanto aceto immixto, refrigeret & sit attractio nis aliquanto particeps, potest & ipsum repellere, quantum in his corporibus sit satis, atque ita propositis scopis satisfacere. Quamuis autem eiusmodi medicamenta, quantum ad eorum naturam pertinet,

tinet, adeo apta, & efficacia sint, ut aliis non sit opus in hac affectio-
 ne tollenda. sintque plerunque, & in plerisque locis omnibus ferè
 in promptu. interdum tamè, & id euenire potest, ut illis careamus;
 ut in nauigationibus & locis remotioribus à ciuitatibus: ideo medi-
 ci & aliorum medicamentorum meminere, quæ præsentì institutò
 possunt accommodari. facile enim prudens medicus, modo medici-
 nalis materiæ sit peritus, simpliciumque medicamentorum particu-
 latim vires memoriter teneat, potest sibi medicamenta apta parare,
 illorum vires cum propositis scopis conferendo. nam si alia desint,
 poterit satis esse perfusio aquæ frigidæ simplicis, ut Galen. docuit,
 modico illi instillato aceto, additoque alio quopiam medicamen-
 to, à quo aliquid astringtionis possit consequi: sicut esset succus uuæ
 acerbæ, aut mali punici, aut mali cotonei, aut alterius, quod non sit
 expers astringtionis, aut mororum non planè maturorū, aut summi-
 tatium rubi, uel alterius id genus. poterit etiā uti succis uel deco-
 ctis rerum refrigerantium, quæ satis erunt si habuerint modicam
 astringtionem, ut cam habent endiuiæ & herbæ cicoraceæ. sin autem
 illam nullam habuerint, sicut ea carèt lactuca, portulaca, lenticula,
 quæ in stagnis & paludibus nascitur. item & fructus multi, sicuti cu-
 curbita, cucumeres, melon indus, qui à nostris anguria dicitur, qui-
 bus commisceri potest aliquid succi solani, poligoni, mespili, sorba-
 rum, & aliorum multorum id genus. Erasistratus autem, ut 2. de cõ-
 po. med. secundum loc. recitat Gal. docuit quo pacto illi qui æstate
 in locis apricis, & sub sole uersantur, aut iter faciunt, possint obui-
 sere quo minus nimis exalfiat caput à radiis solaribus. nempe si
 sponsia lara cauag; & densa, demergatur & madescat aqua frigida:
 quam mox diligenter exprimamus ac capiti impositam deferamus
 donec exsiccetur, quo deinde tempore iterum madescat ac ita sub-
 inde. aliqui simili fere utuntur remedio, sudarium enim madidum
 aqua sub pileo gestant, ita tamen summo pileo assutum sit, ut capi-
 ti minime incumbat. Sed iam ad alteram intemperiem huic contra-
 riam accedamus. Quam uis hæc intemperatura sit priori omnino
 contraria secundum primas qualitates, & à contrariis etiam causis
 suboritur: nam sicut illa à sole calidiori, & cæteris exterius, & pere-
 grinis causis calefacientibus ortum habet. ita & hæc à frigiori aere,
 à uentis, niue, glacie & reliquis frigidis & externis concitatur. ple-
 runque. n. ab externis causis fiunt intemperaturæ citra materiã, ab in-
 ternis autem illæ quæ ab affluxu materiæ pendent. & si, ut superius
 dictum

d. Cap. 1.

dictum est, aliquādo ab externis & procatarticis causis aliqua fiat
intēperatura cū materia, id accidit potius rōne corporis quod plenū
& excrementū est. nā ut in prouerbio est, procatartica, & exter
na causa mouēt internas, & antecedētes, si eorū copiā in corpore in
uenerit. Habet tamē aliqua, quæ in utrisque cōmunia & ferē eadem
sunt: primūque, q̃ utraque: dū recens est, non multo negotio tolli
tur, & quo diuturnior sit, & magis inueterascit, eo ægrius curationē
admittit. Sed & quæcunque ab ea indicatione pēndent, quæ à natu
ra affectæ particulæ petēda ē eadē omnino in utrisque sunt. unde in
utrisque idē est modus remedia adhibendi, & idē est locus, cui sunt
adhibenda, & sicut in intēperie calida à natura & situ particulæ affe
ctæ de prompta erat ratio immiscendi acetū aliis medicamentis: nē
pe ut facilius fieret transitus: ita quāuis calida medicamenta quæ
in hac intēperie necessaria sunt, facilius frigidis permeare possint,
attamen hac de causa inter calida ea rursus utiliora cēsentur, quæ te
nuioribus partibus constant. natura ergo ipsius affectus indicat ca
lesciendum esse. ratio uero partis affectæ, illorū usum esse accōmo
datum indicat quæ partibus tenuibus, & tenui constant substantia.
& proinde sicuti oleum rosaceū cū modico aceto habitum, & tan
quam præcipuū medicamentū, frigidum actu persusum, ita in do
lore ex frigida intemperatura, uel quicūque sit affectus ex frigida
intemperie, oleū rutaceū actu calidum iūdem persusum in præci
pui remediis positū est. Quod si interdū uideretur hoc non esse sa
tis: sed esse opus insigniori calfactione: multorū præterea meminit,
tū simpliciu tū cōpositorū medicamentorū, quæ hoc, uel alio calido
oleo mixta, possunt nobis esse usui: simplicia uero sūt castoreū, eu
phorbiū, piretrū, possemus in his ponere anisum, semē nasturcii &
id genus alia multa; ex compositis præsertim quæ antiquis erant in
usu: præcipuum est id emplastrum cuius, meminit Gal. 1. de cōpo.
med. secundum locos, quod diapipereon dicebatur. nostris autē tē
poribus possemus medicamenta conficere ex pulueribus illius me
dicamenti quod deuorari solet, & itidē diatriōpipereō dicitur, uel il
lis oleo addito, uel addita & cera cōfecto cerato, uel pulueribus et
aliarū, quas iuniores cōfectiones uocāt, ut diacosti, diagalāgæ. aro
matici gariophilati. Nec modo hæc calefacientia capiti affusa, uel il
lita, uel apposita possunt esse utilia. uerū Galeno plurimum proba
tur, ut internæ nares eiusmodi rebus calefacientibus illinētur, nā tū
per attractos uapores potest cerebrum affici, tum etiam per neruū
ad

ad nares delatum ob odoratus sensum. meminit autem ibidem Galenus. vnguentorum illorum quæ præciosa antiquitus erant & in multo usu mulieribus, qualia erant quæ spicata vel foliata dicebantur, vel id genus alia. idem officium nobis præstare possent ea quæ in præsentia ab istis vnguentariis venduntur, tñm vnguenta tum olea odorata. sicut oleum quod ex ielsamino flore conficitur, sambacinum autem ab Arabibus dicitur, itemque id quod ex cinamomo, vel ex reliquis aromatibus parant. pauperibus autem posset esse vile oleum laurinum. item si ex sansuco vel maiorana, item ex pulegio, calamento, vel origano, aut sisimbrio conficeretur. Sed idem etiam consuluit, ut in aures instillentur calefacientia olea. Præterea vero, sicuti in calida temperatura præcepit thermas esse omnino deuitandas, ita in hac dixit eas posse esse admodum utiles. Motus præterea, exercitatio, utpote quæ calefaciant conferunt, & potus aliquantuli vini, quod calidum sit, & tenuium partium. quamuis Apollonius id interdixerit, qui perinde in hac sicut in priori censuit cibum subtrahendum, & corpus esse inaniendum. Galenus. tamen in hac frigidiori vacuandi corporis expressam mentionem facit: præsertim vero per vomitum. & id, mea quidem sententia, quia refrigerato capite, consensu cum cerebro plurimum læditur ventriculus, qui genitis subinde multis cruditatibus, potest fouere capitis affectum. Sed hæc ferè præter institutum nostrum: unde hic finem faciemus, his tamen additis, quod medicamenta sunt ipsis affectibus aptanda, ut & maioribus & vetustioribus ea adhibeantur quæ fortiora sunt & calidiora. in recentioribus autem & minoribus, minoribus quatenus ad eorum vim pertinet, utamur deinde quod compositionem spectat, sicuti frigidiori temperaturæ oleum accommodatum est quod recens sit, & non omnino maturum, ita in hac, quo maturius est, aptius etiam est. immo si aliquam contraxisset vetustatem non esset inutile. nec de hac intemperatura in longius sermonem protrahemus, sed ad eorum accedemus, quæ cum materia sunt.

Victoris Trincauellij

De affectibus capitis qui a præfente materia fonentur per topica medicamenta curandis. Cap. 6.

Non est, vt diximus, ita simplex ratio vel methodus curandi capitis affectus, qui a præfente materia pendent, sicut illorum qui sola constant intemperatura, cum ad illas priores indicationes quibus attendere oportebat in solis intemperaturis, & aliæ quædam ratione præfentis & affluentis materie, accedant, quæ locum etiam prioribus illis præcipiunt. cum enim intemperies quam fouet materia nequeat tolli donec præfens illa est, prius omnino danda erit opera, ut materia auferatur. imo sæpius non modo præfentis materie rationem habere necesse est, verum & illius quæ continenter affluit ad locum affectum, nec etiam solum istius: sed præterea, & loci vel particulæ, quæ istius influxus causa est, vt pote, quia illam copiosam ex aliquo eius vitio generat. & hæc omnia suam particulatim habent indicationem a medico spectandam, quæ tamen particulatim examinare non pertinet ad præsentem tractationem. in uniuersum tamen de illis nonnulla verba faciemus, cum hæc sint veluti prima fundamenta eorum, quæ à nobis postea particulatim sunt diffinienda. Materie itaque a quibus morbi hi imprimis pendent, duplices sunt. alię. n. solidiori cōsistentia crassiorique constant substantia: hæc vero sunt quattuor humores, qui sunt quasi proxima humani corporis elementa, & præterea serosus humor. Aliæ vero tenuem & vaporosam habent consistentiam, ut sunt halitus qui in corpore vi caloris excitantur, & flatus spiritus. præterea vero & materię hæc duplicē possunt in morbis rationem habere. nam aut in loco affecto receptæ proxime ad essentiam morbi pertinent, a quibus etiam proxime curationis indicatio accipitur: nempe per eius vacuationem. aut digestæ sunt in habitu vniuersi corporis, in venis quæ contentæ. vel si non in vniuerso corpore: saltem in aliqua vel aliquibus particulis, a quibus amandatæ fluunt postea ad locum affectum, & habent rationem causæ antecedentis. & credo nulli esse dubium, indicationem quæ ab hac materia petenda est, cæteris prædictis priorem suapte natura esse censendam. nam dixit Galenus, quod si quis male affecti oculi curationem assumere voluerit, illi prius erit considerandum, quo nam pacto se habeat caput, & si illud sit excrementis scatens, prius illius cura habenda est, nisi pariter & corpus ipsum sit excrementosum, quia in his curationis

initium

initium erit sumendum ab uniuerso corpore: si tamen prius remota sit causa cur tot in uniuerso corpore, vel in particulis gignuntur excrementa. Sed hoc ad præsens institutum non pertinet. de ratione uero corpus uniuersum inaniendi, ac de instrumentis, quibus inaniri à medicis solet, aliqua quidem dicemus: pauca tamen, & ea in uniuersum, quia particularim ea medicamenta, quæ apta sunt huic indicationi & scopo, a primo libro petenda sunt, sicut a secundo illa, quæ humores crudos & ad vacuationem ineptos parant, & concoquunt, atque illa etiam quæ possunt visceribus, & capiti robur addere. & quia cuiusunque methodi fundamentum indicationibus innititur, indicatio uero a natura rei sumenda semper est, unde pro natura, & ratione humoris vel materiæ detrahenda (detrahenda uero ea est, quæ aut facit, aut fouet morbum) ineunda est inaniendi ratio. quod apertissime nos docuere Hippo. 1. aph. & Gale. cōmentario 2. nam si materia superuacua & excrementosa sit bilis, bilis quidem detrahenda nō pituita, neque sanguis. ita etiam si illa sit pituitosa, pituita non alius humor, nisi cum pituita sit alius humor mixtus, atque ita etiam subinde de aliis dicendum, & qui innixi sententia Hipp. 4. de rat. vict. in acu. mor. & Gal. in libello de ratione curan. per venam sectam, ubi aiunt in magnis morbis si vires, & ætas hæc patiantur, mittendum esse sanguinem, credunt magnitudinem morbi eam esse quæ primum, & per se indicet mittendum esse sanguinem, decipiuntur, neque Hipp. Galenique decreta recte accipiunt. neque enim magnus morbus indicat mittendum esse sanguinem, nisi ea ratione qua sanguis missus per uenam sectam inter magna remedia numeratur. morbus uero magnus, uti idem exposuere eodem libro primo, indicat magnis esse opus remediis, unde & victus exquisitè tenuis, ut eodem 1. lib. illi iidem insinuarunt, cōtinetur sub indicatione a magno morbo, & purgatio per medicamenta, ut Gal. ait 4. metho. respicit indicationē a magno morbo. humor itaq; qui fouet aut fouere potest morbum, aut quo corpus refectū est, ostēdit quid nā purgandum, aut vacuandum, & qua ratione vacuandum, aut purgandum sit: Sed de his alibi latius disputauimus. hoc autem loco hæc satis sint. nam quibus medicamentis: siue simplicia illa sint, siue cōposita, hoc tēpore medici corpus uniuersum purgare soleant, ut nuper diximus, in primo nostro cōmentariolo de usu & compos. medic. purgantium, satis lucide a nobis actum fuit. longe etiam minus pertinet ad præsens negotium agere

aph. 1.

Com.

aph. 6.

de sanguine mittendo. Exinanito autem vniuerso: si caput, adhuc particulatim habeat congestam superuacuum materiam, quæ & ipsa adhuc ferat rationem antecedentis causæ, quæ morbum foueat, & ipsa statim suam proferet indicationem; nempe caput quoque particulatim esse inanierdum, & quæuis multi credant per deuorata catapotia, vel ut aiunt, pilulas caput particulatim inaniri, hi tamen non recte sentiunt, catapotia enim primum, & magis vniuersum corpus inaniunt. quod si etiam videantur caput subinde vacuare id est, quia cum solidiore & duriori constent substantia, diutius antequam a calore ventriculi uincantur & dissoluantur, ibi manent, atque ita magis attrahere videntur a superposito capite & a longinquiore partibus, proprie autem illa a capite particulatim comprehensam in eo materiam detrahunt, quæ per loca attrahunt, per quæ caput solet, sponte sua, excrementa & super vacuas materias excernere: solet autem, per nares, atque per palatum & os. quare per illa medicamenta solet fieri expurgatio priuatim ipsius capitis, quæ vel attracta per nares, vel mansa vel exagitata in ore & faucibus, humores per has partes attrahunt, hæc autem a Græcis apophlegmarismi dicuntur, nam præsertim pituitam detrahunt, raro enim vel fortasse nunquam bilis per eiusmodi medicamenta detrahitur. Quæ vero, per nares attrahuntur, ea a Græcis enrina, quia in nares induntur, a iunioribus autem nostris caput purgia nuncupantur, alia vero quæ concitata sternutatione purgant, ab effectu sternutatoria. At quæ in ora assumpta purgant, illa aut diu dentibus mansa attractam pituitam expuendam ad os ducunt, quæ a iunioribus, masticatoria dicuntur, aut vi spiritus in interiori oris parte ad palatum allisa agitantur, & hæc gargarismata a Græcis vocantur. & quia possunt isthæc omnia inter propria & huic loco accommodata medicamenta recenseri, & in topicis poni: ideo de illis pauca quædam verba faciemus, antea quam sermo instituat, de illis medicamentis, quæ omnino externa sunt, & vere localia possunt nuncupari. incipiemus autem ab his, quæ enrina Græce, a iunioribus caput purgia dicuntur, Medicamenta ergo quæ naribus induntur, triplicem habere modum vel formam solent, alia enim sunt omnino humida & fluida, ut sunt succi vel decocta, alia sunt arida, & in tenuem puluerem redacta, alia vero mediam quandam habent consistentiam: quia neque arida,

neque

neque fluida sunt: sed quandam vnguenti compagem habent. prima quidem, quæ fluida omnino sunt, per nares una cum attracto spiritu ad superiores usque capitis partes attrahuntur, quæ cum vim attenuantem, & detergentem habeant, dum postea redcunt & excernuntur, secum pituitam ducunt quæ locis illis hærens & infarcta erat. Quæ vero modum habent vnguenti, intra nares illinuntur. ubi à calore loci in vapores digesta, una cum spiritu ad cerebrum attrahuntur, atque ibi inuentam pituitam attenuant & quasi dissoluunt, ut illa deinde facilius defluat. arida vero fistula aliqua vel pena excepta, in nares usque ad supremas partes insufflantur, aut in aliquo vase egitata naribus odoranda offeruntur ut simul cum acre agitatus pulvisculus per nares attrahatur, ibique facultatem expultricem, ea molestia quam afferunt, vellicando irritant. unde concitata sternutatione, fit expulsio non sine insigni vi materiam contentam in cerebro. nam sternutatio violentior est motus cerebri expellentis noxia excrementa, quam sit tussis vel vomitus. unde à Græcis medicamenta hæc *σπασμωδία* dicta sunt, sternutatoria à Latinis. differunt autem medicamenta hæc, quod plerumque vim maiorem habent sternutatoria. quæ vero caput purgia fluida, & humida sunt, mitiora, & faciliora sunt: viribus medium locum sustinent quæ illinuntur. & quamvis medicamenta omnia, quæ ad hoc genus pertinent, eas vires habeant, ut præsertim pituitam detrahant, quæ suapte natura frigidus, & humidus humor est, qui videtur indicare calidioribus eiusmodi medicamentis esse opus: aliquando tamen, vel propter febrem præsentem, uel caput suapte natura calidum, & quod facile inflamatur, vel propterea quia humor extraneum aliquem uel ex putredine, uel ex mixtura alterius calidioris humoris aliquem insignem calorem contraxerit, utimur et vel frigidis, vel non admodum calidis his, quæ per nares attrahuntur: sicut aqua hordacea, in qua parum Zacchari, vel mellis rosacei dissolutum sit. Sed, & succus betæ in frequenti usu medicis esse solet, qui ex vitiosis partibus, quibus ex natura præditus est, attenuare, & digerere potest. neque tamen calefacit. laudant præterea & anagalidis purpureos flores ferentis succum antiqui ferere omnes. solemus autem, & lam suco, quam maioranam appellamus, uti. Sed iam calidius est medicamentum, & valentius, cuius varia est utendi ratio. nam alii aqua utuntur quæ per distillationem sit extracta: alii vero, succo ex ea expresso, & quia non potest multus ex ea succus exprimi: si cum alio conteratur, ut cum

beta, vel anagalice, facilius poterit eius haberi succus. Galeno autem probatur 5. de facultatib. simp. medi. succus hederę. his autem fortiores sunt succus iridis & succus ciclamini. Sed & decocta non pauca possunt in hunc usum deduci, vt sanfuci, hyfopi, pulegii, calaminthę sisimbrij & multorum aliorum id genus simplicium, quę sunt satis modesta medicamenta, efficacia tamen. Est & alterũ istorum medicamentorum genus: Sed longe valenius, & acrius, ex quo potest accipi materia non modo ad hęc conficienda medicamenta, quę per nares sunt attrahenda: sed ea etiam quę vel illinenda, vel arida insufflata, vt sternutamenta citentur. imo & ex eisdem confici possunt ea quę masticata pituitam euocant, ea vero sunt piper, zingiber, piretrum, sinapi, veratruin, staphis agria, quā Latini pedicularē herbam appellant, & istius generis multa, nobis enim satis est ea recensuisse, quę magis in promptu esse solent. Ratio vero compositionis horum ea est, quod si ex cis & aqua aliqua vel succo fiat decoctum fluidum attrahi per nares poterit. sin autem ea trita in puluerem redigantur, insufflata in his medicamentis erunt, quę sternutatoria appellatur. Sed si melle, aut oleo aliquo assumpta in modum unguenti componantur, intra nares poterunt illiniri, & quantum ad horum medicamentorum rationem spectat, hęc in pręsentia possunt esse satis. verum postea quā huc peruenimus, prædictis & hoc addendum, quod aliquando vimur aliquibus suffumigiis quę naribus ita calida odoranda offeruntur, ex illis quę attenuant & dissecant crassitiem humorum occupantium caput. præsertim vbi grauis sopor molestus est. nam possunt strenue excitare & euigilare sicuti i comate accidit, & in lethargo. neq; in apoplexia, & grauiori epilepsia, inutile est remedium. sic autem hoc medicamentum, decoctis herbis illis quarum nuper facta est mentio vt ruta serpillum, hyfopus, calamentum, & id genus cætera. coquuntur vero ex aceto & illo quidem acri. Quatenus vero ad vsum pertinet quædam sunt aduertenda: primumque quod quę caput purgi a iunioribus dicuntur fluida quę sunt, cum attrahuntur, solent frequenter: si in attrahendo vis aliqua adhibeatur, per interiorē viam ad palatum, & fauces ferri, vbi nō parui negotii partibus illis exasperatis, & irritatis facescunt. cui tamen incommodo facile occurrī potest. si antea quam attrahatur medicamentum a naribus, absorbeamus, in ore quę detinemus, aut aquam, aut alium quempiam liquorem donec medicamentum per nares fuerit excre-

tum.

tum. Alterum, quod est aduertendum, est cum multi sint ordines horum omnium medicamentorum, de quibus in præsentia sermonem habemus. quod si in illis a scopo proposito aberremus: si is error sit commissus in acrioribus, & fortioribus medicamentis: poterit interdum sequi magna noxa, quæ nequit deinde facile corrigi: si autem in minoribus, & remissioribus imbecillioribusque, non sequitur inde magnum aliquod damnum, præterquam quod non tantum sicut opus esset, conferunt: quod postea additis viribus medicamento, emendari facile potest. vnde semper fere & in his, & aliis affectibus, nisi ualde præceps sit periculum, longe magis præstat, & tutius est, a leuioribus incipere, & paulatim vires augendo ascendere, donec scopus attingatur. Sed de illis præterea, quæ mandant gargarizari solent, pauca quædam dicamus: hæc itaque mansæ remanent pituitæ detrahunt. vñ, & apophlegmati (mi dicuntur, & proinde obscurum non est, quod neque ita mollia, & fluida oportet ea esse, ut diffuunt sub dentibus, neque ita dura, & sicca, ut dentibus minime cedant, sed in puluerem ab illis conterantur: Sed media quadam consistentia cum aliquo lentore ut dentibus cedant, non tamen terantur vel diffuant, in his autem ordo quidam est. inter simplicia quidem sunt in leuissimis primum mastiche: si recens, & tenera sit, nam si vetustior, & siccior, in puluerem teritur, cui consulimus: si quantum est tritici granum, ceram addamus. similis huic est terebinthina, quæ cocta est, & consistens. horum utrumque mansum concitat multum pituitæ sputum. Sed si hæc cum aliis commisceantur, fortius medicamentum fit. quæ autem addi possunt, simplicia multa sunt, quæ acris sunt saporis, subindeque tenuis substantiæ, ut sunt piper, zingiber, piretrum. staphis agria. in his potest hyssopus poni, si simbrum, origanum, sinapi, & id genus alia multa. quæ possunt misceri cum mastiche, aut terebinthina, addita, si sit opus, cera vel melle, vel passo. quibus, si immisceatur aliquid olei, & id Galeno probaretur. Vnde si accipiat staphidis agriæ tritæ, exempli causa sesquidragma, illa quæ melle, quantum satis esse videatur subacta, ad eam medicamentum compagem ducatur, quæ mandi possit, erit medicamentum non parum efficax. idem ex piretro fieri potest: quauis multi sola simplici utantur piretri radice mansa ad hoc officium, alii vero radice zingiberis: eodem modo, & alia relata possunt componi, quæ de industria, ne longior iusto sim, prætermitto. Vnde relato solo illo composito medicamento, quod descripsit Archigenes

de cōp.med.secundū loc.cap.2.& illo proposito,vt sit quasi exēplū
 aliorū multorū quæ possent describi,ad alia sermonē nostrū cōuer
 temus.nā de gargarismatib.nō est cur multa dicamus.eorū. n. cadē
 ferē est materia,quæ & horū,quæ hætenus recensuimus.si ex ipsis
 decocta parētur,quæ deinde addito,aut rosaceo mellē,aut oximel
 lite,aut syrupo ex hyfopo,vel simili alio possunt fieri gargarismata,
 quæ valētiora,aut mitiora erūt pro rōne simplicīū,ex quib.confici
 cētur:nā simplicissimū oīum esset:si ex aqua hordei,& oximelite,
 vel rosaceo melle,aut ēt ex syrupo ex hyfopo,aut calamētō,aut quo
 piā alio simili fieret gargarizatio.Medicamētū Archigenis in hūc
 modū se habet.Accipit piperis,alii staphidis,origani,casīæ.sing.ʒ.
 ii.excipiunt uuarū passarū exiccatarum vel sicuū pinguiū carnes &
 māduntur.Quæ autē exterius in his affectibus in vsum ducūtur,illa
 varia,& diuersa sunt, quorum diuersitas a variis scopis ortam ha
 bet,quos nobis ostendunt uariæ indicationes adiuersis affectuum
 naturis desumptæ.Sed in his quoque exponendis breuissimū eri
 mus,cum maxima pars eorum quæ possent spectare ad præsentem
 locum,iama nobis eo capite,ubi de ratione curandi phrenitim &
 lethargum egimus,fuerint tractata.Primū itaque hoc in memo
 riam reuocandum,quod nostra hæc oratio versatur circa illos affe
 ctus,vel rationem medicamentorum,quibus curandi sunt capitis
 affectus,quorum essentia est in intemperatura cum matēria,in qui
 bus prima & princeps indicatio semper ferē illa est, quæ nobis
 offert materia.quæ tamen duplex est,quia aut a matēria accepta est
 quæ iam omnino fluxa est,& in parte affecta iam recepta, aut ab illa
 quæ nuper fuit.quandoque vero mixta est hæc indicatio,sicut mix
 ta est matēriæ ratio:nempe quia illa partim fuit, partim fluxa est.
 materia quatenus fuit,indicat repellendum,vt fluxio consistat,illa
 autem quæ iam fluxit,duplicem habere rationem potest. nam aut
 iam in loco inueterata est,& aut a tempore & natura, digestis te
 nuibus partibus,uel ex importuno vsu refrigerantium,uel immo
 dico digerentium iam induruit,& in naturam scirrhī conuersa est.
 aut adhuc recens est,& modeste mollis.Quæ hoc modo se habet,
 indicat digerendum,& concoquendum,& quoquomodo mollien
 dum esse,quæ vero iam induruit perinde vt scirrhī tractanda est.
 sed & de illis affectibus,quæ a calidæ matēriæ affluxu originem ha
 buere,nō est cur multa dicamus, quatenus ad repellentium
 vsum pertinent. nam eadem in his ratio est,quæ,& in phrenitide,
 &

& idem medicamentorum vsus, sicut, & superuacanea videri posset longior eorū disquisitio quę concitantur à fluxione frigida, & pituitosa materię. cum similem, & hæc rationem illis habeant, quę de lethargo superius exposita fuere. imo si exquisitius rem examinauerimus, cū similis deinde sit medicamentorū ratio, quib. tractanda est phrenitis & lethargus, cum febris deferuescere incæperit. nam cum utriusque affectus calidi sint, quibus semper asidet insignis febris, dum ea viget, nunquam est negligenda: ideo quamuis in incremento, & vigore sit opus digerentibus, tamen illis vtendum, quę non possint insigniter calefaciendo febrem exacerbare. ea vero deferuescente, vt diximus, ad valentiora erunt manus admo- uendę: vnde quamuis ratio horum medicamentorum his affectibus hoc tempore communis sit, & aliis præterea frigidioribus capitis affectibus à frigida, & crassa materia excitatis: in his tamen non plerumque nulla adest febris: & proinde calefacientium liberalior potest esse vsus. Sed rem hanc particulatim iam tractemus. Inanito itaque vniuerso corpore, & subinde etiam priuatim ipso capite: materia quę omnino fluxit, & in particulis quasi absorta est, nequit vacuari alioquin, nisi per digestionem & euaporationem, facilius autem sit euaporatio: si laxior sit ipsa particula. densitas enim digestionem, & euaporationem obstat: quare digerentia, & aliquo modo laxantia erunt maxime opportuna huic muneri. quare oleum, quod rosaceum completum diximus appellari, aliquid facere potest: licet non mukum, chaimelinum aliquanto plus: sed plus est anethinū: valentius est ruthaceum, & sic deinceps; ad oleum laurinum, quę inungi, vel ex ipsis fieri quoque possunt epithemata, quemadmodum diximus, vbi de lethargo erat nobis sermo, & interdum illis solis; nonnumquam multis vnā mixtis pro vt ratio morbi, aut naturę corporis, vel cōstitutionis temporis requirere videtur. Ad hunc præterea scopum, & ad hanc medicamentorum rationem pertinent ea epithemata, quę fieri solent ex pulmonibus calidis veruecum nuper exenteratorum, aque ita applicatis ac replicatis capiti, de rasas prius capillis. item quę expullis columbarum per dorsum dissectis, atque ita calidis capillis adhibitis: præterea, & ex catulis paulo antea natis. laxant enim & digerunt. Sed quia id agunt dum calent, non possunt autem diu retinere calorem: ideo excogitarunt medici, vt cum refrigescunt demergantur in aliquod decoctum

Victoris Trincauellij

ex illis, quæ vim habeant digerendi, & attenuandi, vt tamen in illis eligendis simplicibus, quæ sint coquenda ad rationem morbi respiciamus. nam in inflammationibus, sicut in phrenitide quando vtuntur medici his exenteratis animalibus, non est parandum illud decoctum ex admodum calidis, quia licet videatur aliquantisper deferbuisse calor: omnino adhuc sunt reliquæ caloris impressæ in ipsi particulis. vnde non est vltra chamemelum in his progrediendum. in lethargo vero, calidioribus aliquanto esset opus, vt anetho & aliis quorum paulo antea hoc, & prioribus capitibus facta est mentio, & in aliis, quæ citra febrem vllam sunt, adhuc valentioribus audacter vti possemus, sicuti hyssopo, serpillio, mentha, pulegio, calamentho: interdum, & ruta, & istiusmodi aliis. Et interdum fouere possumus caput oleis calidioribus, ita vt illis etiâ antiqui medici & castoreum addiderint. sed finis tandem huius capituli faciendus est: si tamen hoc addiderimus, quod non erit inutile; præsertim ad vsum & delectionem medicamentorum, vt & nos Galenus monuit. id quod vt diximus, reliquæ calidorum & affectuum, postquam febris deferbuerit, vacuantur per digestionem quæ in primis per attenuantia fit, & aliquam præterea concoctionem. quia semper vltimæ remanent crassiores partes: vnde vltima etiam inflammationis pars ad naturam scirrhi inclinat. longe tamen difficilior est, eorum digestio, & discussio, quæ aut ex nimio refrigerantium vel ex importuno digerentium, & discutientium vsu induruerunt. refrigerantia enim densant, incrassant, & impingunt. digerentia vero immolesta, digestis, & vacuatis tenuioribus partibus, & mollioribus, quod reliquum est crassius, & durius reddunt. vnde interdum quæ laxant, & digerunt non sunt satis ad dissipandas illas reliquias: sed cogitur medicus vt validioribus medicamentis, quæ validè possunt crassitiem humorum diffecare, & præterea potenter attrahere ex profundo, confectis emplastris, aut cataplasmatibus, aut ceratis, quæ castoreum, aut sinapim, aut piperitum, aut piper accipiunt. Sed tandem ad alia transeamus.

De affectibus per medicamenta topica curandis, quibus exerceri solent particulae, quae habent ortum, & facultates à cerebro: primumque de illis qui ad nervos & nervosas partes referuntur, ut sunt resolutio & convulsio. Cap. 7.

Nervorum affectus, qui eos exercent quatenus instrumenta sunt, & viz, per quas vis motrix atque sensus ad omnes partes, quae sunt capaces tum sensus tum motus deferretur, duo in primis sunt: nempe resolutio quae *παράλυσις*, & convulsio, quae *εκσπασίς* à Græcis dicitur. quia si qui sunt praeterea alii, ad hos tandem, referendi sunt. nam stupor est quasi via quaedam in resolutionem vel levis & parva incipiensque resolutio. ita etiam tremor membrorum quidem refertur in imbecillitatem facultatis motricis, quae ortum habuit ab aliqua frigidiori, vel humidiori nervorum intemperie, aut ab eorum obstructione. palpitatio vero si spiritu flatulento incluso in musculis. unde nobis in praesentia satis erit si de medicamentis egerimus, quae utilia sunt curandae resolutioni, & convulsioni. sequemur autem eandem in his, quam in aliis haecenus, methodi rationem sumus secuti: nempe ut ab indicationibus quas nobis statim offerunt naturae ipsorum morborum scopos depromamus, qui in his uniuersam medendi rationem dirigant. & quia multae utriusque horum sunt differentiae, non modo diuersae inter se: utrum & aduersariae: ideo necesse est idem est, ut, & contrarias indicationes habeant, & contrarii scopi medico offerantur. Sed haec particularim inuestigemus, & primum agamus de resolutione, quae si integra sit, aufert & delet omnem actionem tam sensus quam motus facultatis. sin autem non integra, ut in stupore actio redditur imminuta, & manca. quod & aliquo modo dici de tremore potest: nempe quatenus ad debilitatem motricis facultatis pertinet. licet tremulus ille motus quoquo modo in vitiatam vel corruptam actionem referri possit. affectus ergo is potest aut in intemperiem nervorum sine materia deduci, aut in obstructionem, aut in solutam continuitatem nervis illatam. intemperatura quidem unde resolui nervi possunt, quatenus ad primas qualitates pertinet, duplex est: nempe frigida, quae ita potest densare nervi substantiam, ut nequeant spiritus deferentes facultates per illos transire: praeterea vero humida, mollitis nempe & laxatis nervis. calida vero ne quaquam

Victoris Trincauellij

quaquam, neque siccet. nam neque resolutio à siccitate fit. si enim immodice nervi siccantur, cōuelluntur potius, quam resoluantur, sicuti ex humiditate nequeunt conuelli. hæc vero intelligenda sunt quantum ad qualitates spectat; quia si sit intemperies cum materia, potest & ex hac resolutio, & ex illa conuulsio oriri: sed hoc potius ratione materiæ, quam qualitarum vel intemperaturæ accidunt. cæteri vero affectus à quibus efficitur resolutio, vel paralysis, in causa sunt, cur facultates tam illa quæ motus, quam quæ sensus author est, clausa vel obstructa via circa initium nervi resoluti, nō possint per illum liberum habere transitum. nam si impingatur in faciat urve crassus aliquis succus, vel etiam lentus alicui initio alicuius nervi, vel initio medullæ spinæ, reliqui nervi inferiores, qui ab illo initio deriuantur, intercepta via ab illo crassiori succo, destituuntur ab omni facultate tum sentiendi, tum mouendi. nec modo nervi sed cæteræ etiam particulæ ad quas diluti nervi inde deriuati, illis sensum motumque subministrabant. & si obstructio hæc fit statim circa initium medullæ, quæ in spina est, omnes subiectæ partes resoluuntur, ex ea saltem parte: nempe dextra, vel sinistra, in qua fiat obstructio. fit autem interdum obstructio, subito aliquo crudo tuberculo, in nervo aliquo vel in ipsa medulla perinde, ac de obstructione diximus: interdum & ex inflammatione. ego tamen putarem, quod si inflammatio corripuerit nervos aliquos, potius illam futuram in causa conuulsioni, quam resolutionis. nam Gale. hoc argumento probat dolores articulares, quos ipse in inflammationem refert, non fieri ex fluxione humorum ad nervos vel chordas: quia, nunquam hos dolores conuulsio sequitur: innititur autem id argumentum huic fundamento, quod potius nervorum inflammationis comes sit conuulsio, quam resolutio. fit autem, & hæc obstructio, nulla impacta materia in nervo vel laborante nervo aliquo suo proprio vitio vel affectu: sed potius dum afficitur, cum alia parte consentiens, sicut interdum à vicinis partibus comprimitur, & eo ex compressione densato prohibetur defluxus facultatis, vel spiritus ad subiectas, & connexas partes. præmitur autem ob aliquem obortum tumorem insignem in vicinis particulis, nempe aut inflammationem, aut crudum aliquem tuberculum aut scirrhum, aut luxationem alicuius articuli, si luxatum os in locum exciderit ubi nervus sit vicinus, cui caput illius ossis impeggerit. Postremo autem fit resolutio: si nervus transversus rescindatur. cum enim nervi à suo

initio

initio omnes vires habeant: nempe à cerebro & à medulla spinæ, cū ab eo diuellunt & dissepantur, ab omni facultate destituuntur: his itaq; modis fit resolutio: præsertim quando illud non accidit ex eorum consensu cum cerebro prius per se affecto: quemadmodum, in commotione, vel cōcussione cerebri, aut in apoplexia, vel catotocho, quæ congelationē Arabes, & iuniores appellant. Nisi quis fortasse obiiciat nobis, se à medicis sæpe audiuisse: præsertim vero in consultationibus, quod sit & interdum resolutio neruorū, ipsi tenui aliquo humore emollitis perfusisq; cuius tamen nullam fecimus mentionem. Sed istius differentię resolutionis propterea mentionem nullam fecimus, quia putamus à tenui humiditate perfusos, conuelli potius quam resolui. nam sicuti exemplo petito à fidi-
bus in musicis instrumentis & à loris quæ duplici ratione abrum-
puntur & retrahuntur versus suum principium: nempe si nimis sic-
centur & arescant, aut si humore aliquo perfundantur: ita duplicē
esse differentiam conuulsionis, alteram quæ fit inanitis, & arescen-
tibus neruis, alteram illis humore repletis, & madidis, & quemad-
modū cordæ in citharis in humidiori aeris statu, vt nocturnus est,
dum humectiores sunt, nisi laxentur, solent abrumpi, neque ta-
men crasso humore perfunduntur ab aere, sed potius tenui: ita &
nerui si perfundantur humore, crassescant, & breuiiores fiunt. po-
test autem id esse argumento, falsum esse, quod à crassa pitui-
ta fiat conuulsio, à tenui resolutio, immo quod ex sola obstru-
ctione, non autem ex perfusione ab aliqua materia: quia in resolu-
tione annuitur pariter sensus, & motus, & id quidem sem-
per: in conuulsione, autem sensus non tollitur, cum tamen
conuulsio, vt hi volunt, fiat repletis neruis multo & crasso hu-
more, unde, si crassus humor non prohibet transitum facul-
tatis per neruos, neque etiam tenuis. in resolutione autem,
quacunque de causa illa fiat, semper sensus & motus
deficiunt. Conuulsio vero ipsa, si sit primarius neruorum
affectus, aut ex repletionē sit, aut ex inanitione, non autem
ex obstructione, cum semper pateat transitus facultati defe-
renti sensum, & motum. aliquando vero fit ex consensu ner-
uorum cum alio, utpote cum cerebro, sicut in epilepsia,
& in venenatis moribus: dum qualitas illa maligna cerebrum
petens, illud cogit vt se colligat & contrahat, atq; ita etiam in dolo-
re. in punctura autem, vel vulnere neruorum, atque etiam in
inflamma-

inflammatione Gale. fenfit ex repletionē fieri conuulſionem . conuelli-
tur enim neruus quando ichores, & tenue pus excerni nequit,
inflammatio vero, quod fit morbus ex plenitudine concitatus, ne-
mo non nouit. Ex his ergo in hunc modum expoſitis, liquido pate-
re ubique poteſt, quod multæ harum differentiæ ad præſens in-
ſtitutum nõ pertinent, tam conuulſionis quam etiam reſolutionis.
vt illa quæ fit conſentientibus neruis cum cerebro, quemadmodum
contingit in apoplexia & epilepſia. quia horum curatio, eſt apople-
xiæ curatio: ita etiam quæ à venenofis morſibus . nam propriam ha-
bent curationem pertinet tẽ ad priuatam rationem curandi vene-
noſos iſtus. Sed neque etiam cum puncturam nerui ſequitur, quia
proprius in priori libro ſermo eſt habitus de aptis medicamen-
tis ad neruorum vulnera . longe etiam minus ſi horum affe-
ctuum ratio pendeat à neruo abſciſſo aut abrupto . Quare de il-
lorum medicamentorum ratione ſermonem habebimus quibus
tollendus eſt proprius aliquis neruorum affectus : ſiue conuulſio
ſit, ſiue reſolutio. primum itaque de illis agamus , qui ſimpliciores
ſunt, vt pote qui in ſola intemperatura conſiſtunt, vt frigida eſt, quæ
vtriſque, tam reſolutioni, quam conuulſioni communis eſſe poteſt.
ſicca vero conuulſio peculiaris eſt, à reſolutione aliena: ſicut con-
tra humida à conuulſione aliena eſt: de illis tamen in præſentia dun-
taxat agimus, quæ circa materię confortium fieri ſolent. In his ergo
in uniuerſum hoc tanquam conſtitutum accipiendum eſt , quod
quatenus ad eiufmodi intemperaturas pertinet, indicatio euacua-
tionis nullum habet locum. ſed res vniuerſa per tranſmutantia eſt
tranſigenda, ſiue de illis ſit ſermo, quæ ad victus, ſiue de his quæ ad
medicamentorum rationem pertinet . Sed & illud nulli non notũ,
& in conſeſſo eſt, quod contrariis vitioſæ intemperaturæ ſunt tra-
ctandæ. & ſi intemperatura fuerit frigida, calidis tum cibis, tum ue-
ro potu. præterea uero, & aere & reliquis omnibus quæ ad victus ra-
tionem pertinent. nec hiſ modo: verum & medicamentis , tum in-
ternis, tum externis. internis quidem, vt ſyrupis decoctis , antido-
tis, & illis quas uulgo conſeſtiones vocant. de quibus copioſa libro
ſecundo inſtituta fuit tractatio, Externis uero, vt ſunt vnguenta, il-
litiones, caraplaſmata, emplaſtra, balneæ, perſuſiones, ſeu , vt Gra-
ci loqui ſolent, embrochæ. de illis ergo in primis erit agendum, quæ
calefaciunt & nos materiam in præſentia exponemus ſolũ modo, vt
in hoc. addamus, qđ ſi præterea aliquam yim digerendi habue-
rint,

rint, illud non ab re fuerit. & si quis obiiciat, quod digerentia euacuant, tu vero paulo ante dixisti, nullam hic haberi vacationis indicationem? Dicemus quod id quidem verum est, quatenus illa intemperatura sine materia per se est. Quia tamen in frigida alicuius particulæ intemperatura calor natiuus imbecillior redditus, non potest, aliqua crudiora excrementa non gignere, quæ eam fouent intemperiem, ileo præter calefactionem, utilis est etiam aliqua digestio. olea igitur quæ calefaciunt huic negotio sunt opportuna, si cuti chamemelinum, anethinum, absinthinum, nardinum, mastichinum, & illud, quod ex hypericon conficitur, liliaceum etiam, & irinum, & costinum, quod etiam fit ex lini semine; sed & fomenta ex decoctis confectis ex eisdem simplicibus, ex quibus illa olea conficiuntur, & ex aliis etiam, quæ eiusdem sint facultatis. itemque & emplastra & cataplasmata, & reliqua id genus medicamentâ fieri possunt, quæ particularim, ob nimiam tractationis prolixitatem in præsentia non sunt exponenda, nisi quod hoc loco id quod aliis quoque faciendum est, monendus sanè iuuenis est, ut semper à faciliioribus & leuioribus curationis sumat exordium, atque ita paulatim tētet, quid possit ferre laborantis natura, sed in his neque thermarum quæ tum actu tum potestate calidæ sunt, usus est inutilis. quales Patavine sunt, quæ multiplices sunt, & Bononienses Porretanz, & in Etruria etiam plures. Nec etiam dissimilis esset ratio medicamentorum, quibus humida neruorum intemperies curanda esset. nam & thermæ omnes siccant quidem, non omnes tamen calefaciunt. Sed & omnia quæ paulo ante recēsuimus, præter id, quod calefaciunt, exiccant etiam. In hac tamen intemperie curanda, & huius est habenda ratio, ut ad naturam corporis eiusque naturalem temperaturam, præterea vero & ad aeris & temporis constitutionem, respiciamus, ne interdum, si usi fuerimus succantibus medicamentis, quæ præterea & calefaciāt, febrem accendamus. Vnde consultius sane erit, ut si calidis exiccantibus sinus usuri, ubi nulla adsit præterea frigida intemperatura, aliqua intermiscantur, quæ siccant quidem, sed & refrigerent, ut illorum calor temperetur, sicuti sunt rosæ aridæ, folia falicis & id genus alia. multi quidem in resolutionibus: si occasionem ab humiditate, uel etiam à frigore habuerint, utuntur aqua ex uino destillata, aquam uitæ uulgo appellant, resolutas partes illa niadefacientes. Ex sicca autem intemperatura, ut diximus, in neruis contracta, resolutio nequit fieri: Sed tantum conuulsio. qui quidem affectus;

affectus si aliquam potest curationem admittere. nam aut nunquā
 aut rarissime & inter prima morbi initia medicamentis aliis ve re
 mediis cedit. Curatur humectantibus secundum omnem modum
 administrandis. nimirum, & ratione victus humectante. non solum
 in potu & cibis: verum & aliis omnibus, vt aere, somno, quiete, tā
 corporis, quam animi. Sed & extremis remediis. prae omnibus au
 tem aliis balnearum. non quidem quae sponte scatariunt & mineralem
 aliquam facultatem continent, quia illae omnes siccant: Sed quae ar
 te parantur. duplex autem balnearum genus potest his esse vtile:
 primum quod fit ex aqua dulci modeste calida, nam si calidior es
 set, magis siccaret digerendo. quod si aliqua praeterea incoqueren
 tur, quae humectarent, vt essent malua, lactuca, borago, & alia quae
 cunque humectant, quae ita tamen essent moderanda, ne nimis aut
 calefacerent aut refrigerarent. non nulli praeterea laudant vt in ea
 etiam aqua incoquantur capita & pedes agnorum, aut veruēcūm.
 Alterum vero balnei genus est, quod fit ex oleo communi, & dul
 ci. quod & planè maturum sit, & non vetus, sitque omnino sincerū,
 vt pote quod sit expressum ex solis oliuis citra salis permixtionem
 & citra germina vel folia vel surculos arboris. haec si quidem om
 nia vlti exiccandi habent. tandem autem Gal. omnia in vnam sum
 mam colligens ait, quod curatio conuulsionis, quae à siccitate acci
 dit eadem tandem est; quae & febris hectice. nempe vt omni, qua id
 fieri potest ratione, corpus humectetur. Vnde iam opportunum
 fuerit, vt ad alias differentias horum affectuum tractandas acceda
 mus. quae à praesente materia ortum, & fomentum habent. siue illa
 nervus repleat, vt in conuulsione, siue obstruat, vt in resolutione: &
 quia, vt & Rasis in suo libro ad Almanforem testatur, eadem est tā
 dem methodus. vel saltem parum admodum differens, qua curan
 di sunt duo hi affectus. nempe resolutio, & conuulsio, quando ab
 abundantia materiae replentis vel obstruentis ortum habent, quam
 vis diuersa & ferè contraria symptomata habeant: ideo de ambo
 bus etiam in vniuersum agemus, expositis primum generalibus
 indicationibus, quibus praesertim curandi methodus innititur. Ge
 nerales igitur indicationes sunt illae, quae omnibus morbis, quae ab affluxu
 materiae ortum, & fomentum habent; communes sunt. nempe quod
 statim à principio, fluxionem intercipiendam, per vacuationem,
 & reuulsionem, vt occasio fluendi tollatur: vacuetur autem cor
 pus vniuersum: si illud vitiosis, & superuacuis humoribus sit ple
 num,

nū deinde vero, & caput. si inde excremento sã materiã ad neruos fluere putemus. Particulatĩ vero modũ, et rōnẽ vacuationis ostēdet natura ipsius affectus, vel causz, q̃ illũ cōcitarũt & fouet: p̃terea vero, & status vel natura ipsius corporis. nã quis Aetius ex Achigene, cui videtur & Paul. subscribere & Areteus, sēper in resolutione, & cōuulsionē senserit a venz sectione esse incipiendũ. Arabes tñ in resolutione ne meminerē quidē q̃ vena, p̃sertim in resolutione, sit secanda, & multi iuniores et dānāt, cū frigidus morbus sit. Gal. vero, in libro de vena secanda contrar Easistratum sensisse videtur vtilem esse venz sectionē p̃sertim illis, in quib. suppressio sanguinis p̃cesserit, qui solitus sit per menses muliebres, aut per hæmorrhoidas fluere. p̃terea vero in 1. libro ad Glauconē cōcedit in his affectib. mittendũ esse sanguinē, non tñ semper. Sed aliquñ, neque tñ particularim deinde, qñ id expediat exponit. nisi quod aliquas videtur in sinuare limitationes, sed cū hæc ad p̃sens institutum non videantur pertinere, in illis exponēdis nō erimus lōgiore. Cum vero plarũque affectus hi à frigidis humorib. fiāt, sãpius quidē a pituitosa materia, interdũ tñ, & a succo melācholico sicuti & epilepsia. ideo plarũque humor pituitosus purgāndus est. nōnũquã & melācholicus, quib. aut medicamētis purgāndus sit is. vel ille humor, in 1. libro satis est à nobis expositum: in 2. vero, quibus coqui, & parari ad vacuationē possit, quibusque succari & roborari nerui possunt, digesto excrementitio humore, qui in illis est impactus. Quare reliquũ est, vt ad illa conuertamus orationē, quz in primis fluxũ iam humorē, & factũ morbũ respiciunt, ut sunt externa, & topica remedia. sed nō erit fortasse inutile, vt prius particularim ea exponamusq; aliqua generalia documēta ab antiquis medicis tradita referamus. & primũ ab Alexādro Tralliano deprōpsimus: hoc vero est, q̃ cū plerũq; fluxionis in morbis his a capite originē primā petere oporteat, quãuis aliquñ viderimus dolores ventriculi, & intestinorũ in neruorũ resolutionē desuisse, ad eos nimirũ trãslata materia: ideo nō modo in illis curādis, vniuersi corporis curã per eius vacuationē habere oportet, verũ & ipsius plerumque capitis, vt & ante illud ab excrementis, quib. scatet expietur, quã factũ iã morbũ in ipsis neruis, externis remedijs aggrediamur. superius aut, vbi de curādis affectib. capitis fuit sermo habitus, de illis, qb. caput sit inaniedũ, particulatĩ plura verba fecimus. Alterũ vero fuit a Gal. deprōptũ. 3. de locis affe. & ad rationem vsus, & administrationis eorum

medicamentorum pertinet, quæ exterius adhibentur, id autem est, quod in hiorum medicamentorum usu in primis & præcipue inquiramus, & iueniamus locū originis eorū neruorū, qui sensum & motū resolutis particulis, aut eōuullis subministrant. nā lōge magis eo loco applicata profunt, initiū. n. longe maioris momenti est. & id etiā est, quod primū labrat, a quo defluit affectus in subiectas partes. vnde si resolutio, vel conuulsio magna sit, in qua non modo inferiores: verum & superiores partes affectæ sint: præcipue spinæ dorsī, quod est initium omnī neruorum, præter septē illas cōiugationes, quæ statim a cerebro deriuantur. medicamenta assectui cōgruentia applicare consueuere peritiōres medici, & illis uertebri: vnde ortū habent resoluti vel eōuulli. nerui. & proinde nos docuit Alexander: vt cū pars aliqua faciei resoluta aut eōuulsa fuerit: sicut pri soler accidere & oculis, cū a cerebro nerui harū partiū proxime oriātur, magis capitis, quā laborātib. particulis aptis remediis cōsulamur. Sed iā de medicamētis localibus agamus particulatim: prius tamen scopis propositis, ad quos dirigenda est eorū vniuersa ratio, quos, quæ nobis ostendit natura ipsius affectus, & ab eo sumptæ indicationes, cū ergo affectus a præsentia materia frigide & crassæ excitatus: princeps scopus erit per digerentia euacuandū esse, & præterea frigidam intēperie corrigendā: Sed quia crassus, & lentus humor nō facile digeritur: ideo attenuandus, & cōcoquendus: Sed & calefaciendū. hoc. n. & res ipsa nos docet, & Gal. 2. & 4. aph. exposuit. erit ergo agendū medicamentis attenuantibus, calefacientibus cōcipientibusque, & tandem digerentibus. & hac eadem de causa aliquando febris conuulsionē, & resolutionē sanare potuit. imo & ob id excogitarunt medici, vt quando difficilis est morbus, febris usu rerū calefacientiū cōcitetur, & Gal. 5. aph. quāuis vinū alioquin neruis sit nocētissimū: interdū tū ait, quod potus eius meraci ab his affectibus hominē, propterea quod calefaciat attenuet & digerat, potest liberari. Sed quatenus ad primū pertinet, non est concitanda neque desideranda acuta aliqua febris, sed potius leuis, & facilis, ne liberi ab uno periculo, in aliud non leuius incidamus. quartanam vero in primis posse hos affectus tollere putarunt Hippo. & Gal. utpote quæ calore possit attenuare & coquite crassam, & frigidam materiam: rigore vero, illā exturbare & excutere. vinū autē potest his affectibus esse vtile, vt 7. apho. & Asclepiadis sententia docuit Gal. quando corpus purgatum & inani-

Com. 26
Com. 57

tum

tum fuerit. alioqui enim potius oberit & insigniter. verum hæc tã
quã ferè parerga omittenda sunt, quãuis non oïno parerga sint.
& de medicamētis tandē particularim sermo instituēdus est. Quæ
ergo calefaciēdi, & attenuandi vim habent, ea huic negotio possunt
esse accōmodata. nos aut ex mūlta, & copiosa sylua aliqua collige-
mus simplicia ab auctoribus laudata, nō q̃ ea sola nobis probētur.
Sed potius utrāquã exēpla proponātur. sunt autē hæc. veluti mate-
ria apta ad diuersorū medicamētōrū cōpositionē, nā & olea medi-
cata ex his parari possunt. & balneæ, perfusionesque cataplasmata
& emplāstra. neq; alicui mirū videatur: si emplāstrorū vel cataplas-
matum meminimus, utpote q̃ graue videatur hæc posse ferri, si
conuulsio uel resolutio multas partes occupauerit. quia, ut supe-
rius monuimus, non est opus his vniuersam comprehendere par-
ticulā, sed satis plerūque est, si vel origini neruorū qui affecti sunt
adhibeantur. Aetius itaque & Paul. multis laudibus hæc extollunt:
nempe artemisiā, conizā, calamentum, rutā. his tamen addere
possumus chamemelū, anethum, saluiā, chamēpitum, organū,
& hypericon, & istius generis plurima alia, quæ possunt ex libris de
facultatibus simpli. medicamentorum depromi. ex his ex aqua co-
ctis, fieri possunt balneæ, perfusionesque, sed si hæc herbæ coctæ re-
rantur in cataplasmatibus emplāstrique formam redigi poterint. olea
vero quæ possunt vtiliter in usum venire, sunt oleum commune
vetus multorum annorum oleum chamemelinum, anethinum, ex
semine lini, recininū, costinum, rutaceum oleum ex hypericon con-
fectum in affectibus neruorum, vel ab ipsis etiam vulgaribus effertur
multis laudibus, oleum præterea de piperibus, oleū vulpinum,
quod ex lumbricis terrestribus paratur, siue sit oleum alioquin
simplex, siue vetus quod fortius erit, siue (ut in p̃sentia est in usu)
confectum ex oleo chamemelino, ad institutū hoc nō parū facere
solēt q̃ thermarū sp̃ôte nascētiū, quæcūq; calefaciūt, & digerūt, qua-
les sunt sulfureæ, nitrosæq; & quæcūq; salis, cineris, calcis ue sunt
participes: Sed & bituminosæ ac aluminosæ, quæ tñ nō plurimū a-
luminis habeāt, ne nimis astringant. ratio vero illis vtēdi multiplex
esse potest nam, & in potu potest earum vsus esse vtilis, & earum
balneæ, perfusionesque vel embrochæ. Sed multis in locis, & lura
quæ subsident ipsis thermis, si illis affectæ partes, præsertim vero
ad neruorum initia illinantur, vtiliter adhibentur, sicut hic in pa-
tauino agro, lutum thermarum. sanctæ Helenæ, itæque sancti Petri

& montis Ortonis. Sancti vero Bartholomei, quamuis aliquibus in resolutione non valde probetur, propterea quia non parum molliat, at tamen cum insigni præterea vim digerendi habeat: ita ut & indurato stumores possit primum mollire, & attenuare: mox vero & valide digerere: non putare illud in resolutione continendum, in conuulsione aut plurimum esse laudandum. Ego vero & aquam, quam vitæ vulgo appellamus, resolutis particulis affusam plurimum præsidii illis attulisse vidi.

De medicamentorum compositione, quæ apta sunt curandis morbis proprijs sensuum instrumentis, primumque oculis, ac de eorum usu. Cap. 8.

Videretur forsitan alicui, & de medicamentis agendum esse, quibus ad tollendas destillationes medici uti solent: Sed, si recte reexaminemus, destillationes sequuntur, aut semper, aut frequentius cerebri affectum proprium: nepe eius imbecillioris, quæ habet originem ab aliqua in eo interperie contracta: præsertim vero frigida. unde Gal. 3. de caus. sympt. simile habere rationem in cerebro destillationem ait, ut in ventriculo alii profluuium, quod a ventriculi cruditate primaria occasione habet. pari enim ratione ex errore concoctricis facultatis in cerebro fluxio concitatur, & destillatio. & quatenus ad hoc pertinet: superuacuum videtur de hac affectione particulatim agere, cum superius de illis fuerit abunde sermo habitus, quibus eiusmodi interperamentum corrigendum sit: de affectibus vero, qui in diuersis alioquin partibus, ad eas decubente destillatione concitari possunt, non hic, sed aliis magis propriis locis erit instituenda tractatio. In presentia ergo ad sensuum instrumenta conuertamus nostram orationem: primumque ad oculos. Oculus ergo uisus est instrumentum, quod magnam cum cerebro connexionem naturalemque affinitatem habet: maiorem fortasse quam quicquam aliorum sensuum. nam præter id, quod visoria vim vniuersam ab eo per nervos opticos habeat, multis musculis circumseptus est, a quibus in varias partes moueri potest, qui nervos suos a cerebro recipiunt, per quos ad illos vis mouendi amanda. partes etiam, ex quibus tamquam instrumentaria, & composita pars coagmetatur: si non omnes, aliquæ saltem originem habent & deriuantur a cerebri membranis. nam cum ex anteriori, & exteriori parte tribus constet membranis seu tunicis: prima, quæ extrema est, & cum Græcis *ἐπιχρωματιον* appellant, quasi adnatam vel adiunctam dicas: iuniores Latini coniunctiuam vocant. altera vero quæ ab hac continetur, ea est, quam corneam nuncupant. tertia estquam uueam, ragoida autem Græci appellant. sed de inter-

ais,

his non proferemus in longum nostram hanc orationem ne nimirum temporis conteramus, satis est, quod omnes tam internas quā externas, tum à cerebro, tum à capitis membranis tamquam propagines ortum habuisse anatomici auctores in administranda oculorum anatome, ostendunt: ex quo tanquam corollarium hoc deduci potest, quod ad rationem curationis affectuum istius particulæ institutendam nō parum utile esse potest id novisse, nimirum quod plerique morbi, qui oculos affligere solent, quando sponte sua oriuntur & ab internis causis, à capite & cerebro inprimis occasionem habent. Sed his præterea addendum est, quod oculi nomine proprie quidem significamus eam tantum particulam: quam circū circa ambit & continet tunica, quam adnatam vocari diximus. nonnunquam tamen latiori quadam significatione & externas partes, quibus oculus proprie includitur, ut sunt palpebræ & cilia super ciliaque, inter eas recensemus, quæ ad conformationem oculi ex propria eius natura pertineant. nos tamen seorsum de illis, & de his agemus, prioremque sermonem habebimus de curandis per medicamenta illis affectibus, qui interiori oculo proprii sunt, & cū duplici facultate oculus à natura sit donatus, nempe motrice, quæ per musculos fit, & visoria: de priori non est cur agamus, quia cum omnes affectus qui motrici facultati noxii sunt, tandem in resolutionem, & convulsionem referantur, eos omnes fuisse comprehensos superiori capite affirmare merito possumus. Qui vero ad alterā facultatem attinere quoquo mō possunt, in multiplici sunt differentia. nam alii proprii sunt partibus oculi cōi tñ quadā rōne quatenus simplices, & similes sunt, alii vero, primū & per se oculū lēdunt, quatenus cōposita & instrumētaria est. quatenus simplices, sunt obnoxii duplici morborum generi illi qđ in intemperatura est, & illi qđ in soluta unitate: intemperaturę vero sunt quatuor simplices, & quatuor cōpositæ, quæ itidē sicut in aliis partibus, vel cū materia esse possunt; vel citra illā. ad intēperaturā cū materia referuntur inflammationes, & reliquæ tumorū differentiz. utraque autē gñā solent dolores sequi, qui symptomata sunt sensus tactus, cuius oculus cōi rōne particeps est. Et quia genus hoc morborum quod intemperie secundum propriam naturā constat, primam etiam rōnem sequitur, ad earum particularum naturam pertinet: ideo de illo priorem sermonem habebimus. ut autē in breviorē sūmā, methodūque quātū p nos fieri poterit, oīa redigamus, hūc ordinem servabimus,

quod primum circa eas intemperaturas versabimur, quæ maioris momenti sunt, & maiorem requirunt diligentiam, quales sunt illæ, quæ ab affluxu materiæ ortum, & fomentum habent. nam in his continentur & illæ quæ citra materiam sunt: atque in his quibus curanda est intemperies cum materia, pleraque eorum comprehenduntur, quæ illam tollere possunt, quæ est citra materiam. Sed & id præterea annotatione dignum est, quod si non omnes, plerique saltem oculorum affectus, qui à præsentia materia pendent, & fouentur, a fluxione originem habent, quæ a capite & cerebro semper ferè primam (ut ex paulo ante expositis facile posset probari) occasionem habent. fluxiones vero, quarum initium est a capite, ex maiori: immo maxima parte sunt, vel a bile, & ex sanguine tenui & bilioso, aut tenui & falsa pituita, vel frigide ex pituita frigida & insipida. aliquando etiam mixta est ex utrisque: nam ab humore melancholico crasso raro hæc eueniunt: nisi interdum aliqua huius succi portio in oculis mixta. Quia vero omnes defluxorii morbi, sicut unam habent communem rationem, qua generantur: ita uni etiam generali methodo, quatenus ad eorum curationem pertinet subiecti sunt: licet particulatim quatenus ad materiam medicamentorum, aliqua sit in eis diuersitas, & aliqua etiam ratione naturæ particulæ morbosæ. sed non est in præsentia opus, ut multa de hac ratione dicamus, quia cum præfens oratio solum circa oculorum affectus versetur, eadem quantum ad hoc spectat, in omnibus erit ratio. nos ergo, ut breuiores simus, non omnium affectuum; qui à calida fluxione pendent, curationem tractabimus: sed de oculorum inflammatione, quæ a Græcis ophtalmia: a Latinis lipitudo dicitur, agemus, quæ erit nobis veluti exemplum quoddam curandarum omnium calidarum fluxionum. neque longi admodum erimus in exponendis illis, quæ in vniuersum continent generalia theoremata horum curandorum affectuum, quia sæpius, & hæc priori libro fuisse expositas: nempe, quod quamuis hæ fluxionis primum & proxime occasionem a cerebro capiteque habeant, fomentum tamen raro illi deest a suppositis partibus, ut ab hepate, sæpius etiam ab vniuerso corpore: Vnde & vniuersi corporis vacuatione priori egent, & reuulsione, & tandem deriuatione. reulsio præcipua illa est, quæ omnibus affectibus calidioribus communis est: nempe per sectionem eiusdem veræ, quæ in affectibus capitis secari solet. deriuationes fieri possunt affixis cucurbitulis scapulis eisdemque incisis. itemque & hirudini-

hirudinibus post aures, atque per misso sanguine fluere post earum casum, quantum expedire visum fuerit. Gal. vero in lib. de facile parab. medic. meminit alterius reuulsionis vel deriuationis, nempe apposita cucurbitula occipiti & incisa, atque inde sanguine detracto, perinde vt Hippocrates rectam frontis venam secandam esse, quando pars posterior capitis male affecta est. auertunt etiam: sine manifesta tamen vacuatione frictiones brachiorum crurum & dorsi. & quamuis hæc reuulsionis ratio frequentior sit medicis, non tamen ea sola in usu est: nam sæpe medicamentis purgantibus utitur, cuius rei meminit Gal. tũ. 1. aph. tum vero 13. meth. vbi ait se curasse sæpius incipientes ophthalmias illo eodem die corpore per medicamenta purgato. & si quis quærat, quamuis fortasse hæc videantur ab hoc instituto aliquantulum aliena, an hæc duę reuellendi rationes semper & in omnibus æqualiter, & indifferenter sint futuræ vtilēs, vel aliqua potius in illis differentia, & distinctio adhibenda, ita vt aliquando altera aliquando autem altera sit accommodatior censenda. Est sanè, & illa præsertim quę a natura fluxionis sumenda est, vt videtur insinuassee Gal. nam si fluxio fuerit aut sanguinea, aut aliorum humorum cum sanguine, sanguinis detractio aptior erit ad curationem. sin autem non fuerit insignis cum sanguine mixtura, vtilior erit purgatio. Vnde Gal. in libello de medicam. fac. parab. signa exposuit, quibus hæc discerni possint. ait enim quod si venę circa frontē tumidiore, & apparentes fuerint, sit sanguis mittendus: sin aut, purgandũ. Sed ad ea tandē transeamus, quę particulatim ad præsens hoc negotium magis videntur attinere: nempe ad tractationē de localibus, & externis medicamentis. vt tamen prius hoc sit considerandum, quod cum methodus primario quidem naturam, rationemque morborũ sequatur: à generalibus morborũ rationibus occasionē habent, & constitutionē theorematā pertinentia ad partē cōmuniore, & generaliorem methodi. cum ergo ophthalmia inflāmatio sit oculi, vnde & ophthalmiæ nomen illi inditũ: necesse est, vt cōmuni methodo curandarũ inflāmatōnũ sit subiecta. habeat tñ aliquas particulatim definitiones & limitationes, a sua ppria, & peculiari natura. at inflāmatio à fluxione efficitur. primũ ergo indicat sistendā esse fluxionē: deinde vero: siquid iā fluxerit, id per digestionē vacuandũ esse. sistitur autē fluxio per repellentia, quę, vt sæpe expositum est, refrigerant, & astringunt. sed & quoquomodo euacuatur particula, dum per hæc

Com. 17.
Cap.

quasi exprimitur : siquid admissum & receptum est, præsertim vero vacuant, quæ vim habent digerendi : vnde inter initia repellentibus agendum est : morbo autem ad incrementum progrediente, miscenda sunt digerentia repellentibus, ac paulatim de repellentibus detrahendum, donec solis digerentibus : quando vigor morbi accesserit, vtamur. Hæc ergo est generalis methodus curandi affectus, qui a fluxione ortum habent. Sed illa postea per peculiare rationes, quæ a varia natura ipsius morbi, vel specie accipienda est : in hac tamen inflammationis quasi specie, quantum ad institutum nostrum pertinet, præcipua diuersitatis ratio ab ipso loco affecto depromenda est, nam adeo differantis naturæ ab alijs particulis oculus est, vt diuersissimam requirat medicamentorum conditionem ab alijs particulis : ita ve quæ in inflammationibus aliarum ferè omnium particularum maxime commoda, & salutaria sunt, in oculorum inflammationibus alijsque eorum morbis maximè nocua sint. nam rosaceo oleo, vt superius fuit expositum, in capitis & cerebri, tum inflammationibus, tum etiam doloribus, & alijs calidis affectionibus, omnes, vel etiam vulgares, vtuntur tamquam præcipuo, optimoque medicamento : quod tamen oculos irritare & exacerbare potest, naturæ enim oculi maxime est aduersarium. & proinde licet in vniuersum eadem sit methodus curandi oculorum lipitudines, qua & aliæ curantur inflammationes, particulatim tamen quatenus ad materiam pertinet ex qua componenda sunt medicamenta apta curandis oculorum morbis, maxima est diuersitas. id vero est propter dignitatem istius particulæ, & eximium in illa sensum, a quo habet quod facillime a quocunque in quo sit vel quamuis modicus aliquarum qualitarum excessus, statim lædatur & irritetur, vt in ea ferè sola locum non habere videtur aphoristica illa sententia, quod extremis morbis extrema remedia conferre solent. nam neque in magnis oculorum morbis vt licet ualentioribus, & fortioribus medicamentis : & inde fit quod eorum curationes tum difficiles, tum etiam longæ esse solent. Vnde, vt Galenus partim decimotertio methodi, partim quinto de compositione medicamentorum secundum locos, docuit, neque primas neque secundas qualitates, neque tertias, nisi moderatissimæ sint, oculi ferre citra noxam possunt : nam neque quæ

quæ insignem aliquem saporem habent , vt austerum vel amarum vel acrem , & tandem , quæ acrimoniæ expertiæ non sunt , quæque exasperant : sicuti astringentia exasperant . omnia enim sunt oculis inimica , nisi modestissime id faciant . immo neque ea quæ vel modeste id agunt , periti medici oculis iniiciunt , nisi prius illa aliquo liquore leni demulceant & deliniant , vt omnem exasperandi facultatem detrahant . liquores vero , qui medicis in oculorum affectibus frequentissimi sunt , tres sunt : primum est album oui dum concutitur & aquæ consistentiam assumit : alterum est muliebre lac : præsertim , vt docuit Rasis , si fuerit mulieris iuuenis & boni habitus , quæ puellam pepererit . hoc enim illum voluisse puto . tertium est seminum fœci græci decoctum diligentissime paratum : nempe prius diligenter abluto semine , vt si quid pulueris vel alterius rei , quæ possit exasperare habeat vel mixtum vel hærens , detrahatur . Sed hoc præterea aduertendum est , quod hac eadem etiam de causa cæci medici ad repellendas fluxiones oculorum potius emplasticis vtuntur medicamentis , quàm astringentibus , quia & illa repellunt , tum quia quoquomodo refrigerant , tum quia meatus particulæ replent & obstruunt : vt deinde nequeant facile defluentes humores admittere . Sed iam de his medicamentis particulatim agamus , quæ incipienti inflammationi congruentia sunt , sumpto initio a facilioribus . in horum autem medicamentorum usu , & delectu , considerandus est primum morbus , impetusque influentis humoris , eius etiam copia & acris qualitas . præterea vero & symptomata : præsertim vero dolor . nam si magnus sit impetus irruentis fluxionis , vt inde sit timenda magna inflammatio , si mala sit materia : vt vel à multitudine facta magna particulæ distentione , vel ab acrimonia , dum mordetur & penè eroditur oculus , ingens excitetur dolor , valentioribus res erit tractanda medicamentis : sin autem neque multa materia impetum in oculos facere videatur , neque adeo acris , vt ingens concitetur dolor , leuioribus & facilioribus , simplicioribusque medicamentis erit agendum . faciliora vero simpliciora hæc imprimis sunt . oui album , quo vel solo sæpe principiis ophtalmicis , multos restitisse vidit : eo nē pe prius probe agitato & concusso , vt in tenuē & ferē aqueū liquo

rem

rem dissoluatur: mox vero in oculos instillate . nam multis nominibus potest esse vtile. primum refrigerando, non tamen ita insigniter, vt lædere possit. vim repellēdi habet, postea aliqd emplastici habet: vnde, vt alias diximus, repletis, & quasi obturatis illis tenuibus meatibus ipsius particula, quibus admittuntur influentia excrementa, fit aliqua repulsio: & illa in primis, quæ magis commoda est oculis, quam, quæ fit per astringentia, cum non ita exasperet, vt astringentia: præterea & hac quidem ratione: delinens asperitatem, & obtundens acrimoniam influentiū succorum, dolorem sedat. cui accedit, quod dum lentore cuius particeps est, oblinat partes per quas defluunt acres fluxiones, illas perinde munit, vt in dysenteria pingua & emplastica medicamēta, quæ intestina ab erosionē acriū excrementorum defendunt. Quod si videatur inter initia maiori aliqua refrigeratione, & aliquantula item astringitione esse opus, sæpe aquam rosaceam intermiscet, quæ cum refrigeret & ipsa, & aliquid astringitionis ex rosa retineat, & id cetera vllam asperitatem, potest adiuuare, & vires albo oui addere. & quamvis decoctum ex aridis rosarum foliis, posset pro aqua venire in vsum: putarem tamen illud non ita futurum cuiuscunque morsus expers, vt aqua rosacea. In mollioribus itaque corporibus, vt mulieris & pueri sunt, vidi repetitas eiusmodi inflammationes hoc medicamento, præsertim vero inter initia. si vero videatur esse aliqua digestionē opus, succuli plantæ scæniculi in frustra resecti dum concuritur, in album oui solent iniici. inde enim aliquam. digerendī facultatem sibi medicamentum comparat. Sæpe etiam inter initia vsus sum rhu obsoniorum. Arabes vero & apothecarii vulgo sumach appellant. vtor autem hoc modo, accipio vnam, aut alteram eius dragmam, ac in albo & raro lintheolo deligo, in aquamque rosaceam demergo, atq; ibi macerari permitto, moxque aquam ex lintheolo expressam in oculum destillare. permitto. citra vllum morsum vel exasperationē medicamentum hoc refrigerat & astringit, & subinde etiam repellit. hoc autem medicamentum præsertim mihi in vsu est in dictis variolis, ad tuendos oculos puerorum. sunt hæc medicamenta familiaria faciliāque parata. post hæc autem, potest esse vtile decoctum scæni Græci, ea diligentia paratum, quam nos docuit Gal. 1. 3. meth. nempe, vt diligenter per ablutionem sordes & omnis puluis detrahatur, moxque ex dulci & simplici coquatur aqua, vt si quid asperitatis, vel morsus habuerit, id deponat. coqui autem solebat ex dulci

dulci aqua paulatim, & lento igne, ne dum violentiori igne efferue-
 scit, inde vim maiorem calefaciendi acquirat, & aliquam subinde
 acrimoniam. instillatur autem medicamentum in oculos, aut illo
 oculi obducuntur, decoctū hōc maiores vires cōcoquēdi priori ha-
 bet, & aliquas detergendi, quamuis non multas, citra tamen aliqūē
 morsum: sed cum sit alicuius caloris particeps, digerere etiam ali-
 quantulum potest, & repellere, perinde vt album oui, ratione nimi-
 sum lentoris, cuius non est expers: & proinde etiam emplasticum
 est. cum ergo cōcoquat, extergatque & digerat, potest digerendo
 coquendo & leniendo dolores mitigare: quare album oui primis
 iniitiis accommodatius erit medicamentum: circa incrementum ve-
 ro scēni Græci decoctum. possumus autem eius facultatibus adde-
 re, vel detrahere, si vel aqua mutetur ex qua coquitur semen, vt si
 pro cōmuni aqua, rosaceum sumamus, minus calefaciet & aliquan-
 tum astringet: si autem aqua scēniculi, magis digeret. præterea pos-
 sunt, dum coquitur, addi rhus obsoniorum vt magis repellat, vel
 germina, aut surculi scēniculi iniici, vel semina, vel id genus aliud.
 nam ita magis digerere poterit. Tertiū vero: quod præsertim opor-
 tunum est, quando vehementiores dolores vrgent, maxime qui ab
 acri fluxione excitantur, est muliebre lac, si sit calidum ab ubere ex-
 pressum mulieris iuuenis & boni habitus. nam & aliquid detergen-
 tis habet ex seroso humore, cuius semper est particeps, quo acres
 delapsas materias abluit, nec diu permanere permittit. nā semper
 locum, in quem decumbunt, vellicant, & abradunt. habet etiam par-
 tem ex qua conficitur caseus, quæ habet non nihil emplastici, quo
 præter id, quod vt sæpe dictum est, potest repellere fluxionem, ob-
 liniens etiam emplastica substantia affectam partem, eam munit ab
 iniuria acrimie excrementorum fluentium. sed pinguiore etiam
 partes illi, non desunt non quales illæ sunt, vnde fit butyrum, quæ
 coquendi facilitate, præditæ sunt, & non nihil digerendi. lenitate
 præterea, quæ illi ex propria sua natura peculiaris est, delinit, & de-
 mulcet omnium acrimoniam & asperitatem. est autem tum hæc, tū
 vero oui album in maiori vsu etiam apud vulgares. In acerbioribus
 autem, & maioribus inflammationibus: vbi egemus ope fortiorum
 medicamentorum, compositis illis solemus vti, quæ Græce collir-
 ia, Arabice autem si ex appellantur. & Galenus in iniitiis fluxionū,
 quando vchementes assident dolores, dixit colliria illa vim magnā
 habere quæ monocera à medicis dicebantur, quia illa eadem die
 possint

possint liberare ab hoc morbo, & quæ à colore trygodi quasi feculenta dicas, alia vero libiana ab illis & cigni ab albo colore & ipse plures horum colliriorum compositiones descripsit, quarto de compositione medicamentorum secundum loc. multas etiam Aetius, Paulus, & Alexander Trali. quæ tamen in præsentia nullibi paratæ reperiuntur neque sunt in usu: & proinde in illis referendis non erimus longiores, cum nullibi ferè in usu in præsentia sint, est vero in usu nostris his temporibus loco eorû. quæ cigni dicuntur collirium Rasis nono ad Almansorem descriptum, quod ipse vocabulo Arabico sic album appellat. & aliquanto illis quæ Gal. quarto de compositione medicamentorum secundum loc. referuntur simplicius. sit autem ex decem partibus cerusæ lotæ, sarcocolæ tribus, vna autem tragacanthæ. in relatis autem à Galeno additur cadmia & amyllum, & gummi, quod nunc Arabicum appellant. vnde illa maiorem vim desiccandi & repellendi hênt ad vlcera consolidanda. Hoc vero quod Rasis descripsit magis lenire dolores potest, & acrimoniam fluxionis delinire & obtundere. sed & fluxiones repellere, doloresque mitigare, dupliciter autem illud in præsentia fit. aliquando enim partem mediam opii addunt, quo deinde vtuntur, vbi doloris vehementia cogit: alioquin vero citra opium in usu est. nec modo hoc medicamento vtuntur id genus oculorum affectus, verum & in aliis quando ab acri excremento concitantur: solent enim vsque in uestigia illud iniicere, in vehementi ardore vrinæ. aptum autem est hoc medicamentum præcipue incipientibus inflammationibus, nam cum iam videtur esse aliqua concoctione opus, huic aliquid illius collirii addit, quod ex croco conficitur, de quo postea suo loco agemus. Galenus vero docet, non solum colliriis quæ instillanda sunt diluta ex aliquo predictorum liquorum: nempe aut albo oui, aut lacte, aut decocto sæni Græci: verum vtiliter posse oculo laboranti adhiberi emplastra apta his affectibus. In libro autem de facile parab. medicamentis describit hoc cataplasma, quod accipit ouum: nempe album, & luteum, additoque meliloto & pane quantum satis sit ad confectiorem cataplasmatæ, atque oleo etiam rosaceo, sit emplastrum quod oculo clauso imponendum, & deligandum est. exceptum tamen lintheolo vel ap. so lini vel simili re. nam vini habet dolorem mitigandi ex oleo & ouo & meliloto, ex albo, itidem que ex oleo repellendi, aliquid etiam concoquendi ex meliloto & oui luteo & pane & digerendi. sed iam caput hoc ad calcem deducendum

cedunt: est: si tamen vnum prius moruerimus, quod nos Gal. docuit, & ad rationem vsus prædictorum medicamentorum pertinet: illud vero est, quod vbi dolor non sit admodum vehemens, si bis, aut ter illa in oculos instillantur, ipse satis esse censuit. in vehementioribus vero doloribus: præterea etiam si dies longiores fuerint, vt æstate sunt, etiam quater, vel quinque. vnde hoc animaduertendum, quod non erat ille ita frequens & importunus in his, sicut sunt in præsentia medici.

Ad vlcerà oculorum. Cap. 9.

Vlcerà oculorum sicuti multiplices habent occasiones vnde fiant: ita etiam particulatim diuersæ curationis rationi subiecta sunt. fiunt autem vel ab interna aliqua causa, quia vel ex aliquo rupto abscessu, in quæ vel inflammatio, vel alius tumor præter naturam in oculo cõcitatus desierit, aut ab acri & mordaci fluxione abradente & erodente tunicas oculorum. vel ab extrema causa, sicuti si ab aliquare pungente, incidente, vel dilacerante tunicas harum particularum soluantur. non solum autem ad causas respiciendum est in curandis vlceribus oculorum: verum & longe magis ad differentias eorum quæ inter se variæ & diuersæ sunt, iplis vlceribus per se consideratis. nam aliqui sunt vlcerà sola. aliqui vero cõiunctas & alias affectiones habent, quæ & ipsæ proprias præter vlcus habent indicationes. coniunguntur autem cum vlcere sæpe inflammatio, aut heresypelas, aut aliqua intemperatura cum materia vel sine ea. interdum & exitus alicuius particulæ oculi, vt in appellato myocephalo vel staphylomate. sed & vlcus sordidum, virulentum, putridum credens non sunt simplicia, sed implexitas alias habent affectiones, vt & priori libro cõi quadam ratione ostendimus, quæ omnes proprias habent indicationes. sunt præterea, & vlcerà maligna, & quæ malignitatis sunt expertia. vt præterea in præsentia, & alias differentias quæ vel à partibus oculi sumi possunt. nam quandoque cornæ, quandoque altera quæ agnata vel coniunctiua dicitur. interdum vero & palpebras corripit. vel à ratione propria ulceris, quia vel magnum vel paruum est, vel profundum, vel non descendit in altum. nam sicut in cõi ulcerum genere continetur: ita postea ratione consentaneum est, quod possit etiam esse earum differentiarum participes, quæ solent communem, & generalem rationem vlcernum sequi. Sed & illud iam potest esse manifestum, quod cum de oculorum ulcere sit instituendus sermo, duo inprimis sunt

sunt spectanda. primum ea quæ nobis à ratione vlceris, & earum differentiarum quæ vlcera sunt, indicantur. deinde vero illa quæ natura affectæ partis nobis indicat. Circa illa quæ à communi vlcis ratione nobis indicantur, non est in præsentia cur multum versamur, cum satis superq; de illis in tertio libro egerimus. nã neque illud dubium est, quod si vlcus sit ab aliqua causa illatum, siue illa externa sit, siue interna, quæ aut omnino, aut maxima ex parte fluxio est, quod primum incumbendum sit, vt causa de medio tollatur: & superius non semel de remediis fuit actum, quibus fluxio tollitur. præsertim vero priori capite vnde sermonem conuertemus ad eas indicationes, quas nobis affert ratio communis & istius communis vlcis natura. quæ quidem iudicat particulam per consolidationem esse ad suam pristinam unitatem restituendam, quod tamen solius est naturæ opus: sicut etiam carnem generare, & ea vlcus: si cauum fuerit, replere. quamvis & medicus non parum possit naturam adiuuare: dum suis instrumentis, illi opem magnam ferre potest: nempe quibusdam remotis, quæ naturam impediunt, quo minus illa suo officio fungi possit. earum vero, quæ naturæ sunt impedimento, aliqua suapte quasi natura sequuntur ipsa vlcera: vt sunt duo illa excrementa, quæ in omnibus vlceribus subcreseunt, alterum quidem tenue & serosum, quod in causa est, cur omnia vlcera delicatatione egeant, & iunioribus autem virus vel virulentia dñr: quodque vbi supra communem vlcis rationem excrefcit, efficit eam vlcis differentiam, qua vlcus violentum præsertim à iunioribus chyrurgis dicitur. Alterum vero crassum quod sordem appellant, & ab hoc cum nimis in vlcere redundauerit, fit altera differentia. nempe vlcus sordidum. ob istud autem excrementum vlcera egent aliqua deterfione: sed de his 3. libro plenius & planius loquuti sumus. Alia vero vlcis consolidationi impedimento sunt, non quia vlcus propria ferè ratione consequitur. sed potius sunt à ratione propria vlcis aliena: verum, aut sunt affectiones simul cum vlcere complicatæ, ut intemperaturæ inflammationes, aut has sequuntur, vt putredo, erosio, & id genus alia. vel sunt causæ, quæ præsentibus adhuc vlcus fouent. horum autem omnium eadem est methodus generalis in oculis, quæ & in aliis aliarum partium vlceribus. de qua, cum in superiori libro quātū satis esse potest, loquuti sumus, in præsentia superuacaneum

vacaneum videretur in longius proferre sermonem. Particulatim autem quemadmodum in superiori capite de inflammatione diximus, ita etiam in curandis his vlceribus, non parua intercedit differentia inter hæc, & alia quatenus ad rationem medicamentorum pertinet, & materiam eligendam, vnde hæc conficienda, quæ differentia perinde hic, vt in curandis inflammationibus, occasionem habet ab ea indicatione quæ accipienda est à natura affectæ particulæ, quæ facillime, & quocumque paruo negotio ab omni acri & exasperante medicamento irritata incidit in dolores, & fluxionibus sit obnoxia. Cum itaque ad curanda hæc vlcera desiccantibus medicamentis detergentibusque, & sæpe concoquentibus sit opus, de concoquentibus quidem non est cur multa dicamus. illa enim potius quatenus concoquunt dolores mitigant: desiccantia autem & detergentia illa erunt aptissima instrumenta: imo & astringentia, nam illis interdum partim ad repellendos influentes humores, partim ad roborandam afflicta particulam, quæ mitiora sunt leuioraque, & quæ opus suum facilius, & citra morsum & irritationem possunt præstare. De his ergo, primum agemus, & prius de simplicibus, mox vero de compolitis. Inter simplicia multa in rerum mineralium genere sunt in usu, quæ præferim: si exquisitæ fuerint loca, aut nullam habent acrimoniam, nullumque morsum, aut si aliquam habent, illam deponunt. sunt etiam quædam terræ vel lapides. sunt demum, quæ *ἰσχυρὰ* Græce, Latine vero lachrimæ, ab Arabib. & iunioribus gummæ appellantur. explanatis quoque in usu sunt, flores, folia, succi, & semina quædam. Sed antequam magis particulatim de his agamus, quædam in vniuersum explananda sunt. Hæc vero ea sunt, quæ à Gal. 13. meth. tũ 4. de comp. med. secundũ loc. inter initia fumus edocti. & sunt non mō vtilia, verũ & necessaria ad perceptionē eorũ, quæ ad rectam medicamentorũ cōpositionē, & intelligentiã pertinent. Hoc itaque constituto, qđ paulo ante fuit explanatũ: nepe ea medicamenta congruentissima esse oculis laborantibus, quæ vel oĩno sunt acrimonię morsusque expertia. itemque exasperationis, uel saltē q̃ minimũ illis prędita sint. talia sunt. quæ emplastica, sũt Emplasticatorũ vero duplex est genus. hoc. n. ab eodẽ Gal. 4. de fac. simp. med. fuit litteris traditũ. Alterũ quidẽ eorũ est, quæ substantia cōstāt exquisitè terea siccaq; aliarũ tñ qualitatur̃ prorsus ferè experte. Alterũ vero ea continet, quæ non prorsus terreã & si ccam habent substantiam, sed potius mixtam ex terreã & aerea.

unde,

unde, & quoquo modo glutinosa sunt, & vt quinto de facultate simplicium medicamentorum ille idem testatur, in his sunt oleum oui album, caseosa lactis pars, suillus adeps, cera quoque quæ expers sit cuiuscunque amaritudinis, & alia præterea multa, quæ quisque potest locis citatis legere. in priori genere sunt metallica multa. in primis vero ponenda est, quæ pompholix à Græcis dicitur: vulgo vero tutia, cum exquisitè fuerit lota: nostris autem temporibus aqua rosacea à multis lauari solet. ea in oculorum morbis nulli alteri, vt idem testatur, secunda est. post hanc est spodium ite lotum: non illud Arabum: sed Græcorum quod minerale est. & à Latinis multis cinerula dicitur. deinde cerusa, cadmia item usta & probe lota. præterea plumbum vstum & lotum, sed & cimolea, samius aser, & amylum, omnia probe lota. in his tamen nonnulla sunt, quæ non sunt prorsus ab omni qualitate immunita: quia cadmia particeps est aliquantulæ facultatis extensoriæ. pompholix vero, spodium & plumbum vstum, quamuis probe lota nullam mordacitatem retineant, retinent tamen aliquam astringentem: sed illam admodum exiguam. Quatenus autem ad vsum horum duplicium generum istorum emplasticorum medicamentorum, atque ad eorum munus, & hoc consideratione dignum est, quod alterum quidem genus: eorum nempe, quæ glutinosa quoquo modo sunt, maxime vtile congruensque illis est, in quibus expedit pus moueri, primum autem, illis, vt quarto de compositione medicamentorum secundum locos, videtur Galenus, insinuare, aptius & vtilius est, in quibus siccare sit opus citra vllum morsum, vacuareque, quo in primis egent dolorosa vlcera, dum curantur. Quia tamen non solum id genus medicamenta, quorum hæctenus meminimus, sunt vlceribus & aliis prauis oculorum affectibus necessaria: sed interdum & detergenibus opus est: imo quandoque & erodentibus: quibus hæc alioquin sint oculis inimicissima, abstergunt vero atque repurgant vlcera valide ex mineralibus, quæ ite in ocularibus medicamentis recipiuntur, squama æris, flos ite æris, chalcitis vsta, misy, sory, stibiūque, quod à iunioribus dicitur antimoniu. erodunt autem auri pigmetū, sandaracha flosque, asæ petreæ. huius autem facultatis non nihil est particeps, est misy. Præterea vero, cum sit duplex medicamentorum astringentium genus. nam quædam modice admodum astringunt, in quibus sunt rosarū flores folia & succus, & ericæ fructus, spica nardi, foliū malabathri, crocus, liycū & hypocistis. alia vero vehemētē vim astringen-

astringendi habent, ut acacia, omphaciū, balaustiū, cytini mali puni-
ci, gallæ omphacitides. Sed his ita explanatis, hoc præterea est addē-
dū, q̄ ad omnes oculorū affectus in primis utilia atque tuta sine ul-
la particulæ offensa sunt ea medicamenta, quę emplastica sunt, & in
primo emplasticorum genere: quę sicca & terrea sunt, utpote quę
moderate, & citra ullā noxā desiccant, & subinde uacuant atque ob-
sistūt fluxioni. & si hæc præterea alicuius alterius facultatis nō sint
expertia, ut pompholix, quę aliquantum astringit illā tamen adeo
modicā habent, ut nequeant exasperando dolorē aliquē ciere, neq;
retinere: siquid defluxit ad affectū locū, ne disfluat, sed potius eara-
tione utilis est, q̄ robur particulæ seruat, & fluxionibus resistit. Et
hac rōne cætera quoque, quę modice astringūt, in oculorū affecti-
bus sunt in frequenti usu. quę uero uehementius id agunt, dolorem
afficiunt, exasperata parte, unde raro etiā admittūtur in ocularibus
medicamentis. & quando admittuntur parte id fit, & non nisi cū il-
lis mixta, à quibus deliniatur, & mitigetur asperitas. vnde raro, nisi
in cōpositione ueniunt in usum: immo & ea cōposita, quę hæc acci-
piunt, plerunque dū illis utimur, cū aliis cōmiscemus, quę possint
reprimere eorū uehementiā. quod bifariā seruari solet, uel admisto
multo liquore quo diluendū est medicamentū, ut est oui albū, uel
aqua rosacea uel lac, uel decoctū fœni Græci. uel addito alio cōpo-
sito medicamētō, in quo sit ualida uis retēdēdi uehementiā illius me-
dicamēti, & quod de his diximus, illis ēt cōe est, quę uehementer
detergunt, quęque uim etiā habent erodēdi, sed quædā etiā de cō-
coquentibus dicemus ac statim ad cōposita medicamenta particu-
latim explicāda accedemus. Concoquentia ergo medicamenta, ex
multis quidē selecta, utpote quę præsertim cōgruentia sunt, quan-
do concoctione opus est: sicut etiā sæpe opus est, sunt hæc, myrrha,
crocus, thus, castoriū, succus fœni Græci. quāuis nō nulla ex his,
ut myrrha, uim etiā discutiendi habeant: sed alia calidiora sunt, alia
minus calida, sicuti diuersa est etiā affectuū ratio. Medicamenta ita
que cōposita reperiuntur ab antiquis descripta ferē innumera, quę
nolumus nos in præsentia explanare. nimis. n. lōga esset hæc oratio:
sed tantum ea persequemur, quę in præsentia in usu sunt frequen-
tiora, & plerisque in locis reperiūtur. nā istis probe perceptis alia
ēt quorū hic nō est facta mētio: si cū istis quę hoc loco fuere expla-
nata differāt facile poterūt percipi. Primū ergo agamus de collyrio
quod diximus si est albū avari fuisse nuncupatū, cuius ipse meminit
præsertim ad curandas inflāmationes oculorū, & eius etiā facta est

priori capite aliqua mētio. nā in vlcēribus oculorū. qñ sunt cum ūe hemētū dolore, neq; oīo sunt expertia inflāmationis, sunt q; à calida, & acri fluxione excitata. præsertim uero inter initia accōmodari utiliter pōt hoc collyriū. vtpote quod pōt desiccare sine aliquo morsu, qđ maxime ulceribus est necessariū, refrigeratq; , & aliquā habet adstrictionē, & tū his facultatibus, tū uero quia emplasticum est medicamētū, repellit, & resistit fluctibus succis acrioribus. & leuē aliquē faciliēq; digestionē habet: vnde his ferē omnibus nominibus, doloribus remedio esse pōt, & lōge ēt magis ex admixto opio. Hæc uero oīa facile, si ea ex quibus componitur extimare uoluerimus, percipere poterimus. nam cerusa lota, & emplastica est, & aliquā nō admodū obscurā habet uim astringēdi, neque tñ exasperat, & desiccāt moleste, refrigeratq; . sarcocola uero & ipsa est in emplasticis medicamentis, & lōge magis si maceretur in lacte fit cuiuscūque mordacitatis expers, & desiccāt, nō caret præterea digerendi facultate. cum. n. alicuius amaritudinis sit particeps, habet aliquas partes calidas: vnde ēt aliquid cōcoctorii habet. tragacātha uero, & ipsa aliquātisper siccat emplasticaq; est, & adeo circa morsum agit, ut possit ea q̄ exasperata sunt leuigare, & acrimoniā obtūdere. & q̄ uis in impressis Rasis exēplaribus nō adsit amyli, Mesue tñ de ophthalmia agēs, referēs hoc medicamētū ac illud Rasi ascribēs, meminit & amyli: quod & ipsum emplasticū est, & circa ullū morsum siccat. de opio aut nō est quod multa dicā. nulli. n. nō est notū, qđ stuporē inducit, & ad resistēdū dolori admittit in medicamētis. Quo loco, & illud aduertēdū est, qđ quāmuīs opiū facultatibus, tum ferē oībus, tū uel maxime sentibus cōtrariū sit, ut pore quod stuporē asferat illarū facultatū instrumentis. si tñ diligēter obseruare uoluerimus ocularia medicamenta, quæ à celebrioribus medicis descripta hæctenus seruātur, uidebimus in illis esse frequētissimū usum opi. Hoc aut fuisse institutū puto, pp̄ eximiū istius particulæ sensum, & uehemētes dolores, quibus, cū male afficitur solet cruciari. sed & hoc nō uidetur prætermittēdū, quod plurima, ut diximus reperiri alba collyria in libris Galeni, Pauli & Aetii, quæ ab illis cigni dicūtur, itē & apud Arabes, hoc tñ aliquātulū est simplicius, & iniitiis primis magis accōmodatū. nā multis illorū additur cadmia, & gūmi, quod vulgo Arabicū appellāt. cadmia aut usta quidē, & lota nō nihil deterforiæ facultatis habet, & ideo potius illis congruens erit, cū iā præterierit principiū, desieritq; inflāmatio, atq; remissior sit factus dolor. Postea aut describemus collyriū ex thure cōfectū, quod

Quod idē Rafis ſic de thure appellat, uimq; & ipſum deſiccādi ci-
tra ullū morſum habet, ſed maiore cōcoquēdi, & aliquā præterea le-
uē tñ, aſtringēdi, & tātillū digerēdi. eius cōſectio in hunc modū ſe
habet. Accipit ammoniaci, ſarcocollæ ſing. partes quinque, thuris
partes decē, croci partes duas. oīa ex muſcilagine ſcēni Græci aſ-
ſumpta in collyriorū formā redigūtur. Thus itaq; ut ab eo incipia-
mus, qđ alia ſuperat copia, quodq; medicamēto nomē dedit, in pri-
mis uim cōcoquēdi habet, aliquā ēt nō tñ multā aſtringēdi, aliquā
tulū ēt deſiccāt. nō nihil præterea digerit, & detergit, ſarcocolla uo-
ro & ipſa medicamētū cōcoctoriū & diſcuſſoriū eſt, qđ præterea, &
citra morſum deſiccare poſſit, & cū emplaſtica ſubſtātia cōſtet, pōt
& fluxionibus obſiſtere, ammoniacū aut mollit inſigniter, & dige-
rit, ad vlcerā etiā maligna utile eſt medicamētum. hæc oīa docuit
Gal. crocū uero cōcoquēdi facultate eſt præditū cū aliqua tñ aſtri-
ctione. cōſimilis quoq; facultatis eſt decoctū, uel muſcilago ſcēni
Græci. Quare oīa in unā ſummā colligēdo, medicamētū hoc impri-
mis quidē cōcoquere pōt crudos, & ſuperuacuos humores in oculo-
lis, eoſque digerēdo, & deſiccādo abſumere, atque inſluētibus ali-
quātulū obſiſtere, roburq; particulæ addere. cōmodū ergo erit, in
clinātibus dolore & inflāmatione in ulcerato oculo, magis. quā
inter initia. Tertiū medicamētū ulceribus cōmodū, qđ, & ipſum
his tēporibus in uſu eſt, & multis in locis paratū reperitur, eſt ab eo
dē Rafi deprōptū, quo ēt ſæpius & ſcēliciter uſus ſum, appellatur
de plūbo, efficaxq; medicamētū ad ſiccāda, & detergenda vlcerā ēt
difficilia, & ea carne replēda & cōſolidāda. vtile aut nō ita in princi-
pio neq; in incremēto: dū dolor, & fluxio vrget. & in hūc modū cō-
ficitur. Accipit plūbi vſti & loti. ita. n. medici eo vtūtur pſertī ī oculo-
lorū affectib. nā dū urit ex igne aliquē cōtrahit calorē, vñ mordere
pōt, ſed id vniuerſū ex lotionē detrahit. ſtibii, vel, vt nūc dici, anti-
monii. & ſi Gal. ſides ſit adhibēda, & hoc medicamētum cōmodius
erit, ſi vſat & laueſ. nā illorū fortē, ait ille, aſtrictionē oſtēdit, q̄ p
loturā adeo exoluit, vt ferē ad ordinē eorū accedat, q̄ citra morda-
citatē agūt. deſiccāt tñ, & ſic ēt nō eſt aſtrictionis expers. pōpholis
vel vt vulgo ſolet appellari, thuriæ itidē lotę. nā & ipſa hoc modo ab-
ſq; vllō morſu ſiccāt, habet p̄terea vī emplaſticā cū aliquātula aſtri-
ctionē, & hæc oīa vlcerib. vel ēt malignis optima ſūt. gr̄is vſti: vchemē-
tē, ait idē Gal. abſterſoriā vī habet hoc medicamētū, & mordax eſt ī
ſigniter, qđ & ipſum ſi lauetur, multū & mordacitatis & abſterſiōis
dētrahit. nō tñ tollit, qñ adhuc & detergat, & aliquantiſp mordeat

De medicamentis quibus macula in oculis ex orte tolluntur ac de eorum usu. Cap. 10.

Variæ sunt maculae quæ in oculis apparētes partim aspectu turpes sunt, partim uero oculo in videndo efficiunt. e quarum numero est quæ à Græcis *Λευκίμα* dicitur, albugo autem à Latinis, ab aliquibus uero nebula. est autem cicatrix ex ulcere corneæ ad cōsolidationē perductō, sicut. n. cicatrices aliorū ulcerū in aliis locis dē flores & duriores euadūt, & ferè callosæ: ita etiā ulceribus corneæ accidit, & quēadmodū omnia corpora diaphana, cū dēfata terminātur, alba fiūt: ita ob cicatricē accidit corneæ vt ex cicatrice, veluti ob ducto callo cōdēfata, ac quasi terminata eius perspicuitate, locus albefcat. Nō absimilis etiā interdū macula oculos obtenebrat. nā & ipsa fit dēfiore reddita cornea, sed alia rōne. nā hæc nō ex crassitudine, & dēfate ob cicatricē ortū habet: sed potius ex infarctu crassiorū humorū in ipsā tunicā. solet autē macula hæc, & veluti albugo vel nebula sequi fluxiones ad oculū calidiorū quidē & tenuiorū humorū à principio, ex quibus fiūt ophthalmiæ, & oculorū cōturbationes. qui affectus *ῥίγησις* Græce dicitur, est autē qñ rubent oculi: præcipue vero adnata & alba eius tunica venæque manifestiores & rubicundiores apparēt. qui affectus leuis est ophthalmia, vel potius initium quoddā ophthalmiæ. solēt autē in oculi inflāmationibus perinde, sicut in aliis quoq; inflāmationibus euenire, quæ p digestionē terminātur: prius, n. calidiores quæ influxerūt partes digestæ euanescent, crassiores vero, quæ & frigidiores, & quasi seculētæ sunt, remanēt, vt quæ difficiliores sunt ad digestionē, vnde post digestas inflāmationes, reliquæ quēdā remanēt duræ & solidiores. & proinde oēs antiqui medici docēt, q curatio inflāmationis circa finē eadē est q & scirrhis: ita ēt in oculis fit sæpē, vt ex reliquiis his cornea crassescat & albefcat aciesq; oculi obtenebretur & offusceatur. Tertia vero macula quæ in oculis oriri interdū solet, fit ex aliqua cōrusione p inde ut in aliis partibus dū cōrundūtur. nā dilaceratis præ cōtusione minutis, & incōspicuis venulis, sanguis quasi expressus exit in circūstātes partes, qui paulo post in grumū versus, nigrescit. ita. n. fiūt uibices, & sugillationes. Hæ itaque maculæ aliquādo curationis sunt capaces: interdū uero nequaquā. cicatrices. n. aliquādo ferè dēlētur, vt pote qñ non admodū crassæ sint, quales illæ quæ sequuntur curata ulcera, quæ non admodum profunda fuerint, sed tantum in summa membrana, & in puerili ætate, aliōquin. n. in adultis, quæ, quæ crassiores sunt, curationis non sunt capaces. Sed & albugines,

quæ sunt reliquæ præcedentis inflammationis : si crassæ admodum & indurata, inueteratæque sint, non curantur, aut ægre admodum curationem admittunt. tertię uero maculæ frequentius curari solent. Quatenus ergo ad indicationes pertinet, quæ nobis rationem, & methodum curationis demonstrant illæ eadem in uniuersum sunt, quæ in similibus affectionibus in aliis partibus contingere solent. nam cicatrices quia densiores & crassiores iusto sunt, detergentibus & quoquo modo attenuantibus quasi atterendę sunt. alię uero macule, quæ ab infarcta materia, digerentibus & attenuantibus & illis etiam quę detergant quæque molliunt. In eligenda autem materia medicinali, unde sint cõponenda medicamenta, quibus hæc sunt peragenda: semp eadē in memoriā reuocanda, quæ & in superioribus capitibus fuisse propofita: nempe spectanda esse naturam affectus particulæ, quæ facillime à ualidis medicamentis irritatur & ad inflātionem perducitur, adeoque si acrioribus oporteat uti, sicuti sepe acriora sunt necessaria, illis modeste uti oportet: & mistis cum aliis, quorum mistura possit acrimonia deliniri: ceterę uero maculæ, quæ ex infectis humoribus & crassis habuere ortum, digerentibus & attenuantibus egent medicamentis, & quandoque, qui ex alto attrahunt. Sed magis particulatim de his agamus, primumquē de illis, quæ uim habent attenuandi, & digerendi materiam tunicis oculorum impactam, aliquantulum etiam detergendi. & à facilioribus lenioribusque exordium sumemus. facillimum quidem medicamentum, & quod in tenuioribus corporibus, ut sunt puerorum, plurimum profuisse sæpius animaduerti, est zacharum quod candū uel candidum vulgo appellant, præsertim rosaceum, tritum adeo, ut in pollinem transeat, oculisque specillo inspersum. Hoc etiā mihi uisum est facile medicamentum, non parum tamen efficax. sicut & uiridia germina fœniculi, aut eius semen, quo ita uti solemus. procuramus, ut aliquis puer aut adolefcens, siue masculus sit seu femella, mastice prius fœniculum, & semen tanē uires maiores habet. deinde uero per aliquos dies exufflet in oculum. uapor. n. ex fœniculo cum aere ad oculum insufflando allitus, ipsum feriens penetrat interius, atque ita magis afficit. uim autem habet attenuandi & discutiendi. deinde uerō efficacius erit medicamentum: si post manus fœniculum oculus delingatnr summa lingua, ad quod munus aptior erit puer, ut diximus, aut adolefcens, quā senex. nam præter fœniculi uires in mandendo, contrahitur aliquantula uis conco-

ctoria

Gloria, ut enim medici testantur, tritileum malicatum magis matu-
 rat tubercula quam coctisum, præterea & salua quæ inter manden-
 dum iminiscetur, vim aliquam attenuandi habet digerendique &
 detergendi. est enim alienius salsedinis parciiceps, potest etiam hoc
 idem fieri manſis aliis quæ oculis familiaria sunt, & digerendi atte-
 nuandique facultatem habent, ut ruta, celidonia, uerbena, uel aliqua
 id genus alia, & hæc etiam utilia sunt ad atterendas albas cicatrices
 præsentim in mollioribus corporibus, ut puerorum, nam in aliis ma-
 gis detergentibus sæpe est opus. Valentius medicamentorum omni-
 bus his est id, quod ab Ioanne Mcf. litteris commissum est capite
 de albugine oculorum, maiorem enim vim digerendi habet, atte-
 nuandique & digerendi. & si opus etiam fuerit, e profundo infar-
 ctas materias attrahendi cuius confectio est, acceptis zacharo, al-
 cyonio, quod spumam maris ipse appellat, sarcochola pari singulo-
 rum pondere, ex quibus optime tritis, & leuigatis fit pulvis subti-
 lissimus, qui sæpius oculis inspergendus est. eo sæpe usus sum, & for-
 titer sanè successu, si medicamentum existimare uoluerimus vim ha-
 bere detergendi & digerendi, & materiam impactam uel etiã ex pro-
 fundo extrahendi. nam zacharum detergit, & nos zacharo solemus
 uti, quod candum vulgo appellatur, præsertim uero rosaceo, nam
 rosa oculum roborat illique familiare medicamentum est, alcyo-
 nium uero acre aliquantisper est tenuium partium unde attenuat,
 digerit, detergitque præterea, & e profundo attrahit, de sarcocho-
 la autem non est cur amplius dicamus, cū superius sit de illa habi-
 tus sermo, sæpe uero pulueres, hos succo sceniculi assumptos in col-
 lyriorū formam, & compagem deducimus, aut ex aqua ex destilla-
 tione mellis. poscimus & aliorum multorum in præsentia meminif-
 se, quæ pertinere huic instituto possent, quæque & ualēiora essent,
 ut illa sunt, quæ ex fellibus conficiuntur, & quæcunque alia ab aucto-
 ribus describuntur ad discutiendas suffusiones saltem incipien-
 tes, nos tamen in hac re his facilioribus contenti esse nouimus, nam
 illa passim descripta reperiuntur, quæ poterit nunc quisque metho-
 dum à nobis expositam insequens, examinare & in suum ordinem
 redigere, ne ergo nimis in longum nostra prouehatur oratio, hic fi-
 nem huic capiti imponamus, hoc tantum præfati, quod de medicamen-
 tis, quæ priores medici ad curandas suffusiones laudauerunt, nolu-
 mus magis particulatim aliquem alioquin sermonem habere: quia
 ut uidetur etiam Gal. 4. de comp. medicam. secundum loca inuulsi,

ea multa quidem in inscriptionibus pollicētur: sed cum ad opus de inde accedimus & ad ipsam experientiam, uel parum admodum, uel potius nihil præstant. neque enim memini me unquam uidisse aliquem, qui cum iam discerni in oculis cœpit, medicorum ope curari potuerit. quare iam aliud caput aggrediamur.

*De ratione componendorum medicamentorum quorum usu curanda sunt affectiones partium circumstantium oculis, primum-
que palpebrarum & angulorum. Cap. II.*

Affectus partiū, quæ oculos circundāt, & cōtinēt, nēpe palpebrarū cū his, quæ ad ipsas pertinet, ciliis, & superciliis, atq; earū angulis, quos *αμφω* appellant Græci: huius uero Latini, uarii & diuersi sunt, pro ratione qua multipliciter harum partium affectiones lædi possunt. nam palpebræ primum, quæ à natura donatæ sunt, ut arbitrario motu moueantur, ut ad animalis libitū aperiri & claudi possint ministerio neruorum, & musculorū, & hac ratione resolutio ni & conuulsioni possunt esse obnoxie: & si resoluantur, cadūt, præsertim uero superior, ut neque alioquin attolli possit: unde semper oculus clausus est: sin aut cōuellatur, ea ad superiora attracta, oculus nequit claudi, & is affectus *αμφω* à Græcis quasi leporis oculus dicitur, quia & id contingere possit ex aliqua duriori & maiori cicatrice, quæ in palpebra occalluerit, sed cū resolutione uel cōuulsione palpebræ laborāt hī affectus sub cōi ratione cōuulsionis, & resolutionis cōtinētur. unde eorū etiā curatio sub cōi resolutionis, & cōuulsionis curatione cōtingitur, & proinde de medicamentis cōponēdis, quæ huc spectāt, atq; subinde de eorū usu, nullū alioquin senonem particulatim hoc loco, ne nimis lōgi simus, habituri sumus. Sed propria quadā, & peculiari alia præterea rōne possunt se male habere palpebræ: unde ministeriū, quod oculis debēt, uitari pōt. nimirū. n. ex interna parte, quæ oculos respicit & attingit, quæ que & lenis & mollis est, interdū possunt fieri asperiores, atque ita dū frequēter & uelociter, mouentur asperitate hāc extimā oculi tunicā super qua mouētur, abradēdo & exasperando irritāt, illique nō parū molestiæ facessūt, & sepe dolores, & inflāmationes cōcitant, Græce aut dī is affectus *ασπριτης* Latine, asperitudo palpebrarū, cuius tres reperiūtur differentię, quarū facta est ab antiquis mentio, quæ tamen solū magnitudine uidētur differre, in primā. n. palpebræ in

uertūt dēfiores oīno factę, & inæquales, & hæc τανύς hoc ē dēfitas, vt Aetius tradit, appellari à medicis cōsueuit. Aliquādo uero crescit, maiorque & deterior fit is affectus, vt nō modo inuerſa pāpebra denſior & asperior fit reddita, uerū & eiūs planities uideat̃ qui buſdā quaſi incifuris iſterſecta. & hæc πρῆξις hoc ē, aspredo uel asperitas palpebrarū nūcupatur. huius uero eſt, & alter modus, nā in interna palpebrę planitie ſubcreſcunt quādoque papulę quę dā ſimiles ferē granis milii, & hæc quidē omnes differentiæ ortū habent à fluxione humorū acrimonię expertū. alioquin. n. eroderent palpebras & oculū. Poſtrema aut̃ aſpritudinū differentia, dī Grece οὐλὴ quaſi ſiſoſum affectum dicas. in ea. n. ſuccreſcunt papulę etiā ſed apertę & quaſi incifę, ut ſimiles uideāt̃ hianti ſicui, e quibus incifuris humor quidā emanat, unde oculi ſemper ſunt humecti. Sed ſi eiufmodi affectiones inueteraſcūt, callū contrahūt, atque tūc οὐλὴ dicitur, hoc eſt, vt ita dicō, calloſitas uel calloſus affectus. ſed & interdū inuertūt̃ palpebrę ita, ut earum eatenus uertitur figura. Grece uero ἰνuerſις à palpebrarū inuerſione dicitur cuius duplex pōt eſſe cauſa. nā uel caro ſubcreſcēs ex earū vlcere, uel crāſſior & durior cicatrix ulceri inducta atq; illā quaſi attrahens, eſt inuerſionis cauſa. Ex fluxione eūā acriū & mordaciū humorū ulcerantur palpebrę interdū: præſertim circa angulos, intumeſcūtque, & rubet̃ nō ſine inſigni pruritus, quę affectū πυρφολαγία dicitur. Latini uero ſcabroſas palpebras dicūt. à nitroſa falſaq; fluxione fit hæc affectio; vnde & oculi illacrimāt̃. Sūt etiā palpebrę uariis obnoxie tumōrū differentiis. & præter cōmunia illa genera, quę alias particulās apprehendere ſolent, has etiā peculiareſ & proprias habent. & primus quidē tumor qui frequens in palpebris ſolet oriri, Grece ὄρνις hoc eſt hordoum à ſimilitudinē grani hordei dictus eſt, qui vulgo ē hordeolū dicitur, dū. n. ſuppuratur imitatur colōre, & figurā hordeaccū granū. eſt & alter tumor, qui ī palpebris ſucceſſit ὀφθαλμία à Græcis dicitur, quaſi inflatio, & eſt cœdemia proprie palpebrarū eiufdē oīno generis cū cœdematibus aliarū partiū, & eodē modo cū illis curādus, & proinde neq; de illo lōgiore ſermonem habebimus. Tertius uero tumor eſt, qui χαλᾶς dicitur in interiori palpebra extuberans, qui dū illa inuertitur, apparet albus & tranſparens ad modū grani grandinis, à cuius etiā ſimilitudine nomen ſortitus eſt. χαλᾶς. n. grādo dicitur. fit aut̃ ab humore pituiſo eo fluētē, & ibi cōcreſcētē. emanat aut̃ ex eo: ſi incidatur liquor quidā lentus

lentus similis albo oui. postremus dicitur *λίανος* à lapide, cui sub
stantia similis est. oriuntur enim tumores quidam tophosi in palpe
bra interna, qui illam asperiores reddunt. sunt præterea obnoxia
palpebræ tumoribus illis qui melicerides, atheromata, & steatoma
ta à Græcis appellantur, ab Arabibus autem & nostris iunioribus
una communi nuncupatione omnes nodi dicuntur, quique cum &
communes sint affectus, aliis etiam partibus & eandem cum illis cu
rationem habeant, de qua priori libro abunde loquuti sumus, ideo
ab eorum tractatione in præsentia nos continebimus. Obnoxia præ
terea peculiaribus quibusdam affectibus sunt palpebræ ratione ci
liorum, quæ instituto naturæ, non sine multa eius providentia in il
lis ortum habent. interdum enim ab illis delituuntur, quod bifariâ
fieri potest, nam aut perinde, ut in arcis, confluentibus vitiis hu
moribus, ad palpebras, ciliorum radices uitiuntur, eroduntur, atq;
ita decidunt, & is affectus *κατάρρεσις* à Græcis fuit nuncupatus. in
terdum vero huic accedit callosa in palpebris duricies, & densitas
cum earum rubore, quæ affectio *πτερόσχησις* dicitur. Sed interdum ali
quis ciliorum pilus, mutato ordine à naturæ instituto, conuertitur
vel inflectitur interius versus oculum, atque illum lacerans & pun
gens irritat & illi plurimum molestus est. quâ affectionem *τριχιάσις*
appellarunt Græci. Denum autem potest & alter exurgere in pal
pebris affectus, qui nunquam potest ex se ortum habere: verum sem
per sequitur alterum affectum: nempe vlcera: plerunque autem ex
incuria medici, aut ministrorum habet occasionē. ulceratæ etenim
palpebræ: si quando diutius clausæ detineantur, vel somnum, vel
quia oculum, diu deligatum teneamus, aut illę mutuo inter se, aut
cum subiectis particulis coalescunt, nempe cum oculorum mem
branis vel tunicis, ut non facile postea diduci & separari possint: ut
nunc & id prætereamus, in præsentia, quæ cilia interdum perinde ut
capilli obnoxia sunt *φθίσις* hoc est, pediculari morbo, annascenti
bus illis animalculis radicibus ciliorum. Hirquæ etiam seu anguli
oculorum, suos habent proprios affectus à quibus infestantur. nam
cum à natura sit genita quædam in illis caruncula propter multas
commoditates, quas anatomici referunt, ab hac primum solent la
chrimæ effluere. unde has præsertim factas fuisse aiunt, ut quasi o
perculum sint illis foraminibus, qui in angulis percipiuntur, quib
us etiam pertusum est os narium usque ad internum meatum: quod
à natura factum est, ut multorum excrementorum, quæ generantur
ab

ab oculis, fiat excretio per eas partes, & caruncula illa illi foramini quasi operculum asidet. quæ interdum adeo excrefcit, ut & turpitudinem oculo afferat, & non paruam etiam incommoditatem; crefcit uero perinde, ut in vlceribus solet superuacua caro, ex nimia humiditate: confluyente enim nimio humore ad oculum. fit hæc accretio istius carunculæ, & affectus is *ἐνστάσις* à Græcis dicitur. interdum uero & contra fit: ut pote quoniam decrefcit & absumitur hæc eadem caruncula, qua deficiente, in ea parte ex congesto multo excrementoso humore lachrimæ continenter ferè fluunt, quod turpe, & incommodum non parum est. atque *πίσις* Græce dicitur is affectus, qui ortum habet quandoque ex immodico, & importuno usu medicamentorum detergentium, & digerentium, quorum tamē usus necessarius est in curatione affectuū aliquorū, tū oculi, tum aliarum partium oculis attinentium. quandoque uero ex aliqua chyrurgia incommoda, quam moliuntur incircumspecti chyrurgi, cum pterigium, quod solet in his partibus excrefcere, rescindere tentant. Est autem pterigium id, quod Arabes unguam, secus quàm Græci consueuerunt appellare. & est quædam ueluti membranosa uel neruosa substantia, quæ tunicæ uel mēbranz, quæ agnata dicitur, aggeneratur accrescitque: quasi quidam eius excessus. incipit autem eius ortus ab angulis oculorum: præsertim uero, & sæpius à maiori angulo: interdum tamen & à minori. raro sub ipsiis palpebris: sæpe adeo excrefcit, ut iidem oculi occupet quandoque pupillam eo usque ut hominem obcecet. At sequitur is affectus interdum scabritiem palpebrarum; quam *καρποφαλίας* nuncupari Græce diximus: nonnunquam autem fluxionem continuam ad oculos. Demum ex his oculorum angulis concitatur sanguinis immodicum profluium, qui tamen affectus in pueris frequentior. ob nimium enim, & frequentiore fletum multa earum partium distensione facta, sanguis erumpit. Hi ergo sunt aut omnes, aut plerique affectus, quibus externæ oculos continentes partes obnoxie esse possunt, de quibus curandis per propria medicamenta sermonē in præsentia sumus habituri, ut tamen in his id ipsum moneamus, quod in aliis monuimus: nempe quod cum omnes propemodum habeant ortum ab humorum fluxione, tum hæc de causa, tum etiam, quia multorum horum curationem aggredi oportet remediis, & medicamentis acrioribus & sæpe dolorosis, quæ si corpus & caput quomodo plenum reperiunt, possunt fluxiones, & inflammatio-

Victoris Trincauellij

nes concitare: necesse est vt plerūque corporis uniuersi, ac deinde capitis uacuatione purgatio ue præcedat. de qua tamē re particulatim agere non pertinet ad præsens institutū: Sed tantum de externis & localibus medicamentis & de eorū cōpositione & usu, quibus istius modi affectus curari à medicis solent: quando curationis sunt capaces. nam aliquando tales sunt, vt curationem admittere nequeant. aliquando uero uniuersum momentum, aut saltem maior curationis pars, potius in manuali opere consistit, quàm in medicamento-
rū usu. de quo tamē medico instrumento agere, in præsentī cōmentario ad nos non attinet. sed ut rem hanc quatenus ad curationē horū affectuū pertinet, non excedendo tamen instituti nostri fines tādē expediamus, & id quàm breuius poterit fieri, hoc in primis erit considerandum, vt facile possimus eos scopos inuenire, qui maxime in medicamentorum his malis curandis accommodatorū cōpositione, usuque sunt spectādi, q̃ horū affectuū alii sunt, quorū uniuersa ferē ratio in additione cōsistit, alii uero in defectu uel detractione, uel imminutione partis alicuius quæ ad partē culæ integritatem necessaria uel plurimum uilis est. aliis præterea, in trāsmutato naturali temperamento istarum particularum, & id uel cū materia, uel citra materiam, & pro horum diuersa ratione diuersæ etiam insurgunt, & indicationes, & scopi. In additione consistunt trachomata uel aspritudines crithæ seu hordeolū, chalaziam. item & lithirasis, top hæccus nempe tumor, præterea qui ab Arabibus iunioribusque nostris nodi dicuntur, & encanthis, pterigiumque, & euerisiones palpebrarum quæ cetroopia à Græcis dicuntur. in defectu uero rationem suam habent, madarosis, & ptilosis, & quæ à fluentibus continenter fere lachrimis rhæas à Græcis dicitur. immutatione temperamentis consistunt inflammationes, conuulsiones, & id genus alia. Quæ in additione alicuius rei præter particulæ naturā consistunt, nobis indicant, id, quod superuacaneum est, detrahendum esse. vnde statim is scopus insurgit absumendum & detrahendum quicquid supernaci additum est. sed hoc fieri duplici ratione potest. nam aut manuum operatione, aut ope medicamentorum. & si hæc à nobis recte sunt estimanda, hoc aduertendum, quod cum affectus hi recentiores, & molliores sunt, possunt medicamenti quidem satis etiam moderatis, non multo etiam negotio tolli. At uero cum inueterascunt & indurantur, difficilior est eorum curatio, & interdum etiam nullam curationem admittunt: imo ex illis
non.

nonnulla sunt, quæ à curatio irritantur, adeo naturæ malignæ sunt, ut in prauos effectus & longe deteriores transcant. plerique vero non nisi aut per chirurgiam, aut acerbis & exardentibus medicamentis. His autem & id accedit considerandum, quod quamuis hi effectus tam ex propria eorum natura, quàm ratione particularum quæ primum affectæ sunt, non uideantur multi esse momenti: si cū illis conferantur, qui primum oculis attinent: cum neque tantæ dignitatis, neque ita exquisiti sint sensus sicut oculis; paulo tamen maiorem cautionem, & respectum requirunt quàm ipsimet oculi si non propter se: saltem propter oculos, utpote quoniam uix fieri potest: imo fieri nequit, ut si sit opus uti acrioribus medicamentis ut quod superuacuum, tollatur in his particulis, quin, & oculi ab illis irritentur, cū nemo possit ulla ratione cauere, quin in oculum affusa, uel adhibita medicamenta non illabatur. & proinde medicorum multi & illi quidē præstantes eo deuenere, ut uariis potius instrumentis chirurgicam potius quàm medicamentariâ medicinæ partē spectantia uterentur, ut detraherent, siquid his particulis accrescens emineat, nā, ut ab aspritudinibus palpebrarum incipiamus, antiquorum aliqui solebāt inuersis palpebris, quod summis digitis faciebāt, concauo specilli deradere eminētes asperitates, mox uero humorem qui inde emanabat, molli spūgia exceptū exiccare, atque in hūc modum nitebantur particulā ad leuitatē, & equalitatē reducere. nonnulli autem quoddā marinorum piscium corio utūtur, squittinæ credo, quod asperius est in summa cuticula perinde ferē ut lima. illa. n. detergūt & fricāt inuersas palpebras, atq; ita asperitates detrahūt & æquāt. Fuere quidā ex præceptoribus Gal. qui quoddā aridū colliriū cōfere, quo utebātur ad palpebrarū aspritudines, & erat cōmodū & satis generosum medicamentum. consueiebant autē ex pumice exquisitissime attrita, & leuigata, ut omnino pulvis euaderet expertus cuiuscūque asperitatis, & ut lenior redderetur, addebāt aliquid aut gummi, aut tragacanthæ. sed quia hoc iā ad medicamēta pertinet, hoc est in primis aduertendū, qđ in his affectibus, qui à fluxione ortum habēt, & ea quidē acri, primus, & princeps scopus, ut sæpe diximus, est, fluxionē antea sistere: id autē uacuatione reuulsioneque, ut superius fuit expositū. Itemque colliriis huic officio apud, de quibus satis abunde in præcedentibus fuit actū. Deinde, & illud considerandū, qđ cū simplices sunt hi affectus, non admodū difficile est rationem inire eos curandi, quia simplex est etiā curatio. postquā. n. fluxio cōstitit

Victoris Trincauellij

stitit. incipiet medicus, vel quando etiam consistere incipit, ex illis uti colliriis quorum talis sit facultas, qualē nobis scopus demonstrat, quæro indicatio deprōpta à natura illius affectus obtulit, donec integre sit sanitas parti affectæ restituta. Sin autē sit aliquis plurimū affectuū cōplexus, nō est ita facile, cū sæpe dū alterū volumus accommodatis curare remediis, alterū magis irritamus, exacerbamusque. Quod ut exēplis clarius reddamus, ponamus, qđ simul sint aspritudo palpebrarum, & ophthalmia, difficile admodum erit instituere eā curandi rōnem, qua utrisque præsertim inter initia inflāmationis conferre possumus, cum diuersa admodum & pene contraria remedia exigant, ita etiam si sit complexus aspritudinis, & vlcē in tunicis oculorum. nam aspritudo detergentibus, & digerētibus curanda esset statim à principio. quæ vero detergent si vim aliquam vel etiam mediocrem habeant; & vlcera augent & dolorē in ipsis concitant. inflammationes etiam inter initia exacerbant, quæ repellentia potius requirunt, neque etiam quæcunque, sed quæ tum refrigerant, tum vero quæ ut superius diximus, emplastra sunt, quibus detergentia aduersaria sunt. Sed quia nimis esset longum, & tedio afficiemus lectores: si omnes complexus vellemus exponere, hi qui propositi sunt tanquam exempla sunt accipienda, & descripta communi methodo, quia tractandi sunt in his cōplicationib. diuersi hi affectus: particularim de ratione curandi vnumquēque propositorum affectuum agemus. cōis itaque methodus, quantum in lib. meth. Gal. in vniuersum, tum vero magis particularim, nempe quatenus ad curandos hos istius particulæ affectus pertinet, in 4. de comp. med. secundum locos explicauit: ista est, ut expendamus primum, quis eorum affectuum, qui in vnum conuenere, maioris negotii, & momenti sit, illique prius, & magis incūbamus: ita tñ, ut q̄to minus fieri poterit, alteri officiamus. Ut eā exēpli, in his iā propositis, longe magis vrget tñ inflāmatio, quā vlcus, q̄ vrgeat asperitas palpebrarū, quia si inflāmatio, minoris fieret, posset in abscessum desinere, quo deinde rupto: si aliquanto esset insignis: nō mō efflueret pus, sed humores quoque proprii, ex qbus coagmētata est substātia oculi, & id ipsum ēt euenire posset: si neglectū vlcus pfundius, per insigniter detergentia fieret. Vnde longe p̄staret, ut vlceris, vel inflāmationis curationē statim aggredere mur, aut oīno postposita curatione aspredinis, aut maxima ex parte, statim inter initia, nisi interdum si in vniuersis leuissimæ palpebris,

palpebris, velimus aliquo collirio, nō quidē fluido, illas fricare, sed potius solidiori, ut illud est, qđ ex tritis leuigatisq; pumice, oleiq; sepiæ addito tragacantho vel gūmi aqua dissolutis cōficitur, cuius paulo supra mentionē fecimus. cū vero inflammatio cōperit inclinare, vel itidē vlcus, pnt ea quæ vim detergendi, interdū etiā insignē habent immiscere colliriis, cæterisq; medicamentis, quib. ad inflāmationes, vel vlcera vtetur medicus. Gal. illis vtēbatur, quæ ab aliquib. dicūtur colliria ex vino, à nonnullis ex croco, quorūq; paulo post institutū cōfectionis descriptionisq; exponemus. Sed tādē ad princeps nostrū institutū redeamus, & gñales rōnes horū omniū affectū illis, quæ hactenus explicata sunt, apponamus: incipiamus aut ab illis, quæ in adiectione vel accretione alicuius sūbæ, pter tñ rōnem naturæ cōsistunt hæc, ut paulo ante diximus, hunc scopum nobis offerunt absumendū, aut detrahendū qđ accreuit, aut adiectū est: id vero, vel medicamentis: si id quidē cōmode, & sine periculo possit, erit agendum, vel instrumentis ad manualis operationis rōnem pertinentibus: sed de his tanquam quæ ad præsens institutum non pertineant, nō agemus in præsentia. Medicamenta aut, quæ in his affectibus curandis in vsu esse solent, & in reliquis oculorum morbis collyria ab antiquis, præsertim Græcis, dicuntur, quæ varia admodum sunt tum natura, & facultatibus, tum vero consistētia & compositionis ratione. Sed si ad propositum scopum respiciamus, oportet, ut ea quæ accommodari horum curationi debent, omnia uim extergendi manifestam habeant, & interdum pro ratione difficultatis affectus etiam exedendi ea quæ accreuerē, plus autem minusve pro ratione, magis minusve inueterati, & indurati, morbi: hoc namq; cōfectio eorum colliriorum, quæ à celebrioribus medicis litteris mandata reperiuntur, pollicentur. ea uero & ascribemus, & postea adiecta censura examinabimus. & quia si indicationes & scopus in affectibus propositos respicere uoluerimus: nemo sit qui non possit facile aspicere, quod uel omnia, uel pleraque illorum, quæ priori capite litteris tradita sunt, ad tollendas oculorum maculas, possunt & præsentibus affectibus, de quibus in præsentia sermonem instituiamus, aptari, quæ cū & leuiores sint, erunt et aptiora illis: curandis, qui faciliores curati sunt, aut quæ tenuiores recentioresque sint, aut quia corpora male affecta molliora tenerioraque sint, vel ob ætatem, ut pueri, vel ob sexum, ut mulieres, vel ob modum & rationem vitæ, eiusq; instituta, ut nobi-

ris drag. i. s. coquantur semina papaveris ex aqua, deinde succus ex illis tritis expressus cæteris iniciatur. ac oīa deinde vino amineo leuigentur. Addit, & tertiū quod ita conficitur. accipit æris vsti, cadmię singulorū drag. 3. lapidis hæmatitis loti drag. 2. croci, myrrhæ, aloes, ammoniaci singulorū drag. 1. lycii indicī, spicę nardi singulorū drag. 4. piperis albi grana. 50. acacię drag. 3. gūmi drag. 1. leuigentur ex phalerno vel amineo vino. addemus nos & quartū qđ ex Alexan. Tralliano descripsimus, quod istis satis simile est facultatibus, attñ nec ipsum est alicuius acrimonię expers. conficitur autē acceptis æris vsti dra. vj. cadmię, 3. iiii. opii, croci, zingiberis, gūmi sing. 3. ij. assumūtur uino aut medesimo unguēto. Sed post hæc aliqua ex Gal. ēt defumamus li. 1. de cōp. med. sec. 1. & ex Arabibus postremo aliquibus decerpis si cōmoda huic negocio videbūtur, illa tuo collata examinabimus, digeremusq; in suos ordines, ut hoc mō deinde, de eorū usu ex methodo agere ualeamus; & quia ubi agit de rōne curādī palpebrarū aspritudines, meminit collyrii trachomatici ex vino vel crocodis seu crocei quod paccianū appellat, utpote quod illi fuerit in frequentiori vsu (inuenimus autē inscriptionē collyrii ita se habentē, collyrium asclepiadeum Pacis) hoc aliis superius descriptis ascribemus. eius ergo cōfectio in hunc modū se hēt. Accipiūtur cadmię, æris vsti, croci, squāmę æris, sing. drag. vi. myrrhæ, spicę nardi, rosarū aridarū, opii, lapidis hematitę sing. drag. iiii. piperis albi gr. xii. gūmi drag. vi. vini Chii quātū sit satis, fiat collyriū. eius aurem vsus postea sit ex ouo, nēpe eius albo. describit paulo post aliud crocode, vel crocū collyrium, quod leontinum appellat, quodq; minorem morsum, & acrimoniam videtur asferre, describitur vero ita à Galeno spodii cyprii 3 vi. croci 3. iii. mirrhę 3. i. s. lapidis hemat. 3. i. opii 3. i. s. piperis albi gr. iiii. gūmi 3. vi. omnia leuigata excipienda sunt vino falerno. apud Arabes duo erāt collyria in multo vsu à Rasi 9. ad Almanf. descripta, quorum alterum, quod rubeum ab illo à calore appellatum est, tanquam facilius propositum est, cuius vsu laudatur quando non sunt admodū indurata & inueterata hæc affectiōes. alterū vero quod uiride ab illis dicitur. tanquā acrius ualde est, & in usu erat in difficilioribus, & magis inueteratis, utpote quod priori sit acrius, & fortius. horū meminere Mes. & Auic. Rubrū ergo accipit lapidis hematitę, atramēti sutorii seu chalcātī vsti, sing. 3. iii. æris vsti 3. ii. mirrhæ, croci, sing. 3. i. piperis lōgi 3. s. ex oībus leuigatis, & uteri uino aspersis fiat collyriū.

Lib. 1. ubi de oculorum affectibus agit.

Cap. 7. uerfus finem.

Accipitmedietatētandem totius dosis.

Oo Viride

Viride vero accipit æruginis drag. 3. atramenti. sutorii. vsti drag. 6. sandaracæ, quam arsenicum rubrum appellant, nitri, alcyonii singulorū drag. 1. salis armoniaci drag. 5. ammoniaci qđ thimiamæ gręci vocāt drag. 2. modus cōpositionis est, vt ammoniacū dissoluatur ex succo ruthæ, qđ deīde inspergatur cæteris prius leuigatis, ac sub inde cōficiātur collyria. Si vero hæc recte volumus in examē deducere, primū qđ ex pumice additis tragacātha vel gūmi, cū nihil acris habeat medicamēti nisi pumicē, qui si vratur tenuitatē partiū maiorē sibi cōparat, si Gal. 1. 1. de fac. med. simpl. credere volumus, & aliquid acrimoniæ, quā tñ lotus deponit, semp tñ detergit & id duplici rōne, tñ p̄tia sua facultate, tñ ēt suæ substantiæ asperitate: non est tñ adeo acre, quā eo optimē leuigato nō cōsueuerint vti prisci medici citra ēt misturam alicuius alterius quo leniatur eius asperitas, quia aut nullū aut exiguū morsum habeat, sed lenius medicamētū erit si tragacāto, vel gūmi dissolutis assumatur ad cōpagē collirij, addito autē osse sępiæ, quod & ipsum & vri pōt, & eandē rationem cum pumice habebit, & nullo modo expertū ignem potest venire in vsum, cum sit tenuium partium, vt facilius in profundum possit se indere, valentius erit medicamentum. nam ait Gal. eodē 1. 1. addito fossili sale detrahare potest id quod pterigiū Græci: vngulā vero Arabes appellāt, neque tñ adhuc collyriū hoc erit insigniter acre, & mordax. Sed Pauli collyria atque alia subsequētia longē vehementiora acrioraq̃ue sunt, vtpote quæ ea accipiunt, quæ vehementiora sunt: imo vehementissima medicamenta, quæque non modo detrahendi: verum deradendi ac exedendi vim hābent, & ea præterea, quæ potenter possunt attenuare digerereque & à profundo attrahere, & etiam quæ valenter alstringunt. Quæ omnia non carent insigni morsu, & proinde habita ratione naturæ particulæ requirunt insignem apparatus, vt obtūdatur mordacitas, à qua vehementer excitantur dolores, qui occasione deinde sunt, vt, & fluxiones, & inflammationes concitentur. Vnde si omnes has istorum collyriorum confectiōes diligenter velimus extimare, earum omnium fundamenta, vel, vt iuniores loquuntur, bases sunt mineralia ea medicamenta, quæ acerrima sunt, & nullis aliis in detergendo sunt secunda, atque non modo detergunt: verum deradunt & exedunt, & quasi urunt, vt atramentum sutorium, chalcitis, misy, sory, sandaracha, quam arsenicum citrinum vocant vel rubeum, æs vstum, squama crīs, ergugo, & si quid præterea istiusmodi

modi generis sit. secundum vero locum tenent, quæ valide attenuant, & digerunt, & suarum partium tenuitate & caliditate in profundum se possunt indere, atque inde immerfas infarctasque materias extrahere. Sed multis deinde opus est, quæ demulceant, & quoquomodo temperent tantum horum acrimoniam & fluxionem, quæ inde posset concitari, doloreque arceant, acrimoniam demulcent, quæ, ut superius exposuimus, emplastica appellantur, ut sunt tragacantum, gummi, & sarcocolla, cadmia lota, lapis hemarites, & schistus, cerusa lota, pompholix lota, & multa alia, ut albu ouï, decoctum fœni græci, sed quæ concoctoriam vim habent prosunt ad mitigandam acrimoniam, ut thus, crocus, & aliquantum etiam myrrha & multæ alix arborum lachrimæ. arceant vero inflammationes, quæ astringunt, in oculis autem inodeste id faciunt & vtilia sunt, sicuti rosæ, & earum flores & fructus, mastix, crocusque, lycium indicum, cytini, acacia, omphacium, & alia multa id genus. Dolor vero bifariâ sedari potest, quia, aut illis, quæ proprie anodina: quasi dolorem remouentia dicuntur, quæque parumper calida sunt, & inodeste molliunt, & ea de causa etiam concoquunt, nam tum omnibus aliis affectibus concoctio est commodâ, tam etiam dolentibus maxime vtilis: præterea quæ obtundunt acrimoniam humorû qui dolores concitant. Alio vero modo dolorem leuamus, sed non proprie, quando stuporem afferimus dolenti particulæ, obtundimusque sensum, ut dolorem: licet ad sit doloris causa, & ingens, non tamen, sensus factus obtusior & quasi obtenebratus, illum percipere quit. quod præstant, quæ narcotica, quasi stuporem uel torpore inducencia, a Græcis dicuntur, ut papauer, opium, mandragoræ radix, hyoscyami semen, & si quodpiam aliud est id genus. in his ergo descriptis collyriis accipiuntur ex omnibus his generibus medicamineta, nepe ut omnium ppositorum scoporum habeatur ratio. quæ deinde varia sunt secundum efficaciam, & vires, sed hoc existimandum indicandumque est primû examinato eorum vnoquoque scorsum. deinde vero illis et mutuo inter se collatis, ut possumus perpẽdere quantum de vnoquoque per eâ detrahatur, quantumque et interdum additur, quantumque per apparatus, aut acriora, aut mitiora quædunt. Paulus ergo in malabatrino suo collyrio, quod isotheu, hoc est deo equale appellari dixit, componit cum dragmaris vlti, & loti, octo, cadmiæ, quæ aliquantisper detergit & siccât, tñ ferè citra morsum: adeo ut Galenus 4. de fac. simp. medi. dixerit, eam, si exquisitè fuerit lo

Cap. 5.

ta: numerari posse in emplasticis medicamentis, eius mistura potest
 nō parū leniri, & tēperari mordacitas & acrimonia, æris vsti, cuius
 operatiōe maxime egēt hi affectus, cum sicut idē dixit 4. de cōp. me
 dic. secūdū loc. sit vehemētis absterforiæ facultatis, & mordax ēt
 medicamentū, quīs dū postea lauatur, plurimū mordacis deponit.
 quare cū illi cadmia copiosa addit lōge ēt magis mitescit, vt iā satis
 mite fiat medicamētū. foliū vero, lyciū, crocus, aloes pter myrrhā,
 vbi cū ære vsto astrigēdi vires hēnt: myrrha vero itē, & crocus lyciū
 q; indicū, foliū, nardus & castoriū cōcoquūt & digerūt, vt ē profun
 do euocare ēt aliqua ipsoꝝ possint, vt castoriū, & attenuare. deter
 git ergo hoc medicamētū, digerit, repellit influētes succos, pterea
 vero concoquit ēt & digerit. vt oī rōne citra dolorē possit admini
 strari, additū est opiū. est ergo satis facile medicamētū, & tāta cau
 tione cōpositū; propter oculū, cū quo plurimū exteriores hę par
 tes consentiunt. Alterum vero longe acrius est, & qđ duriorib. cor
 poribus, & vetustioribus affectionib. magisq; caute est administrā
 dū, accipit. n. duo admodū acria medicamēta: nēpe æs vstū, & chal
 citim, neq; tñ addit qđ sit lotū, neque qđ chalcitis usta neq; lota sit.
 vnde secūdū vniuersas vires & integras voluit hęc in hunc vsum
 venire, vt tñ aliquo modo eorū acrimonia remittatur, addunt cad
 miam, quā neq; lauari pręcipit. illota enim magis detergit & acri
 monię non est expers. hematites autē & schistus lapis, qui omnino
 emplastici sunt, aliquanto plus obtundunt vehementiam morsus,
 & quoquomodo repellunt. sed dū pterea a chalcitide & vsto
 ære in hoc munere adiuuātur, propter eorū insignē astringentem,
 maior sequitur. reuulsio. His pterea addēdū, quod i primo collyrio,
 medicamenta erant aqua pluuiali assumēda. nā hęc est in frequēti
 oꝝ vsu in cōficiēdis eiusmodi collyriis, quæ & ipsa pōt aliquantulū
 acrimonię detrachere, in hoc altero aut vtitur vino salerno vel ami
 neo, quæ calidiora, & potētiora sunt, & potius addunt, qđ detrahāt
 vires medicamēti. qbus, & id accedit, qđ in priori accipitur opiū, qđ
 lōge vires habet maiores, quā succus seminiū papaueris post deco
 ctionē expressus quo in hoc vtitur, nihil autē in hoc accipitur quod
 concoquat vel emolliat. Tertium vero longe minus acre, & effi
 cax est secūdo. forsitan autem: si ita exquisitè conficiatur vt de
 scriptum reperitur, nō est admodum viribus & efficacia differēs a
 primo. nā i hoc differūt duo hęc, qđ hoc de quo loquimur i pſentia,
 aliquanto primo acrius, & magis detergens: nam primum
 accipie-

accipiebat αs ustum, & lotum: in hoc uero nulla fit loturæ mentio, qđ aliquantulū refert, in illo iniicitur castorium, quod digerit, attenuat, & concoquit, in hoc uero piperis grana. 50. sed additur ammoniacū, qđ insignē vim habet emollicendi & mitigandi vt ait Gal. 10. de comp. med. secū. loc. cui, & gūmi additur vt cōtēpere- tur aliquāto eius calor. vnde erit satis accōmodatū medicamētū sicosis & cōliosis affectibus, vbi sit aliqua emollicione opus. Quartum vero quod ex libris Alexandri descriptū fuit, tertio satis simile viribus esse videtur: mihi tñ nō nihil acrius illa, videtur. nā cum αs vltū pondere superet ipsam cadmiā, nō pōt ita temperare eius acris & vehemens deterfio. deest præterea in hoc lapis hematites, qui et ipse pōt acrimoniā gris delinire. sed neq; eas vires concoquēdi, & digerendi hēt, quas prius: neq; ēt molliēdi, neq; ēt repellendi. nā in hoc nō concoquit nisi crocus, non astringit præter αs vltū nisi crocus, nō digerit nisi zingiber & aliquantulum crocus: vnde in quibus præsertim sit deterfio necessaria vtile erit medicamentū. Quatenus ad paccianū collyrium, quod Galeno videtur in multo fuisse vsu: mihi videtur medicamentum viribus quidem efficax, sed adeo tēperatum, vt neq; possit plurimū mordere, & irritare assectas particulas. nā quę sunt veluti bases istius collirij, sunt αs vltū & αris squamma. quę si cōferantur cum reliquis, sunt simul accepta quanta totius cōpositionis pars. horum medicamentorū demulcent cadmiæ drag. vj. & totidē lapidis hematitis, itemq; & gummi, quę in pondere illa in sesquialtera, proportionē, in sesqui tertia vero exceditur ferē à tota. sed & adiuvantur ēt à concoquentibus ea, quę mitigant, nēpe à croco & myrrha, quę præterea ad digestionē, & attenuationem faciūt vna cum albo pipere, qđ item ē profundo: materiam potest attrahare. vnde potest quidem satis valide detergere citra tamen morsum, qui possit admodum irritare affectas particulas, repellat etiam modeste. nam astringunt mineralia, rosę & crocus. nihil tamē accipit quod possit mollire: vnde ad callosas induratasq; affectiones non videtur posse esse plurimum vtile medicamentum: quamuis autem ad componendum collyriū velit omnia assumi, vel leuigari astuso vino, eo tamen esse vtendum ex oui albo, ut ita etiam lenius, & mitius reddatur. Alterū uero ex descriptis à Gal. desumptū, qđ leontanū fuisse nūcupatū ait, mihi facillimū videtur, i quo est leuis admodū uis deterforia rōne myrrhę, quę aliorum cōparationē admodū modica est. aliquid etiam

digerentis facultatis ex pipere albo, quamvis fortasse potius appo-
situm est, ut adiuuet alia ad penetrationem in profundum. crocus
vero concoquit, unde mihi videtur, quod mite sit medicamen-
tum, per quod ad aspritudines, & ceteras affectiones, quæ detractio-
ne & deterfione insigni egeant, sit parum efficax, & illud, quod pos-
sit accommodari recentibus teneris nuperque incipientibus affec-
tibus, magisq; illis aptum sit, quibus exiccatione, & digestionem cum ali-
qua repulsione sit opus, ut sunt ulcera & quæ h. s. ob continentem
lacrimarum copiam, exuberantemque dicantur. Et Gal. quidē inter
hoc & prius, aliud descripsit, cui nomen nectarii inditum erat. cuius
qui dem cōpositio similis est cum pacciana, nisi quod aliquanto for-
tius hoc esse videtur. nam addit æri vsto, & squammæ eris misy assis-
verum si ita conficiatur verumque ut præcise scriptum reperimus,
non intercedit multa differentia inter illa, quia in hoc nectario ac-
cipiuntur æs, & squamma vsta, & lora. in pacciano nulla loturæ sit
mentio. cum autem non lora accipiuntur acriora & efficaciora sunt.
in misy vero nulla sit lotionis mentio, & cum ex pacciano si cum
nectario conferatur, possit facile nectarium in examen & iudicium
reuocari ideo parentes tempori & prolixitati nullum præterea vo-
lumus de eo habere sermonem. Sed transibimus ad collyria quæ ab
Arabibus multi facta sunt. primumque collyrium, quod mihi om-
nibus aliis prioribus acrius videtur, cuiq; nō possit esse locus cō-
gruens, nisi in pertinacibus admodum & inueteratis affec-
tibus, nam accipit, aliorum comparatione. magnum atramenti futuri
pondus, est enim ferè quarta totius compositionis, quod acetri-
mum est omnium metallicorum medicamentorum. cui sextam ferè
totius medicamenti partem addit æris vsti. neque addit aliquid,
quod possit horum morsum obtundere & mitigare vel emollica-
natura, nec alia rōne nisi hematitis lapidē, quē pari pōdere cū atra-
mento commiscet, & crocum, & myrram, quæ nisi quatenus conco-
quūt, possunt quoquomodo dolorē lenire. & morsum nā & opium di-
mittit. Vnde raro eo auderem uti nisi in rusticis & duris admodū
corporibus. vel eis factis fluidis & liquidis simis, ex aliquo liquo-
re lenissimo dilutis, ut lacte vel albo oui vel aliis id genus, de qui-
bus facta est mentio superius. Sed & postremum, quod viride dici-
tur & à calore, quo ab ærugine afficitur nuncupationem sortitum
est, acerrimū omnium priorū mihi omnino videtur, accipit erugi-
nem, & atramentum vstum quidem copiosum, ut parum à medie-

tate totius compositionis deficiat, quæ ambo ad detergendum, vel potius ad exedendum efficacissima medicamenta sunt: nam grugo fortior est præ usto, quibus paulo inferior est sandaracha, de qua non multa dicemus, cum illius parum admisceat; & hæc omnia nihil habent, quod emollire possit acrimoniam, & ut ita dicam, uiolentiam eorum, nisi duas dragmas ammoniaci: nam & nitrum, & sal ammoniacum, & alcionium non parum habent acrimoniarum, ut superius fuit a nobis expositum, neque ea minus in oculorum vel palpebrarum affectibus egent aliis, quibus leniantur, quam quæ ipsa possunt hæc corrigere, & quasi hæc minus quam par esset viderentur acria, præcipit ut ex succo ruthe dissoluatur ammoniacum. noluit etiam addere aliquid opii aut alterius medicamenti istius generis: unde affectionibus plurimum in ueteratis & induratis, in corporibus etiam durioribus poterit admitti eius usus: in detergendo enim efficax admodum erit. Sed & digerendi uim habet satis insignem propter nitrum, alcyonium, & sal ammoniacum & rutam: aliquam etiam emolliendi induratos affectus ex ammoniaco. addimus tam oportere medicum esse admodum oculatum & cautum in usu eius, & si, in quo alio, in hoc esse seruanda antiquorum medicorum præcepta. primū, ut paulatim particulam huic medicamento assuefaciamus, & si eo sit affricandus locus affectus, dū incipit: breui temporis spacio id agat, ne nimis irriteretur locus. deinde uero ut locus aliquo liquore mulcenti & emollienti foueatur, atque ita paretur, ut facilius fiat operatio pharmaci. postea uero, si qua facta sit irritatio & dolor excitatus, aliqua alligentur oculo, quæ dolorem sedent, & inflammationem arceant, ut essent album oui exceptum bombice aut lintheo aut lana, vel cataplasma ex medulla panis macerata lacte præsertim muliebri, vel simili alia re, quorum facta est superius copiosa mentio. Et quatenus ad eorum affectuum curationem, quæ in quadam alicuius substantiæ aditione, vel incremento consistunt, quantum ad præsens institutum pertinet, hæc mihi satis esse videntur. De illis uero, quæ de tractione & defectu uniuersam suam rationem habent, non est opus longo admodum sermone, nam (ut a rhæde incipiamus, quæ nihil aliud est) nisi ablatio, aut absumptio caruncula in angulo oculi ad nares, qua ablata effluunt continenter lachrimæ, quæ & molestiâ & turpitudine afferunt, non exiguis affectus si penitus ablata, aut deleta sit ea carúcula, nullâ potest admittere curationem, quæ illa

ferro abraſo, vel perforato terébello, aut exuſto ignito aliquo iſtru
mēto. quare neceſſe eſt, vt à calidiorū humorū fluxione ortū habe-
at, & tādē ad inſlāmationis genus pertineat. quāuis difficilis ab oib.
ſit habita eius curatio talis, vt nō in fiſtulā abeat, nō eſt tñ ita diffici-
lis quin aliqui interdū fuerint curati: ſi res diligenter inter initia
fuerit tractata, in quibus neq; in abſceſſum, neq; in fiſtulā trāſierit.
cur autē facile primū in abſceſſum mox in fiſtulā trāſeat hoc tuber-
culū, in cauſa eſt natura iſtius particula quæ ex tenuibus partibus
exanguibusq; coagmentata eſt, quæ ob inopiā natiui caloris neque
unt facile adminiſtrare ac digerere inſluētes ſuccos excremēticioſ.
Sed, & ſubiectū os quod & exile eſt molleque, & rarū, facile corrū-
piur ab excremētis & pure, quæ proxime illi incūbūt. Curandi ve-
ro ratio nō eſt admodū diſſimilis, a curatione affectuū oculorū qui
a calida fluxioē excitari ſolēt, & parū minorē cautelā requirit, q̃ illi,
qa neq; fieri ferē pōt ob vicinitatē, quin & medicamēta loco affe-
cto adhibita nō cōfluāt in oculū, & cū in abſceſſum cōuertitur ſem-
per in angulū & oculū pus cōfluit, qđ illū nō probe afficit. Vnde q̃
ſuperius de illis dicta quātū ad curationē pertinet, hic in memoriā
reuocāda ſunt: nimirū. q̃ ſtatim inter fluxionis initia illi tenuiori vi-
ctu ſit occurrēdū, itēq; reuulſionib., deriuationib; q̃ tū p manifeſtā
vacuationē, tū vero citra illā. Quatenus vero ad localia medicamē-
ta, nemini obſcurū eſſe pōt, accōmodata eſſe ſtatim inter initia illa,
q̃ vī habēt refrigerādi & aſtrīgēdi, vt fiat repulſio ab affecto loco cō-
fluētiū ſuccorū. dūmodo ea talia ſint, vt nequeāt irritare & exaspe-
re oculos. vnde illa aptari poterūt, quorū in oculorū affectib; ad re-
pellēdas fluxiōes facta eſt mētio, q̃ eligēda erūt pro ratione magni-
tudinis morbi & impetus fluxionis. poſtea vero increſcente tuber-
culo, his aliqua erūt miſcēda q̃ tū digerere, tū cōcoquere poſſunt:
poſtremo vero validis diſcuſſoriis incumbendum: modo citra
morſum id facere poſſint ne exacerbetur oculus. Sed vt hęc exēplis
exponantur, quædam, quæ mihi ſuere in maiori vſu, in præſentia de-
ſcribā. accipio ergo collyrii albi, quod ſuperius ſuit deſcriptū. Ḃ. s.
roſaceum aridatum, aloes, thuris, corallorum rubeorū paratorū ut
paſſim parari ſolent, ſingulorū Ḃ. s. terātur oīa exquiſitiſſime, ac
albo oui aſſumantur, atq; lineo pāniculo excepta apponātur, mute-
tur autē medicamentum mane & ſero. at vbi res vltcrius verſus
vigore progrediatur, de repellētib; detrahēdū ac digerentib; addē-
dū & cōcoquentib; quare illis aliquid, vtpote ſcrapulū collyrii, ſeti

ut Arabes aiūt sief de thure illis addo; eius semper aucta copia, quāto magis ad uigorē res accedit, ut mox ubi aut omnino, aut ex maiori parte videtur cōstitisse fluxio, & solis discutientibus ac ex parte coquētib; res est tractāda, parare solitus sum cataplasma ex myrrha, Aloe & thure, acceptis singulorum paribus portionibus, & illis assumptis decocto seminum scēni Græci. Antiquiores vero me dici quemadmodum Aetius ex sententia Seueri testatus est, ad discutiendas induratas & difficiles ægilopas, utebantur magis illis emplastris, quæ eo tempore erant in multo honore & nomine, ut erat emplastrum barbarum descriptum à Gal. secundo de compositione medicamentorum secundum gen. cuius nos etiam in priori nostro comentariolo meminimus. item & illo quod Athena nuncupabatur, eodem item secundo relatum, & quod de salicibus, cuius confectio quinto eiusdem operis libro exponitur. & aliis plurimis quæ efficacissima sunt, præsertimque in eo libro de compositione medicamentorum secundum genera referuntur. inter simplicia autem medicamenta quæ summo opere laudantur ad digestionem ægilopis, est succus herbæ eiusdem cum affectu nominis. ita dicta vel propter similitudinem quā cum eius semine habet is affectus, vel propterea quia vires habeat discutiendi ægilopas. Plerunque vero ad integram huic particulæ sanitatem restituendam, necessaria est manualis operatio: nimirum ut aperto loco usque ad os, quod solet sæpius uiciari & male affici à pure & vitiosis ichoribus illi insistentibus, adeo ut nequeat consolidari locus ita ut stabilis diu sit cōsolidatio, nisi abscedat ab osse quasi desquamato pars male affecta, ut autem illa abscedat, aut scalpello deraditur, aut terebello perforatur, aut ferro candenti inuritur. Sed de his agere non pertinet ad præsens institutum, unde ad alia transeamus. Non longe ab hac parte solent præsertim ex contusione, sub oculis, statimque sub ipsis inferiori palpebra in ea molliori & laxiori parte excitari liuor primū: deinde atra quædam macula, quā Græci, quæ sub oculis oriatur *ὀφθαλμική* appellauere, Latini uero sugillationem: quæ quia turpitudinem uideatur afferri ipsi faciei: ideo per quandam translationem, suggillari eos dicimus, quibus aliqua sit illata ignominia. sicut itē dicimus illis esse inustam notam. est autem hypopium, uel sugillatio in genere *ὀφθαλμική*, uel ut Latini dicunt, uibicis: nisi quod suggillatio tūc dicitur, cum in eo loco sub oculis fuerit illata. alibi uero, uibex uel *ὀφθαλμική*. sit autem contusa præsertim carne à duriori aliqua

re, ex qua cōtusione exiles uenæ per illam disperitæ dilacerantur, ac inde sanguis in sparia circumstantia illis uenis effunditur. & sicut semper accidit, sanguini cum extra uasa effusus in aliquo loco comprehenditur, grumescit, unde locus contusus liuore primui, deinde nigro suffunditur colore, ob sanguinis transmutationem. Cum ergo uniuersa ratio suggillationis cōsistat in plenitudine illius particulæ: plenitudine inquam concreti sanguinis, indicatio erit primum ab ea depromenda: nempe illam esse euacuandam detractio sanguine. neque alioquin alia potest esse opportuna vacuatio, nisi per ea, quæ digerūt, & discutiunt. unde, cum futura sit facilius eius digestio, quanto recentior fuerit suggillatio, & principio magis propinqua (nam quo diutius ibi inculcatus manet sanguis, eo magis crassescit & indurescit euanescentibus & quasvis expressis spiritibus, & tenuioribus partibus, ut consensere Galenus & antiquiores omnes medici) digerentibus & laxatibns erit opus medicamentis, ut tamen & hoc considerandum sit, quod inter initia antea quam dilaceratæ uenæ consolidatæ ad pristinum statum redeant, apertæ adhuc sunt, & proinde medicamenta quæ laxant, & digerunt si illis solis utamur statim inter initia, possunt esse in causa cur laxioribus illis partibus redditis, maior fiat sanguinis effusio. iō ut huic consuleretur incommodo, monuere illi idem à principio cum his esse commiscenda illa quæ astringendo possunt repellere sanguinem ne effluat. Sed ut particulatim res hæc exponatur, exponemus modum medicamentorum, quæ semper fuisse in usu Galeni in curandis suggillatis, suggillatū locū fouebat prius decocto fœni Græci, quod mollit, laxat, & concoquit, digeritque, & melliloti, quod, & ipsum concoquit & digerit. sed præterea non nihil astringit, ratione cuius potest aliquid facere ad hoc postremum consilium. postea accipiebat collyrium diarodon, cuius omnes antiqui medici meminere. Gal. Aetius, Paulus, Celsus, Scriboniusque, habet autem mixtas facultates ex astringentibus repellentibusque, & ex concoquentibus & digerentibus, & ex aqua dissolutum illinebat loco suggillato, deinde ex prædicto decocto in oculari cote dissolutum illinebat, mox ex decocto folius fœni Græci diluebat, postea solo fori fœni Græci utebatur. at si postremo viderentur aliquæ reliquæ sup eresse ad digestionem difficiliiores, illas ualentioribus aggrediebatur discutientibus, ut sunt collyria ex myrrha, quæ diasmyrna nuncupata sunt. solent autem mulieres cerusa

ex oleo rosaceo illinire suggillata . quod tamen remediū initiis esset accommodatum. refrigerant & astringant, quamuis ex rosaceo oleo. præsertim si sit id quod completum appellant, sit particeps alicuius digestionis, salua autem humana summopere à Gal. laudatur. 10. de facultate simplicium medicament. ieiuni hominis . nam digerit & concoquit. itaque ualentius præstare poterit, si fuerit præmasticata radícula, & pluriima eorum quæ manduntur, ut panis, triticum & id genus alia. quæ si præterea, & ipsa vim aliquam habuerint laxandi, & digerendi, ut esset absinthium, vel raphanus, aut hyssopum, ita & passa ex acinata, quamuis in principio quando requiritur aliquid astringentis, non essent inutiles passæ uæ cum acinis. Sed de his satis. Nunc ad medicamenta aliorum affectuum accedamus, qui sunt circa alias faciei partes: præsertim uero nasum, & mentum. sunt uero in genere tumorum præter loci naturam, vel tuberculorum, duplici uero ratione, tam uiris quàm mulieribus molesti sunt. nam faciem quoquo modo deturpant, & præterea, vel pruritu vel dolore aliquo importuni sunt. neque omnes eiusdem naturæ: sed diuersæ, quatenus ex humorum diuersorum confluxu ad externas faciei partes, ut quinto de compositione medicamentorum secundum loc. docuit Galenus, ortum habent. Sed rem breuiter expediamus: si ad extimam faciem, atque adeo etiam ad cutem confluat humor crassus caloris, & acrimoniæ expers, qui multus non sit, cum in tumorem parum attollit durum tamen, ex humoris siquidem crassitie durus euadit: parus uero, quia non potest fieri magnus, nisi multus fluxerit humor. hos tumores Græci *ἰσθμῖες*, appellant, nostri varos. nostrum vulgus cossos nuncupat. Sed si non solus crassus humor confluat, sed sit præterea particeps alicuius tenuis serosi, & ichorosi: nisi cito curatio adhibeatur: fit ut tandem ulceretur tamen. tenuis enim & serosa illa particula infarcta & intus intrusa, cum perspirare nequeat, incallescens aliquam contrahit acredinem, ut deinde abrasa cute, vlcus afferat, atque hi tumores à Græcis *οὐλῆες*, appellantur, à Latinis si cossi: & hi plerunque in mento expullulant. de quibus ita ait Orbasius. ficus expullulationes subduræ, rotundæ, rubicundæ, ulcerosæ, quarum plerunque comes est dolor. oriuntur autem plerunque circa qui capitis partes, quamuis interdum erumpant in reliquo corpore. Quandoque etiam confluunt succi similiter mixti ex crassos & tenuibus serosisque acrioribus tamen, & magis mordacibus qui

qui occupato mento *Αιχμηδης* concitant tumores à Græcis dictos, quasi referentes naturam lichenes, hoc est impetiginis, & pruriginosus est is affectus, & qui, si negligatur, ut tradidit Gal. tandem in eas scabiei species degenerat, quæ lepra & pfora Græce dicuntur. Efflorescunt præterea & aliæ papulæ iisdem in mento asperæ, & ulcerosæ, pariter ex acrioribus serosisque excrementis à capite defluentibus spontaneum ferè ortum habentes, quæ neque pruritus, neque alicuius doloris sunt expertes. Actius vero affectum hunc menti asperitatis uocauit, quem sequi solet *ωρυπανσις*, quam Latini porriginem, iuniores fursurationem transtulere. nonnunquam autem ad collum serpit interdum, & aurium meatus tentat. solet autem in eiusmodi affectu esse distensa cutis. Reliquæ præterea sunt etiam duæ, tuberculorum differentia, quæ in facie solent extubera re, tum natura, tum nominibus differentium, quæ Græce *διδυμοι*, & *φύματα* dicuntur. priorem differentiam, Celsus furunculos, alteram proprie tubercula nuncupauit. differunt vero inter se, ut ait Galen. duritie, & figura, quia tuberculū est tumor rotundus & planus, qui cito crescit & cito suppuratur. Furunculus vero durior est & acutior, qui & ipse tandem suppuratus in abscessum transit, non tamè egre facile & cito. Sed furunculi frequentius prouentus circa faciem & mentum, quamuis & in reliquo corpore interdum oriuntur. eorum item duæ sunt differentia, alii duriores, qui proinde magis sunt varis similes, sicut & non ita facile maturantur aut suppurantur, & id quia sunt ex crassiori materia, quæ refert naturam pituitosi vel melancholici humoris: unde neque dolorosi sunt, in quo etiam varis assimilantur: sunt tamen illis maiores. Altera vero horum species eorum sunt, qui magis accedunt ad naturam inflammationis: suntque maiores, rubicundiores & calidiores, subinde magis dolorosi, à quibus sæpe febres accenduntur, atque ut propriū est calidiorū tuberculorū facilius ad suppurationē properant. Similis autem est horum omnium generatio, & generationis occasio, ut pote qui omnes excitentur ab excrementitio & uitioso humore, quem natura ad cutem protrudit, ut sanguinem, qui futurus est alimentum internis uisceribus expiet, & sincerum quantū pōt cōseruet. un̄ quēadmodū horū oīum aut eadē, aut similis gñationis rō in uniuersum: ita et oportet unā eē cōem in curādi methodo indicationē. ea uero demōstrat materiā illā excrementosā ī primis eē uacuādā. Sed id aduertēdū, nū copiosa ad cutē horū malorū humorū & frequēs fiat p̄pulsio, frequētesq; & maiores expullulēt

ita vt vno digesto subinde alii & plures succedat: q̄a id argumento esse posset, q̄ multa esset cachochymia in corpore cōgesta, aut uniuerso si ad alias etiam partes serperent, aut in capite si tantū circa faciē orirētur, à qua mala hæc foverentur. nā rō vniuersa suaderet prius, aut corpus vniuersum, aut caput expurgari oportere, vt fomē tū subtraheretur, put illa videretur requirere: nēpe aut sectione vena aut purgatione: præterea & victus p̄bi, nullo autē modo excrementosi esse instituendā, q̄ ad p̄sens institutū particulatim tractare non pertinet. Quare ad eos scopos exponendos accedamus, qui nobis possint ostendere vel aperire rationem eorum medicamentorū quibus priuatim & particulatim sint curandi hi affectus. Sed si ex methodo hoc sit agendum, oportebit eorum naturam cōsiderare. quia illa nobis scopos indicabit, quos spectantes omnia reperiemus. nam quicunque horum tumorum duriores sunt & citra vlcus, vt sunt proprie nari, & prior furunculorum, qui aliqua tenus ad uarorum naturam accedunt. hi egent digerentibus in primis remediis, vt pote quæ plenitudinem loci possint vacuare: verum cum præterea adsit & durities, egent item & emollientibus. nam ita facilius & citius fiet digestio. qui vero excitati sunt à tenui & seroso humore, præstantius per exiccantia curabuntur, quam per digerentia: quia hæc cum sint calidiora, facile serosos eos & tennes succos aciores & magis erodentes reddent. vnde lichenosi vel impetiginosi tumores antequam in psoram degenerent, & qui ficosi dicti sunt: & si requirant aliquem digerentium vsum, longe tamen exiccantium maiorem, & id propter multam mixturam serosorū humorū, q̄ quo fuerint aciores mordacio resq̄, eo ēt egēt magis exiccantibus. & proinde impetiginosi quàm ficosi magis de siccantia desiderant: antequam in obliquam scalpici speciem transeant. quia tunc aliquibus præterea detergentibus esset opus. At vero eruptiones vel efflorescentes papulæ in mento: cum sint vlcerosi affectus, eandem cum cæteris vlceribus in vniuersum indicant rationem curationis: nempe per exiccantia. & hæc est generalis methodus curandorum horum omnium affectuum. Sed & particulatim quoque rationes horum omnium exponamus. quo loco & id reuocandum est in memoriam, quod sæpius à nobis & repetitum & repetendum est: uempe, quod horum, vt exempli gratia, neruorum non est omnium eadem ratio, alii enim duriores vt prope ad naturam calli accedant, alii vero minus duri: quod illis potest euenire

nire aut ratione materiæ vnde ortum habent, aut ratione temporis, cum enim inueterascunt, magis indurescunt, aut ratione corporis in quo oritur quod habet aut duriores cutem & subiectam carnem, aut molliorem vel ob ætatem, vel ob sexum, vel ob artem & modum transactæ vitæ. Qui duriores sunt, vt difficiliiores sunt ad digestionem, ita & valentioribus egent, tum digerentibus, tum emollientibus. vnde sicut in his affectibus in duritie & mollitie: ita & vt recte curentur necessarii sunt varij & diuersi medicamentorum ordinis. & proinde prisci medici hoc insinuare volentes, interdum medicamenta describunt, ea aiunt esse vtilia ad varos amandandos, nullo præterea addito: quasi voluerint, ea esse accommoda moderatis varis: non autem callosis: interdum vero addunt quod valent ad varos in veteratos vel callosos. quia communes & recentiores leuioribus & facilioribus medicamentis tolluntur. vidi siquidem sepe sola illitione saluæ & ea repetita frequentius deletos fuisse varos præsertim ieiuni hoīs. valentius negotiū hoc expediret gallinæ ætus adeps & adhuc citius anserinus. vim prætereā maiorem haberet amygdala amara mansa & apposita vel confecto cataplasinate ex ea trita & cum aliquo ex his adipe commixta. Inter medicamenta autem, quæ antiquis fuisse in vsu admodum aptum & vtile videtur illud cuius meminit Gal. quinto de compositione medicamentorum secundum loca ex sententia Critonis. cuius hæc est confectio. accipiantur lythargyri seu spumæ argenti drag. iij. resinæ terebinthinæ quantum æquet fabam Aegyptiam, puta dragmam vnā. olei clari & albi parum. omnia probe misceantur. quantum ad vsum vero pertinet, primum facies detergenda. mox vero immerso digito in medicamento, palmæ manus illud imponendum, & vtraque manu conficcate conterendum, illoque illinendi sunt vari. medicamentum lene & leue, quod potest esse aptissimum teneris, molliibusque corporibus, in quo vis est mediocriter molliendi, & digerendi. nam terebenthina, vt 8. de compositione medicamentorum secundum locos tradidit Gal. vim habet molliendi, concoquendi, & modeste digerendi. quibus facultatibus & oleum clarum aliquantulum præditum est. lythargyrum vero mediæ marariæ est, aliquantulum tñ desiccatur. vnde est quasi materia istius medicamenti. videtur autem istud medicamentum esse mulieribus mobilibus, & delicatis, quam maxime accommodatum: ut pote quod præter id quod utile est affectui huic curando, potest etiam conciliare medi-

co gratiam & fauorem apud ipsas: cum aliquid facere possit ad ornamentum & decorem faciei, quia si diligēter sit paratum illustriorem illam reddit & planiorem, quia efficit ut cutis magis distenta fiat, applanatis rugis, si quæ adsint. & propterea in componendo hoc medicamento, procuret, ut habeat oleum clarum, itemque & terebenthinam ut melius hoc præstare possit. Addit præterea & alterū, quod acrius ualentiusque est medicamentum, & proinde quod congruentius sit uaris magis inueteratis, & in corporibus solidioribus durioribusque. Conficitur uero in hunc modum. amigdalæ amaræ exquisitæ sunt conterendæ, atque deinde aceto diluendæ, quibus postea illinire uaros oportet. nullus autem non uidet, quod amaræ amigdalæ attenuandi, detergendique, & digerendi vires satis conspicuas habet. de aceto præterea sæpius sermonem habuimus: unde in his quidem robore locū priori superius est. sed non tantū potest mollire, & concoquere, quantum prius. quamuis aliquis dicet fortasse, quod in amigdala sint aliquæ partes oleaginosæ. nam ex ipsis exprimitur oleum satis copiosum: hac etiam ratione mollire poterit quantum huic rei sit futurum sat is. unde & si fortius sit hoc medicamentum, non tamen adhuc illius est generis, ut pertinaces uaros, & illos, qui eo deuenierint, ut iam callosi dicendi sint, possit discutere, atterereque: ut ea medicamēta, quæ ibidem à Galieno eodem Critone descripta referuntur. quale illud est, quod conficitur acceptis dragmis quatuor saponis, ammoniaci uero, & thuris singulorum dragma. hæc uero omnia miscenda, dissoluta tamen ex aqua eatenus, ut cerati compagem habeant. confecto deinde medicamento, hunc esse admodum seruandum. quantum ad rationem usus pertinet, ut id uaro apponatur. ibique dimittantur per horæ spacium, statimque detrahatur, moxque facies detergatur abluaturque aqua tepida. Quod optime considerandum. quia id non modo in his affectibus: sed in multis præterea aliis poterit esse utile, quando fuerit opus acrioribus uti medicamentis. maxime uero in corporibus, vel particulis, quæ molliores tenerioresque sunt, ut facile abradi vel erodi possint. unde & subinde ulcera excitarentur quæ uideri deinde possent, maiora & turpiora mala. cui rei consulere docuit Crito hac ratione: nempe ne permittatur morari medicamentum hærens faciei ultra horam. ne longior mora maiorem quam par sit faciat impressionem, postea lauanda: faciem consulit aqua tepida, ut si quid acrimoniæ sit derelictū in loco, vel aliqua particula ablata

la ablati medicamenti vel si morsus aliquis reliquis sit tepido illo calore, atque humiditate aquar, morsus & acrimonia demulceatur & deliniatur, deterganturq; omnes reliquæ medicamenti. quo facto locus erit inspiciendus, & considerandū, an adhuc, vari maior pars sit superstes, quæ egeat repetito medicamento, atque reponendū erit idē medicamentū: si adhuc morbus pertinax videatur, vel si nimis acre uideatur, aut aliud tenuius apponendū, aut idē quidem: Sed alio aliquo addito & intermixto quo remitti, & deliniri possit eius acrimonia, medicamentū vero hoc calidū quidem, quod habet & vim detergendi insignē ex sapone, vt consentiunt omnes medici, & proinde partium constat tenuitate, qua laxare, & discutere, attenuareq; crassam, & durā materiam ex ammoniaco vero habet vim imprimis emolliendi concoquendique, & digerendi. a thure vero adiuuatur uis concoquendi, & aliquantulum molliendi, & digerendi uis. additur autem aliqua astringendi, qua possit tantillum repellere alios, qui adhuc in eum locum confluant humores. Hæc a nobis hoc loco descripta sunt, non quin & alia multa & ea quidē utilia describi potuissent: sed nimis prorogaretur in longum tractatio hæc. quare ista visa sunt posse esse satis: si tamquam exempla accipiantur a iuuenibus medicis, quibus in his rudimētis scribimus. Sed vt tandem possimus huic capiti finē imponere: de reliquis commemoratis affectib. sermonē aliquē: breuē tñ habeamus. & de illis q. dē, qui naturā inflāmationi similē habēt: cū eadē, aut similē curationi inflāmationis requirāt, de qua alias copiose sumus loquuti, super uacaneū uidetur ulterius de ea agere. Quare ad vlcerosos faciei affectus sermonē cōuertamus. Hi duplici vel cōplicata rōne cōstāt. cū & à præsentē materia in loco sint cōcitati, & præterea adsit, & vlcus, & cū princeps curationis ratio a natura morbi depromēda sit: ideo necesse est etiam, vt curandi methodus duplici innitatur indicationi, quæ duplicem quoque scopum spectandum ostendat. nā, & materia præsens detrahenda, digerendū esse nobis indicat, & cū omnia vlcera præsertim exiccatione curentur: ideo & siccandum esse nobis ostendunt, & proinde: si Galenum, imo rationē ipsam sequamur, medicamenti opus est in his curandis concoquentibus quidem, digerentibusque & detergentibus, & attenuantibus sicut in variis: Sed longe etiam magis deliccantibus, quorum exēpla itidē ex Critone deprōpta voluit proponere, omnia quidē acria & valētia. Sed nos illis volumus esse cōtenti q̄ hæctenus fuere conscripta,

Victoris Trincauellij

cū omnia legi possunt apud Gal. 5. de cōp. med. secundum locos. & vt tādē absoluauius hoc caput, nonnulla de lichenosis seu impetiginosis faciei expululationib. dicamus. qui affectus, quāuis interdū lenis, & facilis esse videatur, nonnunquam prāter turpitudinem, maximum suo pruritu negotium facescit, & sāpe in scabiē transiit, quāq; malā & ferinā, & serpēdo, pertingensq; ad oculos. Vnde imprimis habēda ratio multa naturæ vel modi istius affectus. quasi videatur ferinā quādā, & malignā per se ferre naturā, nō debet acribus admodū medicamentis irritari exacerbarique. quia hoc pacto malignior euadet, sed potius, vt cētera maligniora ulcera, delinientib. & demulcētib. eius mollire feritatē. Sed si malignitate careat, tractendus & medicamētis ex pportione respondētib., malignitudini facilitati, vt ipsius morbi. Sed quatenus ad indicationes cōmunes atq; ēt scopos, pertinet, qui in cōstitutione methodi, qua curāndus est affectus, cū ille ortū habeat a mixtura variorū excrementorū, quorū alia tēnia sunt ichorosa serosaq; & acria, alia vero crassiora, eget in primis & ipse exiccantib. attenuantib., & si cōcoquētia fuerint, addita nō erūt pter rē, vt tñ postea si factus fuerit trāsitus in scabiē, sint ēt necessaria detergētia. & quia hi licheno si affectus diuersos habent ordines: ita ēt diuersorū ordinū medicamenta reperiuntur, q̄ illis possunt aptari. aliqui etenim adeo faciles & lenes sunt, vt sola salia frequentē quidem illinitione superari, & vt Gal. ait 10. de fac. simp. med. 1. tolli possint: faciliū itē remediū erit succus tritici ex eo vt docuit Crito exceptus hoc pacto. uoluit multa eius grana incudi impeni: illisque mox cardentem & ignitam laminam apponi, ac eo liquore qui ignis vi e granis elicitur inungi lichenas. in eodem ferē ordine erit etiam syluestris maluē fructus: si quando est tener mundatus teratur, ex succo ex eo expresso illinatur impetigo, dum tñ frequens, & ferē continens fiat illitio. Præterea perdicium herba: quæ & parietaria dicitur: si illa affricetur loco impetiginoso, & liquor qui ui ignis abutumi oliuē lignis, vel a brasicarum caulibus dū comburuntur, destillat, huic rei utilis est, portulaca etiam ab omnibus summo pere laudatur, illo loco illinito eius succo, & lichene herba, q̄ a quibusdā iuniorib. hæpatica solet nūcupari; dicta aut lichene a Græcis, quia lichenis sanādis maxime utilis est. Secūdi vero ordinis sunt aphodeli, vel vt Latini appellant, aluci radix ex aceto cocta, ac deinde trita illitaq; itē viticis, vel vt iuniores dicunt, agnicasti folia trita ex aceto atq; apposita, eodē modo, & capparis folia

folia ex aceto trita & in modū cataplasmatiſ redacta, cortices etiā radicū rumicis hortēſis leuigati ex aceto, & eodē modo appoſiti, ſicuti chamelēōtis radix parata eodē modo. & hæc quidē valentiora ſūt, q̄ vilia ſunt difficiliorib. uetuſtiorib; ſq; aut alia rōne eiꝰſmo di affectib; . Sed adhuc vehementiora ſunt quę ſequuntur, nempe ſulſur ex aceto, itē ammoniacū, & thus diſſoluta ex aceto, præterea & pix liquida, & utrumque alcyoniorum genus, utrumque etiā veratrum, & caprinum ſtercus. Longe vero acriorib; vti conſueuere antiqui medici cum calloſi fuerint hi affectus. componunt. n. medicamētum ex illis quę valde acia ſunt, nam ſępe iſtis addunt miſy, atramentum ſutorium, ſquamam æris & id genus reliqua. Sed nos iam receptui canamus. ſatis, n. hæcenus ſumus vagati, & de ſimi libus medicamentis adeo copioſē, cum hæc tū ſupra in 3. lib. horum rudimentorum loquuti ſumus, vti illis perceptis facile quiſque poſſit medicamenta in medicorum tam antiquorum quā recenſiorum libris deſcripta recte perpenſa iudicare.

De ratione compositionis eorum medicamentorum quibus apte curari poſunt narium affectus. Cap. 13.

NVlla mihi particula eſſe videtur circa caput, quę magis propi qua ſit illis de quorū affectib; curādis hæcenus egimus, & cū il lis maiori connexionē coniuncta quā nares ſint, intra quas odoratus organum continetur: vnde merito etiā & nō abſque rōne quā uis alij alium ordinē ſeruauerint ſequentes noſtrum inſtitutū poſ ſumus poſt illorū tractationē hanc de curandis narium affectib; per localia medicamenta ſubinde ſubiungere, & quia triplex officium habent triplicēque afferunt animantibus vtilitatē: ideo triplici ēt ratione lēdi poſſunt, & proinde variis, & multiplicibus morbis ſunt obnoxii. Sunt etenim ipſę, vel ſaltem continent odoratus propriū inſtrumentum: vnde proficiſcuntur actiones illi ſenſui primum at tinentes. Et hoc illis eſt princeps munus, propter quod a natura ſunt fabricatę. ſunt præterea uia & quaſi canalis introeunti & exeun ti aeri qui per inſpirationem & reſpirationem attrahitur & expelli tur a pulmonib; . naturaliter ſiquidem ſit inſpiratio, & reſpiratio per nares, quę per os etiā fieri pōt: ſed nō niſi qñ nares obſtructę ſunt, & id quidem non niſi propter aliquid accidens præter ipſius naturę ordinē. Tertio eſt ueluti cloacha, per quam excernuntur

excremēta q̄ multa in capite & cerebro cōgeri solēt. & quīs alia nā
rium munia sint digniora, præsertim vero quæ ad odoratus sen-
sum pertinet, hæc tñ actio, quæ excremēta cerebri, per hos quasi ca-
nales expurgantur ad sanitatē tuendam, præsertim capitis, magis vi-
detur necessaria. Sed antequā ea aggrediamur quæ particulatim præ-
senti huic nostro instituto magis attinent, hoc considerandum q̄
narium, sicut & aliorum sensuum instrumenta duplices habēt par-
tes, ex quibus coagmentata sunt aliq̄ quidē sunt exteriores, quæ &
visui expositz, aliæ vero internæ, quæ digniores, vtiliores, & magis
necessariæ. exterior est ipsa cutis & os, quæ quidem, cū nullos habeāt
priuatos peculiaresque morbos, præter illos, quos cōmunes habēt
cū aliis faciei partibus, præsertim vero cū reliquā illius cutis: ideo ne-
que de illis opus erit eundem iterum sermonem repetere. Sed &
internæ etiam aliquos habent morbos aliis fere omnibus, quæ sunt
eiusdem generis communes, de quib. nolumus ēt alioquin agere,
cū aut parū, aut nihil eorum curatio in naribus euariet nisi fortasse
hac rōne, q̄ cū siccior sit natura temperaturaque narium, quā ocu-
lorū, & eorū quæ tanquam instrumenta gustui inseruiunt: minus
autem sicca quā illa quæ auditur. nempe quam auris, ideo siccio-
ra requirit medicamenta, & illa quoque si acriora sint facilius ferre
quā oculus & os. in hoc tamen ut omnes ferē medici asserunt ab
aure, superatur. Quatenus autem ad eos affectus pertinet, qui fami-
liari, & priuata quadam ratione in internis istius particulæ meatib.
oriri solent. aliq̄ quidē illi magis attribui possunt, ut sunt quasi viæ
vel cloacæ per quas capitis excremēta solent expurgari, & per
quas fit expiratio in aliis vero: quatenus ad sensum odoratus p̄tinet.
Tres autem sunt affectus quibus secundum priorem rationem na-
res obnoxie sunt. primus in genere solutz vnitatis comprehenditur.
est enim vlcus satis malignum, & curatu difficile, quod orium ha-
bet ab acris excrementis, quæ a capite per hos meatus defluunt.
appellantur autem id genus vlcera à Græcis ozene, quia præter
malam naturam vnde difficilime curationem admittunt, male etiā
olent. a quo fœtore ozene dictæ sunt. & vlcera huiusmodi ex his
sunt, quæ sponte oriuntur, nempe influxu humorum: non ex alia ex-
terna occasione. vnde necesse fit vt ab acris, vt nuper dictū est, hu-
moribus vel ichoribus, vt 3. de cōp. med. secūdū locos scripsit Gal.
p̄signātur. alioquin. n. nō abraderēt. p̄terea cū maleoleāt, id fieri ne-
quit, nisi putredinē cōtrahant. & quāuis ab hoc fetore nūcupa-
tionem

tionem habuerint, attamen non semper male solent: sed semper cum corrosione sunt, ægreque curantur, alter vero affectus est, qui polypus dicitur, ob id quod constat substantia quadam simili carni polypi marini piscis è genere mollium appellatorum piscium. est enim tumor quidam intra nares exorians rotundus ab una radice plerumque tenui pendens, & interdum adeo excreescens, ut non modo repleat meatum, sed & pendulus extra exeat. vidi interdum equantem magnitudine nucem auellanam maiorem. & carneus videtur esse is tumor, & mollis, cuius caro cartilaginea similis carni polypi uel sepiæ. similem uero ortum habent communi quidem ratione hi duo affectus, sed particularim postea differunt. nam uterque excitatur à succis uitiolis à cerebro primum, & proxime destillantibus. nam & à suppositis partibus, ut à ventriculo, iocinore, & ab uniuerso corpore similibus excrementis referto potest aliquod habere fomentum. particularim tamen fluxiones differunt natura eorum, quæ defluunt, quia ozena ortum habet à tenuiori, & acriori fluxione, & sæpe sapiente aliquam putredinem. polypus autem generatur à crassa lentaque pituita, ex qua ibi concrementa callescit mollis hæc, & inutilis caro, aliquando tamen confluit aliqua maligna materia referens naturam atræ bilis: unde polypus etiam gignitur sapiens naturam maligni, & cancerosi tumoris. Et solet polypus sicuti & aliæ similes carunculae molles, & inutiles sequi aliqua ulcera, & ea præsertim quæ nimio scatent humore, & eo plerumque inutili. sed similis huic in aliis quibusdam meatibus aliarum partium, ut in meatu urinario. nam uirili tum muliebri, in meatu etiam auris, neque alioquin gigni potest nisi ulcus præcesserit aut abrasio. siue ex erosione sit factum ulcus, siue ex rupto aliquo tuberculo, uel aliqua inflammatione ibi ruptis. Est & tertium symptoma quod huic particulari est quam maxime familiare, nempe immodica eruptio, & profusio sanguinis: Sed de hoc paulo post seorsum, & particularim proprio capite agemus, ne nimis hunc sermonem confundamus. Redeam. ergo ad ozenam, & polypum, ut methodum curationis instituere possimus. Hi ergo affectus sicuti unum in uniuersum sui ortus communem rationem habent, ita oportet, ut in uniuersum communem habeant curationis methodum. Vnde cum sint affectus proprii narium, qui tamen originem, & fomentum à fluxione à capite, & interdum et, & si non proxime, saltem per caput, à subiectis partibus fouentur: ideo statim duæ insurgunt primæ, & communes indicationes. altera quidem à fluxione, quæ est

causa ipsius morbi, ipsum efficiens, & augens: altera vero ab ipso morbo iam aliqua saltem ex parte facta, & tempore quidem prior est, & quae in initio vim maiorem habet, est ea, quae a fluxione fuit deprompta. statim ergo fluxionem reprimere intercipereque oportet. Sed id nequit fieri, nisi remota causa fluxionis, quae vel à capite in primis petenda est, vel ab alijs etiam: siquæ sint quæ in hoc conspirauerint: utpote quia vitiosis vaporibus, & tandem humoribus caput repleat. Quare eo primùm curatio cōuertēda erit: inēpe bene cōsiderādo quid in causa sit quātā & adeo vitiosa materia sit & in dies generatur. nam in uenimus esse aliquod vitiū intemperaturæ in eo contractum, aut aliqua obstructio in vijs quibus cerebrum expiari solet à multis, quæ in eo continenter generantur excrementis. unde his primū erit consulendū. nā & detrahenda primū per euacuationem præfens congesta materia, & quia prior sit inter initia hæc indicatio, ita tamen eius est habenda ratio, ut non omnino, & altera negligatur. unde si agendum est cum vacuatione: etiam tamen vacuationē molliri oportet, quæ non ducat materiā versus male effectas n. ares, sed potius reuellat, talis uero fiat euacuatio, quale nobis ostendit natura excrementorum, ut ea iuxta Hipp. decreta, & talia purgentur, quæ, & qualia purgari oportet, ut talis uacuatio conferre possit. deinde corrigenda est intemperies capitis, ac si qua sit obstructio, illa erit referenda, mox uero siccandū, roborandū que caput. Verū cū hæc sint cōmunia multis: imo uero omnibus affectibus de quibus hætenus fuit habitus sermo: ideo superuacaneū uideri posuit de his particulatim magis agere uelle. nisi forte uoluerimus hic quoddam cataplasma describere, excerptum ex libello de facile parabilibus, quod ibi refert tāquam id, quod vim habeat intercipiendi istiusmodi fluxiones. Corficitur autem hoc modō accipiuntur limaciæ duo integræ: inēpe cū suate testa, thuris drag. 1. mirrhæ drag. 4. his omnib. tritis addatur albū duorū ouorū, & aliquid asurgiz ut fiat cōmodū cataplasma, quod lintheo excerptū apponatur. In hoc medicamento albū oui, & limaciarū caro sua emplastica & glutinosa substantia possunt sistere fluxionē. uoluit tūc cū testis terræ limacias, ut præterea exiccarent. thus coquit aliquantisper, exiccatur & moderate astringit. myrrha uero cōcoquit aliquantisper, magis aut siccatur, & digerit & discutit. & quæuis præterea Gal. uulgorū empl. stororū meminit, cuius cōfectiones descriptæ sunt in libris de cōp. med. secundū genus, nos tñ in præsentia sub silentio pertrānsibimus

mus, tãquã illa quæ potius præter nostrum institutũ esse videntur. Cũ vero his recte peractis, erit curatio conuertenda ad locum affectum & morbũ, nõ erit amplius particulatim eadẽ in vtrisque curationis ratio seruanda, sed varia pro ratione diuersæ horum affectuũ naturæ. cũ. n. ozena fiat ab aeri mordaci, & sæpius putrescente succo: ideo primũ spectãdi ijdẽ scopi, qui & in aliis vlcerib. spectari solẽt qñ facta sunt, & fouentur a fluxione vitiosorũ humorũ. in his. n. pronus qui nobis offertur scopus ratione vlceris est, exiccãdũ esse, cũ cõmunis vlcerũ curatio exiccatione imprimis cõstet, cũ vero locus hic sit maxime, & si quis alius, obnoxius fluxioni vitiosorũ humorũ, cũ subiectus sit particulæ quæ plurimũ est excrementosa sitque ex morbo factus imbecillior, & proinde facilis, & aptus ad recipiendum: mox indicatur repellendũ esse. tertio etiam quia ulcus fouetur a multa materia iam absorta in affecta, nobis ostenditur illam esse vacatione detrahẽdam. & propterea Gal. 3. de cõp. me. Cap. 41. secundũ loca, recte collegisse videtur, quod materia medicamentorũ, quæ his vlceribus curandis idonea sunt, oportet, vt desiccandi facultatem habeant: præterea uero repellendi, & digerendi, & hoc quod quatenus ad cõmunẽ eorũ rationẽ pertinet. Sed hæc magis particulatim disquirenda sunt, quia quæ siccant, quæque repellunt, vel digerunt, non eas facultates æquales habent: sed uarii sunt illis ordines, sicut & istius generis ulceribus omnibus non est par ratio, sed in illis sunt uarii ordines in facilitate & difficultate cũ alia recentiora sint, alia, quæ iam inueterata sint, ut ferẽ sit iam habitus particulæ immutatus. unde illa faciliora curatu, præterea alia maligniora, quæ aciora & fortiora desiderant remedia, alia minus maligna, quæ poterũt faciliorib. leuioribusq; superari. quia semper remedia debent morbis accommodari, ut in aph. docuit Hipp. ut præterea nunquã sit prætermittenda illa indicatio quæ à natura laborãtis corporis quæ molliora & iuniora leniorib. & minus uehementibus. solidiora uero ac seniora acrioribus, & ualidiorib. sunt tractanda. & si quæ particula nostri corporis desiderat in ulceribus caute tractari, maxime nãres istud requirunt, quia facile ulcera in ipsis si nimis exasperentur & irriterent malignitatem contrahunt: & cancerosa fiunt. Sed iam hoc negotium magis particulatim tractemus. Varios itaq; ordines in hac medicamentorum classe reperiri diximus, ut possent facile omnibus differentiis horum ulcerũ aptari. nã alia sunt faciliora, & leuiora, alia uero uehemẽtio-

ra & acriora. Rasis quidē inter initia, & antea q̄ adhuc sit factū ulcus
sed efflorescūt uesiculæ intra nares, q̄ paulo post ruptæ in ulcus de
sinunt, ad exiccādum tenuem illum humorem in illis contentum, ne
succedat vlcus utitur linamento acri aceto immerso, cui sit aliquid
salis additū. exiccāt. n. satis valide & repellit digeritq; excitato au-
tem ulcere plerique medici, si crustosum fuerit id imprimis procu-
rant, ut crusta cadat. non quidem ea unguibus aut alio simili instru-
mento ui detracta, quia id sine dolore fieri nequit, unde & irritā-
tur ulcera, & magis cōcitur fluxio: Sed his medicamētis quæ mol-
liant, aliqui. n. fotu aquæ aliquātulū calidæ, alii uaporib; calidæ aque
ea in uase stricti orificij imposita, atque naribus illo supposito. ab-
latis uero crustis, tunc curanda ulcera, & si aliquātisper uideantur
sordida, lauanda erunt aliquo liquore in quo sit uis detergendi, &
desiccādi. maior uero, uel minor, pro rōne qualitatis tū ulceris tū cū
ut sæpe diximus, corporis male affecti. sūt aut huic officio maxime
apta mulla aqua, uel uinū mulsū, de quib; fuit in priori libro sermo
habitus. hic aut satis erit dixisse, qd̄ desiccāt magis, itēque detergit,
& aliquātisp magis mordax est: unde accōmodatū erit deteriorib;
ulceribus: nisi in ea fuerint dolorosa, & acris sensus, ut ægre possint
ferre hoc medicamētū, quia nimis mordax est. mulla uero lenior
est & minus mordax. aliqui et̄ dicūt, utilē in his esse usum urinæ, &
hoc Gal. attribuit, q̄ uoluerit uti urina asinina ad ulceratas nares: p̄-
sertim in malis ulcerib; Sed usus in his urinæ pueri fortasse tollerari
posset abhorret Gal. horū sordidorū medicamētorū usum 10. de
fac. simp. med. cosq; medicos, q̄ illis utūtur, sordidos appellat. sed
itidēq; neq; egroti eos admittūt, p̄sertim ut affectib; capitis, faciei
q; & itādē superiorū partiū, cū non desint alia medicamēta, quæ pos-
sint honestis & ciuilib; uiris administrari, & maxime cū aut ore assū-
mēda aut uehēmētur atrahēda per nares laudat tū chrysocolam, quæ
fit ex urina pueri ad curanda difficilia vlcera sordida & putrida.
Quatenus uero ad carnē generādā in his ulcerib; si quidē recentia
sint, & nondū rebellia, pertinaciaque, multa communia appellata
unguenta, possunt esse satis, ut quod ex ccrusa fit. immo cerusa præ-
sertim lota ac ex oleo rosaceo assumpta potest præcipue tenellis
corporibus satisfacere, si interiores nares illinantur, aut his deli-
butum linamētum imponatur. sed trita, & in pollinem redacta insu-
fletur, ita etiam pompholix, uel tutia, parata & lota, ut in præsentia
ubique parata reperitur, uel arida insufflata, uel eius unguentum il-
linatur

Cap.

linatur, uel ex linamento exceptum imponatur. itemque & ex plūbo usto & loto confectum medicamentum. quæ omnia non solum in his non admodum malis & difficilibus ulceribus sunt utilia: uerum, & illis quæ adeo maligna sunt, ut à uel modice acribus exacerbentur. sed & diachalciteos, quod a multis diapalma nuncupatur. Galenus ait se multoties ulcera narium maligna etiam & in tencellis corporibus, solis aridis rosas & tritis & ulceri inspersis ea curasse. Quod si maligna, & erodentia iam ulcera euaserint & putredinis non expertia, tunc acrioribus esset opus medicamentis, nempe quæ maiorem uim exiccandi & detergendi habent, ut esset unguentū illud, quod apostolorum appellant descriptū ab Auic. & Isis à Gal. & Aegyptiacū ab Arabibus, de quibus priori cōmentario exactius egimus. sunt & multa alia quæ ab antiquis medicis descripta reperiuntur, quæque possunt in eorū libris legi: neque. n. uolumus omnium meminisse, ne æquo simus lōgiores. Sed de polypo sermonē instituemus & breuē quidem, quia parum differt ratio curādī hūc & illū affectū, imo plerūque authores eisdem medicamentis utrūq; curant, & de eisdē eodē capite agere consuevere, & præferim de illis agemus medicamentis, quæ in familiari usu fuerit Gal. & multa experientia ab eo probata, hoc primum constituto, quod cum polypus sit inutilis, & mala caro, quæ præter naturā huius particulæ excreuerit, insurgit indicatio illā detrahendi, si in propriū, & naturālē statū illa sit reditura, detrahi uero pōt, aut ope manū & chirurgicis instrumentis, nēpe aut abscissionē, aut uisione, uel ui medicamētorū ualide detergentiū, aut desiccantiū & discutientiū: ut tū prius cōsideremus, an id commodē, & tuto fieri possit. quod cognoscemus considerata natura effectus, sunt enim polypi nonnulli malignæ cuiusdam naturæ, utpote qui fuerint geniti ex humore accedente ad naturam exusti humoris & melancholici, qui exasperati faciliē transeunt in carcinoma, atque ita incurabiles euadunt, & proinde neque tractandi sunt: nisi blandis admodum, & lenibus medicamentis, in quibus satis fuerit, si contineantur ne serpent, & maligniores reddantur. cognosci uero & discerni possunt duricie colore & adhesionē. nam qui malignioris sunt naturæ duriores sunt iuxta naturam humoris, à quo sunt progeneriti, suntque colore liuido aut subatro, cum alteri sint, uel albi uel ad rubrum uergant, & molliores sint, & præterea magis soluti, & quasi ab una tenuique radice pendants.

cum

ſeſciſſime expertus eſt. nam citra vllū morſum deſiccāt aſtringit
& excrementoſam humiditatem abſumit, vnde optimum ſemper
illi viſum eſt medicamentum, tam ad polypos tollendos quam ad
vlcera vel etiam mala in naribus curanda. cuius conſectio in hunc
modum ſe habet, vt tria accipiamus mala punica, nempe trium
illarum differentiarum. nempe dulcis. aſteri & acetoli. ſint
autem magnitudine paria, & matura & recentia ſimul autem omnia
in mortario probe terantur tota, vt ex illis ſuccus poſſit exprimi.
qui expreſſus aliquantulum coquendus eſt, vt conſumatur ſuperua
caneas: qua ſit eius humiditas, vt imputris ſeruari poſſit. nam in
ſtanneo vaſe illum ſeruari voluit. quod vero craſſius ab expreſſo
ſucco remanet, iterum atterendum in mortario erit, vt leuigatum
poſtea poſſit formari in collyria quæ aptari poſſint meatui narium,
quando erunt imponenda. conſumit enim tandem polypum, quam
uis non admodum cito, ſicut acriora medicamenta: ſed citra ullum
morſum aut dolorem alicuius partis, quod non præſtant acriora me
dicamenta. attamen quia plerunque accidit, ut eiſmodi ſolidiora
medicamenta nequeant intra nares contineri tum propter illorum
moleſtiam & incomodum, tum uero qui abluuntur à perpetuo fe
re deſluxu humorum à capite à quibus diluitur medicamentorum
uis, cum auferenda ſunt collyria. ſuccus ille ſeruatus loco affecto il
liniri poterit inſigni utilitate. hoc ita parato, uti conſuevit Gale.
alii tamen præſertim uero iuniores & alia adde re uoluere, ut myro
balanos, gallas interdum & alumen, quæ aliis medicamentis accom
modatis aſciſtibus iſtis addidere antiqui. Gal. tamen eo ita ſimpli
pliciori ſe eſſe uſum cum ſeſci etiam ſucceſſu teſtatus eſt. Quod ſi
adeo difficilis & remittens uideretur iſ morbus ut iſtis non cederet,
uel ægrotans uiſus eſſet impatiens, ſe tranſire ſolitū fuiſſe ad
paſtillos ſeu trociſcos ab antiquis deſcriptos ad ſimiles uſus, nem
pe ad corrigendā ulcerum malignitatem. & abſumendam carnem
ſuccreſcentē in ulceribus, ut ſunt Andronis Politidæ & Paſſionis,
de quibus quantum uidebatur poſſe eſſe ſatis in priori libro fuit
habitus ſermo. in præſentia autem i quam plurimo uſu eſt puluis il
le, qui præcipitatum dicitur, & conſicitur ex hydrargyro more al
chymiſtarum appellatum deſtillato in uaiſ uitreis, repetita de
ſtillatione, donec tabeſcat. inſuſa tamen prius aqua, qua aurum ab
argento ſeparatur ipſi lythargyro in ſeſquialtera proportionē. de
quo alias. ſicut autem fuit iuuentum alchymiſtarum: ita etiam no
men

men habet ab illis. nam potenter detergit desiccet & digerit, sed etiam astringendo fluxionem repellit. optimum quidem est medicamentum, & validum quoque: citra tamen dolorem vel morsum insignem. verum longe etiam lenius redditur si perinde lauetur, ut alia mineralia post eorum usum Gal. lauare docuit. Hic autem exemplo, & consilio Gal. moniti considerare debemus quantum melius agatur cum medico, si potius sibi veram methodum compareret medendi, & rationem, qua recte componuntur medicamenta, quam si habeat multa composita medicamenta in aliquod commentarium descripta, aut à suis præceptoribus, & aliis medicis, & illud tanquam secretorum thesaurum secum ferat, neque postea calleat methodum illis utendi oportune. nam qui rationem potius didicisse voluerit, ille ubique fuerit medicamenti non carebit, & optime opportunissimeque utetur tam illis quæ suere ab aliis inuenta, quam quæ ipse composuerit, sequæ facile accommodabit non solum naturis sed moribus et quorumcunque hominum, ut ipse Gal. loco citato se accommodauit cuidam diuiti & delicato, qui non poterat sufferre ingratos odores aliorum medicamentorum, de quibus antea mentio facta est. excogitauit uti odorato quidem medicamento, sed in quo illæ omnes vires reperirentur, quas præscripti scopi requirunt, usus est medicamento. cuius meminere omnes qui de conficienda Theriaca scripsere, quia unum ex illis est, unde antidotus illa conficitur. appellatur autem Græce dicroos. possemus præterea & cyphi uti, si ad ea ex quibus confectum est, respiciamus. quod medicamentum accipitur in mitridatica antidoto. quatenus vero ad modum usus pertinet, quia troisci istiusmodi egent aliquo liquore quo assumantur ubi triti fuerint, ut in collyrii formam conformari possint: ideo idem Gal. docuit accipiendum esse acetum vel vinum, & vinum aut vetustius aut minus vetus, ite acetum, aut acrimonium aut minus, prout res videtur maiorem aut minorem requirere desiccationem. nam vinum vetus, nouo magis desiccet. vino acetum magis desiccet. illud autem magis quod acrius fuerit. Sed tandem ut huic capiti si nem imponamus, ad aliud symptoma proprium huic particulæ sermonem conuertamus, nempe de eruptione, & immodico sanguinis profluvio ex naribus, de quo; cum non admodum multa, quatenus tamen ad præsens institutum pertinere potest, occurrant dicenda, ea hoc eodem capite comprehendamus. Hæc itaque sanguinis multa profusio symptoma est, quod ad exeuntium excretionem pertinet, quæ præter rationem fieri solet (nam ut sæpe testatus est Gal.

omnis

omnis excretio sanguinis est à toto genere præter naturam excepta muliebri mēstruorum purgatione) & hac ratione quatenus symptomata sunt nullam habet vim indicandi : nisi si quando adeo copiosa fiat vacuatio , ut viris subeant periculum , ne labefactæ concidant , quo casu vim indicandi assumit , adeo ut sæpe occasionem aliis omnibus præcipiat : Sed tunc non habet amplius rationem symptomatis , sed causæ , alioquin enim affectus , qui istius symptomatis sunt causæ , ipsi sibi indicandi rationem vendicant . causæ vero sunt multiplices , de quibus nonnulla dicemus summatim , hoc primum posito , quod locus proprius in quo naturæ instituto sanguis servatur sunt venæ , & arteriæ : unde confertim , & copiose sanguis effluere nequit , nisi aperta vena aut arteria , quæ nequeunt aperiri : nisi aut ab externa causa , & procatactica , si incidantur , vel frangantur & dilacerentur , vel si erodantur ulcerenturque ex aliquo acri & erodente medicamento , vel ab interna antecedente , ut ab acri & erodente excremento destillante præsertim à capite . vel aperiuntur ora illarum , quæ ad nares terminantur : aperiuntur autem , aut ob nimiam earum plenitudinem aggrauantem naturam , quæ deinde excitat expultricem facultatem , vel ex acri pungente & mordente , vel ex nimis calido sanguine , vel ex infirmitatē venarum , & contrictis facultatis , quæ in eis sunt , ex mala aliqua intemperatura , à qua sit correpta hæc particula . Quandoque ab ipsa natura sponte sua agente non vi alterius morbi : quippe quæ morbum aliquem , præsertim acutum hac ratione indicatura est , vel ex nimia sanguinis tenuitate : unde , vel nequeunt vel ægre queunt ipsum continere . de refusalione autem , quæ fit tum ex tenuitate sanguinis , tum ex raritate vasorum , non est cur multa dicamus , cum rarissime hac de causa & in multa copia possit sanguis effluere . His vero positis , aut omnis , aut princeps indicatio est petenda ab ipsis causis , nempe , ut primum remoueantur . quia remotis est illis , aut sponte sistetur sanguinis profluuium , aut paruo negotio . Sed si occasionem habet à nimia copia sanguinis , vel à natura indicante aliquem morbum , nulla ratione illi occurrendum est , neque sistendū , nisi tūto impetu concitata natura moueat ut iam vires illud timere incipiant . alioquin enim euacuata copia sanguinis , quam

euacuari

euacuari expediebat, definit illa profusio ex se. de soluta autem con-
tinuitate ex ulcere, vel vulnere, vel fractura in naribus paulo antea
sermo à nobis habitus est. de infirmitate venarum, quæ earum intē-
peraturam sequitur, satis nobis fuerit quod contrariis tam in vi-
ctus ratione, quam in medicamentis sit corrigenda illa intempera-
tura. Quibus ita summatim expositis accedamus ad rationem clau-
dendi ora venarum quocunque modo fuerint aperta. Verum si præ-
ceps fuerit impetus sanguinis irruentis ad nares: nisi prius in petus
ille refrenetur, aut ægre admodum claudi poterunt, aut nequaquã,
nullum efficacius impetum irruentium humorum refrenat & inter-
cipit, quàm reuulsio, tum cum vacuatione, tum sine vacuatione,
quare nisi vires imbecillæ, vel ætas obstant, secunda est vena hume-
ralis, vel cephalica, qua respicit narem vnde exit sanguis. Sed si hæc
obstant, illud idem agere enitendum est aut incisio cucurbitu-
lis, vel sine præcisione etiam, citra aliam vacuationem, affixis illis
infernis partibus, præcipue vero præcordiis vel altero, vel utroq;
si ex utrisque, vel ex altera tantum nare fiat sanguinis excretio. mox
vero externis remediis agendum erit, quæ refrigerando imprimis
& astringendo, partim repellere, & aliò conuertere possint motû
sanguinis, præsertim vero deorsum, vt si aqua frigida in faciem frō-
temque irroretur, vel aspergatur, vel etiam posca, aqua nempe fri-
gida in mixto aceto. vel si lintheus his iidem frigidis, vel similibus
aliis madefactis ceruici nude inuoluat. postremo nari eainiciant
quæ possunt astringendo id præstare & aliqua præterea emplastica
facultate claudere ora vnde exit sanguis, & quamuis ab antiquis
medicis multa descripta sint huic officio apta medicamenta, ait ta-
men Galenus se aliud non inuenisse, quod præstantius id præstaret
quam medicamentum id, quo, & in vulneribus, & in aliis omnibus
affectibus, in quibus solet talis fieri sanguinis eruptio. vti consue-
uit vt, est illud, quod expositum fuit in priori libro, vbi, & de
aliis pulueribus egimus, quos ab affectu constrictiuos medici nun-
cupant, & quia superuacuum esset de illis hic iterum verba facere,
ideo hic consistemus. Nam & si possemus aliquem sermonem habe-
re de affectibus per apta medicamenta curandis, qui proprii sunt
istius particulæ, vt est instrumentum sensus odoratus: quoniam ta-
men omnes vel in ipsum cerebrum, vel de stillationem, vel poly-
pum, vel inflammationem, vel scirrhum, vel id genus aliud quod-
piam mearus obstruentem tandem referuntur, de quibus seorsum

& hæcenus egimus, & suo loco agemus, ne in longum minus nostra protrahatur oratio, eorum curatione consulto hic prætermittimus illud tantummodo monēdo, quod quemadmodum omnium aliorum sensuum, ita odoratus actio læditur uel imminuitur, cum obtusior est in ea sensus, uel ablatus, cum omnino tollitur, uel deprauatur: cum uitiatur corrumpitur uel, ut cum foetorem ex interno aliquo initio percipi uidetur: id quod fieri non potest nisi ex putrescente aliqua interna humiditate, quæ deinde putredo præsertim intemperiem earum partium calidiorem sequi solet. Quando autem imminuitur, uel tollitur, uel est ex defectu facultatis in suo principio: nempe in cerebro, uel ex aliquo uitio contracto in instrumento quia sint uia transitus odorabilem ad ipsum sensum obstructæ, obstructio fieri potest, uel à materia crassa destillante à capite & obstruente meatus oris, quod à cribri similitudine ichmoides dicitur, uel ex aliquo tumore præter naturam orto in narium meatibus, ut polypus, inflammatio, scirrhus uel quid simile. igitur hoc tantum addito, quod ad apericendas internas obstructions excitatas à crassa materia infarctæ in naribus inde inspirationi & odoribus intercipitur transitus, solent medici uti suffitu decoctorum earum rerum quæ vim imprimis habent, attenuandi & secandi, quorum non semel prius facta est mentio, & proinde non toties repetenda; quæ decocta si ex aceto, & illo etiam acri fiant, efficaciora erunt. finem ergo huic capiti imponamus, transeamusque tandem ad ea quæ auribus contingunt.

Lib. 8. cap.
16.

De medicamentis, quibus utuntur medici in aurium affectibus ex ratione curandis. Cap. 14.

Sicut non admodum dispar est ratio eorum affectuum, quibus aures obnoxie sunt, ab illorum ratione qui nares corripere solent: ita neque admodum utrorumque dissimilis erit ratio curationis: si aliqua autem sit differentia erit ea quæ à differenti natura eorum, depromenda est. nam si compositionem auris consideramus, illamque naribus conferamus, aures sunt aliquanto (ut omnes præsertim anatomici restantur quam nares sicciore: unde in morbis, qui in utraque particula ad idem genus pertinent, sicciore medicamenta requirunt, & facilius ferunt aures quam nares. Sed exquisitori sensu à natura ponantur sunt interiores aurium partes, quam nares. loquor autem

tem de sensu tactus in præsentia, ratione cuius vehementioribus doloribus auris exposita est quam nares. hoc autem habet, quia ad aures natura nervos insignes, & molles ex illis coniugationibus nervorum qui statim interiori à cerebro sunt deducti. atque ea membrana quæ interno auris meatui vndique prætensa est à membranis cerebri deriuatur. nimirum ergo ex his duobus capitibus occasionem habet quæcunque est differentia, in compositione & usu medicamentorum attinentium curationi affectuum harum particularum, sed antea quam particulatim rem aggrediamur, hoc etiam consideremus, quod sicuti affectus qui externis partibus accidere possunt ut abscessus, tubercula, vlcera, & id genus alia, non habent diuersam aliquam rationem ab illa, quam habent similes in aliis partibus, ita eidem curandi rationi subiecti sunt: quam ob rem, ne in superuacaneis laboremus, neque ubiq; eadē repetamus, de internis partibus sermonem instituemus. Internæ vero partes duplici modo considerandæ sunt, altero qui secundum se: quatenus nempe ad propriam earum naturam pertinet, altero vero quatenus ex illis compositum est integrū instrumentū, organū, sensus, auditus, quatenus ad primam rōnem, obnoxia est auris: omnibus intemperaturis tam simplicibus, quam compositis citra materiam, & cum materia, in quo genere sunt inflammationes, & reliqua, quæ in genere tumorum præter naturam à medicis recenseri solent: sunt præterea obnoxia omnibus affectibus, qui in solutione vnitatis consistunt, & eis tandem omnibus quorum comes potest esse dolor, sed & obstructionibus. quatenus vero ad secundam rationem spectat, expositæ sunt omnibus illis affectibus à quibus primum potest lædi actio istius sensus. læditur vero tribus illis modis, quibus aliorum sensuum actiones lædi solent. quia, aut omnino tollitur ut in surdis, aut hebetatur, ut in surdastris, aut viuiatur ita ut perperam audiant, seu obaudiant. sicut in illis, qui sibi videntur exterius somnū audire earum rerū, quæ tñ tunc nullū strepitū exterius edunt, ut si bilos, vel campanarū sonos, vel fluentiū aquarū vel ventorum, & id genus alia multa. Sed de prioribus primum agemus, primumq; de dolorosis, aurium affectibus, postea quam maximos, & vehementissimos maximeque molestos interdum dolores illas corripunt. quorum in vniuersum, ut omnibus medicis in confesso est, duplex est causa intemperatura, quando confertim & cito transmutatur, itemque solutio continui velox, dum ipsa etiam sit: non autem cum

iam facta est. prima autem ratio pertinet ad frigidam vel calidam, si magnus sit dolor, humida nisi cum materia fuerit non efficit dolorem, & quando efficit, non ratione qualitatis, & transmutationis: Sed ratione materię quatenus aut aggrauando, aut replendo & distendendo, & subinde dilacerando continuum soluit. siccitas vero, ut qualitas est, aliquem concitare dolorem potest: Sed non admodum magnum. Cum ergo insignis excitatur in aure dolor, a nimio calore, vel ex externa causa, ut solis æstu, quo male fuerit affecta, aut ab igne, qui uicinus nimium illam calefecerit, aut teruenti aqua in aurem iniecta. Vel interna, nempe a calida fluxione calidiorum humorum, quando calore potius afficiunt, quam quod replentes distendant. interdum vero utroque nomine, nempe, & quia calefaciendo transmutat, ite quia replendo & nimis extendendo distrahunt & ferè dilacerant affectas partes ut sit in inflammationib. a frigore et utroque modo gignit dolor a causa nempe externa, ut a frigidiore aere: præsertim cum vento frigidiore, quia uentus cum impetu statim irrupit in aurem: ideo antea quam frigus remittatur, potest magis particulam afficere. solus autem aer in ingressu illo flexuoso diutius moram trahens, antequam intimas partes pertingat a circumstantibus sæpe fit, ut deinde nequeat plurimum ledere internas auri partes: sæpe ab aqua frigida se in meatum auris insinuante possunt vehementes concitari dolores, sicut interdum accidit natantibus, & immergentibus se in aquis frigidis vel communibus vel medicatis & mineralibus. Sed ab interna & antecedente causa itidem potest dolor occasione habere, ut ab aliqua cruda pituita, vel ab humore melancholico, si è capite, cerebroque defluerint. præsertim vero vehemētes afferunt dolores si rarefacti & non discussi a calore auris non admodum ualido in statum uertuntur, qui ibi intrusus & inclusus, dum exire nititur indeque erumpere partibus præ nimia distensione quasi dilaceratis, ualidos cit dolores. Ratio itaque inueniendorum componendorumque medicamentorum aptorum curationi horum affectuum duobus innititur fundamentis præcipuis. nam oportet ut medico sit optime perspecta materia medicinalis: nempe ut noscat naturas & uires simplicium medicamentorum. nec id in uniuersum, & confusa cognitione, sed particulatim, & distincte quantum ad eorum ordines spectat. Deinde uero ut probè etiam teneat, atque respiciat, & in rectum ordinem redigat scopos, quos offerunt indicationes, quæ sunt de prompte, tum ab affectus curandi natura, tum uero a natura

tura corporis mali affecti, ac itidem particulæ laborantis. atque ab alijs, quæ tandem in hæc referuntur. Et quantum ad intemperaturas simplices citra materiam, illæ quidē, vtpote quæ simplices sint, simplices etiam offerunt scopos: nimirum illas contrariis remediis quantum ad qualitates attinet, in quibus a naturali temperamento factus est excessus, oppugnandas esse selectis tñ illis quæ naturæ illius particulæ accommodari ex ratione possunt. Sed si à materia pendeant, & foucantur, tunc multiplices exurgunt scopi, a pluribus indicationibus emanantes. nam indicatio a materia desumpta ostendit prius illam materiam quæ fecit, & fouet illam intemperiem detrahendam esse, quare statim exurgit scopus euacuandum esse. instrumenta autem illa quibus probè euacuari potest ea materia, nobis ostendit naturam humoris fuentis, vt docere Hippocrates & Galenus primo aph., euacuata autem materia, quæ bifariam potest euacuari. nā vel vt præcipue reuellamus, quod maxime necessarium est, cum a fluxione pendet vniuersa ferè occasio excitandi morbum illum: & hanc vacuationem, statim ab initio oportet moliri cum morbi incohant, vt procul a loco affecto conuertatur fluxio, vel vt tñ modo euacuemus quod conuenit, cum vniuersa iam fluxio aut ferè vniuersa, euacuatio autem necessaria quia fluxam, & iam receptam materiam a loco affecto proxime detrahat oportet. loca vero per quæ opportune possit ea fieri mutatio, ostēdet situs ipsius malæ affectæ particulæ, & connexio vel communitas cum alijs. quæ ita summam a nobis exponuntur, cum illa non pertineant proprie ad præsens institutum. hoc tamen, antequam magis particulatim conuertamur ad rationem medicamentorum, addendum putamus, quod cum auris particula sit, quæ in capite sita est, & quasi pars eius, & maximam connexionem habeat cum cerebro, à quo multa suscipere potest excrementa, tum suapte natura, tum etiam ex alijs occasionibus, quæ sunt præter vtriusque naturam, opus est, vt medicus rationem habeat vniuersæ corporis: si illud multis supernuacaneis humoribus scatet, à quibus aurium affectus foteri possit. Sed mox, & capitis, vt & ipsum proprijs, & consuetis instrumentis euacuetur, quibus rectè peractis localibus remedijs res ipsa tractanda erit, quorum princeps ratio a supradictis indicationibus erit petenda. quia si dolor, vel alius quouis affectus pendeat ab aliqua materia fluente in eum locum: si res in principio fuerit: sicut si inflammationis esset

esset initium: auertenda inde esset fluxio. auerſiunt autem ea, quæ refrigerant, ut sæpe alias dictum est. postea euacuanda est illa, quæ iam influxit materia, quod per digerentia fieri poterit, dum vero partim fluit adhuc, partim iam fluxa est, commixtis & repellentibus & digerentibus curandus erit affectus. & quamuis communis hæc sit ratio omnium affectuum curandorum, quando fiunt a fluxione: tamen maxime, & præ aliis attribuitur inflammationi, utpote qui sit morbus magis præceps & acutus, quique longe vehementiores affert dolores, & proinde difficilius ferri potest, & celeriora, maioraque remedia requirit. si itaque, uel inflammatio, uel alia alioqui affectio dolorosa, à fluxione calidiori concitata erit, si quidem magna fuerit cum pulsu, uehementioribus erit remediis locus. ut tamen id imprimis consideretur an adeo urgeat doloris sæuicia, ut iam sibi aliquam indicationem arroget, quæ etiam interdum tantam vim habeat ut obscuræ alias indicationes, quæ ortum habuere, uel à causa, uel ab ipso morbo: quia tunc opus esset incumbere uel omnino uel ex maxima parte sedando dolori. & si aliis nequiremus auxiliis, saltem illis, quæ vim aliquam haberent stuporem inducendi, ea narcotica à Græcis dicuntur. verum nili ita urgeat dolor & mediocris sit inflammatio, leuioribus erit agendum repellentibus ea commiscendo, quæ proprie à modina dicta sunt, nempe quæ cum aliquo: modico tamen calore aliquantulum laxant & digerunt. Sed si importunior sit dolor, & iam limites pertranseat, quibus perferri iam & tollerari a natura possit, necesse esset addere etiam illa, quæ stuporem, ut diximus, adducerent. At magis particulatim agamus, & ea medicamenta describamus, quæ magis præcipua, & in frequentiori & magis familiari usu & antiquitus & nostris temporibus esse solent. primum ergo, & præ omnibus aliis, sit ubique mentio olei rosacei: addit tamen Galenus, si optimum fuerit rosaceum. optimum uero est id, quod sit repetitis sæpius, & mutatis rosarum foliis. sique oleum optimum fuerit & iminaturum: ita enim erit, & magis refrigerans & magis astringens. hoc ergo statim ab initio infundendum tepidum in auris meatum. Secundo uero loco à Galeno & aliis laudatur oxirodinum, hoc est oleum itidem rosaceum immixto aceto. de qua mixtura, in primis istius quæstii commentarii capitibus, quatenus opportunum huic instituto

esse videbatur sermo fuit habitus . Verum antiqui medici duplicis modi , quod parari hoc oxirodinum possit meminere ; primi quidem Galenus . nam cum usus illo erat , acetum , ut superius diximus , oleo infundebat , & ut exquisita fieret mixtura agitabat & concutiebat , statimque auri infundebat . Mesue uero accipiebat tantumdem utriusque : deinde ad ignem positum procurabat , ut ad consumptionem aceti deferuescerent : deinde tepescens medicamentum infundebat . mihi uero uidetur , quòd primum magis refrigerare possit . quia : si Galeno credimus , quæ diutius ab igne coquuntur , ab eo etiam aliquid ignei contrahunt . Quod si uideretur feruor adeo ingens & fluxio ut & maiori esset opus refrigeratione , huic medicamento addebant aliquam portionem alicuius succi ; qui refrigeraret , astringeret , & subinde repelleret . antiqui glaucium addebant , aut collyrium ex eo confectum , de quo egimus ubi de affectibus oculorum fuit institutus sermo . memite appellant hanc herbam ubique Arabes . quam quia ea caremus in præsentia : sub silentio præteribimus . possemus pro eo alio ui succo refrigerante & astringente , ut esset succus polygoni , capreolorum uiris , caudæ equinæ , solani , aut germinum rubi . Quod si dolor aliquod præterea uideretur postulare quod refrigerando quidem : sed magis deliniendo demulceretur : accommodatissimum , ut in primis Galenus & cæteri Græci , deinde uero Mesue & Arabes consulunt , esset lac muliebre ita calidum in aurem mulctum , aut album ouis conuassatum & tepescatum . uerum tamen quando adhuc inualeceret magis dolor , tandem illis essent ad mouendæ manus quæ stuporem sensui inducunt : nempe , quia aliquid opii accipiant . ubi id considerandum , ut in superioribus etiam capitibus ex Galen. sententia monuimus , quod in dolore capitis omnino damnauit usum rerum , quæ soporem afferunt , in doloribus autem aurium : præsertim uero ex inflammatione eorum usum admittit , & hoc propterea , quia longe deteriores , & validiores sunt aurium dolores , & magis in eo præceps est periculum , propter auditorium neruum qui statim a cerebro ortu suu habet , & illi etiam maxime vicinus est : & hac de causa facile cū illo cerebrū sentire potest . Sed particulatim de medicamentis agamus , de quibus eorū usu , quæ huic officio sunt accommodata . postquā ergo ea expedita fu-

rint, quæ geueralia dici solent, quæque pertinent ad euacuationem
vniuersi corporis, & capitis pariter ad reuulsiones. atq; cū admini-
strata fuerint, quæ vim repellēdi habent, vt oleum rosaceum, vel
oxirodinū, vt paulo antea expositū est, si dolor plurimum urgeret
tentassetque medicus illum, aut albo oui, aut muliebri lacte delini-
re, hocque parum contulisset & esset opus vehementiori reme-
dio, tandem ad vsum stupefacientium esset deueniendum. quamuis
autem multa reperiantur medicamenta ab antiquis medicis descri-
pta, opium recipientia, optime ab illis composita, qualia sunt multa
collyria, quæ relata sunt: ubi de curandis dolorosis oculorum affecti-
bus egimus: sicut erat illud, quod diagraucium appellabant, nec nō
collyrium album cum opio, de quo superius fuit habitus sermo, &
illa quæ diarodon & diacrocu dicta sunt. solebat tamen Galen. non
nullis vti, quæ illi & apta magis tutioraque & faciliora paratu vide-
bantur, duorum vero mentionem faciemus. instillare solebat lac
mulieris nuper multum, in quo fuisset dissolutum parum opii: vt
potē si grana duo, vel etiam tria immiscerentur semunciz lactis.
Vel hoc aliud, quod componitur ex opio, & castoreo & sapa, multi.
quippe quæ in sedandis doloribus vim maiorem habet, aliquando
autem accipiebat par vtriusque pondus. componebat autem hoc
pactō, castoreum optime tritum leuigabat, itidemque opium ex sa-
pa, simulque commiscebat, tantum vero sapa assumebat, quantum
erat satis ad hoc ita diluenda, vt fluere possent. hac vero composi-
tionis modo utebatur si uehemens admodum videretur dolor, alio
quin enim duplum accipiebat castorii ad opium. Quod si iam flu-
xio, aut omnino maiori ex parte fuisset intercepta, neque uehēmēs
admodum urgeret dolor, illorum iam esset opportunus vsus, quæ
vim haberent, tum cōcoquendi tum digerendi. ita tñ vt non eadem
esset opportuna credendū sit. quia si adhuc insignis in eo loco esset
feruor, uel tepus esset estiuum, & insigniter calidū, accommodata es-
sent oleum amigdalæ dulcium, adipēs etiam qui non pluri-
mum calefaciant, qualis est gallinaceus, anserinus, anatini-
nus vulpinus, ut aut aliquis eorum seorsum imponatur, aut
ut plures mixtim, illis tamen addatur rosaceum oleum: si
uel adsint adhuc reliquæ caloris, & inflammatione præ-
sertim quando in incrementum iam aduenit, quo tempo-
re curatione mixta ex repellentibus, & digerentibus esse
opus dicebamus. quod si omnino cesset fluxio, & incre-

Qq 3 mentum,

mentum præterisset, opportunum esset oleum chamemelinum, uē-
pote quod magis laxet, & digerat. duplex autem est modus admi-
nistrationis. nam vel illis eliquatis & mixtis ita sosa, & eliquata in-
fundantur, uel adeps efformatus ad similitudinem collyrij demer-
gatur prius in oleum tepidum: subinde vero meatui auris indatur.
Gal. autem, qui volebat instruere medicos: nō solū qui pauperū cu-
rationi præerant: uerum, & eos qui principibus & delicatiorib. præ-
cipue nobilioribus mulieribus mederentur, quæ medicamenta illa,
quæ nō bene oleant detrectare solēt. ideo ait illa vnguenta preciosa,
quæ in multo usu erant illa tēpestare, quæ foliata uel nardina dice-
bantur, his quoq; affectib. posse cōuenire: de quib. quia tēporib. istis
in nullo sunt usu, volumus in præsentia uerba facere. in libro autem
de medicamentis facile parabi. ait quod tetrapharmacum vnguētū,
si illi addatur spica nardi erit uile medicamētū his dolorib. ex inflā-
matione, uersus inclinationē, & nulli dubiū est quod intelligit uerā
spicā nardi: quia tñ raro habere possumus eā spicā uerā, & recentē
ita, ut vires eius nō sint obsoletæ: ideo quāuis celtica spica sit aliquā-
to infirmior, nō erit tñ inutilis illius mixtura, sed, si collyqnaretur
tetrapharmacū hoc, quod ē Basilicon nūcupant, oleo nardino sim-
plici quidē, tantundem, in eo quidē iudicio esset. in hac autem ratio-
ne curandi inflāmmationes & ea continentur qua dolores tollendī
sunt ex alijs calidis causis excitatos, siue ex materia ortū habuerint,
siue citra illam molestē sint. quia illis eisdē refrigerantibus, quorū
meminimus, curatur nulla habita euacuationis ratione, qñ nulla præ-
sens fuerit materia. Quod si illa adfuerit, eodē modo, & eisdem in-
strumentis uacuationē moliri oportebit, quibus & in inflāmmatio-
ne. Vnde uno tantum exposito, quatenus ad usum istorum medica-
mentorum pertinet: quod a Gal. plurimi sit, ad dolores qui concu-
tantur a causa uel affectione frigida nostrum conuertemus sermo-
nem. Illud uero est, quando dolet insigni & ualido dolore internus
auris meatus, medicamenta sunt liquida & fluida infundenda uel in-
stillanda: itaq; nulla re loca circumsolentia tangamus, ullo instru-
mento, neque etiam lana quantumlibet molli, neque etiam si ali-
quid uī deatur detergendum. Sed ex infusis sepius fluidis medica-
mentis eluatur. nam facillime loca illa, quæ exquisiti sensus sunt,
propter neruum illum auditorium quolibet uel leni tactu exa-
cerbantur. post infusa autem medicamenta contegatur meatus la-
na mollissima sine compressione aliqua. Hæc itaque ratio est me-
dicamento-

dicamentorum, quibus calida affectus aurium: præsertim uero dolorosi curari solent, atque eorum etiam usus. Quamuis autem non tanti momenti sint, neque adeo insignis periculi dolores qui a frigidiore causa ortum habent: attamen interdum, & hi uehementissimi sunt, & sæpe non parum curatu difficiles. ideo rationi consentaneum esse uidetur, de his quoque aliquem habere sermonem, & quantumlibet perinde in his, ut in prioribus, & ab frigore circumsulam materiam possit dolor concitari, & ab eodem cum materia, ne frustra tempus conteramus, sumemus initium ab eorum curatione cum materia, utpote quoniam, percepta ratione eos curandi, statim & ea poterit esse perspecta qua curetur & corrigatur sola interperatura. & quia scopus quem nobis in hoc compendio proposuimus est, quoad per nos fieri potest, omnia ex methodo exponere: cuius potiora principia sunt indicationes, quas a natura affectus petendas esse antiqui, & rationales medici nos docuere: ideo de causis a quib. cõcitantur id genus dolores agere par erit. Cũ autem proxima horum dolorum causa sit, aut crassus, & lentus humor, aut spiritus flatuosus intra aurcm, in partibus nempe internis auris intrusus & inclusus, qui dum quærit exitum illi interceptum ex obstructione, distendit, & quasi dilacerat partes in quibus conclusus est, ut exire possit, atque ita soluto continuo dolores uehementes affert. hinc fit ut princeps & primaria causa istius affectus sit obstructio, uel potius ipsemet affectus, quæ quidem licet possit à crassitie ipsius humoris: plerumque tamen occasionem habet ab externo frigore ex aere, aut uento aut aqua frigidiore ex. frigore enim solent condensari constiparique externæ partes, ipsaque nostri corporis substantia, atque ita eorum meatus concluditur, ut nequeant per eos diffiliari & excerni multa, quæ alioqui excerni solent excrementa uaporosa, per excretionem & effluxum sensibus inconspicuum. his autem detentis ac in flatum conuersis, ac replentibus ac subinde distendentibus partes in quibus includuntur, fiunt dolores. & quamuis ad præsens institutum non uidetur pertinere de motis, quib. dignosci possit, quando & flatu, & quando a crassa materia sit concitatus dolor: quia tamen Galenus 3. de compositione medicamentorum per loc. horum quoque breuissime meminit, nos etiam eadem exponemus. Hoc ergo tribus argumentis percipiemus primum ex modo doloris. quia si dolor fuerit cum grauitate, necesse est, ut a materia lenta & crassa foueatur. Sin autem cum distentione

Cap. I.

a flatu fomentum habebit. Deinde vero ex præcedentis victus ratione vt si victus eiusmodi fuerit, vt plurimum flatum generare potuerit, aut crassam lentamque materiam. Tertio si causæ præcesserint; de procacitatibus loquor, quæ constipare aurium partes soleant: vt refrigerantes, ac illis constipatis esse occasione vt congestus sit flatulentus spiritus. Sed redeamus vnde diuerteramus, & rationem exponamus inueniendi, componendique id genus medicamenta, quorum vsu curare oporteat hos aurium dolorosos affectus. Verum quia institutum præfens præsertim spectat medicamenta illa, quæ topica uel localia solent a medicis dici, quæque priuata sunt: hæc recte nequeunt administrari, nisi prius perspecto quo nam pacto se habeant vniuersum corpus & viscera capiti subiecta, & quo etiam caput, a quo semper aliquid ad aures solet facile defluere, quod auris affectum fouere possit. semper verò hæc consideratio, vt pote quæ generalior sit & communior, his priuatis præmittenda est: & si aliquas obrulerit indicationes, quæ vim aliquam insignem habent. nempe quia, aliqua partes illas occupauerit plenitudo, aut cacochymia: illis prius, per accommodatas vacationes purgationes ve erit inferuendum, pro vt euacuandi humoris ratio demonstrabit. quæ tamen omnia in præcedentibus, tum capitibus, tum libris sunt particulatim explanata; ideo illis prætermisissis, in præsentia, solis indicationibus & scopis insistemus, quæ nobis ostendere possunt rationem medicamentorum, quæ tamquam topica remedia possunt isti curationi apte accommodari. Cum itaque vniuersum ferè horum affectuum momentum consistat proxime in obstruptione, quæ ortum habuit, aut a crassis lentisque humoribus, aut a constipatione, statim oritur indicatio esse aperiendum attenuandum & incidendum ac detergendum tantum his, quæ id citra mordacitatem præstare possint. secus. n. loca affecta irritarent: vnde dolor magis recrudesceret, has autem vires ea imprimis habent, quæ constant ex partibus suapte naturæ tenuioribus. eius generis sunt multa quorū à principio istius commentarii fuit facta mentio, vt thapsia, euphorbium, sinapi, adarce, alcioniū, & id genus multa, atq; in vniuersum omnia vt tradidit Gal. quibus ad comminuendos calculos medici solent vti, quorum ampla sylua fuit à Gal. descripta in libris de fac. simpl. medic. in 3. autem de compositione med. secundum locos ea quæ magis præcipua sunt recensuit. quæ sunt spuma niri, ipsumque niri-
 trum

trum,oleum præterea amigdalinum, præsertim vero expressum ex amaris amigdalibus,utrumque veratrum,tres Aristolochiæ,iris illyrica,cinamomum,cassia,radix sylvestris cucumeris,bryonizque,& ari,ite & draculi,& centaureæ poliû,& tandè quæcunque amara sunt,utpote quæ meatus expurgent. Alij vero ut Mes.mulcorû me minere,tû oleorû,ut chamemelini,anerini,laurini,ruthacei,alborû liliorû,oleû ex matronali viola,quâ cheyri Arabes nûcuparût,maxi me etiam laudat oleum expressum ex fructu quem Arabes ben appellant,Græci myrobalanum,hoc est vnguentariam glandem. quod oleo præcipue vnguentarii vtuntur.& tandem quæcunque calefaciunt & discutiunt,quorum sylua amplissima.hæc autem sint tamquam exempla proposita.Iuniores vero ex sententiâ tamen quorundam Arabum præferunt omnibus fere aliis oleis in sedandis dolorib, similib. nō modo auris, sed aliarum etiam particularû,oleû ex vitellis ouorû expressis,ex his mixtis simul possunt uaria confici medicamēta cōposita,in quib.examinādīs nō consumemus tēporis plurimū.nemo.n. est, qui perceptis simpliciu naturis unde cōponūtur, ac illis mutuo collatis,sequentē normā,qua in priorib.libris usi sumus,non possit ex se facile ad examen reuocare. Sed neque præterea hæc sunt prætermittēda,quorû a plerisq; sit mētio,quasi eorû quæ plurimā vim habēt instillata in aurē,ad tollēdos hos dolores. ut oleû in quo efferbuerint aselli,qui & mille pedē dicuntur,oriuntur uero sub hydiis aquarû itidēq; & lūbrici terrestres,siue ex oleo amigdalaiû amararû coquātur aut chamemelino,aut anethino,aut alio ex supra relatis,siue ex cōmuni oleo.& ut efficacius esset medicamētū,aliqui in cēpe ex cauato oleû efferrere faciunt.quod potest ad hos usus adhibēa.vulgare autē ferē remediū est,ut uale co olei quod guturnio simile est:habet.n.angustū quoddā orificiū,quo oleû effundit,quā illud nolūt confertim effundere,cōcalecto,dū oleum non continet,atque angusto orificio meatui auris applicato uaporē calidū excipiant,quod si aliquod aliud ex prædictis oleis cōtinuillet,validius esset medicamētū.Sed de his satis superque egimus,atāscamus in p̄sentia ad rōnē medicamētorû, quibus curanda esse aurium ulcera docuere petiti medicī.summatim tamen prius aliqua dicamus de causis occasionibusque unde concitari solent ulcera in auribus, ut facilius deinde rationem inire possimus, ea ad curationem adducendi. sunt ergo ulcera in auribus, tum ab aliqua externa, tum ab interna causa. sicut de

de vlceribus aliarum partium, diximus, de quibus hætenus sermonem habuimus, & quæ ab externa causa occasionem habent, vt à gladio sagitta aut ab alijs id genus instrumentis, vel à liquore aliquo medicamentofo & erodente instillato in meatum auris, ea plerunque solent esse simpliciora quantum ad ipsa pertinet. nam si interdum aliquam contrahant malitiam, vel malignitatem, id potius illis accidit ratione vel male affecti corporis ob eius aliquam intemperaturam, vel alicuius alterius particulæ eius consensu male afficitur vlceratus locus. quæ autem à causa interna, quam antece dentem vocant ortum habent, illa necesse est, vt à confluxu viciofo rum humorum ad aurem, & plerunque à capite foueatur. possum tamen foueri à male affecto iocinore, vel liene, vel ventriculo vel vniuerso corpore, quæ sanè omnia oportet esse cognita medico recte curaturo hæc vlcera, vt pote quæ nequeant recto, & exquisitè vnquam curari: nisi prius remoueatur causa. Sed ad remouendam causam à qua seruatur vlcus, & ad subtrahendum fomentum quod curationi vlcis obsistit, vt in alijs quoque quæ superius à nobis sunt tractata, monuimus, vel vniuersum corpus curandum erit prius oportunis purgationibus, vacuationibus, reuulsionibus, quorum superioribus capitibus facta est frequens mentio, atque corrigendum si quod fuerit vitium in vniuerso corpore, vel si cum aliqua alia particula sit insignis consensus, cuius ratione vlcis curatio impediatur, turbeturque, ita tractanda ea particula est remedijs appositis, vt consensus ille tollatur. His autem recte peractis, simili ferè modo, quo & posse fieri in alijs similibus affectibus priorum particularum, diximus, tandem conuertenda erit vniuersa curatione ad vlcus particulatim: obseruatis omnibus, tum scopis tum indicationibus, quæ & à natura vlcis in vniuersam depromendæ sunt, & ab illis, quæ cum vlcere coniunctæ sunt, si aliquis sit aliorum aliquarum affectionum complexus. Solet autem, aut semper, aut plerunque in vlcere duo illa excrementa reperiri, quæ vlcus ferè quatenus vlcus est sequi solent. nempe tenue illud, & serosum vel ichorosum, quod virus nostri appellant, & crassum illud & feculentum, quod sordem dicunt, vnde duæ sunt vlcis primæ ferè differentia, nempe virulentum, & sordidum: prout vel virus, vel sordes abundantius scætant in vlcere. sunt tamen & aliæ differentia quarum frequens est mentio dum de vlceribus in vniuersum sermo instituitur, nempe erosum, & putridum, de quibus non proficemus

feremus orationem in longius, quia de illis antea sæpius locuti fuimus. Deinde vero conuertenda erit consideratio ad naturam partikulæ: nempe auris, ut pote cuius indicatio sit, omnem medicamentorum rationem, moderatura. Ut autem sæpius itidem diximus communis curandorum iuuentum ratio, à primis illis duabus differentiis assumpta, duos nobis scopos proponit: qui sunt, exiccandum, & detergendum. quos ferè reliquæ omnes differentiæ tamquam fundamenta subiciunt. Omnia enim vlcerum exiccatione, tum deterfione curanda sunt. non tamen eisdem aut æqualibus siccantibus detergentibusque, quia alia magis siccantibus, vel detergentibus curari requirunt: alia vero minus. huius vero diuersitatis ratio à duobus præsertim capitibus depromenda est. à conditione, & modo, vel ratione vlceris, quatenus, aut magis virulentum, aut fordidius est, aut erodens, aut putridum est. Præterea vero à naturæ particula. nam inter sensuum instrumenta, nullum auri siccius est, ut pote quod constet cute, cartilagine, membranosa substantia, neruoque, & osse, quæ omnia admodum sicca sunt: & proinde, si ad naturam eiusmodi instrumenti respiciamus, siccioribus præ aliis ferè paritulis eius vlcerum curanda sunt. præterea quia medicamenta accotimodata curandis aurium vlceribus, si interior meatus vlcere tentatur, instillari plerumque solent, & hac de causa ea fluida oportet reddere, vel ad eam compagem adduci, ut illiniri possint, quare necesse plerumque est ut liquore aliquo diluantur: præcipiunt antiqui medici ferè omnes ea atterenda esse in medicinali cote, leuigandaque, ex acerrimo ætæto, ut maiorem desiccandi vim sibi compèant. Quia vero non omnino omnia ulcera eisdem medicamentis qualiacunque sint, & in quocunque tempore curentur, tractari oportet. Sed quo simpliciora sunt, & minus contumacia minusque maligna, itemque quo recentiora sunt leuioribus, & minus detergentibus minusque siccantibus, & minus acris medicamentis facile cedunt, quo uero magis inueterata, & contumaciora sunt, eo etiam ualentiora & acriora requirunt medicamenta: de negantibus prius sermonem instituumus ut pote quæ infirmioribus auxiliis superari soleant. Si igitur ad methodum ab antiquis traditam litteris respiciamus, quãdo ulcus sit nuper excitatum: si id ab antecedente & interna causa factum fuerit, necesse est, ut à fluxione acris succi originem habuerit, & proinde conuertenda erit curationis ratio, tum ad ulcus, quod, ut sæpius dictum est, siccari postulat, tum uero ad fluxionem
quæ

quæ fouere, & feruare potest fluxionem, vt ob id indicet repulsiō-
 ne esse opus, quæ fluentes succi auertantur ab vlcerato loco. duas er-
 go has facultates exigit à medicamento auri vlceratæ administran-
 do si curandum sit vlcus. Quare Galenus, cæteri quæ præsci medici
 in illis curandis glaucio utebantur, & pastillis ex glaucio confectis,
 illis quæ ex acri aceto leuigatis: item quæ pastillis quæ diarodon ap-
 pellantur, quorum examinationem posuimus in superioribus capi-
 tibus, vbi de medicaminibus aptis oculorum affectibus curandis
 egimus. Sed neque glaucium in præsentia habemus, neque pastilli
 nuper nominati parati reperiuntur, & licet eorum aliqui possint
 parati, sæpe tamen contingit nos facere medicinam, vbi neque apo-
 thecarii vli sunt, vt ruri, sæpe in exercitu, in nauigationibus. Num
 ergo copia medicamentorum quibus curari possint hæc vlcera nos
 deficiet? nequaquam. quoniam; si velimus rationalium medicorum
 vestigia sequi, consideratis illis facultatibus in his medicamentis,
 quas antiqui in illis requirebant: nempe desiccatio & astrictio, mul-
 ta nobis, quæ eisdem facultatibus prædita sunt, iidem trita & leui-
 gata ex acri aceto illud idem nobis poterunt præstare, vt hypocistis,
 cytini, mali punici eorundem malicorium, ex herbis vero plantago,
 polygonum, hyparis & sexcenta alia. Arabes vero in his vlceribus,
 & hoc tempore, utebantur mulla, detergit siquidem modeste & de-
 siccatur, sed & vino mulso quod magis item detergit & siccatur. quod si
 videatur esse aliqua astrictione opus, vinum mulsum ex vino aliquā-
 tis per austerum confectum magis opportunum erit. interdum vero &
 oximelite vti soliti sunt. Sed vbi magis exiccandum erat, iniiciebāt
 medicamentum factum ex thure vino dissoluto, aut altero confe-
 cto ex sarcocolla & thure assumptis vino, & pauco melle, aut alio
 ex myrrha, Aloe, & vino. hoc ex Aloe satis astringit. ex myrrha non
 parum detergit: ex omnibus vero valide desiccatur. alterum autem
 magis concoquit præsertim ex thure, & sarcocolla modeste. siccatur
 etiam modeste citra vllum morsum. primum vero cæteris imbecil-
 lius, modice enim astringit ex thure, & coquit à si tamen vnum sit
 aliquantulum austerum magis astringet, quod si pro vino, vt anti-
 qui agebant acetum terentur, longe efficaciora essent hæc medicamē-
 ta, & magis siccantia, sed cum talia vlcera difficiliora non erant, lau-
 dabant vsum collyriorum quæ diaroda dicebantur & diacroca, & il-
 lius quod Nili collyriū dicebatur, de quibus satis fuit à nobis actū.
 quæ aliquando ex vino, interdum ex aceto instillabat. Verum vbi

iam satis essent purulenta vlcera, citra tamen dolorem, quia ubi dolorosa sint ab omnibus, quæ detergendo mordent, ne locum exasperent & irritent, validioribus detergentibus utebantur, qualia sunt collyria, quæ antiquitus dialmyrna vocabantur. similem autem viam, & Arabes sunt sequuti, ut ex his comprehendi potest, quæ nuper fuere exposita. Postea vero cum peiora fiunt vlcera & valde purulenta, ut iam non sint expertia putredinis & malignitatis, accurre dum sane erit ad acriora medicamenta & quæ fortius detergant, & siccant, ut quasi erodendi vim habeant, ut inter ea, quæ antiquis erant in usu, est isis, dictum medicamentum, & quæ similem cum eo rationem habent, ut apostolorum, sed fortius est Aegyptiacum ab Arabibus appellatum medicamentum ab eis descriptum, Græci vero pastillis Andronis vel Musæ vel Polydæ frequenter utebantur, de quibus in tertio commentario diligens fuit à nobis sermo habitus. Attamen, tum Galenus tum etiam alii præsci medicis ad curanda contumacia aurium, malignaque vlcera, cæteris ferè aliis medicamentis præferunt scoriam ferri paratum (ut parari docuere medici illi) nempe diligentissime tritam, & in sole pluribus diebus ex acerrimo aceto leuigatam. multa præterea à varijs auctoribus descripta, in hunc locum possent transferri: Sed nimis postea excreceret hoc compendium, & ultra nostrum institutum progredieremur. quare huic capiti finem imponemus, nam si aliqua deesse illi visa fuerint, illa à tertio huius compendii libro, ubi de vlceribus fuit institutus sermo erunt petenda, quia, & huic loco illa optime accommodari poterunt, habita semper, ut docuimus, aliqua ratione naturæ istius particulæ.

De ratione medicamentorum, quibus consulere medici solent auditui laboranti quatenus ad propriam eius rationem pertinet.

Cap. 15.

EAdem omnino methodus, quæ ostendit modum & rationem curandi morbos, medico etiam rationem medicamentorum accommodatorum locis affectis demonstrat, & præterea modum
etiam

etiam vsus opportuni eorum, quia omnia hæc tandem, vt sæpius alias ex antiquorum omnium sententia ostendimus, ad iam sæpius expositas indicationes, & expositos scopos referenda sunt: vnde in his explicandis non erimus alioquin multi. sicuti neque quam similem habeant: imo, ferè eandem rationem affectus, qui ad sensus omnes pertinent, & à quibus actiones eorum propriè ladi possunt. vt pote quia illam iam superius explanauerimus. Sicut ergo in aliis sensibus, ita & in auditu solet contingere, vt penitus interdum tollatur auditus, vt in surdis contingere solet, interdum grauior sit & obtusior, vt in surdastis, quandoque vero vitatur & peruertitur in sibilo, & strepiu aurium, primus affectus ex proportionem cecitatis in oculis respondet, alter luscis vel lusciosis acrius illis, quibus variaz imagines præ oculis obuersari videntur. & sicut cecitas fieri potest, vel oblesam facultatem in suo initio, nempe in cerebro, ex aliquo eius proprio affectu. aliquando vero ex aliqua labe in instrumento sensus, ita & surditas, labe autem contracta in instrumento, est aut obstructio in nervis internis per quos defertur audiendi facultas ad aures: aut obstructio in meatu auris, per quem sonorum species feruntur interius ad primum sensus auditus organum. aut les aliqua intemperatura insigni contracta in nervo auditorio, obstructiões vero in nervis fieri possunt ex confluxu alicuius humoris præsertim crassi, & lenti atque plerumque à cerebro. aut ex aliquo tumore præter naturam velut, auris meatu, vel in locis illis proximis, ita vt ab illis premi possint. in meatu vero auris potest fieri obstructio vel ex orto aliquo tumore, ex illis qui præter naturam illius partis, ibi excrecere solent, sicut inflammationes, scirrhii, & varia tuberculorum genera, & uerrucæ, vel interdum ab excremento illo luteæ ceræ simili, quod peculiariter in omnibus per meatum auris excerni à natura solet, cerebrum, aut partes huc pertinentes expurgate. grumus interdum pusis ex aliquo interno vlcere congestus potest meatum obstruere: Sed & multabilis confluens ad organum auditus potest esse impedimento actioni ipsius sensus. vnde Hipp. in apho. dixit quod interdum, diarga surditatem soluit. potest præterea & aliquis humor externus in aurem ingressus auditum lædere, vt interdum in natantibus, aqua, vel dum lanatur caput, lixiuium. His autem modis imminuitur, aut omnino auferitur. Interdum vero vitatur corrumpiturque vt in sibilis & strepitibus qui in aure audiri videntur, nullo tamen exterius sonante, aut obstrepon

re. fit autem is strepitus à flatulento spiritu concluso intra me-
tum, qui dum mouetur motu quodam inordinato percutiens & co-
mouens internum, & quasi naturam auris aerem, eos strepitus con-
citatur. potest autem tum in aure gigni flatulentus is spiritus ab illius
inabecilliore reddito calore, ob intemperiem in ea subortam, cum
matéria, vel citra illam, vñ hoc postea sit refertendum in propriū
auris affectum, potest etiam alibi genitus in aurem se conferre, au-
re siquidem consentiente cum alia quapiam parte, vt cum cerebro
sæpius, quandoque cum vniuerso corpore, quandoque cum ventri-
culq. & sicuti imagines quæ ob oculos obuersantur, nunciant suf-
fusionem, & tandem cecitatem, ita strepitus illi vel sibili surdi-
tatem prædicunt. nam quamuis sæpe hæc non ex primario au-
ris affectu fieri contingat, quæ tamen ex consensu fiunt, ni-
si eorum ratio habeatur, cum consenserunt, transeunt in affectum
propriū. Sicuti autem, vt ex his quæ hæcenus fuere exposita, quid
que videre potest, non vnica sed multiplex est modus ratioque qua
lædi potest auditus: ita multiplices necesse est, vt exurgant indica-
tiones, multiplicesque scopi ab illis, medico cõsistantur, qui & me-
thodo voluerit medicamenta scrutari quibus consulendum sit au-
ditui male affecto recteque ea componere, & eis congruere vt
Sed, de illis, quidem quæ accommodatæ huic affectui esse possunt
quando auditus læsus est, aure cum cerebro vel vniuerso corpore
consentiente, vel cum ventriculo, non est cur in præsentia agamus,
quia omnis curatio est conuertenda, ad illa cum quibus consentit
auris, de qua agere non pertinet ad præsens institutum. cõnem vero
medicamentorū, quæ congruere possunt affectibus propriis auris
tollendis, atque facultates, quæ in illis exquiruntur, nobis exponere
propria illorum affectuum natura. Quare nullum de illis sermonē
habaturi sumus qui respiciunt auditum consentiente aure cum
cerebro vel aliqua alia particula. Quatenus cutem spectare potest
ad ablatum auditum aut inimistum ob aliquem tumorem præter
naturam in aure interna eius parte ad neruum pertingente exci-
tatum: si is fuerit calidus dolorosus admodū erit, & eisdem remediis
curandus erit, quo tollendū dolorē ex inflāmatione diximus in su-
periore capite: si autem frigidus & scirrhus: si aliqua eius potest
spectari curatio, post vincti corporis (si inde semenium habent,
procuracionem, mox & capitis,) vt sæpe prius fuit expositum, cu-
rari illis medicamentis secundum communem rationem habet, que
depro-

depromenda sunt à cōmunibus indicationibus, quæ à natura sciri-
 ri, & communi eius ratione petendæ sunt. de quibus in priori co-
 mentario, quantū visum est posse esse satis, sermo fuit habitus. neq;
 ab hac dissimilis est curatio, quam requirit obstructio ipsius nerui,
 vel eius condensatio. nam ea medicamenta erunt of portuna, cum
 à crasso lēto pituitosoq;ue siiceo ortum habuerint, quæ attenuare, se-
 care, detergere, digerereque possunt: siue de illis loquamur, quæ in-
 terius sumenda bibendaq;ue vel deuoranda sunt, siue de illis esse
 instillanda immittendaq;ue in aures, de qua etiam materia ex par-
 te in priori capite verba fecimus. vnde neq; iterū in præsentia repe-
 tenda sunt. si vnus itaq; medicamenti meminerō, cuius mentio ab
 empiricis fieri solet, quasi maximi arcani, quamuis nunc etiam mul-
 tis vulgaribus sit notum, & plurimum ab illis laudatum: ad alia com-
 uerteinus orationem. medicamentum autem hoc est adeps qui de-
 stillat ex anguilla cum ex ueru torretur: si in aures instilletur. potest
 autem ex ratione esse vilis. nā ex assatione comparat sibi naturā ab
 igne attenuandi, & digerendi perinde, vt de oleo lucernæ protulit
 Gal. qd simile euadit oleo veteri. redditur siquidē calidius, & partiū
 tenuiorum. Sed huic adipi, & id accedit, qd ex foliis lauri quæ fe-
 re ab omnibus interfinguntur frustis anguillæ dum ex ueru torretur,
 maiorem contrahit vim attenuandi, digerendi, & calefaciendi.
 Quod si tabes in meatu auris sit contracta, facta nempe obstructio-
 ne, exorta à multo illo excremento antri familiari ibi congesto &
 concreto, vel à grumo puris, auris calpio hæc auferre oportet. vel
 si sit opus medicamentis, ea quæ secant, deterguntque accommo-
 data erunt, nisi si quando nimis induruisse. nam & mollientibus
 aliquibus egerent. Quia vero uerruca etiam subcrefcens in me-
 tu auditorio potest auditui esse impedimento, quæ & ipsa subere-
 fcens detractione esset curanda, de eius curatione non sum multa
 dicturi: sed omnia comprehensus sum in hac summa. nempe
 quod eadem ratione illam esse detrahendam dixere medici, sicut cu-
 randum esse diximus polypum, si in naribus subcrefcit. Sed & quæ
 sit curatio commodam inflammationi in hoc loco exoriente, & aliis
 præterea tumoribus in aure præter ipsius naturam, abunde exposui
 mus. Sed neque de sibilo, & aliis vitiosis sonis qui obstrepere sæ-
 pius in aurib. percipiuntur, opus est sermonē longiorē hēre: si quis
 eorum memor sit, quæ de auris dolore dicta fuere. præsertim si sit
 à statu concitatus, nam & sonitus isti habent similem cum illo cau-
 sam

lam . nempe statulentum spiritum qui intra aurem inordinate mouetur , & mouet subinde aerem proprium , & internum . qui motus allidens instrumento auditus excitat eiusmodi strepitus , quare & similibus remediis tollentur , quibus statibus medentur , & proinde neque de istiusmodi strepitibus aliquin sumus magis particulatim aliquem sermonem habituri . Postremo ad hoc caput videntur pertinere & vermes , qui aliquando in aurium meatu solent viui reperiri , quod altero duorum modorum euenire posse videtur . aut enim exterius adueniunt , memini enim me quendam vidisse , in quo uermis aurem ingressus maximam illi tum pungendo , tum etiam dum continenter mouebatur , molestia afferebat : erat autem tinea qualis sepe in tritico gigni solet . ceciderat uero ex fissuris stabulati horrei , cui lectus subiacebat : aut uero ibi oriantur ex putri aliquo excremento , in aure congesto , uel ex aliquo ulcere nõ expertæ putredinis . eius uero curatio facilis est quantum ad uermes perinet , ut inde educantur . duplex autem est eos extrahendi ratio , aliquando siquidem uiui educi possunt , aliquo forpice si in loco sint , ubi conspici possint . sin autem in penitiores partes irreperint , ut nequeant conspici , aliquis adeps insulsus , ut gallinæ , anserinus , uel suillus efformatus in collyrij , uel glandis formam , uel ut nunc loquuntur chyrurgi , tentæ , indatur auri , ibique tantisper maneat , donec animal allectum eo cibo , quo plurimum delectatur , illi affigatur . nam simul cū adipe , si commode educatur , extrahitur & uermis illi affixus . aliqui etiam corum bene pexum , carminatum , aut lanæ uellus , auri imponunt , ut animal illud , quodcūque sit . nam pulices & formicæ facilius hoc pacto educuntur , dum mouetur per meatus ibi inuoluatur , & quasi irretitū extrahatur . alii etiam coto aut uellere inuoluunt auriscalpiū , ac alicui glutinoso , ac tenaci liquore imbuunt , ut esset resina terebentina uel laricea , aurique indunt , ut animal quasi uisco captum educatur . Interdum uero prius id genus animalia necantur medicamento huic rei apto , postea extrahuntur . necantur uero quibuscumque amaris , ut succo absinthii , marubii , camedrios , centaury præsertim minoris , & cæteris , quæ istis similia sunt . præcipuus uero , ut testatur Galenus septimo de facultate simplicium medicamentorum , est succus uel decoctum calamentii . Sed sepe accidit ut aliquid diutius , & solidius in auris meatum incidat , aut irruat .

R r t u r

sur, ut est lapillus aliquis, vel granum semēve aliquod, quod non parum illi negotii interdum faciesit, in qua re à medicis exquiritur auxilium. Verum quia id in hoc parum expectare à medicamentis possumus. nam horum extractio potius ad operam manuum & ad quædam instrumenta apta huic negotio pertinet. ideo in his non conteremus tempus, cum sint aliena a nostro instituto. Quare iam tempus opportunum esset ad oris affectus, & ad medicamenta illis curandis accommodata transire, nisi fortasse videant aliqua esse dicenda de ratione eorū medicamentorum, & eorum apud vfu quibus parotides curantur. ut ferè cū res hæc interdū non exigui: sed potius maximi sit momenti, videatur priuatim & ipsa seorsum, quæ proprium caput desiderare. Sed quia parotides in genere sunt, ut testantur omnes, præsertim vero Gal. inflammationum: magna ex parte etiam eandem cum aliis inflammationibus expectunt curationis, eandemque medicamentorum rationē saltem quatenus ad eas indicationes spectare videtur, quæ a natura morbi solent de promi. alioquin enim indicationes istius loci in quo exurgere consuevere parotides cogunt medicum deflectere aliquantulum per a communi methodo curationis inflammationis, & a communi eorum remediorum vfu, & hoc quidem in principio. nam in aliis istius affectus temporibus in idem parotidis ea ratio cum aliorum curatione tandem convenit, & ideo summatim hac tantum differentiā vel diuersitate exposita finem huic capiti imponemus. In hoc loco secundum aures ubi oriuntur parotides, a quo etiam hoc nomen apud Græcos habuere, sunt a natura genitæ quædam carnes glandulosæ vel adenosæ, ut Græci loquuntur, quales etiam in aliis quibusdam locis, quæ emunctoria ab Arabibus & à nostris iunioribus Latinis Arabum sequacibus vocantur sicuti sub alis & inguinibus. quæ sunt partes suapte natura imbecilles, atque ita a natura dedita opera genitæ, ut possint ab internis & nobilioribus particulis impulsæ excrementa quæ in illis retenta plurimum obesse possent, facilius admittere. unde quotiescunque aliqua fit superuacuum humorum impulsio ad has adenas, in his locis consistentes, statim peculiaris quædam insurgit indicatio, quæ variat communem eam methodum, quæ morbos ex fluxionibus factos respicit: quatenus saltem ad eorum principia pertinet. in quo genere sunt & inflammationes reliquique tumores, qui præter naturam ipsius particulæ insurgunt. in hoc autem varia fit eorum ratio in his locis, quod

reciucienda

reicienda sunt omnino ea localia remedia, quæ vim habent repel-
lendi influentes humores, & id ea ratione, quia non exiguum ea re-
pulsio periculum affert, ne retro cedentia vitiosa excrementa & in-
ternas præcipuasque partes occupantia, aliquod facerent maxi-
mum malum: quod præterea seruandum esse præcipiunt medici
in omnibus illis affectibus, in quibus natura tentare videtur expul-
sionem noxiæ materiæ ab internis partibus versus cutem, vel a par-
te aliqua nobiliori & magis præcipua ad ignobiliorem. nam ut Gal.
in libro de constitutione artis medicæ nos docuit, sæpe morbus ma-
lignus, expulsa mala materia a membris nobilibus ad ignobilia,
fit non malignus: sicut contra translata mala materia, ab ignobili-
bus ad nobilia efficitur malignus, qui prius videbatur cuiuscum-
que malignitatis expers. præsertim vero cauenda est in parotide re-
pulsio, quando illa in febribus: siue critice, ut aiunt, seu ratione sym-
ptomática exoritur. & hoc quia eiusmodi inflammationes, quæ in
his partibus, quas Arabes & iuniores emunctoria solent, ut diximus,
appellare, caro fieri solent nisi in malignis febribus & quæ pestilen-
tis naturæ non sunt expertes. sunt autem a natura quæ malignā ma-
teriam nititur ad has adenas, impellere, ut membra magis prin-
cipalia liberet & tueatur, quæ repelli reflectivè interius minime
posset sine graui periculo. quare nunquam quomodocumque fiât,
debemus per repellentia prohibere exitum vitiosæ illius materiæ.
quæ ad glandulosas carnes propellitur. & uel nihil eo tempore,
dum incipit, aut augetur tumor, agendum, quatenus ad eum tumo-
rem pertinet, & soli naturæ uniuersum negotium relinquendum
est, aut si quod agendum est, attrahentibus, natura, ut facilius ex-
pellat, erit adiuuanda, remediis, quæ uim habeant malam mate-
riam ex profundo attrahere, ut eiusmodi medicamentis, quæ his
uiribus sint prædita, uel interdum cucurbitulis. nam si facilis uide-
retur expulsio a natura facta, illi dimittendum esset hoc munus.
si uero tentare expulsionem uideremus, parum uero in expellen-
do proficeret, illi ferre opem expèdiret. Quod si niultus esse, na-
turæ in expellendo impetus, nihil quod ad expulsionem pertineret
esset agendum, ne confluentibus ad eum locum multis illis super-
flueis succis calidisque sæpius & acribus, ibi concitaretur aliquis
insignis dolor, qui laborem, inquietudinemque, & uigiliam affli-
cto corpori adderet, unde facile possent uires dissolui. immo si spō-
taneus esset confluxus, & dolor uehemens insurgeret, iuuanda qui

Cap. 2.

dem erit natura : Sed non in expellendo: verum mulcendo miti-
gandoque dolores. illis nimirum cataplasmatibus , quæ temperatâ
caliditate cum aliqua humiditate possunt id præstare. nam talia præ-
ter id quod non parum possunt sedando & deliniendo dolorem,
adiuvant etiam concoctionem influentium humorum , vt neque esse
in his sit repellendum, quâvis præceps & multus sit impetus. vt ne-
que tamen multus is in impetus contemnendus sit , & deferendus a
medico, præcipue si videat naturæ vires non eas esse vt possit tan-
tam copiam recte administrare. immo illi succurrendum erit , alio
modo refrenando impetum, per inanitiones vniuersi corporis, per
sectam venam, vel per medicamenta, sicut magis expedire illi visum
fuerit, quæ possint reuellendo auertere fluentes succos ad affectum
locum aliqua saltem parte. quæ autem sunt cataplasmata apta ad do-
lores vrgentes sedando ostendit Gal. 3. de compositione medica-
mentorum secundum locos, nempe quæ fiunt ex farina triticea, vel
hordeacea, vel seminis lini, & mulsæ , si ex decocto seminis lini, vel
althææ, vel chamemelini coquantur. nam quocûque horum vtamur
ita cōfecto, vt docet Gal. vt possumus vtiliter, vel si etiam, vel duæ
ex illis farinis simul miscentur utilis omnino erit cataplasmatiss cō-
positio. quia si aliquam refrigerationem requirerent ob id, quia flu-
xio plurimum esset calida, farinæ triticeæ ordeaceam adderemus.
sin autem maiorem digestionem & maturationem , farinam semi-
nis lini. sin vtriusque egeremus. omnes commisceremus . ita etiam
quatenus pertinet ad liquores ex quibus hæc coquenda sunt dicen-
dum videtur. nam mulsæ refrigerat magis, aliquantisper etiam at-
tenuat & non nihil detergit. althææ vero decoctum mollit magis
& maturat, aliquantisper digerit. sceni Græci vero decoctum ali-
quantisper calefacit, & pinde aliquo modo attenuat & digerit, quâ-
vis non nihil etiam astringentis habeat. pro ratione ergo naturæ suc-
corum quæ desluunt ad parotidem hæc sunt varianda, & vel illis so-
lis vel simul mistis expedit vti. Gal. autem 13. meth. ait sæpe oleû
calidum satis fuisse ad hoc munus . horum autem usus , non
modo utilis est quia dolorem sedent , verum etiam quia con-
coctionem horum humorum non parum iuvant . in aliis au-
tem temporibus postea curatio parotidis a communi aliarum
inflammationum curatione , aut nihil , aut parum admodum
euariat . non agendum , vt nobis ratio affectus indicabit. in-
terdum enim per propriam methodum inflammationum,
& so-

& solitā res erit tractāda. nēpe procurādū vt materia fluxa & admīssa in inflāmatione digeratur, aut (vt nunc loqui vulgo solemus) resoluat. Quod si magis videretur in suppurationē vergere, illis oportet agere quæ maturāt & pus mouēt. illis autē suppuratis, via aperiēda qua pus exeat, ita. n. facere cōsueuere nostro tēpore oēs ferē medici. aperiiri autē abscessus possūt uel ferro, uel caustico medicamēto. diximus autē ita cōsueuisse medicos hac nostratē pestate. qā atq; vt ex Gal. haberi pōt, tētabant discussionē puris inclusi in abscessu sine apertione, medicamētis quæ vim attrahēdi ex profundo haberent, præterea vero attenuādi, & digerēdi. hoc vero agebant, qñ nō erat abscessus magnus, & qui nō multā copiā puris, neque plurimum crassi cōtineret. nā alioquin, & ipsi aperiebant, aperto uero abscessu & vbi pus effluxerit, affectus iam transit in vlcus. & quia in his nullā est, quæ sit alicuius momenti, differentia, à ratione curandi alias inflammationes, quæ hoc vel altero uel tertio modo solent curari, & de aliis abunde in priori libro sermonem habuimus, quatenus ad medicamenta & eorum usum pertinet: ideo tandem huic capiti finem imponemus.

De medicamentorum compositione & usu, quæ apta possunt esse curandis affectibus oris. Cap. 16.

AD ea tandem accedamus quæ ad os pertinent & partes eius, & quia os in præsentia appellamus uniuersum illud spacium, quod intra labra comprehenditur, in quo præterea comprehenduntur continenturque multæ partes utiles & necessariæ & non modici momenti, eas recensebimus, & cum ordinem sequemur in illis exponendis, quem sensus præsertim uisus, dum introspicimus, nobis ostendit. primum ergo labia intuemur. de quibus non ideo cur multa à nobis sint dicenda, præsertim si institutum nostrum in hoc compendio uelimus sequi. quamuis. n. ulceribus, uulneribus, & tumorib. præter naturā cuiuscunque generis, resolutionib. & conuulsionib. sicuti in distortionē oris solet sæpe euenire, corripiantur, quia tñ proprius scopus hoc loco præsertim uersatur circa rōnē compositionis & usus medicamentorū, quæ localia passim in præsentia dicuntur, in quib. præcipua ratio a natura læsæ particulæ sumēda est. & quatenus ad istud pertinet, nō est aliqua in his priuata ratio differēs a communi ratione eorundem affectuum, qñ

Victoris Trincauellij

in alijs carneis particulis oriuntur: præ et rem erit hoc loco, ea re-
perere, quæ magis apte tractata sunt in alijs locis, præsertim vero in
primo libro. Labia subinde sequuntur gingivæ, & illis impositi den-
tes, interiusque spaciū illud, quod linguā continet, cuius duplices
sunt partes, superior est quæ palatū dicitur, à Græcis vero *ρανισ-*
cus, quasi parvū cælum, & inde fortasse acceptum est a vulgaribus
in his locis, quod cælum oris eam partem appellant, & inferior quæ
sub lingua est, & ab ea tegitur, quæ propriū nomen, quod ego
meminerim, non habent. mox ex lingua quæ gustus præcipuum est
instrumentum, & efformandi sermone. præterea vero masticatio-
ni non parum utilis est. cibum enim sub dentes impellit ut commo-
dius ab illis teratur, quem etiam varie inuertit ad radicem linguæ
duæ sunt glandulosæ carnes quæ tonsillæ à Latinis, à Græcis vero
αμυγδαλαι in medio vero ab extremo palato pendent columella, quā
Græci *σιμπα* vel *σπριγιορα* appellant. interius vero spaciū faucis
à Latinis, *ασπυς* vero à Græcis dicitur. postremo ad fauces inti-
mas pertinent duo meatus illi maxime insignes, quorum alter in
partem anteriorem vergit, quia via est spiritus ad pulmonem, & as-
pera arteria dicitur, cuius supremum caput ad fauces est, id quod
à Græcis *αρτηρα*, guttur à Latinis dicitur. alter vero meatus pos-
terior via est ad ventriculum per quem cibus potusque in ventri-
culum fertur, & *ισοφαρυγος* Græce dicitur, Latine vero gula. Sed primū
de his agemus, quæ ad partes oris quæ magis ex irorsum vergunt, ut
sunt gingivæ, dentes, palatum, lingua & quæ pars sub lingua te-
gitur. mox vero de illis quæ ad fauces pertinent ut sunt tonsillæ &
columella atque guttur & gula. sunt autem affectus quidam qui
sunt omnibus fere particulis communes. Gingivæ ergo solent a ve-
hementibus cruciari doloribus, qui possunt a varijs causis, & affe-
ctibus concitari, nempe vel ex transmutatione propriæ & naturalis
suz temperaturæ, cum confertim, & repente fit: vel ab illis quæ con-
tinuum solvunt: & hæc, vel ab externis & procacitatibus causis effici
possunt, vel ab internis & antecedentibus. ab externis sicuti ventis,
cibis nimis calidis, vel acris, aut minus frigidis, item & potu &
alijs tandem quæcunque in os ingeri possunt: præterea quæcunque
exterius possunt tūdere, erodere, pūgere, & incidere. internæ vero
& antecedentes causæ sunt fluxiones calidorū vel frigidorū humo-
rū qui possunt sua humiditate putrefacere gingivas & alias partes,
& acrimonia pūgere, abradere, & tandem ulcerare, & transmutata
etiam,

etiam partis temperatura dolores concitare, qui sæpius quidē solent a capite & cerebro, cui subiectę sunt destillare, interdū tamen, & ex inferioribus, sæpius autem a uentriculo solent male affici ratione uiciorum excrementorum qui ibi continentur, a quorum uaporibus ascendentibus uiciantur oris partes. Sed ex eisdem causis possunt exoriri in his oris partibus præsertim carnis inflammationes scirrhi & alij tumores præter eorum naturam, qui quandoque sunt malignitatis, & interdum non parum, participes. Solent præter alia interdum fieri, quædam carnis excrescentiæ in intimis gingiuis ad ultimos molares dentes, quæ *parulis* uel *parulis* a Gregæis dicuntur *πάρυλ* enim gingiuā significat, qui affectus dolorosus est, & in genere inflammationum est is affectus. præterea uero ex nimia laxitate, & redundancia uiciosi sanguinis, præsertim biliosis (ut refert Actius) & erosione fiunt cruentę gingiuę. Sed affectus illi, qui & alijs omnibus ferè particulis communes, unam itidē cōmunē habēt a rationis rōnē, qđ si aliqua in his particulatū differētiareperiatur, illa a diuersa particularū natura occasionē habet, qđ sæpius a nobis prius expositum est. Vnde cū os ueluti ostiū sit per quod ingressus est tum ad uentriculū, eorū omniū, quæ bibenda & denoranda sunt, tum uero ad pulmones, & sæpe, uel nobis etiam nolentibus, quę ore assumuntur illabuntur in pulmones uel uentriculū, & proinde ab illis medicamentis, quātum fieri potest, in affectibus harū partiū curandis cauendū est, uel saltem illis caute utēdū, in quibus aliqua sit pernicioſa qualitas: si in uentriculū uel pulmones illabuntur. unde quatenus ad generalia theoremata attinet ea dcm sunt, in omnibus nempe repellentibus in morbi principio esse opus, mox repellentibus admiscenda esse digerentia, atque subinde digerentia augenda, de repellētib. uero semper ad finē vsque detrahēdū: si affectus ad genus inflammationis attineat. sin autē ad genus ulcerū, exiccantib. imprimis, sed præterea, & detergentib. frequēter. Vt in ea præcedāt remedia, quæ præsertim & primū causam respiciāta habita ratione fluxionis a qua hæc semper ferè excitari solent: earū que particularū, unde ea extremētia defluūt, vniuersa uero hæc ratio consistit in procuratione vniuersi corporis, earū quæ partiū quæsu peruacuā materiam ad has amandant. nempe ut per uacuationem sectione venæ, uel purgatione intercipiatur, & auertatur fluxio. Sed hæc ad aliud, nō ad præsens institutū pertinet: sicut & de cōgruēti uictus ratione agere. Quare conuertamus tandem sermonum par-

ticulatim ad remedia accommodanda his morbis curandis, & primum de illis agemus, quæ referuntur ad inflammationum genus, quæ tamen non sunt ratione loci graves morbi, vt in gingiuis palato lingua & aliis quæ his natura attinent. nam de internis scorsum loquimur. Itaque cum gingiue & pellicula quæ lingvæ & palato prætensa est dolent, sicuti quæque vehementi cruciantur dolore, qui ab incipiente inflammatione habet omnem occasionem. statim considerandum quod sit inflammationi occurrendum, ea seruata methodo quæ communis est omnibus inflammationibus, nempe repellentibus primum, mox repellentibus quidem: sed vt simul digerentia immisceantur, & illis semper magis autis quanto magis procedit inflammatio. Sed postea cum repellentia refrigerent & adstringant, & illa varia diuersaque sint, & diuersorum ordinum quatenus ad vires & vehementiam pertinent, sit vt non æqualiter, & indifferente, semper his laborantibus particulis possint aptare. quare horum discretio apprimè erit medico necessaria. istius vero rei ratio a natura ipsius particulæ erit petenda ut a mollitie, duricieque, ab eius sensu, a situ. nam partes hæc molles sanè sunt, & duplici sensu, & eo quidem acri præditæ gustu, & tactu sunt; expositæ vt facillime illis medicamentis occurrere possint, quæ per se neque valida & violètia medicamenta, quæcumque illa sint facile ferunt, sed melius a mediocribus se habent. si namque adstringentibus repellentibusque vehementioribus vtamur, similè, vt de cõp. med. secundum loc. affectionem contusioni imprimimus. vnde irritatur dolor, & subinde magis incitatur fluxio. Contra vero dentes qui dura constant substantia, cum dolent & inflammatione tentantur profundior neruus ad eorum radices, uehementiora remedia non bene ferunt, sed etiam talia desiderant, & præterea etiam vt illis sint intermixta, quæ acria, & tenuium sint partium, vt facilius fiat aditus, & penetratio ad internas & profundiores partes. vnde consueuerunt antiqui ex aceto acerrimo coquere medicamenta ad dolorem dictum. ratione vero alterius sensus, nempe gustus cuius particeps est internum os, insurgit & alia indicatio, quatenus ad sapes medicamentorum quibus. vt in curandis his inflammationibus pertinet. ea vero est, quod cum horum medicamentorum multa sint, quæ horribilis & ingratissimi sunt saporis, quo maxime cruciantur partes hæc, nec modo dum illis utuntur, sed postea et remanet malus ille eorum sapor longiori tempore, vnde præterea & sæpe subuertit venter, & vt diximus, præterea multa illorum illapsa in interiores meatus subiectis particulis non parum negotii facessere. propterea talia quantum fieri potest sunt declinanda, & illis vitæ dum

dū q̄ aut gratiora, aut minus ingrata sint, & p̄inde in doloribus gingiuarū & aliarū partiū oris, quorū meminimus. Gale. prae oībus sc̄rē aliis medicamētis laudat oleū lētifcinū, vt pote qđ sit moderatū medicamētū. astringit. n. modeste, vñ sit vt repellat citra vllā noxā, digerit ēt aliquanto. calidas siquidē aliquas partes habet, & digerendo aliquatūlū vacuat intentā particulā, atq; ita aliquantisper dolor remittitur. verū ait oportere vt oleū nouū sit. quia olea, cū inuetera scūt, calidiora sūt & repulsiōi ineptiora. noluit aut vt eo frigido vtamur, quia in his partib. actuale frigus, vt ait Gal. 4. de fac. simp. med. mordax & dolorosum est. Sed calefieri in duplici vase, quia quæ ad ignē calefunt calorē quendā acré magis & mordacē contrahunt. Sed cū tale oleū lentiscinū nō sit ita in prōptu vbiq; , neq; ita paratū facile reperiatur, iō proxime ad illud accedit oleū rosaceū, quod cōpletū appellat. differunt tñ quatenus rosaceū aliquāto frigidius est, & proinde maiore ēt vim repellēdi habet, nō tñ tantā dīgerendi, quantā lentiscinū. Dioscorides vero ad inflāmationes gingiuarū laudat vinum in quo efferbuerint folia rosarum aridarum. ita tñ vt post cocturam, liquor percolatus ex eis exprimatur, eoq̄ue gingiuarū p̄ena deliniatur. neque absq; rōne laudatur hoc medicamentum, cum ex aridis rosis possit refrigerare, & repellere, ex vino aut aliquantulum digere. Sed lentiscinum oleum videtur aptius, nam oleū molliens pōt magis dolores sedare, nā crederem & decoctum lentisci etiam quando eius oleo careremus posse conferre, minus tñ quam oleum. quamuis possemus addere lentisco semina sconi Græci aliqua aut lini, aut aliqd radicū althææ. Laudat p̄terea Diosco. & verūq; tribulū si gingiuarū ex oximelle illinātur. nā tribulus quidē refrigerat & repellit, vñ Gal. de fac. simp. med. ait esse, cōtra gñationē inflāmationē, cui addit fortasse mel, ut p̄terea aliqua ēt ad sit vis digerēdi. Verū q̄a sæpe ēt accidit, vt dolores hi gingiuarū ex inflāmauone his repellētibus, digerētibusq; medicamētis neq; tolli possint neq; deliniri, q̄a in suppurationē inflāmatio tēdat. nō est resistendū reluctandūve, naturæ, sed potius iuuāda est, atque p̄curā dū vi maturetur, quo citius fieri poterit. erūpēte etenim pure desinet dolor, & cū ita affectus in vlcus transeat; reliquū postea erit, vt medicamētis locus is tractetur, statui & naturæ viceris accommodatis, de quibus agemus paulo post. adiuuabunt vero maturationē, suppurationēq̄e inprimis decocta huic officio apta, vt radicū althææ, caricarum pinguium, passularum non modo istarum exilium, & nigrarum, quæ in multo vsu sunt, in p̄sentia verū & illarum maiorum

Victoris Trincauellij

maiorum à quibus acini vel semina possunt eximi (vt sæpe præci-
piunt antiqui medici) vt pote quia non parum astringant, & exiccēt
quæ coqui, vel ex aqua possunt, vel ex iure aliquo pingui . nam & id
ad concoctionem maturationemq; adiuuat, atque dolorem lenit, tū
molliciendo tū vero aliquantulum digerendo, sed & aliquid Zacchari
immisceri poterit, ex omnibus autem his, vel ex aliquibus quæ ma-
gis in promptu erunt fieri potest decoctum ad consumptionem me-
dietatis iuris : si ius sit acceptum quantum videatur exposcere rō
portionis medicamentorum , vt tñ sine sale sit ius. & calido eo vta-
mur aliquantulūque in ore detineamus atque sæpius ita agamus.
sæpe tanē simpliciori medicamēto sumus vsi & felici successu. Me-
minere tamen medici antiqui quarundam inflammationum quæ in
externis interorsum gingiuis. aliquādo oriuntur & *ἐν τῷ στόματι*, dicuntur
à Græcis, quæ potius vt dixeret Aetius & Paulus sunt quædam car-
nis excreſcentiæ ab inflammatione: quarum interdum comes febris
est & vehemens item dolor vt ne os quidem aperiri possit & quam-
uis ad epulidas curandas descripta reperiantur medicamenta pluri-
mum acria, vt pote quæ & atramentum sutorium admittant & alia
istius generis. id tñ sano modo intelligendum est, vt optime distin-
xit Aetius. Quia talia medicamenta versus sinē sæpe sunt necessaria
quando ea sola viget indicatio quæ à super excreſcentia carnis de-
prompta est, illa enim contrahi nequit, reprimique nisi per illa quæ
non parū desiccant astringuntq; & detergūt ēt talia. n. sunt quæ de-
scribuntur à Paulo, Aetioque & à Galeno ex sententia tamen Ar-
chigenis, componuntur siquidem ex erugine, sutorio atramento,
ox galis, ex alumine & eiusmodi aliis . Verum inter initia dum fe-
bris dolorque plurimum affligit. consulit Aetius, vt his omnibus
dimissis laxatibus utamur, vt sunt mulsa tepida, vel cremor hordei,
decoctum seminis lini & similibus, in quibus vis est leniendo, dolo-
rem sedare, atque non nihil digrere. dolor enim qui vehemens est
eo tempore vim maiorem habet in indicando . Sed vbi iam defer-
buerit inflāmatio, & eatenus dissoluta sit dolorque remissus, ut iam
possit ægrotans, hiare, tunc apta sunt ea, quæ extuberantem carnē
desiccant, & reprimunt, cui officio maxime apta sunt, si Aetio cre-
dimus, medicamenta arida. in quibus ait ille, esse id cuius conse-
ctionem ipse describit. sit vero ex sulfure ignem non experto, pipe-
reque & scissili alumine exusto omnibus pari pondere triis, & in-
spersis epulidis. Sed alumen omne vltum, & Gallæ trita. & tamquā
aridum

aridum medicamentum insperſz. quæcunque enim valide delieſcāt & aſtringunt, poſſunt huic aſſectui eſſe medicamenta congruentia mihi ſæpe ſatis fuit medicamentum id, cuius, vbi de polypo eſſet ſermo, mentionem fecimus. nam ſicut poteſt polypum abſumere & atterere, poterit etiam epulidas & parulidas. & quamvis eius vis & operatio tardior ſit, eſt tamē ſecurior: vtpote in quo nihil ſit, quod noxiam habeat qualitatem. omnes tamen: ſi morbus is pertinax & plurimum tam medico, quam medicamenti ſit renitens, ad acriora medicamenta accedunt, vt eſt chalcitis, ſutorium, atramentum, ærugō, & vt ait Actius, vſque ad ea tandem medicamenta, quæ carnem erodunt, & detrahunt. & ad ea quorum vſus ſolet eſſe in depaſcētibus gingivarū vlceribus, de quibus paulo poſt ſermonē ſumus habituri. Gingivarum itaque vlcera & partium ad ipſas pertinentiū, ut & diuerſas occaſiones unde orta ſunt habuere, ita etiā quantum pertinet ad initium curationis, diuerſimode tractari ſolent. nam aut ab externa cauſa excitata ſunt, ex incifione, punctura, aut ab alia quo medicamento, vel medicamentosa re, quæ abraderet, & erodere potuerit, aut ex interna, & id duplici modo, quia vel ex rupto aliquo abſceſſu, vel ex acri & erodente malorum humorum fluxione. diximus autem quantum ad initium curationis ſpectat, quia aliqua horū quæ accidunt à fluxione, necceſſe eſt, vt donec durat fluxio foueatur à plenitudine vel cacochymia, aut vniuerſi corporis, aut aliquarum particularum præſertim capitis à quibus fouetur fluxio, à quibus prior ſurgit indicatio, procurandum eſſe vt ſæpiſſime iam dictum eſt, quod intercipiatur reprimaturque fluxio illis rationibus, quæ ſæpius item à nobis fuere expoſitz. At vero ſi nulla aliunde petenda ſit indicatio præterquam ab vlcere, & ab affecta particula: tūc variatur pro ratione earum differentiarū quibus vlcera diſcerni, ac diſtingui à medicis ſolent. ab eis nempe depromptis propriis indicationibus, & ſcopis, de quibus non eſt in præſentia cur multa dicamus, cum hæc omnia in primo libro ſatis diſtincte, & diligenter fuerint expoſita, vt nunquam tamen obliuioni tradamus eam indicationem, & conſiderationem, quæ petenda eſt à natura particulæ. Et quomnis quādo ſponte & à nulla externa cauſa vlceratur: nequeat id plerunque fieri: niſi à fluxione acrium & erodentium excrementorum, & proinde ſit necceſſe vt curationi ſi initium ſit ab hoc capite nē pe vt liſtamus, remoueamusque fluxionem, tum reuulſione uacuationeque, tū temperatione & mitigatione mordacitatis eorum excremen-

Victoris Trincauellij

crementorū , in quo officio præcipue sunt balneæ aquæ dulcis
 (vt testati sunt Gal. & alij præci medici, nisi aliqui fluxio acridinis
 sit expers quæ sit in causa cur nimio humore madidæ gingivæ pu-
 trefcant, & subinde exulcerentur. nam tunc & vniuersum corpus,
 & caput erunt inanienda & refecanda) mox vbi res priuatim loca-
 libus remediis erit tractanda. quorum administratio ad præsens atti-
 net institutum. nam cætera alibi fuere tractata & propria ulcerum
 curatio desiccatione perficienda tandem erit, cui si aliquid austeri,
 & astringētis sit adiunctum, præstantius, vt sæpius dictum est, erit
 medicamentum, vt pote quod possit arcere: si quid à circumstanti-
 bus partibus, excrementitiæ materiæ esset mandandum. & si qui-
 dem vlcus simplex sit, quodque nullam præterea aliam habeat dif-
 ferentiam, quæ aliam per se habeat indidationem, communibus &
 familiaribus lotionibus, quæ ex aptis decoctis fieri solent, curabun-
 tur, vt si arida rosarum folia ex vino non nihil austero coquantur,
 & colluatur os. Quod si videretur esse opus vehementiori medica-
 mento: his addi possunt cytini mali punici, vel malicorii, fortius et
 esset si gallæ adderentur. possemus & ex his aridum conficere medi-
 camentum illis tritis, & in puluerem reductis, vlcerique inspersis:
 Sed, & coralius lapis ita, vt solet passim paratus, poterit inspergi, &
 erit facile, neque ingratum medicamentum. pompholix vero, quam
 solent vulgo tutiam vocare, ita vt consuevit lauari teri & parari, op-
 timum esset medicamentum, nisi quod esset cauendum, ne quando-
 que cum saliuâ deglutita deuoraretur. Sed facile id cauere poterit, si
 post adhibitum medicamentum aliquanto temporis spacio interpo-
 sito os abluatur aut vino aliquo aliquantulum austero, aut aliquo ex
 prædictis decoctis. Quando autem vlcus sordidius videretur, & ali-
 quam præterea deteriorationem desiderare, mel rosaceum facile, & non
 ingratum esset medicamentum: nisi interdum nimis acris sensus es-
 set in vlcere, ita vt morderi videretur à rosaceo nielle, sicut interdū
 in aliquibus obseruauimus, vt alias et testati sumus, nepe qđ rosaceū
 simplici melle mordacius est medicamentū. tunc aut simplici melle
 vtendū esset, aut syrupo rosaceo, qui conficitur ex succo rosarū &
 zaccharo, vel his simplicibus vel eis immixtis prioribus aliquibus
 decoctionibus. quibus si aliquid esset addendum, his & aliquantu-
 lum myrrhæ addi poterit. Noui præcos medicos, vbi res diffici-
 lior videretur, & iam eam malignitate in induisset, vt in ordinem re-
 ferri eorum vlcerum posset, quæ aut depasceant aut putrida, appel-
 lantur:

lantur, aut cacoethe dici solent, ad ea medicamēta cōfugisse visos esse, quæ acria sunt & nō vsquequaq; in oris affectibus tuta, nisi caute tractētur, vt sunt ærugo, atramentū sutoriū, chalcitis, myli, sandarachæ, & reliqua istius ordinis: Sed quia istiusmodi medicamētōrū rōnē & vsum supra in tertio libro exposuimus: iō in illis repetēdis nō cōteremus iēpus. Sed quibusdā explicatis, q̄ prinēt ad rōnem remedii, cuius meminit Gal. 5. libro de cōp. med. per loca, qđ mihi præstantissimū videtur in his malignis vlceribus; ad medicamēta apta ad dētiū affectus curandos sermonē cōuertemus. re mediū autē hoc qđ facile, & mea sententia, tutū, ad cauteriōrū genus referri pōt, & eorū quæ, ni fallor, actu ignea dicuntur & urentia à iunioribus. nō q̄ urant quidē ignēū & vrentē oīno calorē vt ferrea, metallicaque instrumenta dū igniuntur, referre solent, sed quia calore actuali, vt ita in præsentia dicam, inurunt. præcipit enim vt specillo aliquo ex altero capite lana aut coto inuoluto, ac in oleum feruescens demerso vlcerata gingiua foueatur, aut potius inuratur, eatenus, dum earū caro à specillo ita parato albescat. nam illud erit signum, quod satis exustæ sint. hac autem potius inurendi ratione, quam ignitis metallicis instrumentis aut causticis medicamētis vsus est, quia in hoc non est ita efficax operatio vt possit denti officere, aut profundius neruum lædere, qui est ad dentis radicem. præterea, cum citius in oleo deferuescat igneus, & feruens calor, postea vbi ad suum naturalem statum redierit, vel ad teporem, habet sedandi dolorem & inflammationem: deinde vero aliquo smegmate arido (vt Græci dicunt) hoc est medicamento arido inspergendæ & affricandæ, qualia multa sunt, quarum paulo ante meminimus, nempe gallæ addita modica myrrha, aut coralloꝝ bene paratorū, aut rosarum aridarum vel malicorri, vel id genus aliorū. mihi satis probaretur medicamētum ex granatis, de quo egimus, vbi de tollendo narim polypo ageremus. siue succo vtamur prius ex illis expresso, siue ea parte quam tritam in pastillos redigi diximus. his eisdem medicamentis poterit quis vti, vel aliis his similibus, ad desiccandas contrahendasque gingiuas, cum nimio humore madidæ quasi prægnantes in tumorem tolluntur. antiqui autem auctores laudant lambruscę flores ex lamina assatos & tritos, si eis gingiuarū fricentur. præterea & alumen, & multa alia, quæ eodē respiciunt, & identidem eisdem succurrere gingiuis possumus, si cruorem effundant.

Victoris Trincauellij

De illis quæ pertinent ad curandos male affectos dentes. Cap. 17.

DENTES quamuis quatenus ad rōnem durioris substantiæ. pertinet, magis ad ofsium naturam accedant, alia tñ rōne ancipitis naturæ videntur, & mediæ inter ossa & alias molliores partes: ut caro & nerui. imo & quādā præterea rationem retinent, quæ ab vtriq; horum genere euariant. nam, & sentiunt non solum per gingiuas, & neruos qui à natura singillatim illis distributi, quamuis ab illis sentiendi facultatem habeant, sed per propriam etiam eorum substantiā, cuius prærogatiuæ expertia sunt cætera ossa, in qua dentes cum carne neruis conueniunt, in hoc vero ab vtrisque particulis dissentiant, quod semper ad extremam vsque ætatem crescere possunt, quod consulto à natura factum est, quia cum munus hoc à natura habent, ut solidiores cibos atterant: in quo, & ipsi non parum atteruntur, nisi huic incommodo naturā prouida consuluisse, breui tempore animal ab hoc officio & vtilitate, quæ non pauci est momenti, destitueretur. Quibus ita positis & expositis, possumus inuestigare quot affectibus, & cuius naturæ obnoxii sint dentes. inde ex his enim facile deinde est rationem componendorum medicamentorum inuenire, ac modi præterea, quo eis oporteat uti. cum itaque sensu sint præditi, tum ratione suæ substantiæ, tum priorum neruorum, dolorum capaces sunt, & illorum quædam maximorum: tum præterea diu & ultra terminos aliorum ofsinum cæterarumq; corporis partium, ex proprio alimento crescere possint, necesse est ut etiam ex assumpto alimento ad eos influente facilius eorum substantia dum sit incrementum, & quo quo modo intumescant. quæ ita se habent possunt interdum nimio influente alimento, ut nimis extendi & quasi intumescere, & hoc modo inflammatione corripi, vel si inflammationem appellare nolumus, erit saltem affectus inflammatione similis. interdum vero periuria alimenti grauelescere, & quasi connascere. quod ubi fiat, cum exquisitè & integre nequeunt replere alueolos maxillarum, quibus inati & infixi sunt: & proinde nequeunt vltèrius ita firmi, & immoti ab illis contineri, quare labore moueri quæ in illis est necesse, quæ affectio senibus familiarior est, ac non æque omnibus neque eodem tempore, accidit. nam aliis id accidit tempestiuus, aliis vero serius pro ratione diuersæ eorum naturæ, aut diuersarum occasionum, vel ex ratione victus, vel ex externis causis, quæ non ita in ætatem referenda postea

postea sunt. Sed in causas eas, quibus & alia ætates possunt esse subiectæ, affectio vero ex plenitudine quam inflammationem appellauimus, frequentior est in ætate iuuenili. sed de his magis particulatim agemus. sicuti autem hæc ex influxu alimenti accidere possunt, ita non minus dentes aliis fluxionibus exposti sunt: præsertim vero de stillationibus, quæ à capite fluunt. nam interdum, imo sæpe, hac humiditate perfusa ligamenta dentium, & innudentia laxiora sunt, nec ea solum: verum & gingiue, & subinde occasione sunt ut labent & vacillent dentes. Sed non solum ligamenta, & gingiue possunt perfundi his defluentibus viciosis succis: sed & dentes eos admittunt, sicut & alimentitiam materiam & ab ea variè affici pro varia illius materiæ ratione quia si acris fuerit, possunt erodi perforarique. si apti ad putredinem, inde & dentes computrescunt si fuliginosa nigrescunt siue talis fuerit ex natura siue comparauerit sibi cum colorem ex corruptione, & putredine. quamuis & alia ratione colorem immutare possint, atque erodi. nempe si reliquæ aliquæ ciborum comestorum remaneant inter vel circiter dentes interdum ibi putrescentes, male eos afficiunt, qui eos vel erodunt, vel putrefaciunt, vel ibi exiccatæ & quasi excoctæ tofosam naturam induunt, & scabros turpesque reddunt dentes. Præter hoc autem & similes affectus: alteri etiam sua quadam peculiari ratione subiecti, quæ *αιμαδία*, Græce dicuntur. apud Latinos vero non habet priuatum aliquod nomen: nisi quod stupor dentium dicitur, qui ortum habet ab acerbo vel austero aliquo succo, aut externo, aut interno. externo, ut sunt succi acidorum vel acerborum. interno autem, sicuti acidæ pituitæ & melancholici humores, quæ aut à capite defluerint, aut à ventriculo vomitu fuerint reiectæ. Quater uero sergo ad eos

affectus quibus dentes corripì solent, & communes fere omnibus esse possunt, hi aut omnes aut præcipui sunt. pueri uero contra dentire incipiunt, multos interdum dolores deterioraque symptomata antea quam è gingiuis illi erumpant perpeti solent, quamuis non eque omnes: alter enim alter solent maiora pati symptomata.

Morte præceptus auctor ulterius progressus non fuit. hoc autem frag-
mentum, quod ad nos pervenit, edere, ac tibi offerre volumus. tu
eo itaque frue & nos, industriamque & diligentiam, qua usi fui-
mus, ut tibi prodessemus amice lector, ama, & uale. dum aliorum ope-
rum huiusce auctoris editionem paramus.

F I N I S.





